





BIBLIOTHÈQUE
DE M. NOËL GUENEAU DE MUSSY
JUIN 1885



52033/E





Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b28755728>

55150
WENCESLAI TRNKA
DE KRZOWITZ

S. R. I. EQUITIS MEDIC. DOCT. IN REG. UNIVERS.
PESTIN. PRAX. MED. PROF. P. O.

HISTORIA HÆMORRHOIDUM


OMNIS ÆVI OBSERVATA
MEDICA CONTINENS.

VOLUMEN I.

OPERIS POSTHUMI
EDITIONEM PROCURAVIT
FRANCISCUS SCHRAUD

IN EADEM UNIVERS. INSTIT. MED. PROF. P. E.

VINDOBONÆ,
APUD CHRISTIAN. FRIDERIC. WAPPLER,
MDCCXCIV.





Lectori benevolo

Franciscus Schraud

S. P. D.

Quam cl. WENCESLAUS TRNKA primarius quondam apud nos rerum medicarum Professor inivit rationem excolendarum privata etiam lucubratione earum disciplinarum, quas summo non minus cum emolumento auditorum suorum; quam insigni nominis sui ad patriæ procures commendatione publice profitebatur; eam tanta & adornavit mentis perspicacia, rerumque multiplicium comprehensione; & executus est adcuracione, patientia, assiduitateque laboris, ut & obtrectatorum, qui primorum ut præcipue solent viri cl. laborum dignitati variis artibus intercesserant, brevi represserit invidiam, & bonis omnibus non mi-

nus satisfecerit per ea, quæ sunt ab ipso profecta; quam plurium similis doctrinæ speciminum desiderium commoverit.

Solent, qui aut novis rebus inveniendis, aut certe expoliendis, aptandisque veteribus amant inclarescere, cumque ingenio ferace rerum talium præcipuam se aliquam divinitatis particulam profiteri gloriantur; solent, inquam, hi minus magnifice de iis sentire, qui, quæ promiscue sunt ab aliis inventa, atque proposita, ipsi ordinata serie componunt, & omiſſis, quæ inuentis suis illustrandis, ornandisque una quæque ætas affudit dilucidandi, explicandique argumenta, posteriorum temporum lectoribus ob mutatam idearum communium, atque obviarum conditionem tædio, molestiæque futura; summa solum rerum ipsarum capita, æquabilis, perpetuæ veritatis, nullasque adeo ob seculorum yicissitudines magis, aut minus gratiosa; civibus suis scienda, memorandaque proponunt. Et tamen Maximilianus Stollus summus ut observandi magister; ita

ita inveniendi artifex non dubitavit publice exoptare, ut omnium ætatum de omnibus rebus medicis inventa Trnkaiano calamo scriberentur: sapienter, ac honeste confessus, non minus valere iudicium debere in censenda inventorum veritate, dignitateque; quam ingenium in inveniando.

Itaque cum vir cl. WENCESLAUS TRNKA scriptam sua ipsius manu, omnibusque paginis multo ante; quam e vivis decederet, absolutam de ani in primis hæmorrhoidibus historiam duobus voluminibus comprehensam reliquisset; cum idem de ea sæpius ad familiares professus esset, se sibi supra; quam usquam alias, hoc in opere satisfecisse; cum denique vel hoc ipso, quanti cum suum laborem faceret, testatum prodidisset, quod codicillo sancitum voluit, ut is bibliothecæ universitatis nostræ muneri, pignori que perpetuo sui in hanc animi traderetur; non dubitavi fore, ut bene videar de re literaria mereri, si qualemcunque meam operam in historia illa typis

pis edenda collocarem, caveremque, ne optimo opere præstantissimi auctoris orbis literarius careret. Quo edendorum viri cl. posthumorum facto initio si intellexero gratiam me apud studiosos, curiososque rerum medicarum inivisse, ad edendam hæmorrhoidum vesicæ historiam ab eodem concinnatam, bibliothecæque nostræ manuscriptis additam, & nonnullas fortassis inaugulares dissertationes, quas vir cl. non solitus est perfunctorie scribere, gradum sum facturus. Vale

Scribebam Pestini Kalendis Martiis

MDCCXCIII.

Præ-



P r æ f a t i o.

Tria præprimis sunt, opinor, quæ hæmorrhoidalem in morbum a me impræsentiarum in lucem prodeuntem cadunt: frequentia, gravitas, varietasque in affligendo. Ad primum omnium animum advertenti continuo apparebit, vix ullam aliam ægritudinem e diuturnarum censu tam esse mortalibus popularem quam sunt hæmorrhoides: cujus equidem frequentia cum numerosæ sint causæ, tum principes illarum omnino sunt labe a majoribus accepta, & vulgata jam exlex vivendi ratio. Hinc paucos reperire est, qui nullos unquam
hujus

hujus mali ut minimum nŕsus experti fuiŕŕŕent. Tacita me ŕæpe tenebat admiratio, dum ægrŕi me conŕŕulentes per initia ne eminus quŕdem hæmorrhoides ŕuŕŕicatum, deinceps vero in ŕymptomatum examine pedetentim progrefŕŕum, demum pene inŕcientem ac velut invitum in hæmorrhoidum adyta deduxere. Frequentiam porro gravitas morbi ŕi non ŕuperat, certe exæquat, ŕive ad ŕymptomatum numerum juxta, ac vehementiam, ŕive effecta, multiplicemve illius eventum reŕpexeris. Graviffimæ proŕfecto ŕunt ŕæpenumero hæmorrhoides, dum eruptionem facere moliuntur; graviores etiam, dum perpetim, nimioque impetu feruntur; ac ne hilo quŕdem leviores, ubi vel per ætatem, vel aliunde injeçta mora receptui canunt, ut leçtione hujus libri ŕatis ŕuperque conŕtabit. Varietas denique in affigendo tanta eŕt, ut non abs re mirari ŕubeat, unum eundemque morbum tot ŕchematicis ab ŕe etiam maxime diŕŕidentibus laceŕŕere poŕŕe, quod nec PROTEUM nec MESTRAM

ERYSICHTONIS unquam induisse memoriæ pro-
 ditum est : nihilo tamen sc̄cius haud alius
 quisquam morbus usque adeo a medicis sus-
 que deque est habitus , ut alii indolis ejus haud
 pro eo ; ac par erāt, gnari omnem illius vim,
 ac potestatem tanquam nubem pro JUNONE
 oblatam contemptui habentes illum ubique
 reprimendum ac velut in semine , quoad ejus
 fieri possit, suffocandum, alii contra parum
 dispicientes, quid symptomaticas inter, atque
 insalubres, & criticas hæmorrhoides intersit,
 easdem nunquam non promovendas foven-
 dasque esse contenderint, oppidoque pauci
 fluxum hunc vel provocandum vel abigendum
 justis circumscripserint limitibus. Quantum
 vero a prioribus illis ægri capiant detrimenti,
 non est, cur multis id verbis persequar : id
 unum hic pro humana fide, justitiaque silen-
 tio mihi prætereundum esse non arbitror, per-
 peram STAHLIO, ejusque discipulis, viris
 longe clarissimis, crimini dari, quasi vero illi
 cum prolixius ab se elaborata hæmorrhoidum

doc-

doctrina, nescio quid, novi monstri, ac saluti humanæ damnosi in medicinam invexerint, effecerintque, ut & pene omnes hodie morbi, pro symptomatibus hæmorrhoidum habeantur, & idcirco etiam hæmorrhoides crebrius, quam oporteret, provocentur; quod calumniæ genus STAHLIO ejusque sequacibus præsertim A. HAEN (a) objecit: „d. STAHLIUS (verba sunt ejus) vir siquis alius in „chemicis versatissimus, speculationibus autem „in medicina supra modum deditus, mutatæ „hac in parte medicinæ non experiundo, sed „speculando exstitit faber, quem mox schola „ejus tota, in eaque principes JUNCKER, ALBERTI, &c. secuti sunt. Suspectum vel ideo „dogma, quod d. STAHLIUS ut alibi passim, „ita disertis repetitisque sæpius verbis in „Epistola ad d. ALBERTI (b) palam fateatur,

„Om-

(a) Thes. pathol. de hæmorrhoidib. Cap. 4. §. 2. 3.

(b) Hujus tractatui de hæmorrhoidib. præfixa.

„omnesque palam fateantur STAHLIANI, no-
 „vum plane, insolitum, inauditumque dog-
 „ma esse. Equidem stat laus sua, honosque
 „novis in medicina observatis, quæ ejusdem
 „pomœria extendant, illustrent, obscura, du-
 „bia firment: sed ea jure vituperes, quæ ne-
 „dum experientia nata, sed eidem penitus
 „adversa reperiuntur.“ Pergit dein per exem-
 pla ostendere velle, quæ objecit. Verum pa-
 ce HAENII dixero, haud satis illi mentem ac
 doctrinam STAHLII fuisse perspectam. Mihi
 quidem HAENIUS magister olim in medicina ob-
 tigit; cui me multa salutari in arte debere
 gratus profiteor; sed DEO. T. O. M. in accep-
 tis refero, me ita a natura esse effictum, ut
 nullius magistri in verba jurare in animum in-
 duxerim. STAHLII sane ejusque sequacium
 sedulæ lectioni; non HAENII thesibus debeo,
 quod de hæmorrhoidum morbo novi: qua-
 propter integro ab assentatione, præjudiciis,
 odiisque animo tuebor, quod sentio. Audia-
 mus itaque speculabundum illum sine experi-
 entia

entia (quam ei HAENIUS contra omnem humanam fidem controvertit) fabrum STAHLIUM (a) de hæmorrhoidibus loquentem: „Sicut... „temere, (inquit ipse) hæmorrhoides assuefacere, quamdiu spes est, generaliori modo „incommodis eorum occurendi, aut ubi prorsus nihil id urget, non minus insanum fuerit, quam in temeraria pericula conjectum „velle, cum semper dubius fere sit hæmorrhoidum successus, & consequenter etiam „eventus, neque careat malorum successuum, „adeoque variorum incommodorum suspicione: ita contra, ubi jam assuefactæ vigent, „certior nulla est via, quam promotio eorundem, ut nulla præsentior noxa & succedentium spasmodicorum pathematum invitatio certior, quam a temeraria talium suppressione.“ Prolixe id ipsum postmodo discipu-

(a) Diff. de motu sanguinis hæmorrhoidali, & hæmorrhoidib. externis. Cap. 10. pag. 29.

cupulus ejusdem M. ALBERTI cum sæpius alias (a) tum præsertim singulari differtatione edita *de hæmorrhoidum salubri & insalubri promotione* (b) inculcavit. At enim vero dixitne vel alia, vel plura, vel saniora, vel certiora his ipsis HÆNIUS? Quid ergo? Nihilne hic aut novi, aut hærescos a STAHLIANIS? nihil prorsus! Id tantum dederunt operam, ut ex veterum suisque observatis ostenderent, imo) hæmorrhoides morbum esse inter mortales vulgatiorem, quam plerisque medicis in mentem veniat 2do) diagnosin planiorem, videntes hæmorrhoidum molimina toties cum aliis confundi morbis ingenti ægrorum damno, ac discrimine: 3tio) therapiam, quæ id temporis a bene multis per calida acriaque institue-

(a) Diff. de hæmorrhoidum præservatione (4to Halæ 1727. Resp. I. M. SCHWARTZ). §. 3. p. 15. & diff. de hæmorrhoidib. longævitat. causa. §. 28.

(b) §. 1. p. 8. (4to Halæ 1726. Resp. I. C. WOXI.)

stituebatur, esse summe noxiam, denique ut 4to) colligerent omnia, riteque digererent, quæ ad illorum usque ætatem de hæmorrhoidibus sparsim in monumentis medicis exstabant. Quod si forte nonnulli proprio suo errore necessariam hanc doctrinam in praxi iusto latius protulere, id his ipsis; non STAHLIO viro in therapia cautissimo, ac vere HIPPOCRATICO, ut nemo vel BOERHAVII vel HAENII affeclarum magis, est imputandum. Neque jactat STAHLIUS se nescio quid plane novi, insoliti, inauditique ad medicinam attulisse; sed ipsi (a) „in aliquibus passibus „quasi nova quædam res est“ non reapse nova, nisi quod asserat (b) neminem sibi innotuisse, qui ante se de motu hæmorrhoidali i. e. de moliminibus hæmorrhoidum luculentam

(a) Diff. de vena portæ porta malorum &c. (4to Halæ 1705. Resp. I. P. GÆTKE) Sect. 3. p. 46.

(b) Epist. cit. ad M. ALBERTI.

tam dedisset doctrinam. In hocne tantum est
 hæreseos? Id quidem nemo præter HAENIUM
 tuendum suscipiet, præsertim cum plurimo-
 rum annorum attentæ observationes docue-
 rint, STAHLIUM hic verissima docuisse. In-
 ficiandum me hercle non est, STAHLIUM ejus-
 que discipulos, ac præsertim M. ALBERTUM
 in illustranda hæmorrhoidum doctrina non
 pœnitendos insumisse conatus; et si forte
 novi quid iis asserere velimus, omni certe
 jure doctrina hæmorrhoidum albarum ad eos
 pertinebit, quarum etsi pauci aliqui multo
 ante meminerint, ordinata nihilo minus doc-
 trina illarum solis debetur STAHLIANIS. In-
 terea tamen cum illi omne hoc pensum in so-
 lis propemodum vel dissertationibus acade-
 micis, vel tabellaribus enchiridiis, vel epicri-
 sibus ad singulares casus clinicos complexi
 sint, infinitaque jam existent, quorum lapsa
 tempora ad hæmorrhoidum historiam accessio-
 nem fecerunt, pro more institutoque meo
 collegi universa, & in planum, perspicuum-
 que

que redegi ordinem ; apud eos initurus (nisi me animus fallit) gratiam, queis nec ætas, nec magistri, nec libraria suppellex, nec experientia propria horum omnium copiam hactenus fecit.

SERIES OPERIS.

P A R S I.

	pag.
CAP. I. §. 1. 2. Definitio - - - -	1
CAP. II. §. 3. Genera - - - -	4
§. 4. I. Vasa - - - -	5
1. Arteriosæ - - - -	—
2. Venosæ - - - -	8
§. 5. II. Organa - - - -	12
a) Ani hæmorrhoides - - - -	—
1. Externæ - - - -	—
2. Internæ - - - -	14
b) Vesicæ hæmorrhoides - - - -	16
c) Uteri, vaginæ hæmorrh. - - - -	17
d) Penis - - - -	18
e) Nafi - - - -	—
§. 6. III. Nifus fanguinis - - - -	19
A. Molimina hæmorrhoidalia - - - -	—
B. Cœcæ hæmorrhoides - - - -	20
1. Spuriæ - - - -	—
b	a) Con-

	pagæ
a) Condylomata - -	21
b) Cristæ - -	22
c) Sycofis - -	23
d) Thymi - -	—
2. Veræ - -	24
a) Figura - -	—
α. Vesicales - -	—
β. Uvales - -	—
γ. Morales - -	—
δ. Verrucosæ - -	25
ε. Saccatæ - -	—
b) Symptomata - -	26
α. Turgentes - -	—
β. Tumentes - -	—
C. Fluentes - -	27
a) Indolēs - -	28
1. Rubræ - -	—
2. Albæ - -	—
b) Copia - -	—
1. Parcæ - -	—
2. Moderatæ - -	—
3. Nimix - -	—
§. 7. IV. Typus - -	30
1. Anomalæ - -	—
2. Regulares - -	31

§. 8. V. Causa	- - -	31
1. Prothopathicae	- -	—
2. Deuteropathicae	-	32
a) Criticae	- -	—
b) Symptomaticae	-	—
§. 9. VI. Status	- - -	—
1. Solitariae	- -	—
2. Complicatae cum	-	33
a) Alvi fluxus	-	—
b) Leucorrhœa	- -	—
c) Lithiasis	- -	—
d) Artuum dolores	-	—

CAP. III. Proegumenæ causæ	- - -	34
§. 10. 1. Aetas	- - -	—
— 11. 2. Sexus	- - -	44
— 12. 3. Temperies	- -	46
— 13. 4. Venarum hæmorrhoid.		
longit. lax. &c.	-	47
— 14. 5. Plethora	- - -	49
— 15. 6. Hæreditaria labes	-	52
— 16. 7. Passio hypochondr. hist.		62
— 17. 8. Tumores	- - -	64
a) Intestinorum	- -	—
b) Uteri	- -	—
c) Renum	- -	65
b 2	d) He-	

			pag.
	d) Hepatis	- -	65
§. 18.	9. Cachexiæ	- -	—
	a) Atrabilis	- -	—
	b) Lithiasis	- -	66
	c) Hydropes	- -	67
	d) Scorbutus	- -	—
	e) Pyoses	- -	—
CAP. IV.	Procatareciæ causæ	- -	68
§. 19.	1. Ingesta	- -	—
	a) Calida	- -	—
	b) Solventia	- -	69
	c) Emmenagoga	- -	70
	d) Cathartica	- -	72
	e) Aloe	- -	75
§. 20.	2. Nixus	- -	78
— 21.	3. Meteorismus	- -	80
— 22.	4. Colluvies	- -	82
— 23.	5. Alvus	- -	83
	a) Fluxa	- -	—
	b) dura	- -	84
— 24.	6. Graviditas	- -	85
— 25.	7. Pathemata animi	- -	88
— 26.	8. Motus quies	- -	90
	a) Quies	- -	—
	b) Motus	- -	92

	α) Concussio humero-		
	rum, natium	-	93
	β) Vestio, equitatio	-	94
	γ) Concubitus	-	96
§. 27.	9. Applicata externa	-	—
	a) Cloacarum effluvia	-	97
	b) Topica	-	98
	c) Contagium	-	—
— 28.	10. Febres	-	99
— 29.	11. Metastases	-	100
	a) Sanguinis	-	—
	α . Hæmorrhagia narium	—	
	β . Catamenia	-	103
	γ . Lochia	-	107
	b) Perspirationis	-	109
— 30.	12. Cœlum	-	—
CAP. V.	— 31. Symptomata	-	111
— 32.	1. Febris	-	112
— 33.	2. Dolores pruritus	-	121
	a) Capitis	-	—
	b) Spinæ dorsi	-	122
	c) Articulorum	-	123
	α . Arthritis	-	—
	β . Ischias	-	—
	γ . Podagra	-	124
	d) Ven-		

				pag.
	d)	Ventriculi	- -	125
	e)	Intestinorum	- -	126
	f)	Lumborum	- -	128
	g)	Ani	- -	129
§. 34.	3.	Vertigo	- -	132
— 35.	4.	Infania	- -	134
— 36.	5.	Spasmi, convulsiones		135
— 37.	6.	Anxietas, dyspnœa etc.		139
— 38.	7.	Hæmorrhagiæ	- -	—
— 39.	8.	Sudores	- -	140
— 40.	9.	Meteorismus abdominis		142
— 41.	10.	Anus constrictus	-	143
— 42.	11.	Tenesmus	- -	144
— 43.	12.	Alvus	- -	145
	a)	Fluxa	- -	—
	b)	Obstrueta	- -	146
— 44.	13.	Vomitus	- -	147
— 45.	14.	Urinæ excretio	- -	148
— 46.	15.	Color corporis	- -	152
— 47.	16.	Tumores	- -	154
	a)	Erysipelas, phlegmone		—
	b)	Varicocèle	- -	155
	c)	Bubones	- -	157

CAP. VI. §. 48. Phænomena varicum, &c.

fluxus	- - -	159
--------	-------	-----

I. Tu-

	I. Tubercula	-	-	-	159
	1. Magnitudo	-	-	-	—
	2. Numerus	-	-	-	161
	3. Figura	-	-	-	—
	4. Renitentia	-	-	-	162
	5. Sensus	-	-	-	—
	6. Exsudatio	-	-	-	—
§. 49.	II. Fluxus hæmorrhoidalis				163
	1. Humor	-	-	-	—
	a) Sanguis	-	-	-	—
	b) Mucus	-	-	-	165
	c) Pus, sanies, ichor	-	-	-	—
	2. Quantitas	-	-	-	166
	3. Tempora	-	-	-	169
CAP. VII. §. 50.	Diagnosis	-	-	-	176
	I. Absoluta	-	-	-	—
	A. Moliminum	-	-	-	—
	1. Causæ	-	-	-	—
	2. Symptomata	-	-	-	177
	3. Reversiones	-	-	-	—
	B. Cœcarum	-	-	-	—
	1. Externarum	-	-	-	178
	2. Internarum	-	-	-	—
	C. Fluxus hæmorrhoidalis				179
§. 51.	II. Relativa	-	-	-	—

	pag.
A. Generum - - -	179
1. Externæ, internæ - -	—
a) Sedes - - -	—
b) Sanguinis - - -	180
c) Effectus - - -	183
2. Tumentes - - -	—
3. Criticæ - - -	184
B. Morborum affinium -	155
a) Fluxus - - -	—
1. Dysenteria - - -	—
2. Hepaticus fluxus -	193
3. Fistulæ ani - - -	194
4. Ingesta - - -	—
b) Lithiasis - - -	—
c) Tumores - - -	197
1. Inflammatio - - -	—
2. Hæmorrhoides spurix -	—
d) Syphilis - - -	198
1. Sarcomata - - -	—
2. Bubones - - -	—
3. Gonorrhœæ - - -	—
e) Cancer - - -	200
CAP. VIII. §. 52. Prognosis - - -	201
Duratio - - -	—
— 53. Effectus - - -	—
I. Moliminum - - -	201

II. Cœcarum hæmorrhoidum	208
1. Coitus dolorificus	209
2. Impotentia motus	—
3. Regurgitatio sanguinis	—
4. Abortus	210
5. Ruptura vasorum	—
6. Prolapsus ani	212
7. Abscessus, fistula ani	213
8. Gangræna, sphacelus	218
9. Occallescentia	221
III. Fluxus hæmorrhoidalis	—
A. Boni	—
1. Prophylactice	223
2. Therapeutice	225
a) Infania	—
b) Coma, apoplexia	227
c) Oculorum morbi	—
d) Spirationis difficultas	—
e) Phthisis	228
f) Hypochondriaca passio	—
g) Nephralgia	229
h) Icterus	230
i) Hydrops	—
k) Cutanei morbi	231
l) Articularis dolor	231
B. Mali	238

	pag.
1. Nimio fluxu - - -	—
a) Cachexia - - -	—
b) Spasmi, convulsiones	243
c) Languor - - -	—
d) Recidivæ - - -	244
2. Aetas junior - - -	246
3. Gravidæ - - -	248
4. Tenuitas acris sanguinis	249
§. 54. Definunt hæmorrhoides -	252
1. Sponte natura - - -	—
2. Senium - - -	—
3. Febris - - -	253
4. Graviditas - - -	256
5. Pathemata animi -	257
6. Vulnera ani - - -	—
7. Applicata - - -	258
8. Ingesta - - -	—
9. Vacuationes - - -	—
a) Sudores - - -	259
b) Vomitus - - -	260
c) Ptyalismus - - -	261
d) Phlebotomia - - -	—
§. 55. Interceptio hæmorrhoidum	265
1. Vertigo - - -	266
2. Infania - - -	—
3. Apoplexia - - -	270

	pag.
4. Paralyſis - - -	276
5. Spiratio difficilis -	277
6. Febres - - -	281
a) Acutæ continuæ -	—
b) Chronicæ - -	282
7. Alvus clauſa - -	288
8. Dyſuria, iſchuria -	292
9. Tumores - - -	—
a) Eryſipelas, phleg- mone, furunculi	293
b) Abſceſſus, Ulcera	294
c) Scirrhi - -	299
d) Cancer - -	300
e) Steatomata, athe- romata - -	301
f) Sarcomata - -	303
g) Varices - -	306
h) Hæmorrhoides cœ- cæ, ſpurix -	309
10. Exanthemata - -	311
11. Hydropes - -	312
12. Dolores - -	316
a) Cephalalgia - -	—
b) Cardialgia - -	317
c) Colica - -	—
d) Iſchias - -	320

	pag.
e) Podagra - - -	321
f) Arthritis, rheumatismus	324
13. Hæmorrhagiæ vicariæ -	329
a) Narium hæmorrhagia	—
b) Palati - - -	331
c) Aurium - - -	335
d) Hæmoptoe - - -	336
e) Hæmatemesis - -	340
f) Umbilicalis - -	343
g) Hæmaturia - -	345
h) Stymatosis - - -	—
14. Agmina symptomatum -	346
§. 56. 15. Revocatio difficilis -	348
§. 57. 16. Provocatio periculosa, nam	350
1. Hæmorrhoides semper sunt morbus	—
2. Criticæ sunt tantum minus malum	352
3. Provocatus fluxus potest esse incon-	
gruus. - - - - -	353
4. Pro fluxu oriunt, hæmorrh. cœcæ	
furentes, aut - - - -	354
5. Stymatosis, hæmaturia &c. -	—
6. Fluxus potest esse frustraneus, vel	
noxius, utpote - - - -	355
a) Internarum hæmorrh. - -	—
b) Nimius - - - -	—
c) Parcus - - - -	—
d) Non levans - - - -	356
e) Si deinceps suppressus fuerit -	—



HISTORIÆ HÆMORRHOIDUM.

PARS I. DE INDOLE AC VARIETATE HÆMORRHOIDUM.

CAPUT. I.

DEFINITIO.

§. I.

HÆMORRHŌIS (*αἱμορροῖς* ex *αἷμα* *sanguis*
& *ῥέω fluo*) vi nominis quidem haud secius
ac *αἱμορραγία* quemlibet sanguinis fluxum sig-
nificat, verum, ab HIPPOCRATE ceterisque
medicis Græcis & hæmorrhoidis, & hæmorr-
hagiæ vocabulum ita pene semper usurpatur
(si paucas quasdam sententias exceperis,) ut
isto fluxum sanguinis e naribus; illo ex ano
intelligent: quod si is aliunde; quam ex
ano, naribusve (ut ex vesica urinaria, utero
&c.) accidens veniat indicandus, nunquam
non veteres ad hæmorrhagiæ vocabulum simul
partis illius nomen adicere consueverunt,
unde

unde sanguis erumpit, neque unquam hæmorrhoidis nomen apud illos hocce eodem in significato est reperire. Testem ejus rei habemus GALENUM (a) scribentem: „vos me, „minisse puto ex aliis membris sanguinis „profluvia (Hæmorrhagias) cum loci appellatione semper dici; ex naribus vero nonnunquam & sine particulæ appellatione sanguinis profluvium simpliciter nominari.“ Clarum, id omnino assertumque esset ni GALENUS alibi (b) aut quisquis ille sit finitionum illarum auctor, novam rei ambiguitatem conciliasset dicens: „hæmorrhagia — Effusio „abundans est sanguinis — Differt hæmorrhagia ab hæmorrhoidide; quia hæmorrhagia „abundans effusio (ut diximus) sanguinis; „hæmorrhoidis autem delatio sanguinis est per „dissolutionem, ac paulatim facta“. Interea nemo non intelligit discrimen hoc & nauci esse, & GALENI experientia indignum, & apud Medicos Græcos nusquam usurpatum. Hæmorrhagia quidem recte dicitur liberalis sanguinis unde eruptio; id tamen haudquaquam eatenus est accipiendum, quasi vero hæmorrhoidis exilem, ac lentam sanguinis vacationem denotaret; isthanc enim HIPPOCRATES (c) nusquam Vocabulo hæmorrhoidis

(a) In Hippocrat, epidem, L. 6. S. 3. 11. 18.
Comment. 3 text. 25.

(b) Finition. medic. ad calcem.

(c) Vid. A. Foesii æconom. HIPPOCRAT. p. 350.

„qui a sanguinis impetu majore, quam est
 „resistentia vasorum sanguiferorum ano vici-
 „norum, proxime oriri solent, adeoque
 „vel per hæmorrhagias, vel per stagnatio-
 „nes sanguinis in Vasis hæmorrhoidalibus, cir-
 „ca finem intestini recti fitis se se exerunt.“
 Cum tamen hæmorrhoidalia Vasa non ad so-
 lum rectum intestinum abeant; verum aliqui
 illorum rami ad Vesicam etiam, vel Vagi-
 nam Uteri commigrent, neque secius ex his,
 quam illis tam varices hæmorrhoidales, quam
 sanguinis fluxus nascatur; & cum porro eveni-
 ente ex his vasis fluxu non semper sanguis,
 sed interdum etiam mucus (serum,) unde albæ
 hæmorrhoides dictæ,) &c. erumpere cerna-
 tur, necessum est, ut definias: hæmorrhoi-
 des esse *spontaneum sanguinis, mucive se-
 rosi, autichorosi ex Vasis hæmorrhoidalibus
 profluvium vel præsens vel imminens*. Quo-
 niam vero a potiori; (ut ajunt) fit denomi-
 natio, fluxusque hic potissimum ex ani Va-
 sis accidit, isque sæpissime sanguineus; ea
 propter haud male dicentur hæmorrhoides
 esse spontanea Ani *hæmorrhagia præsens im-
 minensve*.

CAPUT II.

GENERA.

§. III.

GENERA *hæmorrhoidum* a vario illarum
 qua imminentium, qua fluentium statu de-
 fu-

sumuntur , eorumque Varietatem determinant.

1. Vasa affecta ,
2. Organum ea recipiens ,
3. Nifus sanguinis in illa varius,
4. Typus morbi varius ,
5. Causa ,
6. Status morbi.

§. IV.

I. *Vasa* , unde hæmorrhoidalis fluxus imminet , vel procedit , si spectemus , continuo occurret dubium , arteriæ , an Venæ sint ? Multum a claris Viris hanc in rem disceptatum est , Venas aliis , aliis arterias , aliis arterias juxta ac Venas , tuentibus ; nec desunt pro quavis harum Sententiarum probabilia rationum momenta : quibus enim hæmorrhoides non Venosæ ; sed

1. *Arteriosæ* proſapiæ esse viſæ ſunt , his potiffimum rationibus opinionem ſuam tuentur.

a) Hæmorrhagia omnis vel rhexi fit , vel anastomofi , neutrum autem iſthic ſanguis Venofus efficere valet , juxta I. D. SANTORINUM (a) G. E. HAMBERGERUM (b) E. I. NEI-

(a) Opuscul. med. 3. §. 14. p. 159. ſq.

(b) Diff. cit. §. 14.

NEIFELDIUM (a) aliosque quandoquidem nullæ Capillares Venæ suis Osculis in cavum intestini recti abscissæ hiant, quarum anastomosis hæmorrhagiam causaret; nec rhexis Venarum locum habet ob motum sanguinis ab apice versus basin, & e Venis angustioribus semper in capaciores. Si enim id genus rhexis locum haberet, tunc I. A. WEDLIO (b) notante sanguis Venæ portæ ab hujus trunco deberet motu retrogrado urgeri versus ultimas radices venosas in spuriiis intestini recti glandulis incipientes, visque hæc deberet prævalere vi cordis, & arteriarum sanguinem progressivo motu in hæc Venarum initia pellenti; nemo vero hactenus ejusmodi vim vel posse dari, nedum existere, probavit: idcirco hæmorrhagia ani nullatenus Vasis hæmorrhoidalibus venosis; sed arteriosis tribuenda est. Contendunt porro arteriarum patroni: hæmorrhoidum fluxus, si ex venosis Vasis accideret, sæpe numero perquam profusus, imo letalis, esse deberet, eo quod Venæ læsæ non ita sese; atque Arteriæ contrahere, fluxumque cohibere valeant: cum autem admodum raro nimius hæmorrhoidum fluxus eveniat, liquido inde colligit NEIFELD (c) profluvium a Venis haudquaquam

(a) Abhandlung von der goldenen Ueber §. 43. Sqq.

(b) Diff. de hæmorrhoidib. (Resp. I. A. WISLICENO 4to. Jenæ 1727. §. 43. p. 17.

(c) I. c. §. 44. p. 21. sq.

quam esse repetendum, arteriisque potius deberi.

b) Tubercula quoque hæmorrhoidalia non esse necessario pro Varicibus Venarum hæmorrhoidalium habendâ censet. A. DUNCAN; (a) siquidem etiam a Sanguine in cellulosam Recti effuso ab arteriis generari possint, id quod & anatome verum esse confirmavit. Neque absonum etiam est, quod G. E. SCHMID (b) tuctur, capillares nempe arteriolas ob tunicarum suarum tenuitatem Venosis haud magnopere inferiorem, posse æque facile in id genus tubercula distendi, sicque vel anastomosi, vel rhexi illarum eveniente sanguinis oriri profluvium, ut fit in hæmorrhagia narium, Uteri &c. Hoc profluvium sua sponte cessaturum, postquam affluentis ad ea Vascula sanguinis impetus, & copia fuerint imminuta. Huc accedit, quod tubercula hæc non raro ex inflammatione atrocissimum creent dolorem, distensionem solarum Venarum nullatenus adscribendum, quem arteriæ capillares plerumque excitare consuevere. Atque hæc sunt, quæ pro arteriosis hæmorrhoidibus & contra Venosas adferri solent. Quibus autem hæmorrhoides.

2. Veno-

(a) Casu medico q. p. m. 86.

(b) Diff. sist. Virum apoplexia extinctum ab hæmorrhoidum inconsulta suppressione (4to. Altorf. 1723.) §. 5. Sqq.

2. *Venosæ* indolis esse censentur, ii tam fluxum; quam tubercula hæmorrhoidalia ad Venas referre malunt propterea, quod

a) Tubercula dicta ut recte observat I. BOHNIUS, (a) per omnia Varicum venosarum habitum præseferant, (ut docet Color e rubro lividus, &c.) nihilque anevrismatici prodant; quippe quæ pulsu in anevrismaticis percipiundo careant (nisi forsan pulsatilis dolor ab inflammatione superveniat,) & Sanguinis ex iis sponte vel arte apertis eruptio sine jactibus (ut in arteriis læsis,) sed æquali tenore, more hæmorrhagiarum Venosarum, fieri observetur. Tubercula hæc eo etiam certius ad Varices esse referenda videntur, quod in majoribus hæmorrhoidalium Venarum ramis a morte plures Varices reperiri soleant. (b) Neque dolor atrox & inflammatio plus pro arteriis; quam Venis militat; quandoquidem utrumque hoc malum ii non raro perinde grave experiuntur, qui Crurum varicibus conflantur.

b) Fluxus vero, cure venis hæmorrhoidalibus accidere non possit, haud dum satis evictum est, nam etsi per anastomosim contingere utique nequeat, rhexi certe illum evenire

(a) Diff. de Hæmorrhoidib. Cæcis (Resp. 1. 1. HERING 4to Lipsiæ. 1694.) §. 3.

(b) MORGAGNI. de sedib. & Caus. morb. Epist. 32. Nro. 10.

evenire posse facile conficitur. Quemadmodum enim crurum varices nimium sanguine venoso distentæ sponte sæpe, vel a minima certe vi applicata, crepant: ita etiam hæmorrhoidalibus varicibus a scybalis transeuntibus easque comprimantibus accidit. Sed unde, inquiunt, varices? Hæ enim in valvulosis tantum venis enasci possunt; hæmorrhoidales autem venæ externæ, etsi valvulis præditæ sint, internæ tamen, de quibus maxime res agitur, illis omnino carent, cum ad systema venæ portæ valvulis destitutum pertineant. Verum difficultati huic facile occurritur: „nam A. Q. RIVINVM (a), si audias, „intelliges minime . . . totam venam portæ „valvulis destitui, sed tantummodo ramificationes intra hepar se expandentes, utpote „quæ sanguinem propellunt, & arteriarum „vices sustinent, illis carere. Propagines vero ceteræ sive a visceribus, sive a ventriculo, sive intestinis seu aliunde advehant, „omnino istis instructæ cernuntur, & præcipue vena hæmorrhoidalis; quippe quæ inter omnes intestinales maxima seu capacissima, dum sanguinem ab extremitatibus intestinorum ad hepar colligit ac deducit, „iisdem minime destituitur (b). De cetero, „dum

(a) Diss. de hæmorrhoidibus apertis (Resp. M. I. C. KÜCHLERO. 4to. Lips. 1709.) §. 8. p. 9.

(b) Vid. HARV. de circul. sangu. p. 121. RIVOLAN, enchirid. anatom. de valvul. venar. p.

„dum eadem venæ hæmorrhoidales nodosas
 „intumescencias, quas varices medici alias
 „appellant, sub nomine hæmorrhoidum cæ-
 „carum frequentius sustinent, ipsæque hæ in-
 „tumescentiæ tandem ruptæ fluentes, seu
 „apertas constituunt, eas valvulis gaudere
 „satis probabile fit.” Et quid si pro varicum
 genesi ne valvulis opus sit? Cum itaque flu-
 xum hæmorrhoidum venosis ex vasis accidere
 posse nil obstat, si alia insuper phænomena
 huius fluxus attente expendantur, illa hunc
 magis e venis quam arteriis proficisci per-
 suadent. Namque iste vix unquam sine tu-
 berculis præviis accidit, ut proinde ex illo-
 rum rhexi (i. e. ex varicum ruptura) semper
 eum contingere merito censendum sit; quod
 si per anastomosi arteriolarum eveniret, ni-
 hil ullis tuberculis præviis opus foret. Imo
 inermi plerumque oculo hiatum in conspicuis
 his varicibus detegere est, unde sanguis hæ-
 morrhoidali sub fluxu scaturit. Porro fluxus
 hic notante STAHLIO (a) non est hæmorrha-
 gia perennis (ut in arteriarum anastomosi,
 ubi hæc non prius conquiescit, quam immi-
 nuto

106. BARTHOLIN. anatom. reform. Lib. 1.
 Cap. 2. & 3.

(a) Diss. de motu sangu. hæmorrhoidali, & hæ-
 morrhoidibus externis (Resp. H. S. JUCH. 4to
 Halæ 1698) Cap. 3. p. 9.

nuto sanguinis ad eas impetu & copia illæ se se denuo contrahere valeant), sed per vices resuscitabilis, & ut plurimum sub egestione alvina, dum nempe varices a fece alvina transeunte compressæ crepant identidem. Qui igitur singula hæcenus dicta expenderit, ne ille hæmorrhoides ad venas magis, quam arterias referet; ut ut inficiandum non sit, fluxum hæmorrhoidum etiam ab arteriolarum hæmorrhoidalium anastomosi aliquando produci posse, quod A. HAENIO (a) admodum probabile visum est. Quod autem NEIFELD raro immodicum hæmorrhoidum fluxum accidere asserat, idque ab arteriarum contractione post moderatam depletionem vasorum repetat; alioquin vero, si ex venis flueret sanguis, enormes hæmorrhagias sæpius, nec raro letales, metuendas fore (quod nempe venæ læsæ haudita, atque arteriæ, contrahere se se valeant) contendat, id certe tanti non est; quis enim casuum hæmorrhoidalium, qui apud auctores exstant (b), gnarus ignorat, immodicum hæmorrhoidum fluxum haud ita rarum esse, atque illum sibi nobisque persuadere vult NEIFELD? Et si arteriarum contractilitas in causa esset, quo minus fluxus hic nimius evaderet, cur nihilo minus iste toties, imo letalis etiam (c), accidit? Ar-

te-

(a) l. c. Cap. 1. §. 9. p. 5. sq.

(b) Vide §. 49. Nro. 2.

(c) Vide §. 117. β.

teriarum fane patroni plures difficultates exhauriendas habent, quam qui pro venis stant.

§. V.

II. ORGANA, per quæ vasa hæmorrhoidalia distribuntur, perinde varia hæmorrhoidum genera suppeditant; hæc inter

a) *Ani hæmorrhoides* primas tenent; quandoquidem hæmorrhoidalia vasa vel maxime ad intestinum rectum pertinent, istudque etiam ab hæmorrhoidali morbo ut plurimum laeßitur. Cum autem duplicis originis hæmorrhoidalia sint vasa, quorum alia extus, intus alia intestinum rectum perreptant: hinc etiam ani hæmorrhoides aliæ externæ sunt, aliæ internæ.

I. *Externæ hæmorrhoides* ani duplici sub notione accipiuntur: alii enim hæmorrhoides externas eas vocant, quæ extra cavum intestini recti circa ani orificium pullulant; ast id minus proprie: alii contra eas dici voluerunt externas, quæ a vasis hæmorrhoidalibus dictis externis progignuntur, arteriis nempe, ac venis hujus nominis. Arteriæ namque hæmorrhoidales externæ duæ sunt, dextra ac sinistra, oriundæ ex sui quæque lateris arteria iliaca interna, seu hypogastrica, ac speciatim ex 4to ejus ramo, cui nomen arteria pudenda communis vel pudenda magna

magna vel pudenda hypogastrica interna. Hæ
 binæ arteriæ hæmorrhoidales externæ decur-
 runt intra duo illa insignia ligamenta, os
 ischii cum sacro neſtentia, datoque prius
 ramo ad bulbum urethræ, & corpus caverno-
 ſum penis, deinde limbum inteſtini recti al-
 luunt, ac proinde ad externam hujus inte-
 ſtini faciem decurrunt: unde & hæmorrhoida-
 les externæ dicuntur. Venæ autem hæmorrhoi-
 dales externæ ab his ipsis arteriis ortæ mul-
 tis ac velut ſerpentinis gyris anum amplexæ,
 inde inferuntur in venas hypogaſtricas, hæ
 in iliacas internas, iſtæ in cavam adſcenden-
 tem. „Perquam vero notatu mihi videtur
 „dignum, inquit M. ALBERTI (a), adumbra-
 „ta hæc vaſa, ſi ad ani marginem pervene-
 „runt, ibidem cum internis hæmorrhoidali-
 „bus mutua anastoſi ita coaleſcere, ut
 „his hydrargyro impletis & ſus nullo negotio
 „inde in hæmorrhoidalia externa ſe protrudi,
 „ex his autem ſimili facilitate in hæmorrhoi-
 „dalia interna retrudi, ſicque ultro citroque
 „in illis moveri patiatur Excell. CASSEBOH-
 „MIO aliquoties hoc omnium oculis ſubji-
 „ciente, cui etiam alter teſtis accedit VINS-
 „LOWIUS (b), qui idem hiſce verbis diſerte
 „tradit: hæmorrhoidales externæ communi-
 „cant

(a) Diſſ. de conſenſu calculi cum hæmorrhoidi-
 bus externis (Reſp. I. H. PREHN, 4to, Halæ
 1739.) §. 6. p. 9.

(b) Anatom. T. 3. de venis. §. 183.

„cant cum internis a vena parva meseraica
 „(una de ramis venæ portæ) oriundis.” Co-
 gnita ergo ita vasorum hæmorrhoidalium ex-
 ternorum origine ac insertione utilissimum
 deducitur hocce corollarium (a): *Fluxu hæ-*
morrhoidum externarum fit directæ, cita,
ac generalis totius systematis vasorum (præ-
 ter systema venæ portæ, quod tunc & lentius
 & parcius depletur,) *depletio, i. e. imminu-*
tio plethoræ universalis.

2. *Internæ* porro ani hæmorrhoides rur-
 sus vel illæ dicuntur, quæ intra cavum inte-
 stini recti delitescunt non conspicuæ, nisi
 forte ano p. n. protrusæ, vel rectius illæ,
 quæ a vasis hæmorrhoidalibus internis dictis
 producuntur, arteriis nempe, ac venis ita
 compellatis. Hic quoque duæ sunt (non
 una, ut quibusdam visum) arteriæ hæmor-
 rhoidales internæ; at non ex uno, eodem-
 que trunco communi oriundæ: una illarum
 conspicuæ est magnitudinis, oriunda ex arte-
 ria colica sinistra (quam conflant primi duo
 rami arteriæ mesentericæ inferioris,) se seque
 in interiora intestini recti pluribus ramis dis-
 persgens; quorum e finibus totidem dein ve-
 nosi furculi exorti confluunt in venam hæ-
 morrhoidalem internam, seu meseraicam mi-
 norem, quæ inseritur vel immediate trunco
 venæ

(a) HAEN. I. c. Cap. I. §. 3.

venæ portæ ventralis, ita ut in angulum a splenica, & meseraica magna factum (dum in truncum venæ portæ conflunt) se se implantet, vel venæ meseraicæ magnæ, vel venæ splenicæ, ut STAHLIUS (a) ipse vidit, vel cum hac in unum prius truncum confluit, qui deinde crus lævum venæ portæ constituit. Hæmorrhoidalis hæc interna vena subinde in cadaveribus enormiter distenta reperitur, ubi in vita hæmorrhoides internæ ægrum afflixere. Sic apud A. VESALIUM (b) „quidam inordinatis vicibus (ut mulieres suis mensibus) sanguinis fluxu ex venis in anum pertinentibus vexari consueverat, & cum ex nigro, arquato, jecorisque mira duritiæ periisset, num portæ rami an cavæ hunc sanguinem evacuant, indagaturus (Auctor) illum dissecuit, atque venæ portæ ramum sub coli intestini, sine, & tota recti longitudine in mesenterio ductum pollicis fere crassitiem æquare, & sanguine turgere animadvertit, conterminis venæ cavæ ramis nihil prorsus immutatis.” Ex hac iterum vasorum hæmorrhoidalium internorum notitia sequens fuit corollarium (c):

Fluxu hæmorrhoidum internarum fit directâ, cita & copiosa depletio systematis venæ portæ; lenta vero, ac parca totius reliqui

sy-

(a) Diss. cit. Cap. 5. p. 15.

(b) De Corp. hum. fabrica. L. 5. C. 15.

(c) HAEN. l. c.

systematis vasorum; ut proinde hoc fluxu plethora totius non adeo imminuatur. Altera porro arteria hæmorrhoidalis interna, priori minor, est WINSLOWIO (a) notante ramus arteriæ glutææ (quæ est secundus arteriæ hypogastricæ ramus): hæc adhuc in pelvi obligat modo dictum ramum sat conspicuum ad intestinum rectum, qui internos illius parietes subiens ibi cum ramis prioris hæmorrhoidalis internæ arteriæ anastomoses facit. Ostendebat hanc alteram arteriam hæmorrhoidalem internam sæpius, testante id M. ALBERTI (b), suis auditoribus CASSEBOHM; verum utrum illa comitem suam habeat venam, & quorsum ista, si adest, inferatur, ad hypogastricam ne, an hæmorrhoidalem internam venam, haut dum est deductum: unde nullum etiam determinatum pro specifica ejus actione canonem condere est integrum.

b) *Vesicæ hæmorrhoides.* Vesica urinaria & si nullos directe ramos a vasis propriæ hæmorrhoidalibus accipiat; accipit tamen arterias a pudenda externa (quæ cum trunco hæmorrhoidalis externæ enascitur ex eadem pudenda hypogastrica interna), cujus rami vesicæ ipsi, ejusque collo prospiciunt: unde sanguis in ramos arteriæ hæmorrhoidalis exter-

(a) L. c. de arteriis. §. 242. sq.

(b) Diff. cit. §. 7. p. 9. sq.

ternæ ingredi quacunque de causa non valens, facile in vicinissimæ arteriæ pudendæ externæ ramos regurgitans vesicam & ejus collum laceffet, ut alibi (a) visuri sumus.

c) *Uteri, vaginæ hæmorrhoides*; CELSO (b) jam non ignotæ, & quarum exempla suis deinceps locis daturi sumus ex Varfaviensi nosocomio (c) ALIXIO (d) & COKBURNIO (e), Neque alliis (f) genus hoc hæmorrhoidum obscurum fuit. Arteriæ nempe uteri, ac vaginæ cum hæmorrhoidalibus externis eadem e Stirpe oriuntur: namque vel utræque ex arteria pudenda communi ortum ita capiunt, ut ex posteriore ejus ramo hæmorrhoidalis externa, & ex anteriore (cui prudenda externa nomen) arteriæ uteri, ac vaginæ prodeant, vel certe (quod maxime in feminis accidit) pudenda externa ex ipsa hypogastrica enascitur, cujus ex 4to. ramo (pudenda hypogastrica dicto) hæmorrhoidalis externa propullulat. Hinc si sanguis in hæmorrhoidales ramos haud satis expedite influere possit, facile in uteri, ac vaginæ arterias regurgitare valet.

d).

(a) Vide histor. hæmorrhoid. vesicæ §. 1.

(b) L. c.

(c) Vide histor. hæmorrhoid. albar, §. 2, I. Nro. 3.

(d) Vide §. 115. Nro. 2.

(e) Vide §. 53. II. 1.

(f) Vide §. 55. Nro. 13. h)

d) *Penis hæmorrhoides* seu stymatosis hæmorrhoidalis; dum nempe sanguis per hæmorrhoidalia externa vasa exitum non nactus ad penis vasa urgetur: hujus enim corpora cavernosa & bulbus urethræ ramos ex ipsis arteriis hæmorrhoidalibus externis nanciscuntur, antequam hæ ad anum ipsum appellunt. Exempla stymatoseos hæmorrhoidalis inferius referentur. Non sunt hic etiam silentio prætereundæ.

e) *Nasi hæmorrhoides* a M. A. SEVERINO a) descriptæ; quæ tamen nullo pacto huc pertinent, seu vasorum hæmorrhoidalium imo in ventre situm, seu sanguinem ab his ad superiora regurgitantem spectes; nam nihil & in historia, & curatione mali reperias, quod hanc regurgitationem probaret. En verba ipsa auctoris! „Intra nares ad imam cartilaginem obortum tuberculum aliquando se obtulit, quod polypum aliis vocari placuit, at non mihi; propterea quod rubicundius, & carnulentius minime pendulum, aut loco mobile, sed confixum cartilagini, exstans, que in ipsa velut naricula lauri baccæ semissis magnitudine. Omnibus autem modis Arabum medicorum hæmorrhoides suspicari licuit . . . Verum has sive hæmorrhoidas, „sive

(a) De effic. med. chirurg. effic. P. 2. de paracenth. cap. 8. & de abscessib. L. 4. C. 9. §. 8,

„sive polypum attrectare ferro cum medici
 „nostri non auderent, punctione per scal-
 „prum ego repressi. Quam punctiōnem cum
 „primum exhorruisset, diuque refugisset mu-
 „lier (fuit enim monialis templi incurabilium),
 „facta mox securior a levamento percepto
 „non levi post primam incisionem, ultro de-
 „inde ipsa ad alteras puncturas, novosque
 „exinanitus me compulit; quibus in dies
 „factis perpetuo recedens abolitus est tumor
 „omnis.“ Hujusmodi autem tumores vere
 hæmorrhoidales alibi (a) sumus visuri; at ali-
 am exigunt curationem.

§. VI.

III. *NISUS Sanguinis* in hæmorrhoida-
 lia hactenus dictorum organorum vasa vari-
 us, exsertus triplicem producere solet effec-
 tum; vel enim vasa reserando fluxum causat;
 vel in hisce, non illico referendis, accumu-
 latus ea in tumores variæ molis, ac figuræ
 distendit; vel denique sola illorum citra ul-
 los tumores observabiles distensione, aut
 solo motu inordinato varia symptomata mor-
 bosa progignit. Unde

A. *Molimina hæmorrhoidalia* primam
 quasi hujus morbi Scenam (utut non in om-
 B 2 nibus)

(a) Vide §. 55. Nro. 9. f) & Nro. 13. a)

nibus) ordiuntur, suntque nil; nisi variæ functionum læsiones ortæ a sanguine uberius ad hæmorrhoidalia vasa contendente, i. e. sunt spontanea ani hæmorrhagia remote imminens. Quanta horum symptomatum sit sæpe varietas, intensitasque, suo postmodo dicetur loco. (a)

B. *Cæcæ hæmorrhoides* porro, quas veteres *siccas* dixere (b) sunt hæmorrhoidalium vasorum tumores a copiosius in illa congesto sanguine, fluxum moliente, qui vulgo *noduli* vel *tubercula hæmorrhoidalia* vocitantur, i. e. sunt spontanea ani hæmorrhagia proxime imminens. Sunt autem *cæcæ hæmorrhoides* aliæ spurix, aliæ veræ.

I. *Spurix* sunt varia circa anum farcomata. Multi illas nihil cum veris hæmorrhoidibus commune præter locum habere volunt; quippe, quæ alius longe, quam veræ, sint originis, & plerumque vel nefandæ sodomix, vel certe labi syphiliticæ debeantur. Alii contra ad hæmorrhoidum verarum censum non abs re contendunt esse referendas; siquidem & ortum suum localem, generis que ab hæmorrhoidalibus vasis p. n. productis capiant; & veræ etiam hæmorrhoides quandoque

(a) Vide §. 31. sq.

(b) A. MASSAR, Præst. med. L, 3. C. 24,

que citra ullam aut sodomiae aut celticae luis culpam in id genus degenerent sarcomata: quod posterius & J. A. WEDELIUS (a) tuetur, & DIETERISCHS (b) luculento comprobat exemplo. Sarcomatum horum doctrinam seorsim plerumque Auctores tradunt, nempe AMATUS (c), CELSUS (d), HEISTERUS (e), & alii (f). Nos pauca tantum, quæ ad rem præsentem faciunt, attingemus. A varia nempe forma, quam spuria hujusmodi hæmorrhoides præferunt, varia nactæ sunt nomina, scilicet:

a) *Condylomata* (κονδυλώματα), quæ sunt callosa carnis circa anum excrescentia, instar articuli, quem condylum vocant, prominens (g) P. FORESTUS (h) autem „condylomata „(inquit) juxta neotericos quosdam sunt hæ- „morrhoides siccae, & tuberositates ani sparsæ „sine pede, a quibus nihil manat sanguinis, „sed interdum quædam humiditas aquosa.“

Et

(a) Diff. de hæmorrhoidib. (Resp. I. A. WISLIZEN 4to Jenæ 1727.) §. 15. p. 9.

(b) Vide histor. 1.

(c) Curat. med. Cent. 2. Cur. 87.

(d) L. c. lib. 6. cap. 18. Nro. 7. 8. & libro 7. cap. 30. Nro. 1. 2.

(e) Institut. chirurg. P. 2. S. 5. C. 165.

(f) V. I. G. WALTHER, Silva med. p. 69.

(g) CASTELLI. Lexicon. med.

(h) Observ. & cur. med. lib. 23. schol. ad obs. 8.

Et alibi (a): „condylomata dicunt esse emi-
 „nentias aliququaliter longas, & in cuspide ma-
 „gis acutas.“ Duorum ipse ægrorum casus
 describit, quorum alter (b) hæmorrhoidalia,
 alter (c) vera condylomata habuit, & seni
 TURNERI (d) hæmorrhoidalia condilomata
 letalem in gangrænam abiire.

b) *Christæ* five hæmorrhoides cristatæ.
 Has J. L. DIETRISCH (e) dividit in malignas
 venereas, & benignas symplices: istæ „sunt
 „p. n. protuberantiæ membranoso-vasculosæ
 „ad instar christarum gallinæ inferiorum pen-
 „dulæ, tenues, plicosæ, partim intensius
 „partim pallide rubentes, vel molles, vel
 „nonnihil duræ, circa orificium ani sitæ, ab
 „extensione & relaxatione interioris rugosæ,
 „& cellulosæ membranæ infimæ extremitatis
 „intestini recti natæ ex congestis, & stag-
 „nantibus humoribus seroso-sanguineis in
 „vasis hæmorrhoidalibus inferioribus, & ex-
 „ternis elevatæ cum dolore, tenesmo diffi-
 „cultate desidendi, alvumque exonerandi con-
 „juncta.,, Rarum illarum, ac luculentum
 præ-

(a) Ibid. schol. ad obs. 9.

(b) Ibid. obs. 7.

(c) Ibid. obs. 8.

(d) Vide §. 53. II. Nro. 8.

(e) Diff. sistens observationem de hæmorrhoid.
 cristatis (4to Altorf. 1764) §. 2.

præmisit casum (a). Ad hasne, an malignas referenda est observatio ab J. D. GOHLIO (b) descripta? his autem cristis comites interdum sunt *Rhagades* (ραγάδες) seu anni fissuræ, i. e. „ulcera uteri, & sedis diducta in „fissuras . . . iis similes quæ inferius labrum „& manus, pedesque dilacerant.„ (c)

c) *Sycosis* (σύκωσις, σύκωμα ficus) *mariscæ* Latinis, de quibus Poeta. (d)

Cæduntur tumidæ medico ridente mariscæ.

Sunt nempe tumores similes thymis, at majores, venereæ ut plurimum proscapiæ, aliquando tamen ex hæmorrhoidibus oriundi.

d) *Thymi* (θύμος nomen desumptum est FORESTO (e) notante a corymborum herbæ montanæ similitudine) sunt excrescentiæ turgidæ, asperæ, oblongæ, subrubræ, in excisione plus sanguinis præbentes, quam magnitudo illarum promittit, rarius faciei, plerumque ano, pudendis, femoribusque infectæ,

(a) Vid. histor. I.

(b) *Acta med. Berolin.* dec. I. vol. 5. sect. 2. Nro. 17. p. 35.

(c) FOREST I. c. obs. 10.

(d) MARTIAL.

(e) L. c. scol. ad obs. 9. confer. schol. ad obs. 3.

stæ, variæ magnitudinis. Alia, quæ minus huc faciunt, excrescentiarum genera in FORESTO (a) videri a lectoribus possunt.

2. *Veræ* autem hæmorrhoides cæcæ sunt varices venarum hæmorrhoidalium, quæ rursus a varia figura, ac mole, variisque sibi symptomatibus conjunctis varia nactæ sunt nomina, videlicet spectata

a) Figura dicuntur aliæ

a. Vesicales, quæ albicantibus piscium vesiculis sunt similes; aliæ

β. Uvales i. e. rotundæ, latæ veluti acini uvarum lividarum teste COO; (b) aliæ

γ. Morales i. e. mori fructui similes, de quibus HIPPOCRATES (c) „venæ (ait) „sanguinem fundenti & tuberosam quandam „eminentiam habenti veluti mori fructus ad- „nascitur & siquidem tuberosa eminentia „foras valde prominet, ei circum circa oper- „culum carnosum adhærescit. “ Aliæ denique sunt

δ. Verruæ

(a) Ibid.

(b) L. c. p. m. 891.

(c) Ibid. p. m. 893.

δ. *Verrucosæ*, quas etſi ALEXANDER VERONENSIS apud FORESTUM (a) ad condylomata relatas velit, ad veras tamen illas refert G. E. STAHLIUS. (b) Longæ nempe ſunt, verrucisque ſimiles. Huc vero etiam pertinent hæmorrhoides.

ε. *Saccatæ* I. C. A. THEDENII. (c) „Auctores (inquit ille) notitiam nobis hæmorrhoidum cæcarum cum dolentium, tum turgentium reliquerunt; ſed quas ego ſaccatas voco, de his nihil, quod ſciam, apud iſtos exſtat; niſi forte eas huc referre quis volet, quarum PLATNERUS (d) meminit. Saccatæ hæmorrhoides mihi ſunt ea inteſtini recti intumeſcentia, ubi a ſanguine hæmorrhoidali vena hæmorrhoidalis interna uſque adeo diſtenditur, ut ſaccos jam parvos, jam majusculos efformet, qui interdum, quemadmodum hæmorrhoides cæcæ ani Orificium vel undique vel uno tantum ex Latere obſidentes cum levamine crepant; interdum vero non crepantes evadunt prægrandes cum variis gravibus, ac non abigendis incommodis & chlorotico quaſi „ægro-

(a) L. c. ſchol. ad Obſ. 3.

(b) Colleg. casual. magn. caſu 16. p. 191.

(c) Neue Bemerk. und Erfahrung. zur Bereicherung der Wundarznei. 1. Theil. 4. Abſchnitt p. 59.

(d) Einleitung in die Chirurgie 2. Theil. ſ. 101 56. ſqq.

„ægrorum misere degentium habitu; nam
 „stagnans hic sanguis putrescere, ac putridi
 „quid reforberi, omnibusque his incommo-
 „dis occasionem præbere potest.“ Exem-
 pla harum saccatarum hæmorrhoidum ab Auc-
 tore visa inferius (a) in medium adferentur.

b) Symptomata porro hæmorrhoidalibus
 varicibus vel nulla insignia juncta sunt, præter
 aliquam tensionem, & leviora quædam alia
 incommoda, vel vero gravia superveniunt, ac
 vel maxime inflammatio admodum dolorifica,
 unde hæmorrhoides cæcæ sunt rursus.

α. *Turgentes*, de quibus HAMBEGERUS
 (b) „hæmorrhoides (ait) cæcæ turgentes,
 „vel indolentes consistunt in vesiculis san-
 „guineis plenis, circa limbum ani externum
 „plerumque conspicuis, quæ nec inflammatae
 „nec per se dolorificæ sunt; nisi quod sub
 „alvi excretionem tenivas molestias produ-
 „cant, eoque majores, quo recentiores sunt
 „hæc vesiculæ“ lividæ, tactuque molles.

β. *Tumentes* vero, & intensiori in gra-
 du *furentes* etiam dictæ, sunt, quas insignis
 dolor (subinde intolerabilis) comitatur, præ-
 sertim ubi simul vehemens juncta est inflam-
 matio cum varicum duritie, quo in Casu fu-
 rentes

(a) Vide §. 117. β.

(b) Diff. cit. §. 51.

rentes id genus hæmorrhoides ad tumores inflammatorios, ac ad veros furunculos referunt ALBERTI (a) ac STAHLIUS. (b)

C. *Fluentes hæmorrhoides* demum sunt ipsa spontanea ani hæmorrhagia actu procedens. „Dicimur fluxum hæmorrhoidum habere, inquit H. F. DELIUS. (c) dum cum majori, minorive, aut nullo sæpe dolore plerumque sub alvi egestionem (ut, ut etiam sæpe sine hac) sanguis ex ano prodit — qui haud raro defectionis tantum tempore sub ultimis nixibus vel in guttis aliquot, vel striis cruentis interfecet, alias vero purus etiam sanguis citra ullos nixus, & inopinate erumpit, ut in indusiis tantum observetur, aliquando autem tam ubertim, ut pro illo excipiendis subjectis linteis opus sit.“ Permirum autem est hæmorrhoides, referente I. STORCHIO, (d) quarum in vita non nisi molimina aderant, a morte fluxisse viro cuidam ex cachexia phthifico, idque ad sepulturam usque. Ceteroquin vero fluentium quoque hæmorrhoidum complura sunt genera, ab indole nempe, & copia profluentis humoris pendentia. Idcirco.

a) In-

(a) Diff. cit. §. 14. p. 17.

(b) Diff. cit. Cap. 9. p. 25. sq.

(c) Fränck. Samml. 7. Band 42. St. Nro. 1. p. 381. sq.

(d) Obs. clin. ann. 3. Junii Nro. 4. p. 375.

a) Indoles fluxus si spectetur, sunt

1. *Rubræ* hæmorrhoides, dum earum fluxu sanguinis cruor excernitur, quod potissimum evenire consuevit.

2. *Albæ* autem hæmorrhoides vocantur, dum humor quidam albicans ano excernitur. De his alibi (a) seorsim agetur.

b) Copia vero fluxus spectata, sunt

1. *Parcæ* hæmorrhoides, vel quod minori quam alias copia procedant, vel quod plethoram non satis imminuant nec symptomata levent.

2. *Moderatæ* vero illæ dicuntur, quæ sine sensibili virium imminutione, & cum euphoria symptomatumque, si qua præcessere, levamine prorumpunt. Denique.

3. *Nimiæ* sunt, quæ sublato per fluxum impetuosum, vel diuturnum, vel crebrum inter humores ac vasa æquilibrio functionum insignem post se trahunt læsionem, summam nempe virium debilitatem, cum sani prius coloris mutatione in pallidum, ac subictericum, quæ sunt propria nimii fluxus hæmorrhoid-

(a) Vid. histor. hæmorrhoid. albar. §. 1. & 2. II. B.

hoidalis criteria (a) sine quæis iste, etsi liberalis fuerit, nimius dici non debet. Utriusque exempla varia inferius (b) dabuntur, & sane plurimum interest, fluxum hæmorrhoidalem nimium a liberaliori discernere, ne in medela aberretur, eunique non e copia sanguinis excreti, sed ex effectibus metiri; fallit enim copia, quæ eadem in uno nimia; in alio mediocris ab effectu censenda est. Hinc scite E. RUDIUS. (c) „qui dejectiones non penes virtutem; sed penes copiam mensurant, patientes in maxima discrimina deducunt, dum ante tempus eas suppresseræ aggrediuntur; quandoque enim exeunt. 4. & 5 **¶** sine virium detrimento, nonnunquam neque duæ sine maximo nocumento excernuntur.“ Ceterum notante F. HOFFMANO (d) „sanguis in nimio hoc profluvio ater plerumque in principio excernitur, valdeque grumosus, interdum etiam in frustra, quæ palmam manus æquant, coactus e varicosis vasis evacuatur; postea sequitur rubicundus, & demùm admodum serosus quandoque pituitosus, sive mucus albuminis ovi speciem habens.

„Copia

(a) L. Riverii Prax. med. L. 10. C. 10. HOFFMANN. med. rat. syst. T. 4. P. 2. S. 1. C. 4. thes. path. §. 1.

(b) Vide §. 49. Nro. 2.

(c) Art. med. L. 2. C. 35.

(d) L. c. §. 3.

„Copia sanguinis excreti nonnunquam oppido magna.“ Plerumque autem nimium hæmorrhoidum fluxum præcedunt varia symptomata spasmodica, testibus ALBERTIO (a) ac HOFFMANNO (b) ut sunt horrores, pulsus contractus, dolores, flatulentia, a pal-
lida, &c. quæ a liberali fluxu absunt.

§. VII.

IV. *Typus* porro *morbi* varius esse solet, ita tamen, ut ad bina sese genera reduci patiatur, quorum constituunt unum

I. *Anomalæ hæmorrhoides* quæ a duplici sanguinis nisu proveniunt, nimirum vel directo versus anum, attamen aut exorbitante, aut insufficiente ad moderatum, pacatumque fluxum producendum, vel regurgitatorio, eoque aut laterali devio, aut retrogrado sursum in abdomen, thoracem, caput, &c. Ac proinde anomalæ hæmorrhoides sunt, quæ vel fluxum inter morbosa symptomata moliendo hunc aut nunquam, aut ægre admodum (i. e. parcum, rarum, vagum,) aut etiam nimium (ubertate, frequentia vel diuturnitate) inducunt, vel ob regurgitantem
a va-

(a) Diff. de hæmorrhoidib. excedentibus. §. 11, 1q. Tract. de hæmorrhoidib. P. 1. p. 194. sqq.

(b) L. c. §. 2.

a vasis ani alias in partes sanguinem harum functiones lædunt. Hæmorrhoidum anomalæ doctrinam proluxa dissertatione complexus est M. ALBERTI; (a) exempla vero illarum prorsus varia passim deinceps (b) occurrent. Alterum porro typicarum hæmorrhoidum genus constituunt.

2. *Regulares hæmorrhoides* i. e. quæ debito tempore, iuxta copia ex ani vasis fluunt sine insigni molestia, imo cum euphoria. Hujus quoque commatis exempla deinceps (c) occurrent.

§. VIII.

V. CAUSA item hæmorrhoidum genera duo suppeditat, cujus intuitu sunt illæ.

1. *Protopathicæ*, quæ tantum modo ex sex rebus non naturalibus progignuntur citra ullum alium præsentem, prægressumve morbum, cui imputari possent. Hujusmodi sunt hæmorrhoides ab ingestis variis, (d) a nixibus (e) motu (f) &c. concitatae. Contra ea

2. *Deu-*

(a) Diss. de hæmorrhoidum anomalis in Tract. de hæmorrhoidib. P. 1. p. 307. sqq.

(b) Vide §. 53. I. II. Nro. 8. III. B. Nro. 1. §. 55.

(c) Vide §. 49. Nro 3.

(d) Vide §. 19.

(e) Vide §. 20.

(f) Vide §. 26.

2. *Deuteropathicæ* morbis aliis præsentibus, aut prægressis velut effectus debentur, cujusmodi sunt, quas alvi fluxus (*a*), febres (*b*), atra bilis (*c*), hydrops (*d*), scorbutus (*e*), &c. effecerunt. Harum rursus aliæ sunt

a) *Criticæ*, quæ morbum, cui superveniunt, solvunt (*f*); aliæ

b) *Symptomaticæ*, quæ morbum supervenientes augent, & periculosiorem reddunt. Solide hoc argumentum M. ALBERTI (*g*) pertractavit.

§. IX.

VI. STATUS denique hujus morbi denuo duplex esse potest, videlicet hæmorrhoides

1. *Solitariae*, quæ hominem ab omni alio morbo liberum detinent,

2. *Com-*

(*a*) Vide §. 23. a) §. 19. d)

(*b*) Vide §. 28.

(*c*) Vide §. 18. a)

(*d*) Vide §. 18. c)

(*e*) Vide §. 18. d)

(*f*) Vide §. 53. III. A. Nro. 2. a) seqq.

(*g*) Diss. de hæmorrhoidib. symptomat. & perniciosis, Resp. F. R. HEIDEGGER, 4, Halæ 1726,

2. *Complicatæ* cum alio morbo, five dum deuteropathicæ sunt, five dum & iste, & ille ex communi causa simul nascuntur, aut dum unus horum morborum alterius est symptoma non nisi epigenomenon, quin ullo sibi nexu copulentur. Et vero haud rarum est, hæmorrhoides cum aliis complicari morbis, iis, quos modo dixi, modis. Frequentiores horum morborum sunt

a) Alvi fluxus (*a*).

b) Leucorrhæa (*b*).

c) Lithiasis (*c*).

d) Artuum dolores (*d*), &c. Podagræ cum lithiasi renum & hæmorrhoidibus anomalis in Jll. quodam sene observatæ casum videre est apud E. G. BALDINGERUM (*e*).

CAPUT

(*a*) Vide §. 43. a) §. 51. B. a. Nro. 1.

(*b*) J. STORCH. Frax. med. T. 2. d. 2. p. 181.

(*c*) M. ALBERTI. Diss. de consensu calculi cum hæmorrhoidib. externis, et Diss. de hæmorrhoidum consensu cum calculo et podagra in Tract. de hæmorrhoidib. P. 2. p. 110. sqq.

(*d*) Vide §. 33. c)

(*e*) Nen. Magazin für Aerzte. 6. Band. 5 St. p. 443.

CAPUT III.

PROEGUMENAE CAUSAE.

§. X.

AETAS hæmorrhoidibus obnoxia est vel maxime *adulta*, ac vegeta: unde illas etiam HIPPOCRATES (a) inter virilis ætatis morbos retulit; ubi enim adolescentiæ juventutisque morbos percensuisset, subdit: „his vero, qui „hanc ætatem superarunt, crebri anhelitus, „morbi laterales, pulmonum inflammationes, „lethargi, phrenitides, febres ardentes, diurna alvi profluvia, cholera, intestinorum „difficultates & levitates, sanguinis per ora „venarum, quæ in ano sunt, profusio, hæmorrhoides Græcis dictæ“ quas ante pubertatem non accidere alibi (b) quoque asserit. Si HEURNIUS (c) audiatur, homines ab anno ætatis 35to ad 64um in hæmorrhoides pronos esse enunciat. Interea tamen haud pauca præstant observata hæmorrhoidum etiam infra hanc ætatem, imo in tenerrima quoque ætate jam visarum. Enim vero nihil ut dicam de annis, 24to & 18vo, quæ ætate duo apud

I.

(a) Sect. 3. Aphor. 30.

(b) Coacor. Nro. 512.

(c) Comment. in HIPPOCR. aphor. cit.

I. S. STORCHIUM. (a) Juvenes hæmorrhoidarii facti sunt, certe 16 vel 17 annorum erat Juvenis SALOMONIS (b)

— — — puella ROSTII. (c)

15 — — — puer BEHRII. (d)

14 — — — puer STORCHII. (e)

qui ad 20 annum quo tempore opem petiit, fluxum hæmorrhoidum cum colica patiebatur.

13 annor. erat puer MATERNII. (f)

12 — — — ETTMULLERI. (g)

11 — — — SCHLIERBACHII. (h)

10 $\frac{1}{2}$ — — — puella STORCHII. (i)

9 — — — puer ALBERTI. (k)

9 — — — LENTILII. (l)

9 — — — BURGHARTI. (m)

C 2

8:

(a) Obs. clin. ann. 1. April. d. 4. Nro. 3. p. 88. sq.
& ann. 2. Jul. d. 2. Nro. 10. p. 303. sqq.

(b) Vide §. 115. Nro. 1.

(c) Vide §. 29. a) β .

(d) Vide §. 15.

(e) L. c. ann. 5. May. d. 4. p. 135.

(f) Vid. hist. hæmorrhoid. vesicæ. §. 23.

(g) Vide §. 63. d)

(h) Vide §. 56

(i) VonWeiberkrankh. 2. Band. Casu. 205. p. 603

(k) Vide §. 15.

(l) Ibidem.

(m) Vide §. 55. Nro. 9. b)

8 annor. erat puer FISCHERI. (a)

8 — — — FRANCI (b), largum hæmorrhoidum fluxum æstate nactus, dein vero trimestri quartana autumnali correptus.

8 annor. erat puella ALBERTI (c),

8 — erat puer s. SCHULTZII (d), sanguinem ano aliquoties sine ullo uspiam dolore, aut functionum læsione excernens, nisi quod interdum copiose sudaret, & sæpe narium pateretur hæmorrhagiam cum non multo p. n. calore, qui sedata hæmorrhagia etiam sedabatur. Inspecto podice tumentes ejus venæ, ac sanguinem stillantes viscebantur. Duravit id per aliquod æstivas hebdomadas; at 12mo anno puer vegetus erat. Meminit Auctor & alius pueri junioris idem sine ullo detrimento passi. Haud secius

8 annorum puella M. B. VALENTINI (e) omni pene mense hæmorrhoides innoxie fluxere. Perinde vix

7 annorum erat puer C. F. PAULINI (f) ex hereditaria labe valde spleneticus, cui post præ-

(a) Vide §. 15.

(b) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 4. Obs. 5.

(c) Vide §. 53. III. B. Nro. 2.

(d) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 8. Obs. 22.

(e) Ibid. dec. 2. ann. 4. Obs. 97.

(f) Ibid. ann. 5. app. p. 52. & Obs. phys. med. Cent. 2. Obs. 92.

prævios lancinantes ventris dolores hæmorrhoides primum crescente luna fluxere, postea vero citra dolorem jam in prima, jam ultima lunæ quadra, interdum etiam in plenilunio, quovis tamen mense per unum alterumve diem cum euphoria ac hilaritate, idque ultra 20. hebdomadas. Perinde

7. annor. erat puella RIEDLINI. (a)

7. — — & puer WAHRENDORFFII. (b)

6. — — puer ALBRECHTI. (c)

6. — — — MÜLLERI. (d)

6. — — — I. C. GRIMMII. (e)

cui sæpius hæmorrhoides sine ullo symptomate fluxere. Et

6to anno ætatis jam I. C. GOETZII (f) vir hæmorrhoidum fluxum sat crebrum, & ubi nactus est, præsertim a majore vel corporis vel animi mortu; quem tamen non tam remediis quam provido regimine incolumen servavit. Porro

5to

(a) Vide §. 15.

(b) Annal. Wratisl. Tent. 37. A. 1726. Jul. d. 4. Art. 18. p. 137. sqq.

(c) Vide §. 23. a)

(d) Vide §. 84. c)

(e) Miscel. nat. cur. Cent. 9. Obs. 92.

(f) Acta natur. cur. Vol. 2. Obs. 186.

5to anno ætatis puer HOFFMANNI (a)
fluxum hunc adeptus est, et

4. $\frac{1}{2}$. anno puer vratislaviensium strangu-
riam primum hæmorrhoidalem contraxit, quam
deinceps fluxus est consecutus. (b)

4. annor. erat puer HOLDBREINDII (c)

4. — — — VOGELII (d)

4. — — — HOFFMANNI (e)

qui „cum ageret 4. annum, binis vicibus
„sanguinem per alvum excrevit, & postea per
„duos annos conquestus est de dolore in
„dextro hypochondrio gravativo, sanus de
„cetero, & floridissimus: 7mo ætatis anno
„corripitur variolis, succedebat febris inter-
„mittens erratica, & tandem lenta, a qua non
„poterat liberari, sed convulsione gravissima
„accedente moriebatur.“

4. annor. erat puer I. M. WOLFFII (f) pa-
tre hæmorrhoidario genitus, qui „4to ætatis
„anno

(a) Vide §. 15.

(b) Vide §. 45.

(c) Vide §. 15.

(d) Vide §. 95. c)

(e) Diff. de morbis incongruis. §. 4. op. supp. 2.
P. 1. p. 617.

(f) Commenc. Nor. T. 10. A. 1740. Hebd. 34.
Nro. 2. p. 269.

„anno hæmorrhoidalem fluxum singulis mensibus ordinarie recurrentem pati cœpit, & talem ordinem per integrum annum fluxus absque multis incommodis servavit. Deinde per semestre profluxus ille cruoris sua sponte desuit; præterlapso autem isto tempore iterum observabatur, & adhuc dum in puero vegeto singulis mensibus revertitur.“ Porro

3. annor. erat puella BERDOTI (a)

3. — — — HOFFMANNI (b)

3. — — — puer HOLDEFREINDII (c)

3. — — — WAHRENDORFFII (d)

3. — — — C. M. ADOLPHI (e),

„qui 3um annum agens hæmorrhoidalibus passionibus & fluxibus primum vexatus est, certisque temporibus, ac statim jam per 3 annos experitur eos.“

2. annorum erat puer FROMMANNI (f), tibicinis filius, in quo „ego (inquit Auctor) . . hæmorrhoides & fluentes, & cæcas hic observavi. Laborabat ille per aliquot dies

(a) Vide §. 53. III. B. Nro. 2.

(b) Vide §. 21.

(c) Vide §. 15.

(d) Vide §. 53. III. B. Nro. 2.

(e) Misc. nat. cur. Cent. 7. Obs. 36.

(f) Traët. de hæmorrhoidib. P. I. probl. 26. p. 125. seqq.

„dies materiæ acrioris profluvio, quod do-
 „mesticis domestici sedare laborarant. Tan-
 „dem autem purus sanguis promanavit, &
 „insimul intumescencia quasi vesicæ cujusdam
 „minoris ex ano prodeuntis, sed brevi in
 „anum redeuntis, ibi fuit notata . . . Ego
 „ . . . vesperi vocatus dormientem offendo
 „puellum, sed ubi evigilarat, tussi primum
 „inde vomitu torquebatur, quo in connatu
 „purus sanguis ex inferioribus quantitate fe-
 „re cochlearis minoris promanabat, eoque
 „ipso momento subito vesica quædam cruore
 „plena atro-rubei coloris ad tactum dura,
 „quæ tamen digito non nihil cedebat, quan-
 „titate, & colore fere maturrimi pruni ex in-
 „feriori gutture emergebat, quam facile manu
 „mater reprimebat. Quo facto infans somno
 „iterum corripiebatur; sed hoc tenuo excusso
 „eandem, quam prius, agebat natura me præ-
 „sente tragœdiam. Huic quod medicamenta
 „alia respueret, liquoris stiptici guttulas ali-
 „quot cum cerevisia exhibendas intro, extra
 „vero cataplasma ex herbis adstringentibus
 „in aqua ferrata decoctis præscribo. Ex ho-
 „rum usu semel admissa mox malum illud re-
 „misit, manente tamen, quia mater usum li-
 „quoris illius neglexerat, fluxu priore, repe-
 „tito autem liquoris usu profluvium conti-
 „nuare desit.“

1 $\frac{1}{2}$ anni fuit puella ALISCHERI (a) puer-
que RIEDLINI. (b)

1. anni erat infans HEISTERI (c) & alius
ejusdem ætatis apud STORCHIUM (d), cui den-
titionis tempore varix hæmorrhoidalis in ano
tumuit, cum febre, tussi, alvo clausa, &c.
Meminit ille (e) alius etiam infantis 20. heb-
domadam, diarrhœam aliquot dierum cum
tenesmo passi, cui semper aliquid sanguinis
succedebat, donec etiam hæmorrhoidale tu-
berculum fuisset enatum. Sic etiam R. A. VO-
GELII (f) sanus infans ac plethoricus, vix
quadrimestris, subito in ani hæmorrhagiam
incidens, die 1mo fugebat, nec ullo dolore
affici videbatur, cum nec inquietus fuerit,
nec ejularit; utut interdum leviter convelle-
retur; die autem 2do jam fugebat ægrius,
hæmorrhagia fuit crebrior uberiorque, abdo-
men intumuit; vomuit aliquoties bilem, &
ubera prorsus respuebat, sub vesperam obiit,
post

(a) Vide histor. hæmorrhoid. albar. §. 2. II. B.
Nro. 1. b)

(b) Vide §. 15.

(c) Vide §. 63. d)

(d) Obs. clin. ann. 4. Decembr. Cl. 3. Nro. 8.
f) p. 614.

(e) Ibid. ann. 3. August. Cl. 3. Nro. 13. p. 504.

(f) Academ. kleine Schriften, pathol. pract. und
chirurg. Inhalts. 1. Samml. Nro. 2. §. 14. p. 69.

post spumam horis aliquot ante mortem circa os collectam, levesque obortas cum stercore convulsiones. Toto hoc biduo nil alvo fecum reddidit. Referebant parentes aliam quoque jam prolem se eodem ex morbo intra idem tempus amisisse. Demum & GOERTZII (a) factior a prima pueritia ad provectam usque ætatem hæmorrhoidum fluxum patiebatur. Plures ejusdem argumenti historias D. M. MATTHIÆ (b) ac I. STORCHIUS (c) collegerunt, multaue de juniorum hæmorrhoidibus M. ALBERTI (d) est commentatus. Numerosa itaque hæc exempla ignorasse omnino videtur A. HAENIUS (e) quærens: *an infantes soleant hæmorrhoidibus laborare?* „Ita „nobis (reponit ipse) vetulæ custodes jurant, „matresque matronæ; facto vero accuratio- „re examine constat, tenello in corpusculo „finem Recti laxari sæpius, ejusque relaxati „plicam referre tumorem, quem falso hæmorrhoida appellitent; vel etiam tumorem hunc „& pressum, & ani strictura veluti suffocatum „speciem gerere corpusculi profunde rubri, „aut lividi, quod hæmorrhoidis appellatione „per-

(a) Vide §. 82.

(b) Obs. med. Nro. 14.

(c) Von Kinderkrankh. T. 3. p. 482. sqq.

(d) Diss. de hæmorrhoidib. juniorum. Resp. E. F. FUCHS. 4. Halæ 1727.

(e) L. c. cap. 5. §. 10. p. 82.

„perperam insigniatur. Inexperta manu data
 „infantibus enemata, pessimus (isque fre-
 „quens tamen) mos suppositoriis ex calidiore
 „semine sacharo involuto eodem assiduo tor-
 „quendi; ani tumores, excoriationes; imo
 „sanguinis fluxum excitare quidem possunt;
 „at vero ideo hæmorrhoides aut non sunt,
 „aut, si sint, ut per infortunium natæ curan-
 „dæ sunt. Posse autem contingere ut infanti
 „fluxus hæmorrhoidalis sponte natura nasca-
 „tur, inficias haud ivero . . . modo mihi
 „concedatur, haud minus id in natura mon-
 „strum esse, quam si recens natæ puellæ men-
 „ses fluant, cujus rei quoque exempla enar-
 „rantur. „ Provocat dein ad HIPPOCRATEM
 hæmorrhoidas ante pubertatem contingere ne-
 gantem, ut paulo superius vidimus, idque
 ob veram plethoram hacce in ætate rarissi-
 mam, utut spuria sæpius accidat, & si ni-
 hilo minus tale quid eveniat, non tam ex
 ano: quam naribus potius hæmorrhagia sol-
 vi: „unde (inquit) necessario consequitur id,
 „ut licet de prosapia genitus sit infans, cui
 „ab ævo immemorabili hæmorrhoids familia-
 „ris; tamen tempus pubertatis requiratur,
 „antequam vere appareat. „ Interea captioso
 HAEN sua in quæstione utitur infantis voca-
 bulo; vel enim de tenerrima tantum impube-
 rum ætate sese intelligi vult, vel de toto us-
 que ad pubertatem ipsam tempore; si prius,
 utique res est longe rarissima, ac pro mon-
 stro habenda, cujus paucissima exstant obser-
 vata; sin posterius, certe actum agit, rem
 rati-

ratiunculis negare volens (id est paulo majorem puerili & adolescente in ætate, ante pubertatem licet, hæmorrhoidum frequentiam), pro cujus veritate adeo numerosa jam exstant observata. Sed qui possit ille pro divitatem ad hæmorrhoides juniori in ætate concedere, qui eam ne in adulta quidem, cui illa propria est, eo usque admittere voluit quo usque vel ipsa natura eandem induxit?

§. XI.

2. *SEXUS masculus* præ sequiori multo sæpius cum hæmorrhoidalibus malis conflictatur, haud tamen eatenus iste ab iis immunis est, ut vel nunquam vel rarissime illis laboret. Nam etsi feminæ plethoram ob catamenialem suum fluxum haud ita facile colligant, & hæmorrhoidalis quoque sanguis per uterum cum catameniali facilem nanciscatur exitum; tamen non ita paucæ vel raræ sunt hæmorrhoidum in feminis causæ singulares, a quibus illæ ipsas affligunt, ut sunt: hereditaria labes, catamenia suppressa, vel per ætatem deficientia, venus nimia, præsertim vero labes syphilitica, &c. Ut recte monuit M. ALBERTI (a), idque vel maxime in plethoricis,
lau-

(a) Diff. de morbis feminarum virilibus (Resp. A. WEGENER. 4to. Halæ 1638. §. 6. 7. p. 21. sqq.

lauteque ac otiose viventibus. Trium hicce Auctor (α) hujusmodi feminarum meminit, quæ ex hæcenus enumeratis peculiaribus causis hæmorrhoides nascæ sunt prima illustris conditionis sanguineo — cholericæ, juvenis, nuptiæ data, lauteque vivens præter catamenia larga hæmorrhoides quoque per intervalla jam serpiginosas, jam cæcas, jam fluentes patiebatur: altera itidem nupta, 20. annorum præter anomalum mensium fluxum modo leucorrhœam, modo hac cessante hæmorrhoides experiebatur: tertia quoque de stemate, ac 22. annorum alternis vicibus anomalos menses, hæmorrhoidesque habuit. Virginem quoque novit M. SCHURIGIUS (β) cui cum catameniis hæmorrhoides quoque semper ubertim fluebant. Perinde R. LENTILIUS (b) matronam novit, cui præter legitima catamenia interdum & hæmorrhoides usque adeo fluebant, ut remediis cohiberi debuerint. Et D. SENNERTUS „novit ipse nobilem feminam corporis constitutione sanguineam, affectio-
 „ni tamen hypochondriacæ obnoxiam, quæ sin-
 „gulis mensibus ordinariæ, & quidem die
 „post menstruum fluxum 14to. hæmorrhoides
 „patiebatur.“ Ita etiam LEONORAM Galliæ
 „Reginam hæmorrhoidibus juxta ac mensibus
 „obnoxiam fuisse testis“ est I. FERNELIUS
 „idem-

(a) Diff. de hæmorrhoidib. juniorum. §. 4. p. 17.

(b) Misc. nat. cur. dec. 3. ann 5. append. p. 99.

(β) Litholog. Cap. 2. §. 65. p. 232.

(a) idemque experta est WEDELII (b) mulier. Plura huc facientia, suis deinceps occurent locis. (c) Ceteris autem paribus hæmorrhoides non immerito viriles ad morbos ab HIPPOCRATE (d) referuntur dicente : „viris „autem intestinorum difficultates, & alvi pro- „fluvia, febres algidæ, & hybernæ diuturnæ, „pustulæ multæ nocturnæ, epinyctides dic- „tæ, & sanguinis profluvia, per ora vena- „rum, quæ in ano sunt, hæmorrhoides vo- „cantur.

§. XII.

3. TEMPERIES, *sanguinea, cholericæ, melancholica*, vel ex his conflata, *sanguineo-cholericæ, vel sanguineo-melancholicæ*, &c. Teste enim G. E. STAHLIO (e) „subjec- „tis accidere solet facilius hic fluxus sangui- „neo-cholericis, & sanguineo-melancholicis „plethora affectis“ videlicet ob sanguinis qua- „copiam, qua lentorem, præsertim relate ad „viscera abdominalia. Veritas hujus causæ ex innumeris passim hujusce libri casibus elu- „cescet.

§. XIII.

(a) Consil. med. 41.

(b) Vide §. 142. d)

(c) Vide §. 29. a) β. γ.

(d) De aere, locis & aquis. p. m. 281.

(e) Diff. de hæmorrhoid. internar. motu (4to.

Halæ 1698. Resp. I. D. COHLIO.) Cap. I. p. 5

§. XIII.

4 VENARUM *hæmorrhoidalium longitudo situs perpendicularis, laxitas, Capacitas* major, Longitudo, situsque ad perpendicularum nativa semper sunt in homine, ac magnopere ad prodividatam in hæmorrhoides faciunt; namque I. B. MORGAGNIO, (a) recte notante sanguis in vena hæmorrhoidali interna præprimis facillime stagnare potest, propter „maximam, quæ inter ceteras illas „venas huic uni peculiaris est, longitudinem, „ut multo ex hac quam ex illis difficilius sit „sanguinem promoveri sursum, præsertim, „ut humani corporis requirit situs: quæ una „haud dubie ex causis est, & quare alia animantia hæmorrhoidibus non sint obnoxia.“ Multo ante id jam suspicatus est I. BOHNIUS (b) cujus verba non pigebit hic attexere. „Præmonere volo (inquit ille,) venæ huic „sedali internæ talem contigisse per naturam „conformationem, quæ ad ejusmodi stagnationem sanguinis inflativam magis disposita videtur. Scilicet, primo perpendiculari magis situm, seu ascensum a podice „versus communem alveum, cujus intuitu „per venam hanc ad perpendicularum tardius, „ac

(a) De sedibus, & causis morbor. Epist. 32: Nro. 10.

(b) Diss. de hæmorrhoidib. cæcis (4to. Lipsiæ 1794, Resp. I. I. HERING.) §. 16. 17.

„ac difficilius sine dubio elevatur sanguis, pe-
 „rinde circiter, ac venas crurum præ aliis
 „frequentius in varices explicari palam est.
 „Deinde ipsa compages intestini recti; in qua
 „illa radices figit, adeo laxa est, ut sibi
 „reliæta sanguinis per hanc motum naturalem
 „minus; ac aliæ firmioris texturæ partes (v.
 „g. muscoli) juvare queat. Quam laxitatem
 „intrinsecam tertio non parum auget humi-
 „ditatum frequentior, ac uberior affluxus
 „(i. e. receptivitati ejus adæquatus,) & per
 „quem leviores ejus læsiones sæpius in gra-
 „viora mala abeunt. Imo quarto venæ hu-
 „jus extremitates, quia non tam in pro-
 „fundo substantiæ intestini reconduntur, quam
 „prominent, & tenui saltem atque tensili
 „admodum tunica obvelantur, facilius dis-
 „tenduntur, atque lacerantur, perinde circiter;
 „ac narium v. g. venulas præ aliarum parti-
 „um vasis sanguinem fundere novimus. De
 „cetero nec improbabile est, hanc confor-
 „mationem omnibus hominibus communem
 „secundum individua aliquantum variare, &
 „ad sustinendas hæmorrhoides cæcas hæc
 „præ aliis magis determinari, ita, ut non
 „omnes a partu difficili eas experiantur; aliæ
 „contra in facili quoque & fere semper —
 „Qualem similemve conformationem pecu-
 „liarem causam quoque puto, quod familiis
 „quibusdam harumve pluribus individuis,
 „hæmorrhoidibus fluentibus æque, ac furen-
 „tibus laborare quasi hereditarium observetur
 „— licet forsan communis hæc familiarum
 „in

„in hunc affectum propensio etiam aliquando
 „identitatem humoralem agnoscat.“ Hæc
 ille. Si vero jam ad hanc nativam venæ in-
 ternæ hæmorrhoidalis longitudinem, situm-
 que perpendicularem simul accesserit seu na-
 tiva pariter, seu aliunde effecta laxitas, &
 capacitas, augebitur columnæ sanguinis,
 ibidem pondus, & difficultas contra direc-
 tionem gravitatis motus, unde stagnatio,
 accumulatio sanguinis, venæque in varices di-
 stensio ac ruptura inevitabilis. De solito ma-
 jori; nativa tamen hujus venæ amplitudine pro-
 stat apud CABROLLIUM (a) observatio in juve-
 ne quodam, cui duo fuere lienes cum propriis
 cuique venis, & arteriis; maxima fuit hæmorr-
 hoidalis vena medio ex liene exiens. In vi-
 tra semper hilaris erat juvenis, nunquam tris-
 tis.

§. XIV.

5. PLETHORA vera spuria; ab utraque
 enim vasa venosa hæmorrhoidalia justo ma-
 gis dilatantur, varicosa fiunt, rumpunturque.
 Situs autem & fabrica harum venarum in
 causa est, cur illis præ aliis a sanguine vis in-
 feratur, ut paulo ante dictum fuit. Quod
 si vero jam aliquando hæ venæ vim a pletho-
 ra perpeßæ sunt, laxioresque redditæ;
 facilius etiam deinde a sanguine vel massa,
 vel

(a) Observ. anat. 15.

vel volumine aucto superantur ; atque sic dispositum ad hæmorrhoides corpus efficitur magis. Cavendus tamen quorundam est error, ne cum illis omnes hæmorrhoides a plethora repetamus, atque sic perperam omnem illarum curationem ad plethoram minuendam præprimis per sanguinis missiones dirigamus ; haud pauci enim hodie sunt pathologi, qui non abs re hæmorrhoides crebrius a dyscrasia humorum ; quam plethora oboriri contendunt. Sic I. A. WEDELIUS (a) „plethora — aliquando (ait) juncta videtur, „rarius tamen, quam quidam existimant, & „si adest, cacochymica, adeoque spuria magis deprehenditur.“ Verum enim vero Auctor hic, & BOHNIUS, (b) contrariam rursus in partem impingunt, dum vix unquam plethoræ veræ locum hic dandum esse censent. Oriri enim multo sæpius, ac illis quidem videtur, ex plethora hæmorrhoides nemo facile inficiabitur, qui secum reputaverit, nasci eas toties in corporibus sanguineæ temperiei, laute, atque simul in otio viventibus, feminis præsertim, parcius simul menstruantibus, neque in bene multis enormem hæmorrhoidum fluxum & quidem per intervalla recursantem (c) citra sensibilem noxam toleratum iri, nisi superfluæ

(a) Diss. de hæmorrhoidib. cæcis (4to. Jenæ 1732. Resp. I. DIELERO) §. 20. p. 12.

(b) Diss. cit. §. 22.

(c) Vide §. 29. 2) β. γ.

fluxū sanguinis boni copię deberetur; quid quod cum euphoria feratur? Accidit utique interdum, ut ipsa plethora vera dyscrasiam sibi demum humorum associet, velut accidit apud F. HOFFMANNUM (c) Comiti cuidam robusto, ac sanguineo, nullum fere unquam ante morbum experto, donec ingravescente ætate lauta ei, & vinosa in otio diætā & neglectā Væ. Sect. hæmorrhoidum fluxum conscivissent, singulis fere mensibus insigni cum euphoria per multos annos revertentem. Tandem hyeme quadam a perfrigerato vehementer corpore hæmorrhoides cæcas ardentes, dolentesque nactus idoneis remediis convaleuit quidem; at circa veris æquinoctium in trimestrem fere illarum incidit fluxum copiosissimum. Supervenit insuper dolorifica ophthalmia. quam perinde sanatam exceperunt suecive crebræ pectoris ventrisque tensiones, pressorii, & gravativi in osse sacro dolores, sæpius ad femora, pedesque extensi, frequens micturitio, anorexia ac dyspepsia. Quæ omnia satis docent, sanguinem hocce in corpore copia tantum primum, deinde etiā lentore peccasse. Sed cum a plethora hæmorrhoides nasci non sit ambiguum; paradoxum tamen videri debet, eas ab inopia humorum bonorum nasci posse, id, quod H. F. DELIUS (a) tuetur, quod videli-

(a) Consult. & resp. med. cent. 2. Cas. 26.

(b) Fränk. Samml. 7. Band. 42. St. 1. Abschnitt.
P. 493.

delicet vacuæ arteriæ magis sese contrahendo sanguinem debiles in venas compellant, eumque ibi stagnare oporteat. Sed vereor, ut opinio hæc defendi possit; nam etsi v. g. hydropicis hecticisque exhaustis hæmorrhoides aliquando accidant, eas tamen non tam ab inopia; quam acri humorum tenuitate nasci existimo.

§. XV.

6. *HÆREDITARIA labes.* „Hæc si ullibi, „certe in hæmorrhoidali negotio manifesto „deprehendi solet, inquit M. ALBERTI (a); „qui hoc argumentum alias etiam fuse per- „tractavit (b).” Radicalis hujus labis causa nondum ingenio humano perspecta est; forte præter temperiem ad hæmorrhoides idoneam soboles a parentibus & venarum arteriarumque aptissimam ad eas fabricam cum sanguine itidem apto, & latente quodam systematis nervosi Characterē, &c. accipit. Quidquid illud sit, quod CREATOR oculorum, ac mentis humanæ aciei subduxit, a posteriori certe hæmorrhoides gentilitias dari satis superque constat. Sic non nemo apud J. SCHENKIIUM (c) „Comites novimus (ait) „cer-

(a) Diss. de fluxus hæmorrhoidalis provocatione (4to. Halæ 1719. Resp. A. HERRMANN) thesi 4ta.

(b) Diss. de hæmorrhoidib. hæreditar. (4to. ibid. 1727. Resp. F. G. MEYENBERG.)

(c) Obs. med. L. 3. P. 1. Obs. 155.

„certæ familiæ, qui ex ordine hæmorrhoidi-
 „bus laborant, & tamen læti vivunt, discur-
 „runt, inquieteque se gerunt, quo citius
 „tum ab iis liberentur, venis ad excretionem
 „stimulatis, irritatisque.” Et M. ALBERTI
 (a) „hic loci adhuc vivit (ait) juvenis qui-
 „dam virilitati jam propinquus, qui a patre
 „hæmorrhoidibus cæcis valde afflicto genitus
 „erat, a teneris annis parco licet hæmorrhoi-
 „dali fluxu & successu, multo vero motu,
 „& molimine hæmorrhoidali similem cæcum
 „statum hæmorrhoidum præsentante, laborat
 „ita frequenti, & urgente, ut quot annis
 „pluribus vicibus talem afflictionem patiatur,
 „quæ rarius, interim tamen aliquando, ad
 „actualem perveniunt eruptionem. Est vero
 „in hoc Subjecto status hæmorrhoidalis ita
 „intricatus, contumax, rebellis, arduus,
 „immoderatus, & dolorosus, ut interdum
 „internæ, & externæ inflammatoriæ commo-
 „tiones, & consecutiones obtigerint: quam
 „ob rem hoc individuum exacta diætæ ac re-
 „giminis ratione frui debet. Huic casui...
 „alterum ad latus ponimus. Pater podagri-
 „cus, nephriticus, & hæmorrhoidarius in
 „populosa urbe celebri in officio constitutus,
 „cum matre sanguineo-cholericæ tempera-
 „menti, & largo subinde mensium ac hæmorr-
 „hoidum fluxu prædita, genuit filiam, quæ
 „SVO

(a) L. c. §. 3. p. 14. sqq.

„8vo ætatis anno motus hæmorrhoidales,
 „postea vero præmaturam mensium, & ac-
 „tualem hæmorrhoidum eruptionem experta
 „fuerat. Hæc multas calamitates ab irregu-
 „lari hæmorrhoidum successu passa est, &
 „dum in matrimonium transit, peperit pau-
 „cos infantes vivos, & integros; multis
 „vero abactionibus defatigata fuit. Infan-
 „tes ipsi, qui adhuc superstites, & jam ali-
 „quot annos circumegerunt, varios hæmorr-
 „hoidales insultus patiuntur.” Duos quo-
 que germanos ex hæreditariis hæmorrhoidi-
 bus hydropicos V. RIEDLINUS (a) curandos
 habuit, quorum unus hæmorrhoides in libe-
 ros quoque ita propagavit, ut sesquiennis
 puer ex uberi earum fluxu ultimo semestri in-
 gruente obierit, & puella septennis per bene
 longum tempus post singulas 6. vel 7. hebdo-
 madas tantum ano sanguinis emisit, quan-
 tum adultæ virgines per catamenia effundunt.
 Ad horum porro numerum addenda venit
 ALBERTII (b) femina cum duobus juvenibus,
 BEHRENSII (c) studiosus, BOERHAVII (d)
 Marchio, CNOEFFELII (e) Rex Poloniæ,
 FRITSCHIUS ipse (f), HEISTERI (g) Magnas,
 HOFF-

(a) Lin. med. ann. 4. Novembr. 21ma. p. 963.

(b) Vide §. 53. Nro. 1. & §. 115. Nro. 3.

(c) Vide §. 51. B. 2. Nro. 1. 8.

(d) Vide §. 55. Nro. 9. e).

(e) Vide §. 53. II. Nro. 6.

(f) Vide §. 75. b)

(g) Vide §. 84. b)

HOFFMANNI (a) Judæus, LOEWII (b) Pharmacopæus, ROLLII (c) Sartor, &c. qui omnes hæmorrhoidum heredes fuere. Hujusmodi autem gentilitiæ hæmorrhoides sæpe admodum juniore jam in ætate sese per molimina, vel varices, vel ipsum quoque fluxum exserunt, ita, ut raro impuberum hæmorrhoides aliunde, quam ex hæreditaria labe ortum ducant. Certe quorum hætenus historiæ datæ sunt, ii plerique fuere ex ipsa prosapia hæmorrhoidarii, uti & puella puerque ALBERTII (d), tum juvenis SALOMMONIS (e), pueri WAHRENDORFFII (f), duo & unus WOLFFII (g) apud M. ALBERTI (h) hæmorrhoidaria quædam „femina . . . inter „plures liberos adhuc vivos etiam puerum „indulgentius educatum, & multo victu saginatum sanum & integrum asservat, qui „tamen paulo quietioris est indolis. Hic jam „ferme a 2. annis sua quidem sponte verno „& æstivo maxime tempore menstrua plane „periodo prævio colico dolore conspicuum „hæ-

(a) Vide §. 65.

(b) Vide §. 55. Nro. 14.

(c) Ibid. Nro. 11.

(d) Vide §. 53. III. B. Nro. 2.

(e) Vide §. 115. Nro. 1.

(f) Vide §. 10. & 53, III. B. Nro. 2.

(g) Vide §. 10.

(h) Act. nat. cur. Vol. 1. Obs. 217.

„hæmorrhoidalem fluxum per triduum duran-
 „tem expertus erat, quo peracto, nihil inde
 „adversi lenferat, sed adhuc bona valetudi-
 „ne gaudet. Interea in hoc puerulo notan-
 „dum est, quod ipse a teneris multo opple-
 „tus fuerit victu, & adhuc voraci distinctus
 „sit appetitu; deinde quod mediocri afflictio-
 „ne verminosa laboraverit, quæ tamen parum
 „molestiæ ipsi unquam faceffit, ita ut ex
 „vermibus menstruum hunc sanguinis fluxum
 „deducere, velle non quidem rationi & veri-
 „tati, quod rare mihi videatur. Porro hic
 „puer quoad externum conspectum paulo
 „palidior & turgidior comparet; interim ipsius
 „parens integra gaudet sanitate, neque ulla
 „eminet qualitate, ex qua per hæreditatem
 „hæmorrhoidales motus ex patre in hunc na-
 „tum propagari potuerint; neque mater illo
 „tempore, quo hic puer genitus fuerat, hæ-
 „morrhoidales lenferat conatus: at enim
 „vero hujus matris parens & mater
 „hæmorrhoidali laboraverant profluvio; ut
 „nihilominus hujus incongrui fluxus in hoc
 „puero ratio in hæreditaria dispositione satis
 „conspicue hæreat.” Memoria quoque dig-
 „num casum refert G. BEHR (a): „viri . . .
 „in officio Regio constituti filius unicus . . .
 „annum tunc agens 15um a patre plethorico,
 „& colica hæmorrhoidali nonnunquam di-
 „ve-

(a) Select. med. Francof. T. 2. V. 4. art. 3. p. 277.

„vexato, nullo vero hæmorrhoidali fluxu
 „hactenus affecto genitus (mense Januario
 „anni . . . 1739. in patre prima vice emica-
 „bant hæmorrhoides, luculento testimonio
 „in filium hæreditario quasi jure transiisse
 „easdem) ante 4 annos, mense nempe Mar-
 „tio 1736. paulo post æquinoctium vernale,
 „persentiscebatur dolores exquisitissimos capitis:
 „quam ob causam Æs temperantes antispas-
 „modici in usum vocabantur; quo factum
 „est, ut subsequente narium hæmorrhagia lar-
 „giori dolores cum omnium symptomatum
 „remissione solverentur. Post trium circiter
 „septimanarum decursum cephalalgia recru-
 „descebat, & una cum tensione, atque infla-
 „tione hypochondriorum, dorsique doloribus
 „denuo invadebat: ac propterea Æs ante
 „dicti temperantes antispasmodici denuo &
 „quidem cum euphoria adhibebantur. Et
 „ecce! cum alvum deponeret, sanguinis pri-
 „mum grumosi deinde floridi portionem ad
 „unius præter propter uncie quantitatē tri-
 „bus vicibus semper excrevit. Interim sym-
 „ptomata omnia puerum relinquebant, atque
 „factum tandem est, ut longe vegetior, atque
 „alacrior inde redderetur. Ejusmodi accessum
 „denuo est passus, & quidem circa Solstitium
 „æstivum, deinde mense Septembri post æqui-
 „noctium autumnale. Post hæc vero excre-
 „tiones tales hæmorrhoidales penitus cessa-
 „runt. Mecum interea pensitans casum præ-
 „sentem, eumque majorem, atque exactiorem
 „mereri attentionem existimans, puerum . . .
 „ut

„ut non solum tempus eruptionis (instabat
 „enim æquinoctium vernale), sed etiam quot
 „dies duraturus, quandoque terminum suum
 „fluxus absoluturus esset, probe observaret
 „admonui; quam ad monitionem haud negle-
 „xit in calendario enim optime omnia adno-
 „tavit, mihiq̃ue Schedulam die 7. Februarii
 „1738. sequentem tradidit:

Anno 1737.

die 27. Mart. initium hæmorrhoidum,
 30. . . . finis,
 11. Julii initium,
 13. . . . finis (sat largiter),
 29. Sept. initium,
 1. Oct. finis (iterum largiter),
 7. . . . cœpit &
 8. . . . desit fluxus,
 3. Nov. initium,
 5. . . . finis,
 16. . . . initium,
 21. . . . finis,
 16. Dec. initium,
 21. . . . finis (iterum sat largiter).

„Fluxum semper antecessere hypochondrio-
 „rum inflationes, dorſique dolores, quos
 „nonnunquam (non tamen semper) sanguinis
 „grumosi portio deinde sanguis subsecutus
 „est floridus, nunc parcius, nunc largior;
 „unciarum autem trium quantitatem vix su-
 „peravit. Præterea est monendum, puerum
 „dictum post hanc excretionem hæmorrhoida-
 „lem

„lem neque cephalalgia laborasse, neque a
 „narium hæmorrhagia amplius esse divexatum,
 „alvum quoque semper fuisse liberam. Cæ-
 „terum quod diætam hæmorrhoidarii nostri
 „junioris attinet, quantum scio, vitæ genus
 „non lautum est, multo minus vinosum vel
 „spirituosum; contra cerevisia secundaria pro
 „potu ordinario ipsi semper fuit: nec multum
 „sedendo, sed potius ambulando vitam trans-
 „egit. Præterea utut annus tam 1736.
 „quam 1737. hic locorum fuerit morbidus, imo
 „multis exitialis, siquidem (A. 1736. dysente-
 „ria, An. vero 1737. febres intermittentes tam
 „3næ quam quotidianæ epidemice grassaban-
 „tur noster tamen juvenis hæmorrhoidarius ab
 „omnibus hic locorum epidemice grassanti-
 „bus morbis salvus, ac incolumis permanfit.“

Haud absimilem casum I. R. S. HOLDEFREÜND
 (a) refert de puero, cui robustis sanisque
 parentibus, ordinatum tamen hæmorrhoi-
 dum fluxum passis, genito, & nondum
 4tum ætatis annum ingresso idem fluxus
 accidit, fere 8va quaque hebdomade rediens,
 ut plurimum moderatus, quandoque tamen
 copiosus ac debilitans, cum quo 6um ætatis
 annum attigit sub optima valetudine, roseo-
 que faciei colore. Quid autem ulterior attu-
 lerit ætas, ignoratur. Vidit & R. LENTILIUS
 (b) novenni puero pallido, macroque, cu-
 jus

(a) Erzählungen merkwürd. Kranken - Geschichten im Anhang 3ter. Vorfall. p. 103.

(b) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 9. obs. 124. ann. 5. app. p. 99.

jus pater sat diu nimium hæmorrhoidum fluxum cum debilitate perpeffus est — jam aliquoties hæmorrhoides fluxiffe. P. HOFFMANNUS (a) perinde novit, „adolefcentem „Halberftadienfem civem, qui patre natus est „hypochondriaco, & hæmorrhoidali fluxui affueto, qui omni menfis fpatio hæmorrhoides large fluentes non fine noxa experitur, „in cute fimul apparentibus maculis, vulgo „Leberflecken, quæ difparuere accedente fluxu hæmorrhoidali.“ Simili etiam hæreditario fluxu ejus (b) „puer ex illuftri familia „5to ætatis anno, & repetitis vicibus fuit „correptus“ I. B. FISCHERUS apud A. E. „BÜCHNERUM (c) vidit puerum patre hæmorrhoidario natum octennem, hæmorrhoidum fluxu ita laborantem, ut fub qualibet alvo egefferit fanguinis cochlear parvum fine moleftia, nifi quod temporis proceffu fegnis ac pallidus evaferit. Fluxus idoneis licet remediis adhibitis, duravit per 6. recurfus a Februario ufque ad Aprilem. Ubi autem in id genus ætate fiftema vaforum hæmorrhoidalium nondum pro eo, ac paraffet, evolutum eft, folet hæreditaria illa ad hoc malum difpositio fanguinem ad alias partes cogere, & evacuare. Illuftre hujus

(a) Diff. cit. l. c.

(b) Diff. de affect. hæredit. §. 6. op. fuppl. 2. P. I. p. 552.

(c) Misc. phys. med. A. 1728. Marr. cl. 2. art. 4. p. 910.

hujus rei exemplum dat *STHALIUS* (a), „illustri-
 „vir, qui hæmorrhoidum commode succedente
 „fluxu valetudinem satis prosperam a pluri-
 „bus annis sustentavit, intercedentibus autem
 „aliquibus hæmorrhoidum interversionibus
 „& alia insignia incommoda emergentia ex-
 „pertus est, & pedum notabilem inflationem
 „pervicacem etiam, atque stabilem, filium
 „genuit, qui florida adhuc adolescentia 15
 „ad 18 annorum uti facie illustrem parentem
 „eximie exprimit, ita peculiare hæmorrhoi-
 „dariæ sanguineæ excretionis hæreditariæ sym-
 „bolum exhibet, frequentem præter modum
 „(& per ætatem vix non quotidianam) na-
 „rium hæmorrhagiam; notabili vero magis,
 „& quantum nos sciamus, rariori exemplo,
 „licet non pariter frequentem, certe tamen
 „per ætatem sibi non infrequentem, since-
 „ram exsudationem guttarum forma sanguinis
 „e poris crurum; integra, sana, & prorsus
 „illibata de reliquo cute. Quando vero hæc
 „inprimis evacuatio & fere post hanc illa
 „per nares, præter solitum cessant, acutis
 „febrilibus insultibus cum inflammatoriæ in-
 „dolus signis prompte corripitur.“ Hujus de-
 „nique etiam loci essent, (modo vera res fo-
 „ret) hæreditariæ Judæorum hæmorrhoides, in
 sempiternum illis opprobrium, pœnamque
 ob

(a) *Diff. de hæredit. disposit. ad varios affectus*
 (4to Halæ 1706. Resp. I. BURGHARD) §. 47.
 p. 32.

ob CHRISTUM neci datum, cujus sanguinis sese reos fecere, inflictæ, haud secius ac Philistæi olim ob arcam Domini retentam iisdem sunt mulctati; qua de re multa in unum erudite collegit ex variis I. C. FROMMANNUS.

(a) Neque etiam hinc excludenda est hæreditaria ad hæmorrhoides dispositio, quam proles a parentibus etsi manifeste non hæmorrhoidariis, podagricis tamen ac hypochondriacis accipiunt, qui sæpissime proles hæmorrhoidarias progignere solent. Sane juvenis ALBERTI (b) patre hypochondriaco; podagrigo GOHLII (c) prognatus est, & vratislaviensium (d) juveni podagricus pater, mater calculosa obtigit.

§. XVI.

7. PASSIO *hypochondriaca hysterica* feraces admodum sunt hæmorrhoidum, idque vel maxime ob crebros abdominis spasmos, a quibus sanguinis per inferiores venas sursum refluxus remoram insignem patitur, ac proinde in his venis congeritur, eas distendit in varices, ac demum rumpit. Causam

(a) L. c. P. I. probl. 33. 34. p. 145. sqq.

(b) Vide §. 33. c) β.

(c) Vide §. 47. c)

(d) Vide §. 55. Nro. 5.

sam hanc medicis enixe inculcat POMME; (a) & quid mirum? cum QUARINONIUS (b) literis prodiderit, sæpe se in hypochondriacis mesenterii venas usque adeo reperisse dilatatas, ut intestina potius; quam venæ esse crederentur. Symptomaticæ tunc ut plurimum ac plus lædentes, nedum levantes, sunt hæmorrhoides qualium exemplum luculentum F. HOFFMANNUS (c) commemorat in viro 40. annorum, melancholicæ temperici, qui ex vita sedentaria continuisque lucubrationibus contraxit inde jam a 20 annis malum hypochondriacum, quod primum præcordiorum anxietates, compressionem pectoris ac diaphragmatis, inflativum hypochondrii lævi dolorem, contumacem alvi adstrictionem & insignem animi angorem attulit; ante 10 annos accessit hæmorrhoidum fluxus, sæpiusque abhinc rediit, nullo emolumento; quin potius antiqua mala novis auxit, nempe cordis palpitatione, doloribus capitis, cervicis, ac demum etiam podagricis. Ingruente horrida tempestate cum septemtrionalibus potissimum ventis omnia mire exacerbata videre fuit, & artubus extremis, qui succis alias turgebant,

hor-

(a) Von den hyster. u. hypoch. Nervenkrankheiten. p. 214. sqq.

(b) Consult. 584.

(c) Med. rat. syl. T. 4. P. 3. S. 1. C. 6: Obs. 5.

horrentibus, detumescentibusque cum disparitione vasorum certum fiebat, imminere paroxysmum, cujus symptomata protinus iterum remittebant ad redeuntem artubus dictis nativum colorem. Dolentibus autem artubus externis caput, ac pectus dolore vocabant; quod si dolor extrema deserebat, caput, pectusque graviter impetebat. Appetitus nihilominus adhuc vigeat, imo sæpius fere immodicus erat.

§. XVII.

8. TUMORES *abdominales* quatenus vel venas comprimendo, sanguinis per eas refluxum remorantur, illeque in iis restitans illas in varices elevat (a), vel arteriosum sanguinem haud ea, qua par esset, copia transmittendo ejus ad hæmorrhoidales arterias uberiorem affluxum causant, &c. Huc itaque referendi sunt tumores.

a) *Intestinorum* vel flatulenti, vel stercorei vel verminosi, &c. de quibus alibi (b) singillatim agitur.

b) *Uteri* præsertim foetu gravidæ, de quo perinde pluribus dicetur inferius (c)

c)

(a) C. G. LUDWIG, *Adversar. med. pract.* Vol.

2. P. 3. Diff. 1. p. 388.

(b) Vide §. 21. 23. b)

(c) Vide §. 24.

c) *Renum* scirrhusi, purulenti, aquosi &c. P. A. BOEHMERUS (a) „vidimus (inquit) „in septuagenario nimio hæmorrhoidum fluxu extenuato; & mortuo specialem renum „Hydropem. Ren dexter ponderabat ℥ ij cum dimidia, sinister ℥ ij. Membrana renum adiposa indurata erat ac sero flavescente „urinam redolente referta; interior vero substantia penitus fere vesicularis eundem liquorem continebat. Vesiculæ inæqualis figuræ & magnitudinis reperiiebantur, maximeque pars substantiæ renalis partim corticalis, partim vero medularis deleta.“

d) *Hepatis* infarctus, scirrhus, &c. unde symptomaticæ ut plurimum hæmorrhoides accidunt.

§. XVIII.

9. CACHEXIAE variæ haud raro ita solidis fluidisque vel vitium vel motum anomalum consciscunt, ut inde corpus ad hæmorrhoides reddatur proclive. Huc vel maxime faciunt,

a) *Atrabilis*; nam GALENO (b) teste „quorum succus malus melancholicus fuerit,
„— ni-

(a) Observ. anatom. rar. facic. 2. in præfat. Obs. 4. fol. 6.

(b) De succor. bonitate & vitio Cap. 14.

„— nigras plerisque varices, & hæmorrhoidas attulit, hujusce modi succus:“ quemadmodum id HOFFMANNI. (c) secretario accidit

b) *Lithiasis*. Hanc inter, & calculum magnam intercedere affinitatem, ita ut alterum ab altero facile nascatur, docte omnino demonstravit M. ALBERTI, (b) & singularem hujus commatis casum I. STORCH (c) commemorat. Cholericus - melancholicus 70 annorum multis ab annis calculosas afflictiones perpeffus Martio mense 1727. nactus est in femore ulcus humidum pruriens, ardensque cum materia alba calcarea ei adhærescente; quo nato immunis evasit ab incommodis calculi. Præscriptum:

R. ☿ conchar ppt. d. j. β

— antispasm. d. β. M. div. in doses sex M. & V. ex aqua sumendas.

R. ☿ C. C. usti 3β

— sem. lycop. d. ij. M.

D. pro conspergendo ulcere. Die 12. femore pene jam siccato inflammabatur scrotum, omisso ergo femore iussus est æger ☿em scroto inspergere, simulque unq. lithar-

(a) Vide §. 53. I.

(b) Diff. cit ad §. 9. c)

(c) Obs. clin. ann. 5. Octobr. cl. 4. p. 230.

lithargirii adhibere. Scroto sic etiam 18vo relevato fluxere hæmorrhoides. Ad evenendam abhinc fluxionis materiam datum 25to die catharticum e pillularum de succin. CRAT. BECHER. purg. 33 ðß. unde toto anno sub leni e femore fluxione senex sic satis sanus vixit.

c) *Hydropes* varii, qui symptomaticas, ac plerumque funestas hæmorrhoides (a) producere solent, nisi forte ab harum suppressione illi orti sint, qui fluxu reverso sanantur. (b)

d) *Scorbutus* quoque ingravescens haud raro symptomaticas, & ut plurimum ominosas hæmorrhoides (c) causare consuevit.

e) *Pyoses*, seu cachexia purulenta ab ulceribus internis, externisve, resorptione puris in sanguinis massam, enata: unde toties in tabidis hæmorrhoides symptomaticæ, & exitium plerumque comminantes.

E 2

CAPUT

(a) Vide §. 53. III. B. Nro. 4.

(b) Vide §. 53. III. A. Nro. 2. i)

(c) Vide §. 53. III. B. Nro. 2.

CAPUT IV.

PROCATARCTICÆ CAUSÆ.

§. XIX.

I. **I**NGESTA varia ita natura sua comparata sunt, ut facile morbum hæmorrhoidalem accersant, & præprimis

a) *Calida*, acria, rarefacientia sanguinem, vel maxime spirituosâ, ut vina generosa præsertim Hungarica, aliaque potulenta inebriantia, quod plethoram spuriam (a) producant. Sic a vino aliisque inebriantibus liquidis in hæmorrhoides incidit HENCKELII (b) ebriosus, vir apud DE LA METHRIE (c), puer MÜLLERII (d), STAHLII (e) aulicus, ac TRUMPHII (f) homo. In iis autem, qui morbo huic jam ante exstiterè obnoxii, ab id genus potibus hæmorrhoides crebrius uberiorque fluere observantur, velut in HERMAN-

NI

(a) Vide §. 14.

(b) Vide histor. hæmorrhoid. Vesicæ. §. 18. B. Nro. 3.

(c) Vide §. 91.

(d) Vide §. 84. c)

(e) Vide §. 75. c)

(f) Vide §. 53. III. A. Nro. 2. 1)

NI (a) viro; imò in immodicum inde fluxum prolapsi sunt, CORNARI (b) nobilis & PEZOLDI (c) Eques. Ac tanto quoque magis hæmorrhoides a vino progignuntur, si illud mangonio vitiatum spasmos intestinorum sanguinis per venas hæmorrhoidales refluentis cursum remorantes accersiverit. Sic apud J. D. GOHLIUM (d) vir hæmorrhoidibus albis obnoxius quoties in potu excederet, anorexia, & nauseosa cardialgia plectebatur, multumque muci albicantis sine ullo sanguinis vestigio cum tenesmo egerebat. Magonisatum autem vinum si quando bibit, mox, capitis, & spasmodico lævi hypochondrii dolore corripiebatur, &c.

b) *Solventia* ab iis, quibus tenuior est sanguis, usurpata, præsertim aquæ soteriæ ac \S lia. Sic ab imprudenti ∇ æ Pÿrmontanæ potu HOFFMANNI (e) æger ex profusio hæmorrhoidum fluxu interiit. Erat is 63. ætatis annum egressus; pleno ac robusto corpore, a multis annis liberalem & fere menstruum hæmorrhoidum fluxum cum lucro valetudinis pati

(a) Vide §. 59. b)

(b) Vide §. 95. d)

(c) Vide §. 59. b)

(d) Act. med. Berolin. dec. I. vol. 4. sect. I. Nro. 4. p. 54.

(e) Med. rat. syst. T. 4. P. 2. S. I. C. 4. Obs. I.

pati solitus, quo a diuturno tacita cum ira mærore suppresso cum faciem ante floridam flavescere, ac flaccescere cum oculorum intumescencia videret, cachexiæ metu Pyrmon-tanas acidulas ex fonte ingenti copia, at sine idoneo sub usu earum, deincepsque regimine, hausit, a quæis effusissima secuta est ani hæmorrhagia, nec nitrosis pulveribus, nec BECHERI pillulis compescenda; sed pedes oedematosi facti, venter intumuit, collapsæ vires, dispnæaque afflixit, & superioribus artubus contabescentibus demum æger obiit. Haud secius civis apud POMME (a) ex ira post &ii usum in immodicum hæmorrhoidum fluxum prolapsus est.

c) *Emmenagoga* quatenus sanguinem ad iliaca vasa & organa in pelvi locata uberius determinant sicque hæmorrhoidalium vasorum infarctum causant, in viris ob uterinarum vasorum absentiam, in feminis vero, dum utero gerunt. J. STORCH (b) curandam habuit mulierem juvenem cholericam in absentia viri ab alio ingravidatam, quæ cum ad excutiendum per catamenia foetum largas balsami ☿ doses & frigidum sabinæ in aqua infusum usurpasset, non modo menses (at illæ-

so,

(a) Vide §. 133. b)

(b) L. c. ann. 7. Febr. cl. 2. p. 41. sq. & von Krankh. der Weiber. T. 3. Cas. 109. p. 489. sqq.

fo, & justo dein tempore edito fœtu) inde
 nacta est, sed etiam hæmorrhoides tumentes
 æque, ac fluentes cum vehementi tenesmo,
 ac dolore, alvo rara, dura & ad syncopen
 usque dolorifica, ventrisque meteorismo.
 Mensibus autem deinceps non reversis eo acri-
 us hæmorrhoides afflixere, quoad peperisset.
 Dignum etiam lectu casum H. F. DELIUS (a)
 suppeditat de robusto milite 24. annorum,
 nec narium hæmorrhagias, nec hæmoptoen,
 nec ullas sanguinis ebullitiones, nec spasmos
 abdominis perpeffo, qui post multos concu-
 bitus insuper jusculo emmenagogo, quod
 puellæ ejus ad pessumdandos fœtus sibi para-
 runt, epoto in tantam abdominis incidit in-
 flationem, ut ilia timuerit crepatura. Sumto
 emetico sæpius quidem, & cum euphoria vo-
 muit; sed ex illo tempore vomitus interdum
 recurrebant, angustiiis præsertim a flatulentia
 recrudescentibus. Variis ab hinc aliis reme-
 diis usus est, sine levamine, quod veram
 mali causam reticuerit, variisque toto inde
 anno cum malis confliâtus est, frequenti-
 bus nempe cardialgiis, flatulentiis, tenesmo,
 & stranguria interdum, atque affectibus lipo-
 thymicis. Cibi assumpti vel modicum usus
 frumenti motus hos exacerbabant. Lapsa ita
 anno Auctorem consuluit luridus aspectu cum
 abdomine tumido, retulitque se ante seme-
 stre

(a) Amœnit. med. dec. 3. Cas. 6. p. 210.

stre bis molestissimo tenesmo correptum scybala striis cruoris permixta egressisse, & ubi diu celatam aliis morbi causam illi apperuisset, præbuit Auctor elixir viscerale ex gumm. resolv. & extractis amaris cum semivinoso menstruo paratum, anim. rhab. ess. cascarill. millefol. α \odot dulc. Ab his blanda alvus & crebri ructus levantes, mitior tenesmus, atque a prandio angustiae pauciores, levioresque; versus vesperam autem plerumque paroxismus hæmorrhoidalis recurrebat impetuosiori ad loca hæmorrhoidalia congestione, colicis doloribus & atrocibus circa os sacrum spasmis. Jungebantur sonora abdominis murmura, & quoties istud manu paulisper comprimebatur, flatus observabatur, ex uno claustro in aliud cum strepitu migrare, jussus est priorem mixturam iterare, & ad gtt. 50 ter in dies capere, in paroxismo autem saturatum millefolii decoctum calide haurire. Cerevisia parcius concessa, & *N*ui frumenti suffecta ∇ a melissæ vinosa. His pedetentim ita est emendatus, ut citra insigne incommodum equo rursus uti potuerit.

d) *Cathartica* præprimis drastica. Eorum enim specifica vis agendi humores uberius ad inferiorum partium vasa determinat, simulque homo tempore dejectionum crebros edit nixus ad alvum egerendam, eoque vehementiores, quo cathartici stimulus acrior fuerit, sub quibus compressio venarum abdominalium efficitur, sicque sanguinis per eas refluxus ratar-

retardatur, ac sanguis ibidem congestus ex arteriis illas in varices distendit, rumpitque; quod eo promptius accidit, si purgans fuerit drasticum, & spasmos abdominales eodem tempore concitaverit, a quibus venarum tanto major efficitur compressio. Sic BIERLINGII (a) mercator a drastico cathartico cæcas nactus est hæmorrhoides, nimium vero a catharticiis fluxerunt militi HOFFMANNI (b) ac figillo SPINDLERI (c). In dispositis autem vel habituali in morbo sola sæpe eccoprotica, vel non usque adeo saltem drastica sufficiunt ad proritandum hæmorrhoidum fluxum. „Novimus, inquit STAHLIUS (d) virum sanguineum leviter melancholici status, plethoricum, qui cum prius & sponte nunquam senserit hæmorrhoidum fluxum, tricenaria circiter ætate, quotiescunque purgans aliquod paulo largiore dosi aut efficacia assumeret, statim sanguinem una, & quidem absque dolore, aut alio incommodo excernere suevit.“ Perinde apud C. T. BIERLINGIUM (e) illustris persona 50 annis major, sanguineo-cholerica, sanissima, prophylactice quotannis ante

(a) Vide §. 126. c) β

(b) Vide §. 95. a)

(c) Vide §. 119. Nro. 4.

(d) Diff. de hæmorrhoidum internar. motu, cap. 4. p. 21.

(e) Adversar. curiosor. Cent. 1. Obs. 21. p. 41.

ante quodvis æquinoctium sumens catharticum jam ex sola pulpa Cassiæ; jam cum pulpa tamarindorum, syrupo Cich. c. rheo, & guttis aliquot efs. ♂ ♀ satæ ZWELF. in infuso Sennæ sine coctione, & expressione post quamlibet purgationem patiebatur 5 ad 9 dies sub alvi depositione fluxum hæmorrhoidum satis uberem, ut in dies sanguinis 3viii vel jx redderet, indeque intestini recti prolapsus, at sine ulla virium jactura. Imo aliqua ex cathartici ob idiosyncrasiam peculiarem nonnulli haud ferunt, quin ocijus hæmorrhoides inde aut fluant, aut tumeant. Ita „Ianius „Ulmensis, narrat I. SCULTETUS (a) . . . „a diuturnis hæmorrhoidibus cannula, & stilo . . . tandem liberatus toties recidivam „passus est, quoties medicamentum purgans, „quod ingrederentur vel folia sennæ, vel „scamonium ore assumpsit. Quapropter . . . „ægrotanti interdiximus usum sennatorum, & „scamoniatorum, qui inde acerbo ab hæmorrhoidum dolore per multos annos immunis „saluberrime vixit.“ Hujus quoque loci sunt acriora clysmata crebrius injecta, ut quæ non modo motum peristalticum adaugent; sed & majorem stimulo suo humorum ad hæmorrhoidalium vasa affluxum alliciant, notantibus id & I. WALÆO (b) & HOFFMANNO apud L.

SCHOL-

(a) Armamentar. chirurg. Obs. 76.

(b) Method. medendi. p. m. 120.

SCHOLZIUM, (a) quæ suffragatur observatio F. DECKERI (b) de muliere ad 38 annos nata; melancholica, alvum fere semper adstrictam habente, præsertim post catharticum, qua resistente variarum partium doloribus affligebatur, alvi egestionem semper mitescens. Postquam autem consilio medici alvum crebris enematibus sollicitasset, natura iis ita assuevit, ut sine iis nunquam alvus solveretur, demumque magnus consequeretur hæmorrhoidum fluxus. Accitus Auctor enematibus suffecit sequentem haustum catarcticum.

R. Cass. fistul recent. extract. ʒβ.

Mannæ calabr.

Syrup. rosar. solut ʒa d. v.

∇æ chichor. q. s. M. F. haustus.

Ter inde sine dolore alvus mota, & post biduum sponte semel soluta. Ab hinc vero resistans denuo alvus eodem semper haustu leniter solvebatur, & 4ta ejus assumptione hæmorrhoidum quoque fluxus est percuratus.

e) *Aloe*, & remedia eam continentia vel crebro, vel dosi liberali usurpata. Quem admodum enim cantharides in vias urophoras, & in salivales glandulas, &c. specificè agunt; ita etiam aloë omnium ætatum, ac medico-

(a) Consil. 173.

(b) Exercit. med. pract. Cap. 6. p. m. 450.

medicorum testimonio primariam a creatore
 nata est efficaciam, sanguinem ad hæmorrhoi-
 dalia vasa uberius determinandi, alvumque
 solvendi; utut nonnulli eam ab hac vi ab-
 solvere sint adnisi: (a) constans tamen expe-
 rientia nullum amplius dubio reliquit locum.
 Certe G. FALLOPIUS (b) affirmat millies quæ-
 si visum a se fuisse, usu aloes referari hæ-
 morrhoides, ita ut e 100. illa utentibus 90
 sint futuri, qui hæmorrhoides inde adipiscan-
 tur. Hinc multis etiam in locis, ubi reme-
 diorum aloeticorum usus invaluit, hæmorr-
 hoides velut endemiæ observantur, R. FON-
 SECA, (c) „hæmorrhoides (ait) sunt morbi
 „regionales, & endemii; frequentissimi ve-
 „netiis, Patavii, & locis circum vicinis, quarum
 „causæ multiplices esse videntur, prima est
 „— frequentissimus usus pillularum aloes 2da.
 „tumores lienis, qui & ipsi quoque frequen-
 „tes sunt in his locis; 3a. multiplex usus medi-
 „camentorum purgantium, clysterium, & sup-
 „positoriorum; 4a attritio partium illarum“ a
 detestando ne Italis familiari crimine sodomi-
 tico? „Ex eadem ratione a medico apud Ham-
 „burgenses aliquamdiu commorato audivimus“
 inquit STAHLIUS. (d) „familiares ibi locorum
 ob-

(a) FROMANN — l. c. P. I. probl. 23. p. 104. sqq.

(b) De simpl. purgant. facult. Cap. 32.

(c) Consult. med. T. I. Conf. 27. p. m. 182.
 sq. 186.

(d) Diss. de motu sanguinis hæmorrhoidali, &
 hæmorrhoidibus externis. Cap. 7. p. 20.

„observari hæmorrhoides ob valde familiarem
 „usum elixirii proprietatis“ &c. Porro G. v.
 WEDELIUS (a) „ab usu adulto (ait) pillularum
 „Francofurtensium 4a. fere pars eorum, qui
 „iis usi sunt, observata fuit hæmorrhoidi-
 „bus correpta. Experiri id quivis potest,
 „si continuare usum ejusdem (aloes) per ali-
 „quot dies sustineat, tenesmum saltem hæ-
 „morrhoidalem excitari“ id quod G. E.
 STAHLIUS (b) etiam bona fide testatur „quod
 „nempe homines aliquotprehenderit, qui
 „non adeo æque ab ulla aliqua prægressa
 „consuetudine hæmorrhagialium aut artifi-
 „cialium sanguinis ventilationum prædispositi,
 „sed solum a paulo agiliori vitæ genere ad
 „paulo segnius transgressi, luculentis valde
 „hæmorrhoidalibus motibus infestari cæpe-
 „runt, nulla alia causa apparente, nisi quod
 „pillularum francofurtensium usui temere as-
 „suevissent.“ Hoc ipsum etiam C. F. PAULLI-
 NI. (c) binis in ægris observavit, & WEBE-
 RI (d) quadragenarius aloeticorum cum car-
 minativis usu hæmorrhoidum fluxum ad asciti-
 tem usque nimium sibi causavit, sic etiam I.
 CALVINUS (referente BEZA in ejus vita) par-
 tim ex vocis contentione; partim (quod) se-

ro

(a) Amænit. Mater. med. L. 2. S. 1. Cap. 6.
 p. 257.

(b) Diff. de hæmorrhoid. internar. motu. Cap.
 4. p. 20.

(c) Vide §. 82. 95. a)

(d) Vide §. 93.

ro nimis animadversum) ex immodico aloes usu primum in hæmorrhoides, easque demum ulcerosas dein 5. ante mortem annis in sanguinis screatum incidit, ac tandem ex quartana interiit. 1. STORCHII. (a) rustica mulier 50. annorum cum ad familiarem sibi constipationem alvi amoliendam sæpius aloem cum — *N* frumenti usurpasset, incidit in enormes ani dolores, ardoremque, ac tenesmum, ardore in dorsum usque excurrente, ac tenesmo purum quandoque sanguinem exprimente. Datus, ubi annum jam sub his tormentis ægra exegit & antispasmodicus, imperatus litus, præbitum infusum millefolii; at omnia sine levamine, alvina constipatione manente tam contumaci, ut ægra intra tres vel 4. dies vix semel quieverit ope foliorum senæ alvum referare, donec relicto aloes usu, & potis per æstatem proximam aliquamdiu aquis fontis Liebsteinensis melius habere cæpit.

§. 20.

2. NIXUS validi, crebrique ad alvum, partum, &c. editi, queis abdominis contenta omnia arctius in spatium rediguntur, ac versus pelvim urgentur; quo fit, ut per venas, præsertim hæmorrhoidales; compressas
san-

(a) Obs. clim. ann. 3. Decemb. d. 4. Nro. 9.
P. 835.

sanguis refluere non valens in varices extendat, aliquando demum crepaturas. In partu vero hanc eandem venarum compressionem foetus etiam insigniter auget. Hinc G. HORSTII (a) mulieri macrae, ad 40 annos natae hæmorrhoides a laborioso partu usque adeo turgebant, ut sæpius cum stercore non modo molis tumor duas juglandes æquans exprimeretur; sed fluidus quoque sanguis profluere. A partu etiam hæmorrhoides natae sunt feminæ FORESTI. (b) GOCKELII. (c) duæ HEISTERI. (d) LENTILII. (e) RIEDLINI. (f) SALOMONIS. (g) ac WEDELII. (h) matronaque R. I. FORTIS. (i) Ab alvi autem nixibus cæcæ hæmorrhoides abortæ sunt RAIMANNI (k) viro, ac WALTHERI (l) nobili. Mirum vero est voluntariis nixibus pro arbitrio fluxum hæmorrhoidum concilari posse, id quod D. PANAROLUS (m) observatum fuit.

(a) Obs. med. P. II. L. 1. Obs. 14.

(b) Vide §. 126. c) d. — (c) Vide §. 119. Nro. 3.

(d) Vide §. 84. c) §. 131. Nro. 7.

(e) Vide §. 64. c) (f) Vide §. 133. a)

(g) Vide §. 115. Nro. 1.

(h) Vide §. 24.

(i) Consult. & resp. med. T. 2. Cent. 3. Cas. 15.
P. 334.

(k) Vide §. 109. b)

(l) Vide §. 131. Nro. 19.

(m) Obs. med. Pentec. 2. Obs. 47. p. 110.

fuisse narrat ; videlicet. „Senex quidam
 „cum non recte se haberet, dum esset ju-
 „venis, erumpente sanguine ex hæmorrhoi-
 „dalibus venis sanus fiebat; sed (quod mi-
 „rum est) natura ex iteratis actibus motum
 „naturalem in voluntarium convertit: tam
 „facilis est hæc sanguinis ejectio in dicto se-
 „ne, ut cum aliquo modo male se habeat,
 „tunc plus vel minus sanguinis, quantum li-
 „bet, excernat, & bene se habeat.“

§. XXI.

3. METEORISMUS *abdominis*: turgenti-
 bus enim aere multo elastico intestinis com-
 pressæ venæ a stagnante suo sanguine & uberius
 continenter ab arteriis affluente sensim in
 varices elevantur, facileque hæ ipsæ crepant.
 F. HOFFMANNI (a) trimula puella pallida,
 parumque appetens cum fecibus alvinis pau-
 xillum cruoris egerebat, ac postea tuberculum
 quoque renitens, & avellanam magnum nacta
 est; multæ molestiæ inter sedendum. Cum
 ex dispepsia, ac flatulentia morbus natus esse
 censeretur, ad liberam alvum servandam,
 sanguinemque depurandum præbuit Auctor
 infusum alternis diebus mane hauriendum.

R. Herb.

(a) Med. rat. syst. T. 4. Supplem. Cap. II.
 Obs. II, Opp. T. 3. p. m. 503.

℞. Herb. hederæ terr. M. j.

Sumitat. millefol.

Flor. chamom. vulg.

— pap. rhæad aa. p. jv.

Fol. Sennæ f. f.

Crem. ☿ri aa 3ij. M. conc. D. ut 3j

cum ℥ij ∇æ infundatur. Stomacho prospere-
tum elixir viscerali Auctoris ad guttas 20.
in prandio & 5ta hora vespertina dato. Ani-
denique tuberculo linteum calido vino rubro
Pontack dicto imbutum admotum. Ab his
ægra brevi convaluit. Nihil autem flatulen-
tiam facilius progignit, quam ingesta flatu-
lenta, ac perfrigeratio corporis, præsertim,
ubi laxitas insuper tubi intestinalis præsto est,
& aliqua simul plethora. Sic J. STORCHII (a)
coqua procera & cholericæ, victu bono, vi-
noque non carens, a comesta pulte farinacea
incidit primum in tormina, quæ deinde in
tenesimum degenerarunt adeo vehementem,
ut sub alvi egestionem non modo sanguis simul
excerneretur, sed ardentia quoque tubercula
dolorifica erumperent. Cum clarum esset,
hæmorrhoides cum cæcas, tum fluentes ad-
esse, dati ☿es ex crystallo ☿ri, ☉o, ac ci-
nabari, atque MRa ex ℞is rheii, ac ☿ri:
mitescens inde hæmorrhoidum doloribus
obortus est ad 14 dies fluxus mensium, quem
cohi-

(a) Von Krankh. der Weiber. T. 2. Cap. 31.
p. 154.

cohibuere ꝑes ex corall. rubr. gr. XV. & ① puriss. gr. V. conflati, 7ma quaque hora ex ▽a hausti. Sublato fluxu imperata larga pedis phlebotomia cum levanine; nam catamenia deinceps iusta copia fluxere.

§. XXII.

4. COLLUVIES *humorum* pravorum primis in viis, quæ non modo ob junctam plerumque flatulentiam; sed etiam, si biliosa illa sit, ob tenuitatem sanguini inductam hæmorrhoides haud raro ac plerumque immodice fluentes, causat. Enim vero neminem Practicorum præterit, varias a biliosa cacochymia hæmorrhagias produci, prout nempe quisque æger secundum sui corporis idiosyncrasiam ad hanc vel illam est magis proclivis. Ita in febribus biliosis catamenia feminis ante tempus comparent, imo, si quæ uteri hæmorrhagiis obnoxia sunt, sæpe has extra febrē a bile collecta pari solent. Neque ulli (opinor) ignotæ sunt hæmoptyses biliosæ &c. Quid igitur mirum, a saburra biliosa hæmorrhoides quoque fluere, & sæpe quidem cum excessu? manifesta hujus rei exempla præbent HERMANNI (a) vir, ac PEZOLDI (b) Eques, multique alii.

§. XXIII.

(a) Vide §. 59. b)

(b) Vide §. 59. b)

§. XXIII.

§. ALVUS vel fluxa vel dura.

a) *Fluxa* ob rationes in catharticis (a) jam datas. A diarrhœa sane hæmorrhoides nacti sunt studiosus BEHRENSII (b) ac vir DANIELIS (c), tum GERBEZIUS (d) ipse, helluo HENCKELII (e) senexque SMETII (f). Dysenteria vero longior imprimis, ob majores nixus conjunctos, spasmos &c. eo promptius hæmorrhoides HAENIO (g) teste accersit. Sic J. S. ALBRECHT (h) de constitutione dysenterica Octobris 1736. Coburgi observata agens „multis (ait) cessante dysenteria, co fluxu pertinacem hæmorrhoidalem supervenisse, quorum e numero puer 14 annorum erat, quem medio Septembri dysenteria adeo benigna invasit, ut non tantum orthostadius maneret, verum etiam appeti-

F 2

„tu

(a) Vide §. 19. d)

(b) Vide §. 51. B. a. Nro 1. 8

(c) Vide §. 60.

(d) Vide §. 84. c)

(e) Vide histor. hæmorrhoid. vesicæ. §. 18. B. Nro. 3.

(f) Vide §. 51. B. a) Nro. 1. 8

(g) L. c. Cap. 2. §. 8.

(h) Commenc. Nor. T. 7. A. 1737. hebdom. 3. Nro. 1. p. 58.

„tu satis laudabili gauderet. In hoc ipso pue-
 „ro tandem symptomata dysenterica (tormina
 „nimirum crebriorque desidendi conatus) om-
 „nino evanuerunt, ut nec minimum de iis
 „sentiret; semel tantum sub noctem post uni-
 „cam fecum alvinarum justæ consistentiæ ex-
 „clusionem, tenesmus cum sanguinis sinceri-
 „oris modica excretionem se manifestabat; qua
 „finita per integrum nycthemerum sine dolo-
 „ribus, & dejectione bene se habuit æger,
 „talisque valetudinis status mensem fere du-
 „rabat; quoniam ob virium exile detrimen-
 „tum ejusmodi excretionem præpropere sus-
 „flaminare non adeo necessarium duceba-
 „tur: donec tandem & hæc chronica excretio
 „penitus cessaret.“ Alias (a) quoque obser-
 „vavit puerum 6 annos natum, qui anno su-
 „periori dysenteriam epidemicam feliciter eva-
 „serat, sub initium statim . . . mensis (Ja-
 „nuarii 1737) hæmorrhoidibus internis fluen-
 „tibus per aliquot dies semper post scybalor-
 „um solidorum excretionem, tentatum fuisse.

b) *Dura*, rara, laboriose deponenda; dura enim scybala diu copiose collecta venas hæmorrhoidales premunt; quam pressionem accedentes deinde validi nixus magis inten-
 dunt: quo fit, ut sanguis per eas reflueret nequies, uberiusque affluens eas distendat,
 rum-

(a) Ibid. hebd. 27. Nro. 2. p. 212. sq.

rumpat. Ab hac fane causa LENTILII (a), ac STORCHII (b) mulieribus, ac RIVERII (c) Religioso hæmorrhoides obortæ sunt. Qua in re MORGAGNIUS (d) non abs re sæpe accusandam censet „consuetudinem . . . multo „partius edendi, & præsertim bibendi, quam „ferre possit natura. Sic in SARPII vita legimus, cum ipse junior parcissime ederet, nil „autem vel plures ad dies biberet, in diuturnam alvi adstrictionem incidisse, qua non „modo ante triduum fere, interdum ante dies „7, nihil dejiceret; verum ut dejiceret tandem, iis uti nixibus cogeretur, unde multos ob hæmorrhoides dolores, & molestum „ani prolapsum pertulit annos plurimos.“

§. XXIV.

6. GRAVIDITAS, quæ & sanguinis ad uterum & intestini recti vasa affluxum auget, & stercora remoratur, & utero tumente venas comprimit, &c. queis omnibus sanguinis accidit in venis hæmorrhoidalibus accumulatio, harumque inde in varices distensio, ac ruptura (e). Præprimis autem in plethoricis

(a) Vide §. 64. c)

(b) Vide §. 19. e)

(c) Vide hist. 4.

(d) L. c. Nro. II.

(e) HAEN l. c. Cap. 2. §. 4. &c. p. 10.

cis gravidis, ubertim alias catamenia habentibus res locum habet, ac sæpe quidem vel primis etiam graviditatis mensibus, a sola catameniorum emanatione, citra ullam adhuc tunc insignem vel stercorem remoram, vel venarum compressionem ab utero, id quod M. ALBERTI (a) observavit „in juniori adhuc, „plurimum tamen infantum, femina, quæ „medio graviditatis tempore largam hæmorrhoidum profusionem citra ullum tamen damnum perpeffa fuit; modo illam colicæ quædam torsiones comitabantur, & aliqualis virium languor consequabatur. Eadem etiam „femina primo in graviditatis mense uterinam „menstruam purgationem subiit, altero hæmorrhoidalem, 3tio iterum menstruam, 4to „vero finito, circa 5ti initium denuo larga „contigit hæmorrhoidalis evacuatio, & sic hic „lusus sanguinei purgaminis aquievit.“ Meminit & alius luxuriosæ feminæ (b), quæ cum extra graviditatem moliminibus hæmorrhoidum esset obnoxia, sub graviditate illarum patiebatur fluxum, & alternantia cum eo ardentia tubercula. Tertiā quoque novit (c), quæ gravida cæcas patiebatur hæmorrhoides, ni
binis

(a) Diff. de hæmorrhoidib. gravidar. & puerperar. (4to Halæ 1727. Resp. I. R. SCHRADER) §. 6. p. 22.

(b) Ibid. §. 4. p. 18.

(c) Vide §. 109. b)

binis eas pedis phlebotomiis præverteret. Acerbæ etiam cæcæ hæmorrhoides fuere feminæ ETTMÜLLERI (a) alterum gravidæ. In plethoricis autem fluentes hæmorrhoides mensium, ac Væ Sis. sunt vicariæ, & cum euphoria accidunt. Sic I. HOLLERIUS (b) „in gravidis . . . notavit hæmorrhoidas utiliter „fluere in duâbus mulieribus nobilissimis jam „4. menses in utero habentibus, in quibus „partus tempestivus consecutus est, & saluberrime adolevit. Erat autem frequens, & „multus fluxus, sanguis fere dilutus, qui ubi „subsistebat, gravius habebant. Aegræ excluso (fœtu) levabantur.“ Quibus autem olim fluentes hæmorrhoides persanatæ sunt, facile illas revocat graviditas, testante rem observatione G.W. WEDELII (c) de muliere 41 annorum, ab 8. annis mensium loco fluxum hæmorrhoidum passa, quem a primo partu adeptæ est. Adhibitis remediis jam pene ab illo percurata, cum alterum gravida facta esset, fluxus revertit, isque immodicus, & ut plurimum diarrhœæ junctus: unde mulier pallida, debilissimæque, & extenuata, nil opitulantibus martialibus anticachecticis, demum exhaustis viribus diem obiit.

§. XXV.

(a) Vide §. 81.

(b) De morbis inter. schol. ad Cap. 55. p. m. 573.

(c) Misc. nat. cur. dcc. 1. ann. 3. Obs. 24.

§. XXV.

7. *PATHEMATATA animi* perinde haud infrequenter hæmorrhoides vel inducunt, vel exasperant, vel anomalas reddunt, in primis: ira, terror, mærorque assiduus; iste biliosum systema turbando, heparque obstruendo; ille humores a peripheria corporis & e minimis vasis ad majora compellendo; ira denique sanguinem rarefaciendo, ac bilem commovendo, alterando; omnes autem simul spasmos abdominales producendo. P. C. STOCKHAUSEN (a) notavit in viro 40. annorum iræ dedito, dum aliquando exarsit, mox postridie gravativum lævi hypochondrii dolorem nasci cum murmure circa umbilicum, unde noctu crebrius dejiciens ineunte die 3tio hæmorrhoidali se fluxu laborare observabat. Pergebat hic fluxus cum levi diarrhœa & ani prolapsu 8 dies; tum omnia symptomata una cum hypochondrii dolore conquieverunt. Referebat æger, sæpius id sibi accidisse, ut post iram fluerent hæmorrhoides. Ita etiam HOFFMANNI (b) virgo, cui alias moderate quovis mense fluebant hæmorrhoides, a concepta ira in immodicum illarum profluvium incidit, & POMMEI (c) civi, qui non multo ante ab nimio

(a) Diss. de hæmorrhoidib. (4to Helmst. 1770)

§. 31.

(b) Vide §. 148.

(c) Vide §. 133. b)

mio hæmorrhoidum fluxu est liberatus, post excandescientiam iste denuo est resuscitatus. Perinde a diuturno, atque immoderato mœrore BLEGNYI (a) vidua hæmorrhoidum fluxum, prius sibi ignotum est adeptæ. E. FERDINANDII (b) puella annum 20. agens, sanguinea, sedentaria, laute vivens ex zelotypia cum amasio, finiente autumno summum in mœrorem lapsa semestrem nacta est hæmorrhoidum fluxum cum 4. uvalibus varicibus ani, ultimo autem bimestri i. e. vere, usque adeo invalescentem, ut ante, & post sterco-
 ra egresserit sanguinis, iis non permixti jam **†** β. jam plus, minusve; at sine ullo dolore: sanguis coibat. Catamenia insuper omni mense rite fluebant. Ex tanta sanguinis jactura facies amisso suo rubore evasit pallida, ac tumidula & ægra præ debilitate vix ince-
 debat, donec innumeris externis internisque præsidiis sub idonea diætâ adhibitis intra mensem prorsus convaluit. Terror quoque GULLMANNI (c) mercatori fluxum hæmorrhoidum id temporis passo incussus eundem effecit immodicum, & I. STORCHII (d) matronæ ab aliquot jam annis hæmorrhoides
 cum

(a) Vide §. 131. Nro. 1.

(b) Histor. med. 16. p. 40. sqq.

(c) Vide §. 53. III. B. Nro. 1. d)

(d) Obs. clin. ann. 1. Novemb. d. 2. Nro. 5.
 p. 253.

cum catameniis alternas tenentes ex terrore, ac mœrore vehementi, ad improvifum de conjugis morte nuncium oborto, magna copia erupere cum animi deliquiis, alio ex alio ingruentibus, quæ mala *R*a coralliorum ac *Æ*es ex magnesia alba & specifico cephalico MICHAEL levarunt.

§. XXVI.

8. MOTUS *quies*. Hæc utut prorsus opposita hæmorrhoides tamen innumeris in mortalibus provocant, &

a) *Quies* quidem, quod motum humorum imminuendo eorundem spiffitudinem creet, copiamque boni sanguinis ob imminutas simul per otium excretiones accumulet, præsertim in lautius viventibus; et fibris laxitatem inducat; præterea quod cum quieti dediti potiffimum sedendo vitam exigant, venis natiùm vicinarumque partium compressis sanguinis refluxus retardetur, ejusque aliunde jam in corpore abundantis ac viscidi facti, copia in illis augeatur: unde venæ hæmorrhoidales in varices facile elevantur, ac sæpe crepant etiam. Otiosæ certe vitæ id F. HOFFMANNUS (a) tribuit, quod in frigidi-
ori-

(a) Med. rat. syst. T. 3. S. 1. Cap. 9. §. 13.
Opp. T. 1. p. m. 343.

oribus regionibus hæmorrhoides hodie multo; quam olim sint frequentiores: „nostris
 „ . . . temporibus (ait ille) in hisce aquilonariis etiam regionibus longe familiarior est
 „(morbus hic), ac frequentior; quam olim,
 „ut ipse testari possim, perpaucos, cum ante
 „40 annos medicinæ exercendæ manum primum
 „admoverem, sanguinis per ani venas
 „stillicidio vel moliminibus ad istud fuisse
 „affectos. Si in causam inquirimus, mea quidem
 „sententia culpa potissimum rejicienda in
 „vitæ genus ex operoso, ac laborioso ob
 „perditos hominum mores in desidiosum, ac
 „otiosum mutatum, quo non solum major,
 „quam par est, sanguinis copia ingignitur,
 „sed etiam ipsum corporis robur lanquescit,
 „ut non mirum sit effeminato corpori femineum
 „quoque accidere sanguinis fluxum.“ Veritas
 „hujus opinionis vel inde elucescit magis,
 „quod multis omnino mortalibus, præsertim
 „bene viventibus ac plethoricis, dum ex mobili
 „plurium annorum vita, quam sine multis
 „morbis exegerunt, ad quietem sese ingravescente
 „ætate conferunt, non multo inde post hæmorrhoidibus
 „occipiant laborare, ut expertus est HOFFMANNI (a) quadragenarius
 „& ISENFLAMMII (b) senex. Quæ cum ita sint,
 „quid mirum, si litterati assiduis lucubrationibus

(a) Vide histor. hæmorrhoid. vesicæ. §. 19.

(b) Vide histor. hæmorrhoid. albar. §. 16.

bus dediti hæmorrhoidibus plerumque sint obnoxii, ut inter infinitos alios FACKHII (a) accidit juveni.

b) *Motus* autem hæmorrhoides duplici præsertim ratione accersere valet, dum nimirum sanguinem vel admodum ac toto in corpore rarefacit, vel uberius ad hæmorrhoidalia vasa determinat. Priorem ad classem pertinet in Annalibus Vratislaviensium (b) mulier 48 annorum spissiusculo, & orgastico prædita sanguine, quæ magnopere commoto per motum multosque conatus sanguine circa medium Januarii incidit in uberrimum hæmorrhoidalem fluxum, sanguinem excernens ut plurimum nigrum, & coactum, lentumque cum spasticis morficationibus, ac levibus circa umbilicum torminibus, ut spatio noctis 12 ad 15 vices alvum cruentam reddiderit, idque per aliquot hebdomades non sine universalis languore & actuum vitalium, animaliumque languore. Datis autem antispasmodicis temperantibus, ac tonicis discutientibus optime restituta est, succedentibus rite catameniiis. Ita etiam I. STORCHII (c) juvenis cholero-sanguineus 24 annorum, amisso ante mensem multo e vulnere sanguine, dum initio
Maji

(a) Vide §. 53. II. Nro. 7.

(b) Tent. 27. A. 1724. Jan. Cl. 2. art. 3. §. 1. p. 37.

(c) L. c. ann. 6. Maji. Cl. 4. p. 579.

Maji insolitum sibi, magnumque in lupulo fulciendo laborem suscepisset, nactus est tuberculum hæmorrhoidale, quod balsamo sulphuris illitum enormes causavit dolores, donec crepans multum sanguinis fudisset. Reliquias doloris, & inflammationis litus ex ungu. litharg. & albo camphor: discussit. Ad motum vero, quo sanguis in hæmorrhoidalia vasa uberius, ac vel maxime repente compellitur, in primis pertinent omnes validæ corporis a summo inum versus concussiones, uti & inferiorum partium succussiones, præsertim cum orgasmo humorum circa genitalia. Hinc

a. Concussio humerorum, natium. Ex lapsu in nates P. I. SCHENFELDERI (a) Canonico recrudit hæmorrhoids, & F. MÜLLERI (b) fabro 22 annorum, dum alter saccum farina refertum in humerum projicit, ille crepitu lævo in latere percepto paucis post diebus corripitur dorsi dolore, cum torminibus, alvi adstrictione, ac febrilibus motibus, quæ ob necessitatem laboris continuandi fluxus hæmorrhoidum est consecutus. Tonsor pedis venam secat. Ab hinc sub labore fabrili, ac vehementi ferri maleatione (sanguinem ita violente ad inferiores partes urgendo) in tantam

(a) Vide §. 94. Nro. 3.

(b) Annal. Vratisl. Tent. 34. A. 1725 Novemb: Cl. 2. art. 3. §. 3. p. 507.

tam ani incidit hæmorrhagiam, ut ipso referente cantharus effluerit sanguinis magna cum virium jactura. Data essent. carmin. WEDDEL, cum \mathcal{R} a fl. milefolii & Ω u \odot dulci, ac \S es nitrosi cum cinnab. & absorb. & in fine cum cryst. mont. ac M. P. de cynogloss. ab his sanguis paucior, & grumofus abibat, ægerque jam parumper appetebat. Ob alvum obstructam, cum enemata prorsus respueret, data potui calida cerevisia secundaria cum cumino. Fluxu autem iterum uberiori facto datum infusum ex ligno sassafr. fl. millefolii papav. rhæad. bellid. scab. hepat. stellatæ, fern. fænic. Exteriori dorso admotum Empl. de hyosc. cum oxicroc. non sine levamine. Ab ira denique reversum denuo fluxum compescuit \S nitrosus cum corall. cinnab. antim. & speciebus de hyacyntho.

β . *Vectio equitatio.* Post vectiorem curru morbus RIEDLINO (a) accidit; de equitatione autem communis omnium est observatio, ab illa hæmorrhoides acciri. G. E. BALDINGER (b) testatur se hæmorrhoides sæpius apud milites equestres; quam pedites habuisse curandas, id quod & WALTHERI (c) confirmat

(a) Vide §. 127. Nro. 7.

(b) Von den Krankheiten einer Armee. 2. Th. 2. Abschn. 12. Cap. p. m. 370.

(c) Vide §. 131. Nro. 19.

mat nobilis; & C. T. BIERLINGII (a) vir 33 annorum, sanguineo-melancholicus, qui 32do circiter ætatis anno post longum pernicious equi cursu confectum iter acerrimos anni nactus est dolores, aliquo tam inde post tempore de-nuo mitigatos. Ante annum vero abhinc iterum recrudescentes ars iterum quidem abegit; ab isto vero tempore id genus molestias æger in præsens usque ex leviori motu vel corporis, vel animi persentiscebatur. Cumque nuper in negotiis arduis multorum dierum iter partim rheda; partim equo fuisset emensus, pristinus ille dolor usque adeo recruduit, ut nec sedere, nec jacere valens insomnes aliquot noctes exigere, ambulandoque tædium levare cogeretur, insequente anorexia & debilitate. Post varia interna, externaque remedia incassum adhibita, consultus Auctor invenit ani sphincterem totum inflammatum, ejusque in superiori parte foramen pisi capax cum labiis parumper callosis, cujus canalis primum recta spinam versus, deinde ampliori cavo dextrum adlatus $\frac{1}{2}$ digiti longitudine declinabat. Quando sphincter ani sese exferebat, sanguis ex hæmorrhoidibus lævo in latere apertis non procul ab illo foramine; ex ipso autem canale sanies effluebat, quæ etiam ex eodem digiti compressione eliciebatur. In dextro sphincteris

(a) Thesaurus theor. pract. Obs. 23.

teris latere hæmorrhoidales venæ tumidæ, in sinistro excrescentia quædam dura albaque instar cartilaginis visebantur. Sub egestione fecum, lubrica licet alvus esset, intolerabilis aderat dolor. Imperati ergo sacculi ex fl. verbasco, furfur, tritic. croco, & sem. lini, ac sequens litus:

℞. Pulpæ pomi sub ciner. cocti. ℥j.
 Pinus Gallin. ℥ss.
 Unquent. popul. ℥ss.
 Croci orient. ℥ss.
 Vitell. ovor No. j. M. F. linimentum.

Ab his quidem dolor, & inflammatio ita remifere, ut æger & sedere interdiu commodius, & noctu in lecto jacere posset; sub quavis tamen egestione alvina imminente immanes horarum aliquot dolores habuit perferendos.

γ. *Concubitus* ardens, sub quo insignis sanguinis ad genitalia, vicinumque iis intestinum rectum orgasmus nascitur, cum valida sphincteris ani constrictione, sanguinis per venas refluxum remorante, corporisque succussus: hinc faciles hæmorrhoides.

§. XXVII.

9. *APPLICATA externa* quæ vasis hæmorrhoidalibus laxitatem p. n. inducunt, stimulo-

muloque suo humores uberius illuc alliciunt, aut sphincteri ani spasmus inferunt, &c. ut sunt

a) *Cloacarum effluvia*. Ab A. HÆNIO (a) inter hæmorrhoidum causas haud abs re accensentur „consuetudo latrinis diutius insident, di: qua fit, ut extrema recti putrido vaporum exposita laxentur admodum, tumeant, que.“ Singularem prorsus hujus rei casum narrat V. RIEDLINUS (b) de vidua ob muscularis motus defectum variis malis obnoxia, quorum gravissime affligebat hæmorrhoidum dolor, ad omnia quæque remedia, quoad causam ejus latuerit, contumax; donec istam casus aperuisset. Cum enim aliquando urgente hoc dolore fomentationes ope sellæ perforatæ ano adhibitas maxime juvare observaret, deinceps alvum quoque hanc in sellam aliquamdiu exonerans toto illo tempore a doloribus immunis mansit. Idcirco sana jam sibi visa denuo ad latrinam dejectiendi causa itare cœpit. Vix autem bis terve illam adiit, cum pristini dolores vehementes recrudere, quos cum pristina quoque methodo profligasset, denuo ad latrinam nihil ab ea mali suspicata secedere occepisset, dolores quoque reversi sunt. Tum vero primum in
men-

(a) L. c. Cap. 2. §. 4. e

(b) Lin. med. ann. 4. Novembr. 2. p. 907.

mentem venit, hos ab illa produci: quapropter deinceps latrinæ sella perforata suffecta ex illo tempore rarius, mitiusque hæmorrhoidum dolor eam afflixit, nisi dum sui velut oblita cloacam adeundo illum revocaret, quam tamen in dies studiosus devitabat. Id ipsum etiam jam olim a marito suo fuisse observatum, narratumque reminiscebatur.

b) *Topica* varia ipsi ano admota. Sic A. SCHAMSKY (a) „habuit studiosum, cui vitrum aqua destillata repletum, & aqua forti præcipitatum (vulgo die Lichtkugeln) congelatum fuit, remanente interne aliquo spatio, lo vacuo. Hic ex curiositate vitrum diffregit, & quia glacies interna frigebat, charta eandem excepit, chartam inde madidam, ex incuria ad loca communia posuit; ipse oblitus ejusdem, dum necessaria peregisset, absterfit eadem charta jam siccata clunes, & immediate ardorem inexplicabilem percepit, qui fomentis ex lacte, & chamomilla evanuit. Post dies 3. hæmorrhoides fluxerunt copiose diebus 11, fluxu cessante non amplius redierunt.“

c) *Contagium* ne etiam? De hoc unicum novi, cumque ambiguum G. E. STAHLII (b) casum

(a) *Promptuar. med. pract. lit. H. Nro. 3. p. 396.*

(b) *Colleg. casual. magn. Casu. 16. p. 190. sq.*

casum, nempe vir 40 annos natus, sanguineo-phlegmaticus, succulentus, & habilior, vinoque assuetus, nullis autem hæmorrhagiis obnoxius, multa ex itineribus longis per postam fatigia perpessus, cum abhinc aliquamdiu sedentariæ vitæ indulgisset, pro equestri rursus itinere suscipiendo mutuum accipit ab amico verrucosis hæmorrhoidibus affecto ephippium. Brevi inde post in exitu ani uno e latere natus ei est tumor ossiculum olivæ aut pruni magnus, alvi sub egestionem observabilis, at sine molesto per aliquot dies dolore; deinceps vero dolor velut ab infixa spina coortus, intra 4. dies adeo increvit, ut æger non modo inde noctu, diuque pervigil ejularit; sed etiam ex aliunde oborta tussi, ac sternutationibus convulsiones metuerit, demumque stupidus ita cubarit, ut genibus iuncti haud amplius valens coactus fuerit subjectis pulvinaribus multis assiduò ventri incumbere. Die tandem 5to. vel 6to. post admota emollientia cataplasmata emerfit vesicula purulenta, ex qua pus cannabini seminis mole egressum est, statimque omnis abiit dolor. At cur non equitationi magis; quam contagio casus hic tribuendus videbatur?

§. XXVIII.

10. FEBRES quoque variæ visæ sunt hæmorrhoidas attulisse, quas acutæ plerumque in declinatione accersunt; intermittentes ve-

ro post se relinquunt; atque in primis 4næ. sic FORESTI (a) vir a 4na. liberatus incidit in hæmorrhoides cæcas & c. F. PAULLINI (b) „novit presbyterum Hildesensem, cui post „gravissimam 4nam sua sponte circa finem „Martii, & circa initium Octobris (hæmorrhoides) fluere cæperunt per biduum plerumque, aut triduum, summo cum sanitatis incremento, qui fluxus ad finem usque vitæ ejus ordinarius fuit.“ De symptomaticis autem hæmorrhoidum febribus alibi (c) erit dicendi locus.

§. XXIX.

II. METASTASE *sani morboſi*, præsertim.

a) *Sanguinis* vacuationes familiares, spontaneæ non reversæ; vel arte faciendæ neglectæ; cum primis autem.

α. *Hæmorrhagia narium*: constans enim omni ab ævo est observatio, homines, qui in juniore ætate crebras narium hæmorrhagias experti sunt, his ob ætatem firmiorem desinentibus, plerumque evadere hæmorrhoidarios observavit id jam olim HIPPOCRATES (a)

(a) L: c. Obs. 7.

(b) De Theriaca cælesti, Sect. 2, Part. 3, Memb. 2. Cap. 7. §. p. 237.

(c) Vide §. 32.

(a) de coxarum dolore, variisque ejus causis agens, quas inter & hæmorrhoides refert, easque hominibus paulo ante dictis accidere animadvertit: „iis autem (inquiens) morbus „iste contingit, quibus pueris, aut juveni- „bus ex naribus sanguinis fluxus consuetus „desiit; ex quibus percontari oportet, num „in juventute sanguinis fluxus contigerit.“ Binis id exemplis M. ALBERTI comprobatur, quorum unum alibi (b) sum daturus; alterum (c) autem tabellarium sistit sanguineo-melancholicum, 46 annorum. „Hic in „juventute frequentes narium hæmorrhagias „cum euphoria expertus est. Postea itinera „sua consueta per Franconiam, Thuringiam, „& Misniam prosequabatur. Obtigit aliquan- „do, ut hyberno tempore, quo ut plurimum „a peregrinationibus abstinebat, & domesticis „officiis suis indulgebat, externis hæmorrhoidi- „bus affligeretur, quæ parum fluebant, mox ve- „ro remittebant. Post annum spatium ite- „rum brumali tempore vexabatur cæcis hæ- „morrhoidibus cum doloribus ischiadicis, „& gonagricis; abstinebat vero ab artificiosis „auxiliis, & simplicia in usum trahebat. Cum „verno tempore denuo itinera sua instituisset, „accidit, ut post vini Thuringici sub itinere „usum dolorem pulsatilem, ardentem & lan-
ci-

(a) Prorrheticor. L. 2. p. m. 113.

(b) Vide §. 55. Nro. 13. a)

(c) Diff. de hæmorrhoidum insolitis viis (Resp.

I. S. GANZLAND 4to. Halæ 1718.) §. 16. p. 29.

„cinantem extrinsecus circa anum in di-
 „stantia 2. digitorum latorum experiretur.
 „Tandem evenit, ut sub alvi depositione,
 „ad quam inter meandum cogeretur, in loco
 „dolente indolentior perruptio sua sponte
 „sine adhibita frictione orta fuerit, & ad
 „venulam, quæ in superficie loci affecti ade-
 „rat, per aliquam moram satis notabilis san-
 „guinis quantitas guttatim efflueret, & qui-
 „dem cum eximia euphoria. Hic fluxus sua
 „sponte iterum cessavit. Nunquam amplius
 „ab eo tempore vel cæcas hæmorrhoides,
 „vel ischiadicum, vel gonagricum malum per-
 „sensit; attamen narium hæmorrhagiæ iterum
 „recurrunt, quas aliquoties per annum, in
 „primis verno, & autumnali tempore ex-
 „periebatur. Quod si vero sub negligentiori
 „diætâ, & regimine narium hæmorrhagiæ in-
 „termiserint, tunc vel capitis erysipelas, vel
 „acris rheumatismus exceperunt.“ Perinde
 I. STORCHII (a) vir 30 annis major, lautæ
 semper mensæ assuetus, juniore ætate multis
 narium hæmorrhagiis obnoxius, spectato
 tunc habitu inter sanguineo - cholericos
 referendus erat, cessantibus demum hæ-
 morrhagiis aliquanto inde post successit mul-
 to crebrior diarrhæa, eique interdum juncta
 sanguinis hæmorrhoidalis excretio, queis
 temperamentum ita est mutatum, ut nunc
 melancholico - phlegmaticum præferret,
 cum

(a) Obs. clin. ann. 3. May. d. 4. Nro. 4. p. 295.

cum metu imminentis vel hydropis, vel phthi-
feos. Tandem immodica illa sanguinis,
aliorumque humorum excretio ita remisit,
ut per intervalla tantum redierit. Nauseæ
primum cum pressione circa stomachum &
borborygmis oriebantur, tum secuta semel
aut bis per hebdomadem diarrhæa, sanguinis
autem excretio quovis tertio tantum mente
semel, &c. Haud secius in alio ejusdem (a)
viro desinentibus narium hæmorrhagiis hæ-
morrhoidum anomalix occipere, ac TISSOTI
(b) quoque viro, narium hæmorrhagiis post
30 annum ætatis non reversis, hæmorrhoi-
des advenerunt, quod idem Comiti cui-
dam accidisse narrat R. I. FORTIS. (β)

β. *Catamenia* vel parciora, vel nulla;
facile enim sanguis menstruus per uteri vasa
egredi non valens ad vicina hæmorrhoidalia
vasa regurgitat. Unde HIPPOCRATES (c)
„muliebria purgamenta (inquit) subsistere non
„utile, ac forte ex talibus comitiales morbi
„oriuntur; partim verò diuturnæ alvi sub-
„ductiones, partim etiam sanguinis per ora
„venarum profluvium (αἱμορρῶδες).“ Non
quacunque corporis ex parte sanguinis erup-
tionem, sed ex ano vel maxime, intellexisse
COUM, dum vocem hæmorrhoidis posuit (ut
ut

(a) Vide §. 29. a) α. §. 54. Nro. 8. d.

(b) Vide §. 104.

(c) Coacor. Nro. 522.

(β) L. c. Cas. 12. p. 330.

ut non ignorarit varias a suppressis catameniiis alias quoque, ac sæpe admirabiles, hæmorrhagias concitari,) experientia casuum satis persuadet; nam cum alia quævis inde hæmorrhagia cooriri soleat, hæmorrhoides tamen omnium frequentissime, quod ipsum couis innuere voluisse videtur. Haud secius intelligenda est sequens ejusdem (a) historia: „apud TECOMARUM Præfecti annonæ filiæ, „cum incertum esset, an uterum gestare inciperet, 2 Mensium spatio vomitus pituitosus, interdum etiam biliosus erupit; difficulter peperit, integre purgata est. Ad „30 diem similis vomitus perseveravit, deinde alvo conturbata vomitus cessavit. Lævitas intestinorum adfuit; neque menses „prodierunt: duorum annorum spatio per „hyemem profluvium, per ora venarum sanguinem (αιμορροϊδαί) fundere solita, passa „est.“ Numerosi alii id ipsum confirmant casus. Sic mulieri ALIXII (b) parcius procedentiæ catamenia hæmorrhoides causerunt cæcas; & similem HIPPOCRATIS historiæ ALBERTI (c) observationem suppeditat de „plebeia femina laete, & delicate vivente, „quæ post puerperium, & ablaetationem in-

„fantis

(a) Epidemior. Libr. 4. Nro. 24.

(b) Vide §. 115. Nro. 2.

(c) Diss. de hæmorrhoidum & mensium consensu §. 10. Tract. de hæmorrhoidib. P. 2. p. 13.

„santis sub mensium defectu per aliquot mens-
 „struos recursus largam, & strenuam hæmorrhoidalem profusionem experta fuerat.“ SEG-
 NITZII (a) quoque puellæ catamenia sup-
 pressa hæmorrhoides attulere. Maxime au-
 tem solenne est, ut menstruis per ætatem de-
 ficientibus succedant hæmorrhoides, quem-
 admodum in maribus post desinentes narium
 hæmorrhagias ingruunt, atque in bene mul-
 tis menstruos observant recursus. Ita apud
 I. C. STUNZER (b) ænosæ matronæ mensi-
 um ætate deficientium in locum hæmorrhoi-
 des omni mense fluxere, quod idem accidit
 matronæ KOELI CHENII, (c) & M. ETIMÜL-
 LER (d) „aliquot scio, (inquit) exempla,
 „quod in habitu corporis succulentiore, &
 „turgidior partium post 49. annum, quando
 „naturaliter fluere desinunt menses, superv-
 „niat fluxus hæmorrhoidum periodicus.“
 Qualem I. STORCHII (e) femina 50 anno-
 rum, cholericæ sanguinea paulo post mensi-
 um finem nacta est uberem, superstite sem-
 per a fluxu colica. Dolorificæ autem hæmorrhoides
 fuere, quas mensium loco nacta est

VEL-

(a) Vide §. 72.

(b) Ueber die goldene Ader p. 40.

(c) Vide §. 90.

(d) Colleg. pract. prax. special. I. I. S. 9. C.
 3. art. 4. opp. T. 2. P. 1. p. 143.

(e) Obs. clin. ann. 6. Febr. cl. 4. §. 3. Nro.
 15. p. 407. April. cl. p. 547. sq.

VELSCHII (a) mulier; immodicæ vero, quas Francofurtensium (b) anus, RIVERII. (c) & HOFFMANNI (d) feminæ sunt adeptæ. Nonnullis etiam catamenia per ætatem suppressa, si hæmorrhoides induxerunt; istis abhinc periodice recurrentibus illa non amplius reversa sunt, velut cuidam I. STORCHII (e) feminæ videtur evenisse, & STAHLII (f) perinde femina „sanguinea cum menses circa 35 „annum supprimerentur, postea & hucusque „hæmorrhoidum fluxum ad bimestria, trime- „stria spatia experitur, intercurrentibus insignibus pathematibus splenicis versus perruptionem.“ Imo I. C. ROST (g) vidit puellam valde cachecticam 16 annorum quæ mensium nunquam obtentorum loco fluxum hæmorrhoidum menstruum a semestri habebat per aliquot dies post alvi dejectiones; semper tamen erat valetudinaria: illo demum subsistente facta perpetuo clinica tandem repente interiit. Non vulgarem etiam id genus casum, at feliciorem cum

(a) Vide §. 140.

(b) Vide §. 55. Nro. 9. e)

(c) Vide §. 106.

(d) Vide §. 119. Nro. 5.

(e) Prax. casual. T. 2. p. 204.

(f) Diff. de hæmorrhoid. intern. motu Cap. 1. p. 6.

(g) Annal - Vratisl. Tent. 10. A. 1719. Octobr. Cl. 4. art. 6. §. 2. p. 493.

cum exitu; narrat H. F. DELIUS (a) puella sanguineo - phlegmatica, nondum menstruatâ, 19no ætatis annoprehenditur vespere quodam frigore, cum insequente æstu. Crescente morbo aderat die 4to. lassitudo artuum, anxietates, dolores capitis, lumborum, dorsû, colici, vomitiones, ac deliria per intervalla, quæ omnia sub usu remediorum durarunt ad 7um diem, quo effloruere miliaria rubra, & alba limpidissima, sine ullo symptomatum, exceptis anxietatibus, levamine. Die 9no. oborta diarrhæa 12. egestionum per 24 horas, ob quam retrocedentibus miliaribus vigilias, deliriaque causantibus, admota brachiis vesicantia cum levamine; a die 10mo. fluxere hæmorrhoides quotidie ad 3v. - vj. quatrduo cum levamine, ut die 11mo. symptomata prorsus conquieverint, miliariaque sicari cæpta sensim desquamarentur. Die 17mo. ægra jam aliquot horis lectum reliquit, ac sensim convaluit. Inde 3tio. post morbum mense catamenia sponte prorupere, ordinatæque processere; hæmorrhoides vero non amplius reversæ sunt.

γ. *Lochia* perinde aut parciore, aut suppressa quæ hæmorrhoidas STAHLII (b) feminæ

(a) Diff. de purpura rubra & alba cum diarrhæa ac fluxu hæmorrhoidali curata 4to. Erlang. 1756. Resp. N. D. SCHMOLLER, §. 1.

(b) Diff. cit. l. c. p. 6. 7.

minæ sanguineo - melancholicæ, ad 27 annos natae acciverunt, cui „cum in tertio puerperio ex intempestiva refrigeratione lochia „subsistere cæpissent, & gravissimi colico — „suffocativi dolores, & spasmi supervenissent „cum specialissimo dolore, & angustia in sinistro hypochondrio, hæc quidem pathemata clysteribus, & medicamentis intra 12 horas sublata sunt, & lochiorum fluxus revocatus; femina vero post 2. circiter menses „cæpit dolores aliquos circa os sacrum, mox „postea tenesnum percipere, quem mox „sanguinis cum fecibus excretio ad 3. circiter dies subsecuta est. Et ex illo tempore deinceps menstruatim hic ipse fluxus „ita procedere continuavit.“ M. ALBERTI (a) meminit etiam puerperæ, quæ „post „præmaturam lochiorum cessationem vehementioribus motibus hæmorrhoidalibus affligebatur, qui præter paucam sanguinis „evacuationem, tanto graviores furores, & „ardores formabant, & tandem in purpuram „aliquam periculosam transibant.“ In alia (b) vero puerpera post tridui fluxum lochiorum vidit hæmorrhoides cum multis colicis cruciatibus per 8 dies illorum in locum fluxisse feminamque nonnisi post aliquot hebdomades convaluisse.

b) Per-

(a) Diff. de hæmorrhoidib. gravidar. §. 4. p. 18.

(b) Ibidem §. 7. p. 24.

b) *Perspirationis*, quoque, ac *Sudoris* excretio imminuta vel cohibita hæmorrhoidum turbas movere, cum primis vero in iis, quibus hic morbus velut habitualis evasit; solet: hinc toties a perfrigerato corpore, ac vel maxime pedibus, hæmorrhoidalia pathemata exasperari videre est, quod ante alios PEZOLDI (a) tutor suo damno est expertus.

§. XXX.

12. COELUM ne seu clyma hic etiam aliquid ex se potest? Superius (a) quidem relatum est, Venetiis, Patavii, Hamburgi, &c. hæmorrhoides esse morbum popularem; at non tam vitio clymatis; quam ob aloeticorum abusum, aliasque res horum locorum incolis arbitrarias: unde cum Austriæ quoque coelum nonnulli morbi hujus ferax esse contenderent; A. HAEN (b) primum; tum nuper etiam I. C. STUNZER (c) nervose ostendit, id non peculiari loci constitutioni; sed hominum vivendi rationi esse imputandum: haud secius nimirum, ac in Polonia, ac præprimis Lithvania, sese res habet

(a) Vide histor. hæmorrhoid. vesicæ §. 13.

(b) Vide §. 19. e)

(c) Bat. med. P. 7. C. 5. §. 5. ad calcem.

(d) L. c. p. 118, sqq.

bet, ubi teste c. f. SCHULZIO (a) hæmorrhoides (cæcæ præsertim, earumque Molimina) tam sunt vulgares, ut earum neuter sexus; nec ulla ætas (ne infantibus quidem exceptis) fere sit expers, & „haud multum „dico (ait ille) asserens, inter 10. vix. 2 vel „3. subjecta repertum iri, ab illis immunia „nisi quod plebs, rustici, & laboriosi levius „præ aliis hoc malo laborent.“ Haud tamen cœlo id tribuit Auctor; sed vel hæreditariæ labi, vel solennibus ibi cibis oleosis laxitatem vasorum abdominalium adferentibus, vel spirituosius potibus immoderate usurpatis; vel denique crebræ, vehementique equitationi, cui Poloni a teneris assuescunt. Interea tamen est aliquando, quod cœlo adscribere possimus; v. g. in Græcia, omni-que Asia hæmorrhoides tam frequentes; quam apud nos catamenia, non aliunde H. BOERHAVIUS (b) repetit, quam quod his populis „feces . . . instar lapidum duræ erant, „& quia eas summo nixu debebant exprimere, inde fiebant hæmorrhoides.“ Hæc autem ingens alvi siccitas non abs re immani horum locorum cœli æstui vel maxime tribuenda videtur. Facit huc etiam G. BAG-

LIVI

(a) Kurze Nachricht einiger besonder. Zufälle sowohl einheim. als ander. Krankh. in Pohlen §. 23. sq.

(b) Prælect. acad. de morbis. nervor. T. 2. p. m. 603.

LIVII (a) observatio: „observavimus (narrat ille) Romæ in viro nostro amicissimo; hic dum in aere aut Neapolitano aut propinquiorum regni regionum vitam degit, statim ischiade, & fluxu hæmorrhoidum corripitur, irritisque quibusvis remediis tunc potissimum, & momento fere temporis convalescit, cum Terracinam Latium, vel Romam ipsam attingit.

CAPUT V.

S Y M P T O M A T A.

§. XXXI.

SYMPATOMATA hæmorrhoidum prorsus singularem, imo incredibilem exposcunt attentionem, nunquam satis tironibus inculcandam; quandoquidem ita sua sunt natura comparata, ut a medentibus, præsertim hæmorrhoidalis morbi haud satis gnaris, pro totidem morbis protopathicis habeantur, atque sæpissime ab longe alia; quam cui debentur, causa videantur esse enata: quo fit, ut medendi quoque ratio iis deinceps adhibita alias inutilis, alias noxia etiam, statumque ægri deterioriorem reddens evadat; quæ si mox per principia ad hæmorrhoidales motus rite fuisset direc-

(a) Prax. med. L. 2. C. 10. §. 4. p. m. 221.

directa, haud raro unica vel catharsi vel sanguinis detractioe idoneo loco, ac tempore instituta absolvi potuisset. Docebit id horum symptomatum varietas, intensitas, mutuusque inter se nexus.

§. XXXII.

I. FEBRIS varia huic morbo non infrequens comes primo loco venit animadvertenda. Etenim febriles motus quandoque tuberculorum genesin, vel hæmorrhoidalem excretionem præcedere consueverunt, velut in GRAFFII (a) nobili est observatum. Alias vero tumentibus, furentibusque ex inflammatione hæmorrhoidibus peracuta *febris inflammatoria* jungitur, nec ante conquiescit, quam inflammatio sit vel discussa, vel in supurationem, aut necrosin terminata. In impuris autem corporibus, vel insigni viscerum infarctu, aut ulcerosa hæmorrhoidum labe affectis, *lenta* vel *hectica* plane febricula emicat, ut ex KALTSCHMIEDIO id genus exemplum alias (b) protuli, & in quinquagenario apud FÜRSTENAU (c) videre est. Sed peculiarisne etiam statuenda est *hæmorrhoidalis* febris? cum enim aliquando epidemicæ febres

(a) Vide §. 47. b).

(b) Histor. febris hecticæ.

(c) Vide §. 53. II. Nro. 7.

bres fuissent observatæ, quibus homines utriusque sexus, ac variæ ætatis, conditionisque correpti plerique sub earum decursu hæmorrhoidas, nunquam licet ante sibi notas, nacti fuissent, venit in mentem, eas vocare hæmorrhoidales. Operæ pretium esse duxi, non nulla earum exempla hic in medium adferre. Primus (quod sciam) GRASSIUS (a) hujusmodi febrim literis prodidit, de qua ita Vratislavienses: „occasione febrium paulo rariorum „memoranda etiam hæmorrhoidalis, quam sibi „observasse visus est D. GRASSIUS; eam his „verbis describit: quosdam infestabant fe- „bres hæmorrhoidales, quæ levi frigore sub- „sequo blando calore ægros (ut plurimum fe- „minas) feroci abdominis circa hepatis regio- „nem, umbilicum, os sacrum, & in cruribus „dolore, cum constrictione diaphragmatis „circa orificium superius stomachi, cum, vel „sine obstructione alvi excruciant. Pulsus „erat durus, & plenus; dolor capitis in ple- „risque vel plane nullus, vel admodum le- „vis. Non cedebat his dolor alvo aperta, „nec laxantibus (clysteribus tamen aliquan- „tis) obediebat; sed obstinata duratione „ad aliquod dies ejulantes ægros torquebat, „singulis diebus vagos paroxismos procre- „ans; victas tamen manus porrigebat præ- „missis malignitati resistentibus medicamentis

Væ.

(a) Histor. morbor. vratislav. A. 1702. p. m. 375. sq.

„Væ. Sni. in pedibus, & Ræ ♂ ♀ satæ.
 „LUDOV. rite præparatæ, intermixtis resol-
 „ventibus, absorbentibus, & nitrosis. Qui-
 „bus autem hæmorrhoidales fluebant venæ,
 „breviori via morbus absolvebatur.“ Febris
 hæc incidit in autumnum A. 1702. Contra
 vero in observatis A. STÖRCKII (a) A. 1760
 „mense Februario & Martio hæc (ipsa hæ-
 „morrhoidalis) febris admodum frequens fuit.
 „Primo die omnes ægri obtusum capitis do-
 „lorem, & vagas horripilationes, & calores
 „conquerebantur; dein rigor, & dolor tensi-
 „vus nucham occupavit, & vagus calor for-
 „micando totam dorsi spinam perrepsit. Tan-
 „dem ortæ sunt præcordiorum anxietates, &
 „molestæ hypochondriorum tensiones. Quan-
 „doque supervenerunt vomendi conatus, &
 „enormes colici dolores, & venter contrac-
 „tus est; quandoque autem absque mag-
 „no dolore colico, & sine omni vomendi
 „conatu venter intumuit. Urina plerumque
 „flammea fuit, & raro, atque iis tantum in
 „casibus, ubi nimis vehementes erant dolo-
 „res colici, tenuis, & cruda deprehensa est.
 „Alvus erat pertinaciter clausa, & nonnisi
 „repetito enemate pauca scybala potuerunt
 „educi. Subinde ani sphincter inveniebatur
 „adeo constrictus, ut tenuis cannula vix po-
 „tuerit introduci. Sitim fere omnes hi ægri
 „mag-

(a) Anno medico II. p. m. 148. sqq.

„magnam habuerunt, & pulsus fuit celer, in-
 „æqualis, quandoque dicrotus, quandoque
 „intermittens, attamen vix non semper ple-
 „nus, ac durus. Nox fuit inquieta, & an-
 „xiis insomniis turbata. Secundo die remi-
 „sit dolor ventris, & hypochondriorum an-
 „xietas, ac tensio, & pulsus fuit magis æqua-
 „lis, & liberior; sitis mediocris. Verum cir-
 „ca lumbos ortus est dolor gravans, dilace-
 „rans, & rigor; accessit alvi tenesmus, &
 „urinæ retentio; nuchæ autem dolor sese ver-
 „sus verticem, & tempora extendit, atque
 „capitis motum valde difficilem, & dolentem
 „reddidit. Nox iterum inquieta fuit, & cor
 „per vices solito fortius palpitavit. Tertio
 „die tantus circa vertebrae lumborum, & os
 „sacrum dolor ortus est, ut ægri se nequa-
 „quam movere potuerint. Anus fortissime
 „contractus est. Nox quartum diem præce-
 „dens fuit omnium inquietissima; hac autem
 „transacta ægri melius habuerunt; nam quar-
 „to die fere penitus desit lumborum, nu-
 „chæ, & ossis sacri dolor, & tubercula diver-
 „sæ magnitudinis circa anum comparuerunt.
 „Hæc tubercula quandoque fuerunt mollia,
 „& ægris nullam molestiam excitarunt, atque
 „tunc quarto die ortis tuberculis febris pe-
 „nitens desit: quandoque autem hæc tuber-
 „cula fuerunt valde rubra, tensa, & ingentes
 „produxerunt dolores, tormina, tenesmos,
 „vertigines, & membrorum stuporem, & sæpe
 „tantas anxietates, ut ægri inciderint in ani-
 „mi deliquium, & extrema fuerint gelida. In-

„ter omnes ægros bini tantum fuerunt, qui-
 „bus 4to die cessante febre nulla tubercula
 „circa anum prodierunt; verum effluxit san-
 „guis copiosus, absque dolore, & tumore.
 „Morbus hic molestus, & periculosus fuit, &
 „medicamentis perverso modo adhibitis po-
 „tuit letalis fieri. Etenim quamvis cognitum
 „fuerit, febrem esse hæmorrhoidalem, & cri-
 „sin versus anum esse futuram, nullis tamen
 „remediis pellentibus, & tumores hæmor-
 „roidales promoventibus uti licuit; nam hæc
 „febrem & morbum exacerbarunt. Primo,
 „& 2do die cum pulsus plenus & durus fuit,
 „repetitis vicibus debebat sanguis e vena
 „emitti; his tamen naturæ vis non erat nimi-
 „um debilitanda, secus accesserunt convulsi-
 „ones, & morbus factus est diuturnus & ano-
 „malus. Si dein decoctis antiphlogisticis, sub-
 „acidis, nitrosis alvus leniter aperta, & flu-
 „xilis reddita est, tunc morbus cito levaba-
 „tur. Qui decocta subacida & nitrosa ferre
 „non potuerunt, his demulcentia, emollien-
 „tia & oleosa profuere. Nec leve levamen
 „sequebatur, si super toto abdomine mol-
 „lissima cataplasmata sunt posita. Enemata
 „emolientissima (ex decoct. emolli: & olei ver-
 „basci āā **℥ss**) leni vi & apta manu ano sæ-
 „pius injecta multum quoque juverunt, ete-
 „nim horum ope dura & numerosa scybala
 „prodierunt, & intestini recti vasa sunt emol-
 „lita & apra reddita ad crisin suscipiendam.
 „Nimii vomendi conatus, dolores colici, &
 „tensimi si emollientibus non cesserunt, tunc
 „reme-

„remediis paregoricis debebant mitigari, sup-
 „primi: 3tio & 4to die vapores ∇ æ. ebulli-
 „entis ano applicati diminuerunt dolores, &
 „crisin reddiderunt faciliorem. Quarto die,
 „si tubercula hæmorrhoidalia apparuerunt, &
 „si omnes dolores & febris cessarunt, tunc
 „ferre nullis amplius medicamentis opus fuit;
 „in sola vivendi ratione erat attendendum,
 „ne acida adstringentia, aut acria aromatica
 „assumerentur. His in casibus intra paucos
 „dies sæpissime perfecta sequebatur curatio,
 „& vasa turgida sponte iterum detumuerunt.
 „Si autem tumente hæmorrhoidē novus do-
 „lor circa anum ortus est, si tubercula valde
 „rubra, calida, pulsantia, & tensa fuerunt,
 „si sitis increvit, & pulsus major, fortior,
 „ac durior factus est, tunc plerumque repe-
 „titi vicibus debebat iterum sanguis mitti,
 „& anus cataplasmatibus probe foveri. De-
 „cocta emollientissima cum paucis nitro hic
 „optime conveniebant, & brevi dolores mi-
 „tigati sunt, præsertim si hæmorrhoids admi-
 „sit, ut talia simul enemata injicerentur. Si
 „adsuit ingens dolor, & tenesmus admodum
 „molestus, ac anxius, tunc opio erat uten-
 „dum. Hæc eadem remedia optime adhibe-
 „bantur, dum tumores hæmorrhoidales intra
 „ani sphincterem latuerunt, sanguisugæ cir-
 „ca anum iis in casibus necessario debebant
 „poni, in quibus ab hæmorrhoidē regurgi-
 „tante fiebant caligines, vertigines, sopores,
 „convulsiones. Dum urina a dolore hæmorr-
 „hoidali retinetur, vitanda sunt omnia for-
 „tiora

„tiora diuretica (a); solis decoctis ex radice
 „althææ & glycyrrhizæ utendum est, & venter,
 „& partes circa anum debent emollientissi-
 „mis cataplasmatibus involvi, foveri . . .
 „Molles & non dolentes hæmorrhoidum tu-
 „mores, si sponte non abeunt, felicissime
 „dispelluntur unquento

R. Unqu. nutrit 3 iij
 — — popul. 3jβ. M.

„Si vero adest tenesmus, & dolor dilace-
 „rans absque ulla inflammatione, tunc præ-
 „fertur unquentum

R. Opii puti gr. iij
 Unqv. nutriti
 — — popul. aa 3ij M.“

Hactenus H. STÖRCK. Tertiam ejusdem-
 modi febrem C. WEBER (b) a se visam hunc
 in modum describit: „in Martio, Aprilique
 „Anni 1764 hæc febris masculino a 20mo
 „ad 55. annum sexui præprimis propria ad-
 „modum frequens fuit. Incepit cum hor-
 „rore, quem æstus continuus, levis, pulsus
 „durus, & celer, somnus inquietus, capi-
 „tis gravedo, sitisque subsecuta sunt. Quar-
 „to die in ægrotis præcordiorum anxietatem,
 „colli

(a) Vipe §. 57. IV. Nro. 2.

(b) Obs. med. Fascic. 2. Obs. 13. §. 13. 14. p.
 55. sqq.

„colli, dorsique dolores tensivos, urinæ
 „flammeæ suppressionem, alvi obstructionem
 „æstusque augmentum observavi: 5to. mane
 „respiratio asthmatica, dolor pleuriticus, ab-
 „domen compressum; vomendi conatus, & cir-
 „ca vespëram vertigo prurigo in intestino rec-
 „to, fornicationisque sensus circa os sacrum
 „incommodo fuerunt. Faciem deprehendi
 „içtericam; & morosam, pulsum inæqualem.
 „Sexta luce præterea de dolore circa os sa-
 „crum, & lumbos, anxietate, alvi obstruc-
 „tione, anique constrictione summa quiritä-
 „runt ægri, nocteque inquietissime peracta
 „7mo. die in intestino recto, circaque illud
 „variæ figuræ, magnitudinisque tubercula ru-
 „bra, dura, rarissime mollia conspexi. Fe-
 „bris inde desinebat, urina sedimento albo
 „dives erat; atque dolores magis, magisque
 „remittebant; qui e contrario perversa me-
 „dicatione usi erant, in febres erraticas,
 „morbos longos, tussim siccam cum febre
 „lenta, hæmorrhoides nimias, & hydropem
 „incidebant. . . . Cum Væ. Sne. in brachio
 „semper curationis initium factum est, hac
 „enim bis ad summum ter instituta omnis
 „vehementis morbi vis illico periit sangui-
 „que primis diebus purpureus, postea vero
 „crusta alba tenaci obductus, effluxit. La-
 „xans dein ex manna, rhabarbarove cum nitro,
 „vel sale seidlizenfi combinatum, clysmata-
 „que ex saponis aqua parata, atque remedia
 „temperantia, præprimisque oxymel simplex,
 „cerasorum, florumve tiliæ aquam, berbe-
 rum

„rum, vel bellidis syrupum, & nitrum præ-
 „scripsi, pomaque, pyraque cocta, ut &
 „cremores avenaceos, hordeacosque com-
 „mendavi. Alvo hinc quotidie bis, & ter
 „laxa observata febris minuebatur insigniter,
 „anxietas, doloresque multum remittebant,
 „tuberculaque sensim & sponte evanescebant.
 „Quid? quod febrem aliquoties in intermit-
 „tentem quotidianam, ex dorso semper cum
 „formicationis sensu incipientem 6 ad 8 ho-
 „ras durantem, & ter, quaterque redeuntem,
 „mutatam viderim. Si me serius vocato
 „dolores circa anum summo incommodo
 „erant, ex hyosciami foliis cum lacte cata-
 „plasma applicui, febreque, doloribusque
 „cessantibus a decimo secundo, 5to, 8vo
 „die martis *Ram.* LUDOV. apperitivam ele-
 „ggi, hisque ægros ad salutem reduxi.“ Hæc
 utut sint, negat tamen A. HÆN (a) febres
 ejusmodi sui esse generis, sed esse vulgares
 febres acutas inflammatorias, quæ vel ani
 tuberculis, vel fluxu hæmorrhoidali oborto
 judicantur, idque ex epidemiæ peculiaris in-
 dole: quemadmodum nempe in aliis constitu-
 tionibus febres vel alvo, vel parotidibus &c.
 solvuntur, quin tamen ulli adhuc in mentem
 venerit, eas alvinas, parotidicas, &c. vo-
 care. At meo judicio lis de nomine est.
 Quid enim vetat febrem appellare hæmorr-
 hoidalem, quam hæmorrhoidalia molimina
 sus-

(a) Rat. med. P. 7. C. 5. §. 5.

fuscitarunt, & obortæ ad anum varices, vel hæmorrhoidum fluxus denuo solvunt?

§. XXXIII.

2. DOLORES, *pruritus*. Iste vel totum afficit corpus, ut in DUNCANI (a) olitore, ac RHODII (b) cænobita, vel unam tantum aliquam ejus partem, inprimis anum, aut genitalia, velut in GOHLII (β) bibliopægo, ac WEBERI (c) ægris, atque in FORTIS (c) Antistite icalptum ad excoriationem usque exposcens: uni autem C. STUNZERI (δ) ægrorum immoderatus pruritus certum erat hæmorrhoidum adventantium præsagium. Multo tamen iste rarius vexat; quam dolores variarum partium, variæque intensitatis, ac durationis, maxime hic solennes esse consueverunt dolores.

a) *Capitis*, quos multos (sudoribus tamen nocturnis cedere solitos) a moliminibus hæmorrhoidum pertulit Vratislaviensium (d) vir, & ægri STÖRCKII (e) olitorque DUNCA-

NI

(a) Vide §. 70.

(b) Vide histor. hæmorrhoid. albar. §. 2. II. B. Nro. I. a)

(c) Vide Sequ. g) (β) Vide §. 55. Nro. 13. d)

(d) Vide §. 84. a) (c) Vide §. præced.

(e) Vide §. præced. (δ) L. c. p. 46.

NI; (a) ALBERTII vero ægrorum unus (b) insolito capitis dolore detentus haud prius ab eo liberatur, quam ubi usu pillularum STAHLII sanguinem alvo excrevisset; alter (c) vero hemicraniam cum cataracta ad omnia pertinacem nactus solis hircudinibus levabatur.

b) *Spinæ dorsi* dolores ab hocce morbo raro unquam absunt, & inter hæmorrhoidalia molimina vix non principem sibi locum vindicant, atque a summa nucha orti non raro ad imum usque ossis sacri totam spinæ longitudinem emetiuntur. Hinc toties hæmorrhoidarii de tensione nuchæ querulantur, quos inter ægri fuere STÖRCKII; (d) aut de spinæ dorsi dolore motum ejusdem vetante, quem Vratislaviensium (e) homo palo toti spinæ infixio, ERNESTII (f) vero quadragenarius cultro ab imo spinæ sursum adacto compararunt. Aliis vero vel maxime in osse sacro molestus est, velut GOHLII (g) bibliopægo. &c.

c) *Ar-*

(a) Vide §. 70.

(b) Vide §. 75. c)

(c) Vide §. 115. Nro. 1.

(d) Vide §. præced.

(e) Vide §. 54. Nro. 8. a)

(f) Vide §. 84. a)

(g) Vide §. 55. Nro. 13. d)

c) *Articulorum* rheumatico - arthritici, vel fixi, vel vagi. Haud satis (opinor) inculcari tironibus potest, ut in artuum curandis doloribus sollicitè semper ante scrutentur, num a motibus hæmorrhoidalibus oriuntur; ne forte aut podagræ veræ, aut aliis non amovendis causis adscripti pro incurabilibus habeantur, vel saltem alia; quam qua in hæmorrhoidalibus malis opus est, medendi methodo adhibita exasperentur potius; quam leventur. Adeo enim dolores hi hæmorrhoidibus familiares sunt, ut inter primaria moliminum hæmorrhoidalium symptomata sint referendi, in primis

α. *Arthritis*, vaga plerumque, rheumatica, velut in ALBERTII (a) juvene, virisque CAMPARDONI, (b) & CARLII, (c) nec non CHOMELII (d) muliere.

β. *Ischias*, totum interdum femur simul, imo crus etiam pedemque infestans. Jam olim HIPPOCRATES (e) dolores coxæ vel articulorum iis acidere notavit, qui hæmorrhoidibus laborant. Neque ad molimina tantum pertinet ischias, sed cæcis quoque sæpe,

(a) Vide sequ. β.

(b) Vide §. 71. c)

(c) Vide §. 55. Nro. 9. f)

(d) Vide §. 115. Nro. 2.

(e) Prædict. L. 2. p. m. 112. sq.

sæpe, quin & interdum fluentibus ipsis hæmorrhoidibus comes est, ut in quodam ALBERTII (a) juvene 20 annorum, a patre valde hypochondriaco genito, cui aliquoties per anum hæmorrhoides cæcæ abortæ, non sine arthriticis, interdum & ischiaticis doloribus, concurrentibus aperiebantur. Ceterum autem ischias plerumque ad censum moliminum hæmorrhoidalium pertinet, quemadmodum in ALBERTII tabellario (b) tum ZETTERMANNI (c) medico, viro GOHLII tribusque aliis STAHLII (d) & SALOMONIS (e) muliere.

γ. *Podagra* non abs re hæmorrhoidalis compellanda; ut, quæ subsecuto deinceps hæmorrhoidum fluxu toties conquiescere visa fuerit. Ex prævia illam arthritide contraxit vir hæmorrhoidarius ALBERTII, (f) cui etiam simile quid MOLLERI (g) præco sacer perpeffus est; nec aliam quam hæmorrhoidalem

(a) Diff. de hæmorrhoidib. cæcis (4to. Halæ 1717. Resp. I. L. MOESER) §. 9. & Tract. de hæmorrhoidib. P. I. p. 286.

(b) Vide §. 29. a) & vel §. 55. Nro. 13. a)

(c) Vide §. 108. b)

(d) Vide §.

(e) Vide §. 115. Nro. 1.

(f) Vide §. 114. Nro. 3.

(g) Vide §. 115. Nro. 1.

lem podagram VOGELII (a) senex habuisse est censendus, ac verè talis fuit, quæ HOFFMANNI (b) virum detinuit. Interea tamen serio monet postremus (c) ne omnis podagra perperam hæmorrhoidali fluxui, vel restitanti, vel erumpere non valenti adscribatur, ut male id nonnulli sunt opinati: „ego cer-
 „te sæpius vidi (ait idem) succedente etiam,
 „quin sub ipso hæmorrhoidum stillicidio &
 „calculum, & podagram tyrannidem suam
 „exercuisse, de quo quidem omni dubitatio-
 „ne majus est exemplum . . . DOLAEI, qui
 „sæpius per litteras apud me conquestus est,
 „quod per 20 annos, licet hæmorrhoides
 „fluxerint, mire calculi, & podagræ dolo-
 „ribus divexatus sit; a quibus tamen diæta
 „lactea utens per biennium liber egit, sed
 „ad pristinum victum & potum postea conce-
 „dens, incidit in dysuriam, demum fune-
 „stam.“ (d)

d) *Ventriculi quoque dolores lumbo-
 rum doloribus accedentes inter hæmorrhoi-
 dalia molimina couis.* (e) refert dicens:
 „lumbis dolentibus, si oris ventriculi dolor
 „accesse-

(a) Vide §. 54. Nro. 3.

(b) Vide §. 53. III. A. Nro. 2. f)

(c) Med. -rat. syst. T. 4. P. 2. S. 2. C. II.
 §. 24.

(d) Ibid. T. 3. S. 1. C. 9. §. 24.

(e) Prædict. L. 1. Nro. 130.

„acceserit, futuræ per hæmorrhoidas vacua-
 „tionis signum est, ac forte etiam eam præ-
 „cessisse significat.“ Id ipsum pene iisdem
 verbis alias (a) quoque asseruit, hocque
 ejus effatum verum esse experti sunt duo AL-
 BERTII (b) ægri, CAMPARDONI (c) vir,
 MOLLERI (d) centurio, VOGELII (e) senex,
 STORCHII (f) femina, & virgo apud CHE-
 VALIER (g) queis omnibus cardialgia ante
 fluxum hæmorrhoidum fuit molesta.

c) *Intestinorum* torminosi, colici hæ-
 morrhoidalibus moliminibus juxta; ac ceteris
 vicissitudinibus tam familiares, ut non *colicæ*
hæmorrhoidalis, quam M. ALBERTI (h)
 prolixè descripsit, adepti sint. Unde G. E.
 STAHLIUS (i) „quicumque (ait)“ manifestè
 hæmorrhoidarii fiunt, tum antequam hæ-
 morrhoides ipsis perrumpunt, tum quando
 redeunt, tum quando impeditius procedunt,
 acerbissime, & manifestissime torminibus, an-
 gu-

(a) Coacor. Nro. 312.

(b) Vide §§. 60. & 53. Nro. 1.

(c) Vide §. 71. e)

(d) Vide §. 115. Nro. 3.

(e) Vide §. 54. Nro. 3.

(f) Vide §. 108. c)

(g) Vide §. 71. a)

(h) Diff. de colica hæmorrhoidali 4to. Halæ 1718.

Resp. I. F. ZECHNER, & Tract. cit. P. 2. p. 183.

(i) Diff. cit. Cap. 3. p. 15.

gustiis, pressionibus, atque tensionibus circa præcordia (seu ut fere nominant Græci *ὑποχόνδρια*) communissime, & quantum observare licuit, numerosis sane exemplis, quasi essentiali indiviso symptomati certo obnoxii sunt. Hæc quidem longe sunt verissima; at longius a vero illud abest, quod idem hic Auctor (a) evincere contendit, nimirum colicam hanc hæmorrhoidalem a coo (b) sub nomine ilei hæmatitis fuisse adumbratam, ut recte id F. HOFFMANNUS (c) illi negavit, & A. HARN (d) meliori jure ad scelotyrben pertinere ostendit. Sed neque HARNIO (e) plus hic fidei tribuendum colicam hæmorrhoidalem usque adeo raram esse inculcanti, „ut, „qui centies, & millies has hæmorrhoidales „colicas sibi videre videantur, etiam centies „& millies easdem, ut tales, quales minime „sint, saluent.“ HOFFMANNUS (f) profecto nullatenus STAHLII Dogmatibus addictus, illaque ubi ubi licuit, lacescens, a propria testatur experientia, colicas hæmorrhoidales ab aliis haud satis agnitas, sæpissime sibi in praxi curandas occurrisse, duosque huc facientes illius insignes enarrat Casus, (g) plures

(a) Ibidem p. 14. 17.

(b) De intern. affectionib. p. m. 557.

(c) Consult. & resp. med. Cent. 2. Casu. 12.

(d) Thes. pathol. de hæmorrhoid. Cas

(e) Ibid. §. 4. sqq. (f) l. c.

(g) Ibidem cas. 12. 13.

res aliorum (a) etiam spectantes. Utinam omnino plurimi medicorum hæmorrhoidalem colicam sibi propius habuissent perspectam, forte ex ea non ignorata nec HOFFMANNI (b) juris consultus, nec aulicus CLACII (c) exspirassent. Istis certe hac in parte feliciores fuere ægri STÖRCKII, (d) vir item Vratislaviensium (e) CORNARI, (f) miles DELII, (g) nobilis GRAFFII, (h) homo HENNINGII, (i) ac puella SEGNITZII, (k) quod medici his omnibus obtigerint hæmorrhoidalis colicæ non ignari.

f) *Lumborum* perinde immanes quandoque cruciatus hæmorrhoidarios torquere consueverunt. Quos jam ab HYPOCRATE notatos fuisse superius (l) dixi & I. C. STUNZER

(a) Vide §. 53. I. II. Nro. 5. §. 55. Nro. 2. §. 95. a) §. 100. 108. a)

(b) Vide §. 55. Nro. 12, c)

(c) Vide §. 53. I.

(d) Vide §. præced.

(e) Vide §. 84. a)

(f) Vide §. 95. d)

(g) Vide §. 19. c)

(h) Vide §. 47. b)

(i) Vide §. 48.

(k) Vide §. 72.

(l) Vide præced. d)

ZER (a) narrat senem 75 annorum per continuos 15 annos e lumbis usque adeo doluisse, ut nec sedere nec stare posset; donec ante 5 annos Badensibus thermis usus hæmorrhoidum fluxum nactus est; unde omnis abiit dolor. At quotidianus licet fluxus fuerit, plethoram haud sane minuere videbatur, namque ob inquietas, insomnesque noctes, anxietates ac vertiginem supervenientem bis insuper quotannis Væ. Sne. opus fuit, quemadmodum nempe ante obortum fluxum factitatum est. Hujusmodi etiam lumbares dolores experti sunt ægri BAGLIVII (β) CAMPARDONI, (b) HOFFMANNII (c) & HOLLERII, (d) qui in BÜNDELLII (e) juvene cum cardialgia juncti erant.

g) *Ani* denique etiam, ac *vulvæ* dolores familiare sunt malum hæmorrhoidum cum ingruentium, tum turgentium, tumentiumque, imo, & sæpe fluentium etiam. Oriuntur autem a distensione vel simplici, vel varicosa vasorum nervos vicinos tendentium. Dolores hi nec assidui semper, ne ejusdem etiam sunt intensitatis, alias enim tensivi tantum, alias vero acutissimi ad syncopen usque

(a) L. c. p. 50. sq. (β) Vide §. 53. II. Nro. 5.

(b) Vide §. 71. e)

(c) Vide §. 55. Nro. 13. e) §. 95. a) §. 100.

(d) Vide §. 117. β.

(e) Vide §. 44.

usque percipiuntur : isti præsentē vel maxime inflammatione , vel certe hac etiam absente sub alvina egestione , aut in feminis coitus tempore discruciant , alioquin vero vel nullus vel tensivus tantum dolor percipitur , quem ægri varie exprimunt. Sic rustica SEGNIZII (a) puella pressionem se in recto intestino experiri aiebat ; HOFERI (b) ægro durum aliquod corpus totum sphincteris ani ambitum cingere videbatur : clavum ano velut infixum juvenis GOHLII , (c) vir STAHLII (d) spinam infixam querebantur ; alii veluti de nucleo intra anum hærente loquuntur. Mulier autem SALOMONIS (e) insuetam se tantum sensationem ibi percipere memoraverat. Ubi autem causa aliqua tensivum hunc dolorem exasperans accesserit , iste in acutum degenerat ; quod ut plurimum subita ac insignis varicum distractio efficit. Sic feminae latentes intra vulvam hæmorrhoidales varices vix sentiunt ; sed admissio viro ab arietatione in varices has voluptatis loco tantus oboritur dolor , ut ei ferendo impares virorum amplexus exhorref-

(a) Vide §. 72.

(b) Vide §. 55. Nro. 9. a)

(c) Vide §. 47. c)

(d) Vide §. 27. c)

(e) Vide §. 115.

horrescant repudientque, uti in ALIXII (a)
& COCKBURNII (b) feminis accidit.

Id ipsum quoque in recto intestino sub
alvina egestione contingit, dum scybala crassa,
duraque anum versus pulsa in hæmorrhoi-
dales varices ibi exstantes impingendo eas
violente distrahunt, unde tam atrox sæpe
dolor enascitur, ut ægri sudore frigido per-
fusi in syncopen prolabantur, malo huic, ut
recte notat ALBERTI, (c) occasionem tunc
alvo plerumque clausa præbente. „Scio ego“
inquit M. ETTMÜLLERUS (d) „exemplum mu-
lieris . . . quæ quando volebat excernere
„alvi excrementa, in animi deliquium cum
„faciei tumore, rubore, & incalescentia in-
„cidebat ex iisdem hæmorrhoidibus cæcis;
„simul ac vero excreta fuerunt stercora, cessa-
„bant omnia talia symptomata.“ Novit &
aliam, (e) ni una eademque sit; quæ toto
anno dolorifice egerebat. Gravida quoque
apud DE LA MOTTE (f) alvum non sine
auctis cruciatibus reddebat. Non indignus
isthic notatu casus est, quem narrat R. I.

FOR-

(a) Vide §. 115. Nro. 2.

(b) Vide §. 53. II. Nro. 1.

(c) Diff. de hæmorrhoidib, cæcis §. 13. Traët,
cit. P. 1. p. 290.

(d) L. c. p. 143. sq. confer. §. 54. Nro. 8, d)

(e) §. 81.

(f) 133. a)

FORTIS (a): Antistes gracilis, fuscus, 48 annum agens, arduis semper negotiis, longisque itineribus deditus, a multis annis & hypochondriacus, & hæmorrhoides passus est, in adolescentia cæcas, dolentesque, quibus ex itineribus demum apertis dolores desiere, mole tamen earum sensim ita aucta, ut nunc acinis uvæ similes essent, & jam a 4. annis sub alvi egestione omnes egressæ non facile mox reponi se sinerent, quæ antehac sanguinem etiam quandoque fuderunt. Demum ab autumnali 3na duplici hæmorrhoidum tumori rursus dolor se junxit, post alvum egestam semper ingravescens, & plures horas, imo totum quandoque diem durans, acutissimus. Varices fuere lividæ, ac fere nigræ, atque in superiore parte versus coccygem ulceratio quædam, & inferius aliæ leviores excoriationes reperiebantur. Exitus ignoratur.

§. XXXIV.

3. VERTIGO quoque hæmorrhoidariis sæpe admodum infesta esse consuevit, dum nimirum sanguis exitum per vasa intestini recti non illico nactus oborto nisu contrario, ad superiora regurgitat. C. C. ENGEL (b) viri eccle-

(a) Consult. & resp. med. T. 2, Cent. 3. Cas. 13. p. 331. sq.

(b) Specim. med. p. 152, sqq.

ecclesiastis casum refert, quem vertigo ab anomalis hæmorrhoidum moliminibus, ac scorbutica dyscrasia oriunda graviter afflixit, & J. C. STUNZER (a) vehementem in nonnullis hæmorrhoidariis vertiginem observavit, quæ mox ut punctorius in ano dolor obortus est, remisit. In Annalibus Vratislaviensium (b) piscator 50 annis major, melancholicus, postquam in, & super aquis diu, multumque laborans corpus admodum perfrigerasset, in tantam incidit vertiginem, ut oborta subinde scotomia in periculo fuerit e scapha in aquam delabendi. Supervenit levior febrilis horror, vehementem in æstum abiens, quo per ðem salinum antispasmodicum sopito, hæmorrhoides cum vehementi ardore sese effudere: unde cum debilitaretur admodum, secta vena continuatisque prioribus ðibus addito Ræ stomach. Θnæ usu, & exhibitis aliquoties pillulis STAHLII, prorsus iterum convaluit. Perinde A. E. BÜCHNERUS (c) meminit viro hæmorrhoidum fluxum omni mense regularem aliquamdiu adepti, sed semper cum ante; tum post fluxum gravem sodam, & aliquoties etiam ante fluxum vehementi vertigine, & uberi narium hæmorrhagia

(a) L. c. 46.

(b) Tent. 27. A. 1724. Martii. cl. art. 2. p. 258.

(c) Miscell. phys. med. A. 1730. Aug. cl. 2. art. 1. §. 2. p. 1245.

hagia vexati, quæ tamen oborto fluxu denuo conquiescebant. SALOMONIS (a) etiam juveni ab hæmorrhoidali sanguine versus caput regurgitante, istud tam imbecillum fuit, ut ille sine comite incedere nequiret. Vertiginosi quoque fuerunt VEBERI (b) ægri, DUNCANI (c) olitor, ac WEISZII (d) mercator. Videbimus etiam deinceps (e), quam sæpe vertigo suppressum hæmorrhoidum fluxum consequatur.

§. XXXV.

4. INSANIA etiam non usque adeo hæmorrhoidariis est infrequens, dum sanguis ano erumpere nequiens caput petit. Qui prima hæmorrhoidum experiuntur molimina, identidem ac sine manifesta causa melancholici evadunt, mæsti; nulla voluptate exhilarandi, velut puella, cujus CHEVALIER (f) meminit; aliis furibunda etiam deliria accidunt, quemadmodum in BANGII (g) viro est observatum. Fluxu autem hæmorrhoidum sponte, arteve

eve-

(a) Vide §. 115. Nro. 1.

(b) Vide §. 32.

(c) Vide §. 70.

(d) Vide §. 101.

(e) Vide §. 55. Nro. 1.

(f) Vide §. 71. 2)

(g) Vide §. 117. β.

eveniente ægri ad rationem hilaritatemque redeunt. Plura huc facientia exempla postmodo (α) etiam visuri sumus.

§. XXXVI.

5. SPASMI, convulsiones inter molimina hæmorrhoidalia hæud secius; ac vertigo, & insania pertinent; idque vel ob encephalon sanguine illuc regurgitante oppressum, vel ob nervos in decursu ab infarctu vasorum laceffitosis. Ita ERNESTI (b) vir spasmus in artubus, in cruribus GRAFFII (c) nobilis, in manibus STORCHII (d) juvenis expertus est. Postremo huic (e) etiam curandus obtigit cholericus 32. annorum, quem 12ma Maji subito tremor artuum, & syncope, sudorque frigidus prehendit. Dato ꝯe antispasmodico temperante omnia conquievit; sed 28va Novembris (f) ingruunt horripilatio, æstusque cum pressione in stomacho; data ergo vesperi pillul. BECCHER. & purg. ꝯ gr. 5. Die 30ma tamen pressio in stomacho superfuit: ergo datum

R.

(a) Vide §. 55. Nro. 2.

(b) Vide §. 39.

(c) Vide §. 47. b)

(d) Vide §. 115. Nro. 2.

(e) Obs. clinic. ann. 4. Maji. cl. 4. §. 4. p. 253.

(f) Ibid. Novembr. cl. 4. §. 3. Nro. 8. p. 577.

R. Elixir ppr. PARAC: sine acido ꝯß.
 Eff. bez. Auctoris ꝯj. M.

S. ter de die gtt. 30. Unde in 4 hebdomadas bene habuit. Donec 28 Decembr. in familiarem sibi defluxionem spasmodicam incidisset, a qua sumto ꝯ ex antisp. ꝯij, & e pil. nigr. ꝯj, in 3 doses ꝯtia quave hora dandas diviso postridie liber factus venam in pede secuit. Die ꝯima flatus adhuc molesti erant cum convulsivo lævi hypochondrii tremore. Datus igitur ꝯ purg. ad gr. xxv. sumendus, dein vero

R. M. P. de succin. CRAT.
 — — purg. aa ꝯß. M.

Divide in ij doses, S. omni hebdomade unam: unde (a) 2da Januar. sexies dejiciens sub finem purum sanguinem egressit, sine ullo tamen levamine, ob superstitem flatulentiam; cui inter varia etiam ▽æcarminativæ oppositæ, cum inquietudines, & alvi obstructionem attulissent, seponendæ iterum erant, alvusque enematibus aperta tenenda. Finiente Februario varix hæmorrhoidalis enata naturam morbi luculente detexit, a quo idonea medendi methodo adhibita prorsus tandem convaluit. Perspicax lector varia utilia colloraria

ex

(a) Ibid. ann. 5. Januar. d. 4. p. 24.

ex hac observatione sibi eruet. Ad spasmos quoque referenda est palpitatio cordis in BEHRENSII (a) literato observata. Gravissimum tamen convulsionum genus est epilepsia, quam hæmorrhoidalia molimina cum paralyfi in CORNARII (b) nobili excitarunt, & cujus duo etiam in praxi exempla J. STORCHIO occurrerunt, unum (c) in illustri quadam virgine, alterum (d) in femina quadam aulica, sanguineo - melancholica, ceteroquin robusta, e nigro fusci coloris. Hæc sub parco catameniorum fluxu jam a biduo ex intervallis spasmos epilepticos cum omnium sensuum abolitione patiebatur quos pro uterina epilepsia habitos cum data MRa ex essent. Castor: cum $\Omega \ominus^*$ in ∇^a hyster. HORSTII (quæ aqua seorsim etiam cochleatim bibenda imperabatur) semper magis magisque exasperasset, Auctor consultus exhibuit 2da quaque hora \oint antispasmodico - absorbentem, a quo 4 horarum morbus inducias dedit, deincepsque prorsus deferbuit. At dum 3tio abhinc die ægra, nescio quo, consulente rursus essentiam pristinam usurpasset, novum nacta est insultum, post quem datum catharticum e $\overline{R}a$ rhei

(a) Vide §. 51. B. a) Nro. 1. §.

(b) Vide §. 95. d)

(c) Von Krankh. der Weiber. 2. Band Cas. 116. p. 432. sq.

(d) Ibidem Casu 96. p. 348. sqq

rhei ʒjß, & arcan. ☐ri ʒß pro binis haustibus; unde ægra alacris, hilarisque nonnisi alvum obstructam, fugacesque calores versus horam 4tam querebatur. Iteratæ proinde MRæ pars una a meridie, altera postera mane, & ʒis antispasmodici ante meridiem, ac vesperti præbium datum, & ad referendam alvum globulus moschatus ano inditus eam sub vespertum movit, sub cujus egestionem, & post illam tenesmus cum tuberculo hæmorrhoidali sese exseruit; sed insultus epileptici haud amplius reversi sunt, contra vero nunc murmura, & aliquæ anxietates molestæ erant; quæ cum nil nisi hæmorrhoidales essent nifus, imperabatur ulterior MRæ ac ʒis usus. Postridie dolor dextro in crure ac pede aderat, sed cum cetera bene haberet ægra, nonnisi semel cum MRa, tum ʒ datus, sequenti die insignis mucis cruenti copia cum ardore, ac tenesmode dolore alvo prodiit, crurisque dolor evanuit, hinc unicus tantum ʒ datus. Biduo abhinc ægra ita profecit, ut lectum deferere quiverit, nil nisi leves adhuc horrores, fugacemque calorem quæsta. Idcirco præscriptum

R. M. P. BECCHER ʒj.

— — purg. ʒß. M.

div. in doses iij, quarum 4to quovis die una sumatur. Triduo post ægra optime valebat, & post Væ. Snem. 8vo inde die in pede factam constanti gavisa est valetudine.

§.

§. XXXVII.

6. ANXIETAS, *dyspnœa*, *asthma*, *orthopnœa*, *tussis*, aliaque respirationis vitia non raro motus hæmorrhoidales comitari assolent. Sic tussis WEISZII (a) tinctori molesta fuit, quam cum dyspnœa expertus est RAIMANNI (b) vir, asthma viduam ALBRECHTI (c) virumque ERNESTII (d) afflixit, cui tussis quoque comes fuit in GOHLII (e) ac STAHLII (f) viris, imo orthopnoicus inde factus est GOHLII (g) bibliopægus, anxietates vero torserunt MOLLERI (h) Pastorem, VOGELII (i) senem, ægrosque STÖRCKII (k) ac WEBERI (l).

§. XXXVIII.

7. HÆMORRHAGIÆ *succenturiatæ* sæpe numero oboriuntur, dum sanguis hæmorrhoidalis

-
- (a) Vide §. 124.
 (b) Vide §. 109. b)
 (c) Vide §. 119. Nro. 5.
 (d) Vide §. 53. I.
 (e) Vide §. 55. Nro. 12. d)
 (f) Vide §. 115. Nro. 1.
 (g) Vide §. 55. Nro. 13. d)
 (h) Vide §. 115. Nro. 1.
 (i) Vide §. 54. Nro. 3.
 (k) Vide §. 32.
 (l) Vide §. ibidem.

dalīs per intestīni recti vasa erumpere haud valens ad alia, vel vicina vel remotiora vasa regurgitat, ibique vel anastomoses articularum, vel varices venarum ad crepaturam usque distentas efficiundo exitum sibi pandit. Sic narium, & e cutaneis poris hæmorrhagiæ obortæ sunt in Ill. juvene STAHLII, (a) & narium quoque hæmorrhagias primum, deinde vero mictum cruentum nactus est CARLII (b) homo, ALBERTII (c) autem vir & GOHLII (d) bibliopœgus cruento sputo inde laborarunt, haud secius ac ii, quibus e suppresso hæmorrhoidum fluxu variæ id genus hæmorrhagiæ accidunt. (e)

§. XXXIX.

8. SUDORES; quoque inter molimina hæmorrhoidalia sunt referendi, iique vel *universales*, qui plerumque nocturni sunt, ut in ERNESTII (f) SALOMONIS (g) ægris vel *topici* v. g. circa anum, ut in I. G. ERNESTII

(a) Vide §. 51.

(b) Vide §. 55. Nro 9. f)

(c) Vide §. 60.

(d) Vide §. 55. Nro. 13. d)

(e) Ibidem, a) sqq.

(f) Vide §. 53. I.

(g) Vide §. 115. Nro. 1.

STII (a) viro sanguineo - cholerico, qui sæpe spasmodicos artuum motus, ac molimina hæmorrhoidum externarum citra justum fluxum, nisi quod subinde, ac præsertim post ingurgitatum vinum leve sanguinis stillicidium sub alvi egestionem sit expertus, perpesus, tandem sudare circa anum ac genitalia cœpit; sed sponte iterum evanescentem in autumno sudorem excepit angustatio pectoris, cum sicca tussi, quæ quidem a Væ. Sne. pedis, eccoproticis, & infusis discutientibus iterum desiit, sed postmodo post levem corporis perfrigerationem enata est otalgia cum purulento aurium fluxu, & carebaria. Hanc suffitus sacculique discutientes cum camphora vertici, ac Nuchæ impositi, & otalgiam quoque abegere, superstite solo aurium fluxu nullis remediis ne minuendo quidem; qui cum ex anomalia hæmorrhoidum sursum regurgitantium natus crederetur, non satistutum videbatur valentioribus cum remediis cohibere, solis itaque insistebatur porro revellentibus, divertentibus, discutientibus, motusque anomalos mitigantibus, imo facta in vere circa æquinoctium Væ. Sne. pedis, datisque iterato infusis eccoproticis, ab omni deinceps medicatione sensim desistebatur, omni negotio naturæ relicto. Et vero fluxus a mane ad meridiem usque copio-

(a) Annal. Vratisl. Tent. 23. A. 1723. Febr. d. 2. art. 3. §. 4. p. 151. sq.

piofior abhinc in vesperam usque semper magis minuebatur, donec etiam horis matutinis minui cœpit, & æstâte demum prorsus desit, reversis iterum doloribus nephritico-colicis, manifesto indicio sanguinem iterum versus ani vasa niti: Luculentum sane motuum hæmorrhoidalium anomalorum exemplum!

§. XL.

9. METEORISMUS *abdominis* inter primaria hæmorrhoidum symptomata pertinet, cui præprimis hæmorrhoidarii, hypochondriaci, & hystericæ sunt obnoxix: hinc tot horum ægrorum querimonix de sonoris ructibus, inflatione stomachi, ac ventris totius, intestinorum rugitu. Unde M. ALBERTI (a) non immerito inter anomalarum hæmorrhoidum symptomata refert ructus illos molestos, & adversos, imo etiam nidorosos, qui præter angustantes molestias flatulentas una affligunt, & sub cardialgicis, & succusatoriiis hypochondriorum, atque diaphragmatis commotionibus eliduntur: quales ructus ceteroquin hypochondriacis etiam perquam familiares existunt. Inflationem autem ventris colicæ plerumque junctam perpassi sunt DELII (b) miles enormem, ERNESTII

(a) Diff. de hæmorrhoidum. consensu cum scorbuto §. 13. Tract. de hæmorrhoidib. P. 2. p. 61.

(b) Vide §. 19. c)

STII (a) senex, HENNINGII (b) vir, ægrique
STÖRCKII (c)

§. XLI.

10. ANUS *constrictus* qua ab infarctu
vasorum hæmorrhoidalium qua a sphincteris
spasmo. STAHLIUS (d) hoc symptoma internis
hæmorrhoidibus non abs re tribuit, anum
dicens usque adeo sæpe contrahi, ut vix
cannulæ clysmaticæ, nedum ipsi liquori ad-
itus pateat, summa sane ani adstrictio adfuit
in STÖRCKII (e) ac WEBERI (f) ægrotis,
& ani perinde angustationem senserunt cum
HEISTERI (g) matrona; tum STORCHII (h)
juvenis, at obortus tandem fluxus huic mo-
lestiæ finem imponere solet. In habituali ta-
men morbo, ubi nullus jam spasmus præsto
est, ani sphincter plerumque ita relaxatur, ut
& anus procidat, (i) & aliquando incon-
tinentia alvi sequatur, quam I. D. GOHLII
(a) mo-

(a) Vide §. 53. III. B. Nro. 4.

(b) Vide §. 78.

(c) Vide §. 32.

(d) Diff. de motu sang. hæmorrhoidali, & hæ-
morrhoidibus externis Cap. 8. p. 21.

(e) Vide §. 32.

(f) Ibidem.

(g) Vide §. 84. c)

(h) Vide §. 115. Nro. 2.

(i) Vide §. 53. II. Nro. 6.

(a) molitor passus est, nisi ejus morbus huc prorsus forte non pertineat: relatio ejus certe admodum est ambigua.

§. LXII.

II. TENESMUS hæmorrhoidale symptoma & familiarissimum, & (si unum forte dolorem demas) omnium facile pessimum, quod ægros frequentia sua ad desperationem fere adigit. Gravis certe fuit in CAMPARDONI (b) Canonico, SEGNITZII (c) puella, ac in primis BEHRENSII (d) literato; PEZOLDI (e) autem equiti tantus erat, ut is inter desidendum ad eclysin usque toto corpore tremaret. Imo symptoma hoc sua frequentia, & intensitate quandoque tam est importunum, ut omni somno prohibito, viribusque exhaustis, in senibus præsertim, mortem accersat, quemadmodum id binis in senibus accidisse i. STORCH (f) testatum reliquit. A sanguine vasa intestini recti distendente, nervosque ita irritante malum hoc oriri vel inde conficitur, quod educto ex ani vasis per admotas hirudines sanguine ocyus sæpe desinat

(a) L. c. Vol. 5. Sect. 2. Nro. 17. p. 35.

(b) Vide §. 71. c)

(c) Vide §. 72.

(d) Vide §. 51. B. a) Nro. 1. 8

(e) Vide §. 59. b)

(f) Obs. clin. ann. 1. Mart. d. 1. Nro. 8. p. 37.

nat, & quod interdum in abscessum ani, ut
1. c. TILLINGIUS (a) vidit, degeneret.

§. XLIII.

12. ALVUS autem hæmorrhoidariorum.

a) *Fluxa* quandoque est, dum nimirum sub nisu sanguinis in vasa intestini recti simul in reliqui etiam intestinalis tubi vasa secretoria plus humorum congeritur cum peristaltici motus augmento. Sic WEDELI (b) mulier cum nimio hæmorrhoidum fluxu diarrhæam simul patiebatur, quam sub molimini-bus hæmorrhoidalibus nactus est ERNESTI (c) senex, STORCHI vir (d) quidam ac femina (e) cholericæ prope quadragenaria, cui ante 6. vel 7. annos hæmatemesin cum interscapulari, lumbarique spinæ dorsi dolore passæ ga. Decembris 1730 post octidui dorsi dolores diarrhæa cruenta oborta est. Hanc data M Ra. c rheo minuit; sed interscapulares ac lumbares postridie percepti dolores reversuræ hæmatemeseos metum ægræ iniecerunt, dempto autem hoc metu ob fluxum hæ-

morr-

(a) Observ. med. singul. circa verum usum ther-mar carolinar. Obs. 35. p. 69.

(b) Vide §. 24.

(c) Vide §. 53. III. B. Nro. 4.

(d) Vide §. 29. a) a. §. 55. Nro. 13. d)

(e) Obs. clin. ann. 8. Decembr. d. 4. p. 672.

morrhoidum præsentem continuata MRa. e rheo diarrhæam sustulit solo hæmorrhoidum fluxu superstitæ, cui semel adhuc opposita mane diei 11 mæ. MRa. ex rheo, binique pulveres antispasmi: c. magnesia alba, a meridie ac vespere fumendi. Choleram quoque morbo huic junctam vidit (a) in cholericæ sexagenario, qui per 8. dies vomitum diarrhæamque cum anxietate mense Augusto nactus est. Dati bini ꝑes. c. rhei elect. & ☉. pur. āā gr. x; dein essent. alex. STAHL. c. ess. ther. a. His vomitus fugatus est pergente diarrhæa enataque tubercula hæmorrhoidalialia dolorifica in ano. Ad leniendam diarrhæam data dosis elect. diascord. imperatusque ventris litus ex ol. fl. Cham. cum carni. Tubercula tepido lacte fovere est iussus: unde unum eorum ruptum sanguinem fudit cum tanto levamine, ut æger expedite incedere quiverit: ad reliquos ergo dolores præscriptum ungu. alb camph. pro litu. Plura hisce analogæ alibi (b) etiam visuri sumus. Verum rarius in hæmorrhoidalibus malis fluxa est alvus, sed plerumque reperitur.

b) *Obstructa*, fecum egestionem obstante non tam vasorum intestini recti tumore; quam spasmus potius motum peristalticum labefactante & elidente. Alvinæ id genus obstruc-

(a) Ibid. August. d. 4. p. 574. sq.

(b) Vide §. 51, B, a) Nro. 1.

structionis exempla præbent viri in Annalibus Vratislaviensium (a) & HOFFMANNI (b), senes LEÜTHNERI (c) ac VOGELII (d), insulanus RIVERII (e) magnas SCHMUKERI (f), femina SALOMONIS (g), & STÖRCKII (h) ægri. Graviorum etiam obstructionum alvinarum historias inferius (i) reperire erit. Quantis autem cum doloribus alvus tunc egeratur, jam superius (k) ostensum fuit.

§. XLIV.

13. VOMITUS, etiam aliquando affligit, quem vel alvus obstinate clausa, vel sanguis ab ano sursum regurgitans causat, præsertim obtinente simul cardialgia, vel colica, ut id videre fuit in viro Vratislaviensium (l) & AL-

BER-

(a) Vide §. 84. a)

(b) Vide §. 100.

(c) Vide §. 96. e)

(d) Vide §. 54. Nro. 3.

(e) Vide §. 126. b) δ.

(f) Vide §. 117. β.

(g) Vide §. 115. Nro. 1.

(h) Vide §. 32.

(i) Vide §. 55. Nro. 7.

(k) Vide §. 33. g)

(l) Vide §. 84. a)

BERTII (a) CORNARI (b) nobili, SPINDLERI (c) figulo, STÖRCKII (d) ægrotis, aliisque (e). Non vulgarem huc facientem casum refert J. C. BÜNDEL apud R. A. VOGEL (f): hæmorrhoidum fluxum in juvene lumborum semper, stomachique dolor præcedebat: cum aliquando fluxus hic triennium emanisset illæsa sanitate, abhinc iterum revertit, verum nunc eundem semper per aliquod noctes statim hora ingruens vomitus præcedebat.

§. XLV.

14. URINÆ *excretio* in hæmorrhoidali morbo non mediocriter solet perturbari, cum enim, ut alias (g) dictum, hæmorrhoidalium vasorum propagines ad vesicam etiam, & corpora cavernosa penis ablegentur, facile liquet, a sanguine hæmorrhoidalia in vasa uberius, impetuosiusque pulso hos quoque ramos eodem tempore distendi, collumque
ita

(a) Vide §. 60.

(b) Vide §. 95. d)

(c) Vide §. 119. Nro. 4.

(d) Vide §. 32.

(e) Vide §. 33. cl. c.

(f) Academ. kleine Schrift. 1, Samml. Nro. 2, Beobacht. 2. P. 45.

(g) Vide §. 5. b. d.

ita veficæ anguftari, ac fpasmo arctari; unde urinæ parcæ, flammæque difficilis excretio, vel omnimoda etiam fuppreffio efficitur. Hinc G. SWIETEN (a) „ftranguriam (inquit) „moleftam . . . ab hæmorrhoidibus cæcis „tumentibus fieri, quotidiana obfervata reftantur; imo & integram urinæ fuppreffionem ab eadem caufa natam fuiſſe vidi, quæ „ruptis vafis tumentibus, & ſanguine copioſo „per anum excreto ſanabatur ſtatim.“ Inſignem ab hacce caufa mejendi difficultatem expertus eſt DODONÆI (b) vir, & conſanguinea SALOMONIS (c): unum autem ex rariffimis hujus comatis exemplum exſtat in Annalibus Vratiſlavienſium (d) de puſione $4\frac{1}{2}$ annorum, phlegmatico ſanguineo, qui æſtate in 6tam jam ſeptimanam aſſidua, ac dolorifica miſturitione tenebatur, lotiumque guttatim tantum ſummos inter dolores excernebat, ſanus ceteroquin & finitis doloribus eſcæ, potusque appetens. Ingruente autem miſturitione omnibus artibus contremiſcebat, pulſu factò inordinato, ſudoreque per totum corpus oborto, non ſine imminentium convuſſionum metu. Ex urina ſubpallida, ac
tur-

(a) Comment. ad H. BOERH. aphor. 963.

(b) Vide §. 11. Nro. 12.

(c) Vide §. 115. Nro. 2.

(d) Tent. 25. A. 1723. Auguſt. d. 2. art. 3. §. 1. p. 152.

turbida nonnullis vesicæ calculus adesse credebatur; sed cum morbus non esset continuus, doloresque interdum ultra octiduum etiam abessent, venit in mentem Auctori molimina hæmorrhoidum calculum vesicæ mentientia suspicari, id quod ipse & in proprio jam ante filio, & in aliis est expertus. Ordinatis ergo discutientibus, ac resolventibus cum ꝑ digestivis cinnabarinis, & imperatis, quoties stranguria fiebat per quam vehemens, enematibus ex emollientibus, ac nervinis tonicis, puer facile mejebat, & aliquamdiu recte valebat. Inde dabatur \mathcal{R} a ꝑii ♀ sata. c. ω C. C. rectif. Revertebatur tamen identidem dysuria ad omnia rebellis, nisi quod enematibus, calidisque fotibus citius; quam internis remediis cederet. Versus Octobrem post octidui a stranguria inducias, incidit puer in tussim, ac spirationem anhelosam, & post usum aliquot expectorantium, inscio Auctore, cœpit sanguinem sat copiose exspuere. Datis ocysus abstergentibus, ac discutientibus sputum cruentum desit, superstita tussi, & pectoris infarctu usque in Novembr. Tum vero denuo revertit stranguria, tussisque abiit. Resumitis ergo iterum enematibus ecce proleclæ sunt dejectiones cruentæ, ac purulentæ in aliquot continenter hebdomadas durantes, ita ut sub quavis egestionē puer cum stercore sanguinem, ac pus excreverit; sed ab hinc omnia desiere symptomata, puerque ex toto convaluit. Ischuriæ autem ex hæmorrhoidibus cæcis enatæ casum haud vulgarem refert

J. STORCH (a): vir 50 annis major eufarcus, sanguineus, semper appetens, multoque abusus vino, toleratam aliquamdiu circa hepar pressionem sublaturus post Vnæ. Snem. enema admisit cum levamine, ab altero autem injecto, utut nec fervido, nec ano a cannula offenso, ocyus hæmorrhoides obortæ sunt cum inflammatione recti, ac protuberantibus tuberculis e livido albis, ac veluti pellucidis, urethra simul usque adeo tumente, ut nihil omnino lotii excerni posset. A data autem 4ta quaque hora ꝑris polichresti Auctoris ʒß ex aqua flor. tiliæ, æger postridie reddidit plurimum lotium admodum fuscum, cum levamine, & imminutione inflammationis, unde sumtis porro 6ta quaque hora iisdem ꝑbus, illitoque externe unguento Lithargyrii, æger sub usu cerevisiæ Naumburgensis sensim convaleuit. Perinde apud DE LA MOTTE (b) femina patiebatur ab hæmorrhoidibus alvi suppressionem, cum tridui ischuria insuperabili: donec indito non sine doloribus cathetere novem scutellas plenas lotio excrevit, & enemate dein adhibito, alvum quoque posuit. Alia quoque illius (c) gravida ex eadem causa in ischuriam incidit, quam & RIEDLINI (d) mu-

(a) L. c. ann. 2. Januar. d. 4. Nro. 7. p. 30.

(b) *Traité compl. des Accouchem.* L. 1. C. 20.
Obs. 51. p. 115.

(c) Vide §. 133. a)

(d) Ibidem.

mulier, & LBÜTHNERI (a) senex, & STÖRCKII (b), ac WEBBERI (c) ægri inde nacti fuerunt.

§. XLVI.

15. COLOR *corporis* in hæmorrhoidariis, habitualibus præprimis consideratione non indignus est; quippe qui singularis esse soleat. Nominavit, non determinavit eum GALENUS (d) scribens: „coloris in universo corpore „proprietas alia quidem per hepatis, alia vero „per splenis affectus apparet, ita ut doctum „medicum haud quaquam possit fallere, si „cui ne color quidem, quem hæmorrhoides „induxerunt.“ Sed quis ille? HIPPOCRATES (e) audiatur: „eos (inquit ille), qui per „ora venarum (αἱμορροϊδᾶς) sanguinem funde- „re sunt soliti, si quis per hyemem liberalio- „re potu usos, aut bene coloratos conspiciat, „hic facile prædixerit ipso vere erupturi san- „guinis magnam spem affore, adeo, ut sub „æstatem decolores, & aquosi evadant.“ Sed istud magis ad plethoram hyeme collectam, æstate vero sublatam, quam ad hæmorrhoidalem

(a) Vide §. 96. c)

(b) Vide §. 32.

(c) Ibidem.

(d) De locis affectis. L. 1. C. 5.

(e) Prædict, L. 2. p. m. 83. sq.

dalem sanguinis dyscrasiam referendum est ;
 de ista vero paulo inferius (a) agere videtur
 dicens : „quibus juvenibus diu coloris fæda-
 „tio inest ; non tam continenter ad instar re-
 „gii morbi , ii viri , & feminæ capitis dolore
 „conflictantur , & lapides , ac terram edunt,
 „aut profluvium per ora venarum sanguinem
 „fundere solita patiuntur , hæmorrhoidas Græ-
 „ci dicunt.“ Ex his non ambigue liquet,
 fœdum corporis colorem eundem hæmorrhoi-
 dariis tribui , qui in chloroticis observatur,
 nimirum e virore pallidum , aut gilvum ; con-
 tinuo enim subdit couis : „at colores cum
 „virore pallidi diuturni absque vehementi re-
 „gio morbo cetera quidem eadem facere so-
 „lent ; verum præcordiorum dolores eos ma-
 „gis vexant , quam ceteros ; neque tamen la-
 „pides , aut terram edunt. Qui vero diu pal-
 „lidi faciem habent tumidam , eos certum est,
 „aut capitis , aut viscerum dolore laborare,
 „aut sedem internam (intestinum rectum) quo-
 „dammodo male affectam esse. Magna autem
 „ex parte , ubi hæc adfuerint , non unum ali-
 „quod malum inesse videtur , sed interdum
 „multa , aut etiam omnia.“ Clarissime autem
 de hac re AVICENNA (b) „plurimum quidem
 „(ait) habentibus hæmorrhoidas adest color
 „proprius eis , & citrinitas declinans ad viri-
 dita-

(a) Ibidem p. m. 110.

(b) L. 3. Fen. 17. Cap. 2.

„ditatem“ i. e. color ex virore gilvus: „id
 „quod in multis aliquando animadvertentes
 „solo hoc signo inducti eos hæmorrhoidibus
 „laborare pronuntiavimus magno cum artis
 „honore“ inquit P. FORESTUS (a) hujusmo-
 di sane colorem præsetulit ISENFHAMMI (b)
 senex, ac PEZOLDI (c) tutor, & vix non
 eundem, nempe icteroden HOFFMANNUS (d)
 suo in viro observavit. *Ani color* etiam in-
 terdum est exquirendus: rubedo enim circum
 anum in moliminibus hæmorrhoidalibus quan-
 doque visitur, ut SALOMONIS (e) in muliere.

§. XLVII.

16. TUMORES varii in variis corporis lo-
 cis ab anomalo sanguinis hæmorrhoidalis mo-
 tu, atque in alias partes decubitu, ut sunt:

a) *Erysipelas, phlegmone*. Femorum
 phlegmone ante fluxum cum asthma, huic-
 que alterno pedum oedemate laboravit AL-
 BRECHTI (f) vidua; rosam autem bullatam
 lævo

(a) L. c. Schol. ad Obs. 5.

(b) Vide histor. hæmorrhoid. alb. §. 16.

(c) Vide histor. hæmorrhoid. vesicæ §. 13.

(d) Vide §. 100

(e) Vide §. 115. Nro. 1.

(f) Vide §. 119. Nro. 5.

lævo in pede ex anomalis hæmorrhoidum motibus nacta est SALOMONIS (a) mulier.

b) *Varicocele*, quam LEBENWALDTII (b) juvenis est adeptus, & C. GRAFFII (c) nobilis ad 50. annos habens, sanguineo-chole-
 lericus, enterocele inguinis lævi laborans ab aliquot jam annis 19na Aprilis 1725. media nocte post brevem somnum correptus est lævi scroti dolorifico tumore duos viriles pugnos æquante, cum torminibus, ac vehementibus spasticis crurum motibus, quibus comes erat febrilis motus, cum rigore, æstu, sitique intensa in multum usque diem continuans: hæc 20ma Aprilis a meridie excepit alvi fluxus aliquot dierum, stercoreo-sanguineus, cum omnium modo dictorum symptomatum abolitione, solo scroti tumore superstitite, at indolente: æger viribus pollens appetebat, & sine incommodo ambulabat; nisi quod ponderis adesset sensus. Accitus chirurgus tumorem pro hernia incarcerata habens, per 3 septimanas cataplasmata, emplastra, fofusque emollientes, ac varia ligamenta admovet incassum, sine ulla tumoris diminutione. Maji 19na consultus Auctor non tam incarceratam herniam, cujus aberant solen-

(a) Vide §. 115. Nro. 1.

(b) Ibidem.

(c) Acta, nat. cur. Vol. 2. Obs. 81.

solennia signa, quam herniam varicoso-humorem adeste ratus anomalis hæmorrhoidibus tribuendam, præbuit rheum, & diuretico-tonica; externe roborantia admovit: ab his evanido brevi tumore æger pristinam recepit sanitatem. J. STORCH (a) refert cholerico-phlegmaticum 52. annorum hæmorrhoides a vini potu nactum, Majo mense 1728 dolentes earum protuberantias pati cœpisse cum diarrhæa pauca, sed fere continua, & quasi lienterica, cui 16ta Maji datum:

R. M. P. BECCHER.

— — alterant āā ʒj. M. F. pil.

S. vesperi Nro. 10 vel 12. pro dosi. Porro.

R. Ræ propr. MYNS.

♂. LUDOVIC. āā ʒij. M.

S. m. & v. gtt. 30. nec non.

R. Summit: millefol. M. ij. D. pro infuso hauriendo. Juni 6ta retulit, a pilulis tenebrum se passum; hac autem hebdomade varicem sibi in scroto crepuisse, & sanguinis inde minimum ʒjß fluxisse cum insigni levamine. Monitus ergo ne Væ. Snes. æquinoc-tiales negligat.

c) Bu-

(a) L. c. ann. 6. d. 4. 579. sq.

c) *Bubones* inguinales, quorum ab hæmorrhoidibus profectorum nonnisi tria exempla novi PEZOLDI (a) in sutore unum, alterum in ejusdem (b) adolescente 14 annorum, qui ex caseo aliisque cibis frigidis ac dyspeptis nactus est hæmorrhoidum fluxum cum colore totius corporis fusco, puncturis pectoris, torminibus, ac tumore bubonum, idoneis tamen remediis omnia sublata sunt. Tertium est in J. D. GOHLII (c) juvene ad 30. annos nato cholericò - sanguineo, ac venerem perditè sectante, qui a patre perquam podagrico progenitus, ac prima jam in juventute arthriticus, 17ma Maji 1721. rectè valens, post prophylacticum purgans ira valida, iterataque excanduit, ac tertio post die secta dextri pedis vena, 5to die sudans, per octo inde dies bene habuit. Abhinc vero lancinans anum dolor invasit, ut æger nec pedem movere, nec tussire citra summum dolorem posset. Chirurgus ope speculi ani hæmorrhoidalem pustulam in dextra intestini recti parte inventam fotu molli, balsamoque externo una cum inguinali tuberculo discussit. Inde ægro ob alvum liberam a 6ta ad 12mam Junii bene valenti deinceps hæmorrhoidalis pustula renata est, summo cum ardore. Secta idcirco lævi
pedis

(a) Vide histor. hæmorrhoid. vesicæ §. 13.

(b) Obs. med. chir. 29.

(c) L. c. Dec. 2. Vol. 1. Sect. 2. p. 76. sqq.

pedis vena dat chirurgus vinum catharticum
 ex antiscorbuticis, & antivenereis, subjun-
 gitque perperam remedium stimulare ex **N**
 C. C. succ. Θ oleos. MYNS. āā 3ij. eff. lign.
 3ß. Ω Θ^* 3ij. M. pro usu nocturno ad gtt.
 45. A vino varix hæmorrhoidalis plus tumuit,
 & a quavis dejectione dolor in ano, similis
 clavo infixio, obortus est, cum impotentia
 sedendi, ambulandi, decumbendi, ipsosque
 flatus emittendi, quorum retentio dolores
 testiculi, & urethræ causavit. Datis autem
 temperantibus, & sale Epsomenfi, pro libera
 alvo, turbæ iterum quieverunt, morbus autem
 hæmorrhoidalis evasit periodicus, a difficili
 præsertim alvo recrudescens. Cum vero sub
 ordinata diætâ interne temperantia, & ex-
 terne emollientia cum discutientibus non mag-
 nopere præderent, hirudines pacatis in in-
 intervallis ano admotæ plurimum levabant. Sed
 æger intemperans melius habens, cum ocys
 genio, vinoque indulgeret, recidivam patie-
 batur, cum sero a vulnusculis denuo tumidis
 exsudante. Admota ∇ a arquebusade cum
 levamine, & cum alvus nec Θ i Epsomenfi,
 nec jalappæ resinæ ppt. ad gr. x obediret, hi-
 rudines alterum cum euphoria admotæ, & ab
 hinc Væ. Sne. in brachio subjuncta, tum semi-
 cupium imperatum in declinatione morbi. Sed
 a gravi ira novi os sacrum, & coccygis do-
 lores ad femur excurrentes invadere; queis
 etiam brevi sopitis, æger ad solita munia re-
 diit. Post annum tamen pulmonali phthisi
 periit. Credebat **GOHLIUS** negante licet
 ægro

ægro, nullisque syphilitidis symptomatibus præsentibus tuberculum esse inguinale, esse venereum; quod tamen nil nisi hæmorrhoidales infarctus pro causa habuit.

CAPUT VI.

PHAENOMENA VARICUM, ET FLUXUS HAEMORRHOIDALIS.

§. XLVIII.

I. **T**UBERCULA hæmorrhoidalia suis in phænomenis, puta: numero, magnitudine, figura, massa, ac sensilitate, magnam exhibent varietatem, tironibus scitu necessariam. Enim vero

1. *Magnitudo* illorum pisum alias, alias fabam, nucem avellanam, juglandemve, alias ovum, pomum, pugnum &c. æquat: generatim fere id tenendum est, varices hæmorrhoidum internarum præ externis majoris esse voluminis capaces, ob tunicæ a tegumentis, qua externæ præditæ sunt, defectum; hæc enim vasorum hæmorrhoidalium externorum dilatationi semper obstat. Si per exempla rem lustrare libet, videre erit varices has pisum grandes fuisse, quas viderunt HEISTER-

RUS (a) ac THEDEN (b): cerasis illas, acinisque æquales LEDRAN (c) repertas refert; avellanam magnas conspicati sunt BRAMBILLA (d), HEISTER (e), GÖCKELIUS (f), HOFFMANNUS (g), THEDEN (h), nucleo olivæ STAHLIUS (i), juglandi nuci BRAMBILLA (k), HEISTER (l), HORSTIUS (m), dimidium digitum longæ, unum latæ in OVELGÜNNII (n) viro erant; ovo gallinæ æquales vidit BRAMBILLA (o), pugno dimidio THEDEN (p); integro BLEGNY (q), ac SCHMUCKER (r), & apud M. ETTMÜLLERUM (s) refert „LINDA-
 „NUS in collegio M. S. super HARTMANNUM
 „se observasse hæmorrhoides cæcas in tantum
 „tumorem auctas, ut pugni instar extra anum
 „foras prominèrent.“

2. Nu-

(a) Vide §. 49. Nro. 3.

(b) Vide §. 117. β. (c) Ibidem.

(d) Abhandl. von der Phlegmone. 2. Th. 6. Cap.
 2. Bed. p. 144. 151.

(e) Vide §. 84. b)

(f) Vide §. 119. Nro. 3.

(g) Vide §. 21. (h) Vide §. 117. β.

(i) Vide §. 27. c) (k) L. c. p. 147.

(l) Vide §. 131. Nro. 7. (m) Vide §. 20.

(n) Vide §. 135. (o) L. c. 149.

(p) Vide §. 117. β. (q) Vide §. 131. Nro. 1.

(r) Vide §. 117. β. (s) L. c. p. 144.

2. *Numerus* quoque varicum est varius unicam GOHLII (a) juvenis, alique multi nacti sunt, duas BRAMBILLÆ Procenturio (b) ac Procolonellus, (c) tres alius ejusdem (d) Procolonellus, 5. 6. L. E. DRANII (e) ægri. Aliquando numerus, ne iniri quidem potest, dum varices altius intra intestinum latent. Unde LUDWIG: (f) „stasis autem sanguinis in his venis oriunda efficit tumores interdum pisi magnitudine, atque etiam majores (nam vidi nonnullos, qui ad ovi columbini, quin etiam gallinacei excrescerent,) modo duros, modo molliores, latius accrescentes, vel ex tenui pedunculo hærentes, pinquedine item cinctos, vel liberos, ut vel hac ex causa vasa in ramis producta varicosa non solum externe sed magis interne ad tractum intestini recti ascendant, & interdum ad coli finem se extendant.“

3. *Figura* perinde non omnibus una est, variaque ab ista iis indita nomina, quem admodum superius (g) jam pluribus dictum.

4. *Reni-*

(a) Vide §. 47. c)

(b) L. c. p. 147.

(c) Ibidem p. 151.

(d) Ibidem p. 144.

(e) Vide §. 117. β.

(f) L. c. p. 392.

(g) Vide §. 6. B. Nro. 2. α) α. β. γ. δ. ε.

4. *Renitentia* etiam alia, atque alia tactu percipitur; namque varices aliquando moles sunt, digitoque compressæ pene evanescent, dum nempe recentes non ad crepaturam usque repletæ, nec inflammatæ sanguinem fluxilem continent, internæ præsertim dictæ; duræ alias sunt e nimia repletione, sanguine spisso, coacto vel phlogistico, vel atrabiliario, vel grumoso refertæ, aut ex inflammatione contentæ, inprimis externæ, ob cutim investientem: vel ob vetustatem callosas tunicas adeptæ.

5 *Sensus* porro varicibus hæmorrhoidalibus varius inesse solet, prout hæ nempe vel turgentes vel tumentes furentesve sunt, (a) ita ut alias tensio tantummodo, alias vero dolor variæ intensitatis, velut in RAIMANNI (b) viro SEVERINI (c) léterico, &c. percipiatur.

6. *Exsudatio* etiam quandoque olidi inde feri contingere observatur, quemadmodum in GOHLII (d) juvene, ac HEISTERI (e) quadragenario. Pusne, an modo dictum serum fuit, quod D. C. SCHOBINGER apud A. HALLERUM

(a) Vide §. 6. B. Nro. 2. b) α , β .

(b) Vide §. 109. b)

(c) Ibidem.

(d) Vide §. 47. c)

(e) Vide §. 131. Nro. 7.

LERUM (*d*) simili in casu ab se visum scribit?
 „pus (vidit) in hæmorrhoidario & crebris
 „alvi prolapsibus laborante ex extremo intesti-
 „tino recto undique exsudans, hos prolapsus
 „inflammatos resolvens, & sedans sine ulla ul-
 „ceris, aut fistulæ suspitione. Accerrime in rem
 „inquisivi, (ait) & certus sum hoc pus ex
 „vasis inflammatis transsudare, sine substantiæ
 „læsione; nec ex cavea intestini venire itidem
 „certus in hoc exemplo sum.“ Videtur sane
 hæc exsudatio ab ipso ani prolapsu fuisse
 causata, veluti in OVBELGÜNNI (*b*) sene se res
 habuit.

§. XLIX.

II. FLUXUS *hæmorrhoidalis* tria præpri-
 mis notatu digna exhibet phænomena, ni-
 mirum humorem excretum, ejus copiam, ex-
 cernendique tempora.

1. *Humor* qui ex hæmorrhoidalibus
 vasis excerni solet, est triplicis generis :

a) *Sanguis*, atque is variæ indolis,
 prout nempe ex arteriis (si unquam ab his
 erumpit) vel venis, hisque aut hæmorrhoida-
 libus externis, aut internis profluit. Qui ex
 arteriis prodiit, fluidior, tenuiorque est,
 ac

(a) Epistolar. ab eruditis viris ad A. HALLE-
 RUM scriptar. Tom. 5. Epist. 2. 13. p. 185.

(b) Vide §. 135.

ac magis rubet contra ea crassus, ac nigricans venosus est, præsertim qui ab externis hæmorrhoidalibus venis scaturit; ex internis enim & fluidior, & rubicundus magis profluere observatur. Hinc multi e sanguinis colore, & consistentia ejus ortum, effectusque determinare consueverunt; quamvis id non semper citra errorem fieri queat. (a) Subinde grumusus primum, deinde fluidus prodit sanguis, velut in BEHRII (b) adolescente, & ERNESTII (c) muliere. Mirum autem, unde hic ingentes quandoque grumi? In feminis similes sæpe post lochia, vel menstrua aliquamdiu suppressa observantur; sed horum ratio facilis ex stagnatione in utero; num idem in recto intestino accidere potest? Hinc & R. LENTILIUS (d) „mirum . . . (inquit,) „sanguinem hæmorrhoidalem in frustra pugni magnitudine concreescere posse, dum supprimuntur, quod in Pastore quodam plus vice simplici me vidisse recordor; siquidem „arteriæ hæmorrhoidales extensionis tantæ „capaces nullatenus videntur, & alia cavitas „desit: nam neque cæcæ hæmorrhoides in „tantos tumores excrescunt. Id enim observatum velim nullo vel ante, vel in egestione „istius sanguinis dolore notabili Pastorem illum

(a) Vide §. 50. C.

(b) Vide §. 15

(c) Vide §. 55. Nro. 9. a)

(d) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 9. Obs. 124.

„lum fuisse cruciatum.“ Hisce vero non minus mirum est, sanguinem excretum interdum esse acerrimum, qualis in PEZOLDI (a) equite est observatus, ut qui cutem, quam attingit, papyrumque eroserit: haud enim veri est simile, reliquum etiam omnem sanguinem ejusdem fuisse causticitatis; secus tenerrimis encephali, aliarumque partium staminibus non pepercisset, gravissimasque passim in corpore produxisset noxas.

b) *Mucus* albus, interdum striis sanguineis interstinctus. Hic aliquando sanguineum fluxum præcedit, ita ut primo dejectiones mucosæ accidant, postmodo vero sanguis ipse erumpat, ut in BEHRII (b) Principe; aliquando autem solus mucus, quin ulla sanguinis excretio ex hæmorrhoidalibus vasis consequatur, alvo egeritur, atque tunc morbus *hæmorrhoides albæ* audit, de quo teorsim (c) agetur.

c) *Pus, sanies, ichor*, ubi hæmorrhoides inflammatæ in suppurationem, abeunt at ichor ne; aut serum potius vitiosum fuerit, quod G. H. VELSCHIIUS (d) in religioso
alias

(a) Vide § 59. b)

(b) Vide histor. hæmorrhoid. albar. §. 4. Nro. 4.

(c) Vide Ibidem §. 1. & 2. II. B. Nro. 1. a)

(d) Vide §. 71. β. §. 131. Nro. 17.

alias, alias nobili in viro prodiisse refert, merito ambigas.

2. *Quantitas* sanguinis effluentis admodum variat; alias enim justo est parcior, iusta alias, alias etiam profusa, ac debilitans. Postremo autem in casu duplici id ratione evenire assolet, videlicet, dum vel simul, ac semel intra breve tempus multus sanguis impetuose erumpit, vel partitis quidem; at multis omnino vicibus longum in tempus Hæmorrhoids fluit rarius primum; posterius autem est frequentius. (a) Operæ autem pretium me facturum censui, si utriusque generis exempla lectori uno quasi obtutu ob oculos sisterem. Enim vero

FISCHERI (b) puer quavis sub
alvi egestionem excrevit sanguinis . Cochli. j.

BEHRII (c) adolescens 3iij.

I. RHODIUS. (d) „ Patavii A.
„ 1628 clericorum regularium mini-
„ strum novit, cui supra 10 jam an-
„ num per hæmorrhoides quotidie
„ sanguinis fere 3iv.
„ manabant, sine labe viscerum, aut
„ fa-

(a) ALBERTI. diff. de hæmorrhoidib. ex-
cedentib. §. 10. Tract. de hæmorrhoidib. P.

I. p. 193.

(b) Vide §. 15.

(c) Ibidem

(d) Obs. med. Cent. 2. Obs. 93.

„facultatis naturalis debilitate. Mu-
 „lier ibidem suppressis mēstruis 4.
 „menses integro ultra 3j v.
 „sanguinis excrevit quotidie per hæ-
 „morrhoides, adeoque hoc temporis
 „spatio libras unde triginta; ℥xxjx.
 „imo fluxu ad horam saltem cessante
 „mox in animi deliquium incidit.“
 FERDINANDII (a) puella toto Ap-
 rili cum alvo semper sanguinis egef-
 sit plus minus ℥β.
 LANZONII (b) sacerdos quotidie ad ℥j.
 POMMEI (c) civis per mensem quo-
 tidie ℥i.
 CORNARI (d) nobilis intra 4. dies ℥vj.
 GULLMANNI (e) mercator intra 18.
 dies ℥xxjv.
 MONTANUS referente H. SCHWEVCHE-
 RO. f) „ait vidisse se . . . labo-
 „rantem hæmorrhoidibus, cui quoti-
 „die effluerent (sanguinis) ℥ij.
 „& amplius idque per 45. dies, nec
 „unquam constrinxisse & curatum esse.“

D. PA-

(a) Vide §. 25.

(b) Consult. med. 97. opp. T. 2. p. 203.

(c) Vide §. 133. b)

(d) Vide §. 95. d)

(e) Vide §. 53. III. B. Nro. 1. d)

(f) Append. Censilior. MONTANI edit. Basileæ
 1583. circa finem p. 59.

D. PANAROLI (a) „nobilis Hispanus
 „quotidie **tbj.**
 „sanguinis 4. ab hinc annis per hæ-
 „morrhoidales venas excrevit, op-
 „timaque fruitur valetudine. Con-
 „sideres, unde quantitas tanta er-
 „rumpere possit, cum usque ad hanc
 „diem plus quam mille libræ sangui-
 „nis fluxæ sint.“ MÜLLERI (b) fa-
 ber intra breve tempus excrevit san-
 guinis *Cantharum*

C. RAYGER (c) homines „ipse vidit
 „qui in una sessione ad $\frac{1}{2}$ **tb** sangui-
 „nis, idque vel ter in die, amifere,
 „sed cum notabili virium defectione,
 „& nisi legitimo modo fuisset sup-
 „pressus enormis hic fluxus, vix ad
 „aliquot dies suffecissent. Recordor
 „cujusdam . . . viri . . . cui non in-
 „frequens erat ultra **tbij.**
 „quandoque una die excernere, sed
 „cum magna virium prostratione, ne-
 „que tamen cito sisti debuit hic fluxus,
 „statim enim sanguis regurgitavit ad
 „pectus, & hæmoptysin introduxit. . .
 „Mærore animi (demum) confec-
 „tus obiit.“

G. HAR-

(a) Obs. med. Pentec. 2. Obs. 46. p. 109.

(b) Vide §. 26. b) a.

(c) Scol. ad P. SPINDLERI obs. med. 44.
 p. 77.

hebdomade accidit. STAHLIUS (a) diversarum periodorum sequentem adstruit causam: „internarum hæmorrhoidum (inquit) sæpe ferre est menstruus circuitus, in ipsis maxime „viris, aut sane frequentiora inde pathemata, „si vel e quantitate sanguinis (universali, aut „partiali circa venam portæ) vel assuefacto „jam hoc motu occasio præcesserit „Externarum magis fere vernæ, & autumnales sunt commotiones, & ob exitum impeditiorem e longe paucioribus, & tenuioribus vasculis longe tardiores etiam successus.“ At hæc nondum ex asse sunt evicta. Nos dubiis ratiociniis in medio relictis ad certa nos observata conferamus. Quidam H. SMETII (b) adolescens ab aliquot jam annis semper circa ver hæmorrhoidum fluxum nanciscebatur, quod ipsum P. I. SCHENFELDERI (c) canonico, ac STEGMANNI (d) civi non vere modo; sed & autumno accidit, & apud M. ALBERTI (e) puer decennis jam a biennio verno, æstivoque tempore quovis mense tri-dui semper hæmorrhoidum fluxum, præcuntibus illi doloribus colicis, expertus est. R. I. FORTIS (f) refert Regio cuidam consiliario

(a) Diff. cit. Cap. 6. p. 17.

(b) Miscell. med. Lib. 10. p. 529. sq.

(c) Histor. enarrat. med. histor. 12. p. 45.

(d) Vide §. 60.

(e) Vide §. 15.

(f) l. c. Cent. 2. Conf. 69. p. 257.

liario hunc fluxum nonnisi 3tio, aut 4to mense venisse cum levamine; induciis tamen subinde totius anni datis. Aliis (quod frequentissimum est) toto anno singulis mensibus fluxus hic revertitur. Sic apud T. BARTHO-
LINUM (a) „famulo . . . mercatoris Haf-
„nienſis ſingulis menſibus ordinato fluxu ſan-
„guis per inferiora expurgatur.“ Perinde
A. ZIMARA (b) „novit quemdam qui ſingulis
„menſibus ſanguinem hæmorrhoidalem patie-
„batur, & erat jam octuagenarius.“ Haud ſeci-
us E. HAGENDORNIO (c) „faber quidam mu-
„rarius ſexagenarius . . . retulit, ſibi ab anno
„ætatis 20mo. ad 60um. uſque ſingulis men-
„ſibus fluxiſſe hæmorrhoides . . . cum addi-
„to, ſe pariter inſtante fluxu hoc paria cum
„femellis experiri ſimptomata, imò diu-
„tius fluere volentes iisdem ſopiri, quibus
„mulierum menſtrua remediis. Qui ipſe per
„multos annos inde pallidus, macilentus,
difficulterque respirans tandem phthiſi obiit.“
Sic & I. JUNKERUS (d) meminit viri, plu-
res per annos die cujuſvis menſis præciſe
18vo. hæmorrhoides experti, non obſtante
impari in menſibus numero dierum. Novit
etiam

(a) Hiſtor. anat. rar. Cent. 5. hiſtor. 33.

(b) Apud. M. DONAT. de medic. hiſtor. mirab.
L. 4. C. 19. P. m. 231.

(c) Hiſt. med. phyſ. Cent. 2. hiſtor. 34.

(d) Compend. med. theor. præct. Tab. 11. p. 67. &
Diſſ. de Dyſent. Pannonica (4to. Halæ 1732.
Reſp. I. C. SEYFFERT) §. 7. p. 13.

etiam I. SCHULTZIUS (a) medicum ingeniosum, fuscum, capillis nigris, cui a 18vo anno hæmorrhoides quovis mense per aliquot dies fluebant cum euphoria; sin vero aut parcius, aut nullatenus aliquando fluxissent, male valebat. Et paulo post (b) „habitabat „(addit) . . . in horto meo . . . senex quidam octuagenario major, sed robustus & „salacissimus, ex corbium firpandorum officio victum quærens, qui a prima statim „juventute ad prædictam ætatem fluxum hæmorrhoidum patitur, & quidem quovis „mense cum maximis dorsi doloribus, & „ventris torminibus ordinarie, & uberrime „redeuntem. Apud ipsum socer ejus commoratur mendicando vitam sustentans nonagenario major, cui idem ab ipsa quoque „juventute hucusque menstruatim contingit.“ Apud H. SMETIUM (c) „litterato juveni ab „anno ætatis 22do hæmorrhoides singulis „mensibus, stasisque diebus jam per triennium fluebant.“ Perinde I. G. SOMMERI (d) „vir . . . temperamento sanguineo-melancholico anno ætatis suæ 20mo. . . primum passus est fluxum hæmorrhoidum, quem „natura ex eo tempore usque in præsens quolibet mense statim tempore repetiit, quamvis

(a) Misc. nat. Cur. dec. 1. ann. 4. Obs. 44.

(b) Ibidem obs. 69.

(c) L. c. p. 547.

(d) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 3. Obs. 108.

„vis hoc naturæ beneficio . . . nunc sexa-
 „genarius paulo partius fruatur . . . Quoties
 „hæmorrhoides tributum suum ratione quan-
 „titatis aut temporis moræ non rite persol-
 „vunt, toties actiones naturæ principes
 „hinc inde turbatæ labascunt, nimirum sub
 „hoc sanguinis *ὀξύασμῳ* calor quidam p. n. alvi
 „obstructio, cordis angustia, hypochondrio-
 „rum inflatio cum totius corporis & animi
 „languore oritur, quoties autem hic fluxus
 „restituitur, toties etiam disparent omnia
 „symptomata. Ceteroquin hos 40 annos . . .
 „in tolerabili sanitatis statu transegit. No-
 „minat etiam alium virum . . . qui eandem
 „cum ipso fortunam hoc in passu fuerit ex-
 „pertus, vegeta senectute felicem.“ Deni-
 „que I. M. MÜLLERUS (a) „cum uxoris cata-
 „menii (inquit) singulis 4. hebdomadibus, inci-
 „pientibus & desinentibus maritus civis hujus
 „loci eodem tempore aliquoties per octiduum
 „ante annum hæmorrhoidali laboravit fluxu.“
 Et C. F. PAULLINI (b) „primarius (ait) vir . . .
 „dixit . . . se toties, quoties conjux ejus
 „fluxum menstruum ordinarie habebat, pati
 „fluxum hæmorrhoidum, eadem quasi hora,
 „& die cum fluxu muliebri incipientem at non
 „desinentem. Menstruum perinde hæmorr-
 hoi-

(a) Ibidem. Cent. 10. Obs. 68.

(b) Ibidem. dec. 2. ann. 5. append. Nro. 1.
 Obs. 80. p. 52. & de nuce moschat. Sect. 2.
 Part 3. membr. 2, cap. 9. §. 5. p. 525.

„hoidum fluxum habuit mulier KOELICHENII
 „(a) puella BERDOTI, (b) propola AMATI,
 „(c) tum puer SCHLIERBACHII, (d) Eques
 PEZOLDI (e) ac faber I. L. HANNEMANNI,
 (f) qui instantem suum fluxum semper præ-
 sentiebat. In feminis quandoque fluxus hæ-
 morrhoidalis cum catameniis alternat. Sic
 I. DOLÆUS (g) „nos (inquit) in Principissa
 „Nassovica quadam juniore observamus flu-
 „xum menstruum novilunio fluentem una cum
 „fluxu hæmorrhoidum plenilunio fluente.,
 C. F. GARMANNO (h) „femina gracilioris
 „habitus, gibbosa ad 50um. vergens . . .
 „ante mortem . . . naravit, se quovis ple-
 „nilunio menstrua, novilunio autem hæmorr-
 „hoidali fluxu laborasse sine notabili virium de-
 „jectione; cumque mater fuerit multorum libe-
 „rorum, ingravidatione facta etiam cum men-
 „struis hæmorrhoides cessasse.“ Apud C. F.
 PAULLINI (i) „Uxor . . . militis, annorum 28.
 „intra novi — & plenilunium 3bus 4tuorve die-
 „bus fluxum habebat menstruum ordinarie, &
 latis

(a) Vide §. 90.

(b) Vide §. 53. III. B. Nro. 23

(c) Vide §. 115. Nro. 3.

(d) Vide §. 56.

(e) Vide §. 59. b)

(f) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 1. Obs. 70.

(g) Encyclop. med. L. 3. C. 10. §. 1.

(h) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 4. annalect.
 p. 299.

(i) De nuce Moschat I. c. §. 4.

„fatis copiose; intra plenilunium postea usque
 „ad novilunium continuo fere (omni puta
 „die) fluxere hæmorrhoides, & sic alterna-
 „tim ad 7um usque mensem viribus adhuc
 „robustis. Lapsa dein in Visurgim ex ter-
 „rore menses sensit suppressos; fluxu vero
 „hæmorrhoidum largiori sequente, qui tan-
 „dem sponte sua substitit.“ Meminit etiam
 I. STORCH (a) mulieris 30 annorum, cho-
 lerico-melancholicæ, patre hæmorrhoidario
 prognatæ, cui jam ab aliquot annis hæmorr-
 hoidum fluxus cum catameniis alternabat
 non sine junctis multis torminibus. Simi-
 lem quoque horum duorum fluxuum alterna-
 tionem in Ill. quadam femina obtinuisse re-
 fert ALBERTI, (b) & I. S. CARLII (c)
 matrona ad 40ta annos habens, languineo-
 cholerica, sensibilibior, laute vivens ac steri-
 lis, statis, certisque lunæ quadris larga ca-
 tamenia, & hæmorrhoides fluentes patieba-
 tur. Ad has periodice fluentes hæmorrhoi-
 des adjungi poterunt cæcæ etiam periodice
 reverti solitæ, quas VANDERMONDII (d) æger
 quovis mense perpetiebatur: haud secius L.
 HEISTERI (e) militi singulis mensibus enas-
 ceban-

(a) Observ. clin. ann. 2, April. d. 2. Nro. 4.
 p. 159.

(b) Diss. de hæmorrhoidib. juniorum. §. 4. p. 18.

(c) Acta nat. cur. Vol. 4. Obs. 83.

(d) Vide §. 96. d)

(e) Medic. chirurg. u. anatom. Warnehm. 2,
 Band, 5, Wahrnehmung.

cebantur in recto intestino hæmorrhoidalia tubercula, pisum magna, multis cum doloribus, at sine ullo sanguinis secuto profluvio.

CAPUT VII.

DIAGNOSIS.

§. L.

I. ABSOLUTA, quæ morbum hæmorrhoidalem præsentem detegit. Cum autem huius triplex esse soleat status, nimirum vel molimina ingruentis morbi, vel tumores varicosi citra fluxum i. e. cæcæ hæmorrhoides, vel denique fluxus ipse, clarum est, distinctam singulorum horum trium statuum notionem esse habendam.

A. Moliminum hæmorrhoidaliū diagnosis plurimum involvit difficultatis, quandoquidem nullum dum pathognomicum signum illorum tenemus; collatis tamen ad se mutuo omnibus, quæ hic occurrere solent, signis, non usque adeo difficile erit sagaci practico moliminum horum detegere præsentiam, quam in primis arguunt.

i. *Causæ prægressæ (a)* rite cognitæ, ac vel maxime temperies morbi huius capax hereditaria

(a) Vide §. 10, sqq. 19. sqq.

ditaria labes, atra bilis præsens, alvus segnis, ac laboriose egerenda, aloeticorum prægressus usus, & crebræ in juniore ætate narium hæmorrhagiæ, &c. His autem cohærere solent.

2. *Symptomata hæmorrhoidalibus motibus maxime solennia* (a) jam plura, jam pauciora, ut sunt, vertigo, dolores dorsi, lumborumve, aut coxarum, ani; tenesmi, &c. præprimis, si (quod probe notandum) nulla alia manifesta horum symptomatum causa sollicita indagine instituta reperiatur. Quod autem nonnulli hic pro pathognomico signo vel colorem icteroden, (b) vel vertiginem cum dolore capitis, lumborumve junctam haberi velint, etiam, atque etiam miror; siquidem utrumque hoc symptoma nec omni nec soli hæmorrhoidali morbo convenit, ut ex centenis hujusce operis historiis colligitur, & sua quisque in praxi est experturus.

3. *Reversiones, & exacerbationes moliminum hæmorrhoidalium vel maxime circa æquinoctia, ac solstitia, earumque prædictio per curationem anti-hæmorrhoidalem paulo ante adhibitam.*

B. *Cæcarum hæmorrhoidum* diagnosi multo est expeditior, in primis.

I. *Ex-*

(a) Vide §. 31. sqq.

(b) Vide §. 46.

1. *Externarum*, quoad situm ita dictarum, quas visus, tactusque continuo detegit.

2. *Internarum* autem, quæ intra anum delitescunt, præsentiam prodit vel digitus ano inditus, vel ani speculum applicatum, vel denique prolapsus intestini recti, sive spontaneus sive arte effectus: unde FORESTUS (a) „internæ (ait) latentes quidem oculis cerni non possunt, nisi descendente ano, aut immisso spelo. Quaquidem in re, antiquis placuit, ut sedes everteretur, inusitatum, nec ita tutum remedium nostris temporibus: neque magis tutum mihi videtur illud RHASIS consilium, qui . . . jubet apponere ventosam supra anum ut sic contemplari possent.“ Ist hæc autem artificia nonnisi vicinas ano varices detegunt; si autem interna vasa hæmorrhoidalia ab orificio ani paulisper remota ita affecta sint (quod tamen rarius contingere solet) ex dolore tum alias, tum si feces ad exitum pergant, ubi magis exquisitus redditur, deprehendi potest.“ Notante I. A. WEDLIO. (b)

C. Flu-

(a) L. c.

(b) Diff. de hæmorrhoidib. cæcis (4to. Jenæ 1732. Resp. 1. DIELERO) §. 22. p. 12.

C. *Fluxus hæmorrhoidalis* denique diagnosi non tam absoluta, utpote solo visu obtinenda, quam relativa potius, quam paulo post daturi sumus, est necessaria.

§. LI.

II. RELATIVA porro diagnosi est, quæ non modo varia morbi hæmorrhoidalis genera ab se invicem discernit, sed illum quoque ab aliis quibusvis analogis morbis dignosci docet.

A. *Generum hæmorrhoidalis morbi discrimen* in eo vel maxime versatur, ut primum hæmorrhoides internæ ab externis, dein tumentes a turgentibus, tum criticæ a symptomaticis rite dignoscantur.

I. *Externæ, internæ* ne sint hæmorrhoides (i. e. ad iliacane valæ, vel venam portæ referendæ,) sequentibus id indiciis obtineri posse nonnulli existimarunt.

a) *Sedes varicum, ac scaturigo fluxus.* Internæ enim intra anum, externæ vero extra eundem sitæ esse censentur: si ergo vel varices intra anum reperiantur, vel sanguis inde scaturire observetur, uterque hic status ad internas referri solet hæmorrhoides; & contra. Sed nihil huic ob-

servationi A. HÆN (a) deferri vult; nec abs re: namque „accuratissimum WINSLOW in „dissecandis cadaveribus secuti convincimur, „(inquit) facile inanitatis illius distinctionis, „qua ab externis hæmorrhoidalibus vasis tam „scrupulose interna sejungamus, & hinc varium scopum practicum veluti dirigere annitatur. Quippe & internæ arteriæ hæmorrhoidales ab hypogastricis ortæ, & externæ dictæ a mesenterica inferiore oriundæ ita usque ad recti finem pergunt, ut fluente in recti margine hæmorrhoidæ nemo affirmet, utrum ab hypogastricis sanguis profiliat, an a mesentericis ramis; præterquam quod præter omnia hæc vasa quæpiam arteria alia hæmorrhoidalis interna formetur a ramo illiaco natium dicto, quæ licet interna sit; tamen non recti modo finem, sed & musculos anipereptat.“ Videmus ergo, quam parum huic criterio tribuere liceat.

b) *Sanguinis indoles, & copia.* Inolita enim opinio fuit, sanguinem e vasis hæmorrhoidalibus internis (i. e. ex venæ portæ systemate) erumpentem crassum, piceumque esse; floridum contra, fluidumque, qui ab externis hæmorrhoidibus (i. e. e venæ cavæ systemate) eructatur. Porro cum interna vasa hæmorrhoidalia & capaciora sint, & integumen-

tis

(a) L. c. Cap. I. §. II. p. 7.

tis communibus non coerceantur, uti coercerentur externa, quæ multo etiam internis exiliora sunt, contendit ALBERTI (a) fluxum ex internis, & facilius accidere, & uberiori simul copia, ita ut immodicus hæmorrhoidum fluxus semper ad vasa interna hæmorrhoidalia sit referendus; quando quidem ab externis vasis nunquam copiosus oritur fluxus, nisi externa illum vis adhibita produxerit v. g. dum iis admodum tumentibus aut magnum ferro vulnus infertur, aut hirudines admotæ ac valide affixæ violente iterum avelluntur. Hinc canon foret: fluxum hæmorrhoidalem facile obortum, liberalem, sanguinis crassi, & nigri ad internas hæmorrhoides; difficulter autem succedentem, ac parcum sanguinis coccinei, ac fluidioris ad externas esse referendum. Verum neque hæc ita sibi semper constant, ut vel plerumque; ne dum semper, sic accidere dici possint, præsertim quantum ad colorem excreti sanguinis attinet: cum... constet, inquit J. C. FROMMANNUS (b), „sanguinem quocunque in loco, adeoque sive in porta, „sive in cava vena fuerit, diutius constrictum „floridam amittere faciem, nigrumque induere „habitum; & si sanguinis citra moram fiat e „porta ejaculatio, coloris gratia superare „posse

(a) Diff. de hæmorrhoidibus excedentibus. §. 7. 8.

Tract. de hæmorrhoidibus. P. 1. p. 189. 199.

(b) L. c. P. I. Probl. 42. p. 179.

„posse eum, qui in cava moram trahit.“ Pluribus etiam vulgarem illam opinionem HÆNIUS (a) est aggressus, nimirum cum inter utrasque tam arterias; quam venas hæmorrhoidales mirabiles intercedant anastomoses, ita ut fluente ex internis dictis vasis sanguine contingat necessario eodem tempore depletio vasorum externorum, ac vicissim; eveniet quidem, si cetera utrinque fuerint paria, ut uberior fiat depletio v. g. systematis venæ portæ quam venæ cavæ, si fluxus oriatur ex ultima propagine venæ mesentericæ, aut lienalis; eo quod impetus columnæ sanguinis directius gravitet in illum, qui est ad vasis aperturam; quam in sanguinem systematis hypogastrici lateraliter tantum cum systemate altero communicantis. At subinde contrarium etiam evenire variis de causis potest, videlicet: „esse in causa spissitudo atrabiliaris cruoris potest, ut lente is motus vix apertura transfluat, intereaque sanguis systematis hypogastrici natura fluidior, qua data porta, ruat: quam eandem ob rem atrabiliaris homo consuetæ evacuationis hæmorrhoidalis effectu penitus caret. Quin & sanguis ex propria arteria impetuosius ruens, venamque propriam subiens superare nonnunquam potest tardiores vim retrogradi sanguinis venosi præ spissitudine vix exstillantis

(a) L. c. §. 4. sqq.

„tis: Adeoque tunc arteriosus idem sanguis
 „ex apertura effluet vix venoso admistus.
 „Verbo quævis communicationes arteriarum,
 „venarumque utriusque hujus systematis effi-
 „cere possunt, ut nunc potius profiliat flo-
 „ridus, immediate fere ex arteria profluens
 „sanguis; alio tempore ex venis exeat pene
 „niger: & vice versa ex venis floridior; ex
 „arteriis obscurior, prout est major in uno;
 „quam altero in vase resistantia. Imo non-
 „nunquam fuit directe ex ipsis arteriis san-
 „guis hæmorrhoidalis.“ Atque sic ruit & al-
 terum criterion.

c) *Effectus* quoque fluxus hæmorrhoi-
 dalis docere prætenditur, ad quænam vasa
 sit referendus; namque si hypochondriacus,
 maniacus &c. hoc fluxu levetur, sanguis ex
 hæmorrhoidibus internis censetur fluxisse: sin
 debilitet, quin symptomata alleviet, ab ex-
 ternis vasis venisse arguitur. Contrarium au-
 tem obtinet in plethoricis, quos lædit flu-
 xus e systemate venæ portæ; levat vero e
 venæ cavæ systemate proveniens (a). Sed
 ex ante dictis HAENII argumentis ne isthæc
 quidem usque adeo certa sunt, ut non fallant.

2. *Tumentes* a turgentibus dolor atrox,
 & symptomata inflammationis conjuncta sa-
 tis

(a) Vide §. 5. a) Nro. 1. 2:

tis, superque discernunt, ut superius (a) dictum.

3. *Criticæ* a symptomaticis in eo præsertim sunt diversæ, ut supra (b) vidimus, quod morbo cuiquam supervenientes eum vel allevient, vel ex toto solvant; dum symptomaticæ eundem potius reddunt graviolem. Criticas autem fere hæmorrhoides præfagiunt, pollicenturque hæc:

- a) Temperies atrabiliaria (c)
- b) Morbi encephali, præprimis autem infania (d)
- c) Epidemiæ crisi hanc affectantis genius, ut alibi (e) vidimus,
- d) habitualis hæmorrhoidum fluxus suppressus, functiones lædens.
- e) Discussio vel moliminum hæmorrhoidalium vel tuberculorum nulla arte obtinenda.
- f) Hæ-

(a) Vide §. 6. B. Nro. 2. b) α . β .

(b) Vide §. 8. Nro. 2. a. b.

(c) H. BOERHAAV. institut. medic. §. 1235.

(d) Confer. §. 53. III. A. Nro. 2. a).

(e) Vide §. 32.

- f) Hæmorrhagiæ aliæ periculosiores (ut hæmoptoe, mictus cruentus, &c.) ex anomalis hæmorrhoidum motibus, aut fluxu haud succedente enatæ, nullis præfidiis aliis tollendæ.

B. *Morborum* autem hæmorrhoidibus affinium, a quibus illas discernere oportet, præcipui sunt.

- a) *Fluxus* rubri alii ex ano, scilicet

1. *Dysenteria* quam ab hæmorrhoidali fluxu distinguunt, notante P. FORESTO (a) vel maxime isthæc:

α. Tormina insignia dejectiones dysentericas nunquam non præcedunt, & comitantur, quæis placidus hæmorrhoidalis fluxus moderatus caret.

β. Sanguis feci alvinæ mistus est in Dysenteria; non item in hæmorrhoidali fluxu, in quo stercus plerumque figuratum, vel pul-taceum saltem egeritur, & sanguis vel ante, vel post stercoris egestionem excernitur, ita, ut idcirco superficiem tantummodo stercoris semper obsideat.

γ. Co-

(a) L. c.

γ. Cópia sanguinis hæmorrhoidalis est semper major; quam in egestionibus dysentericis, imo subinde immodica.

δ. Exstillat sanguis hæmorrhoidalis ex ano, quod in dysenteria non observatur. Unica tamen in hacce diagnosi emergit difficultas, dum fluxui hæmorrhoidum complicatur torminosa diarrhœa; tunc enim omnia fere dysentericæ symptomata adsunt, videlicet: sanguis alvinis fecibus liquidis permixtus, tormina, crebræ dejectiones, tenesmus, &c. In hujusmodi casu J. JUNCKERUS (a) isthoc statuit criterion: „si eliminationem sanguinis „dolorum alleviatio excipit, si denique, quo „plus sanguinis egeritur, eo majori commo- „do æger fruitur, tunc non dysentericum; „sed potius hæmorrhoidalem fluxum... con- „cludimus, in dysenterica enim dejectione si „sanguis purus, & quidem majori in quanti- „tate ejicitur, plerumque summæ imminent „angustiae, quæ brevi nonnunquam tempore „decumbentem cogunt, ut vitam cum morte „commutet.“ Reliquas differentias, quas insuper Auctor enumerat; nempe dysentericæ contagium, autumnale tempus, hæmorrhoidumque reversiones, tanti non esse, duo mox adducendi casus a G. E. STAHLIO observati, abunde docebunt; horum in uno (b)

„vir

(a) Diff. cit. l. c. p. 12.

(b) Diff. de dysenteria (4. Halæ 1706. Resp. I. H. HEILERSIEG) Cap. 3. p. 13. sqq.

„vir juvenis 30 annos non multum excedens,
 „fatis procerus, sanguinei, leviter cholericus
 „habitus, a longo tempore, orio & vino
 „Turingico fortiori plus, quam aliis rebus
 „indulgens, hæmorrhoides, ad quas hæredi-
 „taria dispositione ferebatur, jam aliquoties
 „expertus, nunquam tamen sine tali sympto-
 „matum syndrome, quæ dysentericiæ cruentæ
 „non modo suspicionem facere videretur;
 „sed plus semel etiam, primis præcipue vici-
 „bus, persuasionem; corripiebatur nempe lu-
 „bricitate alvi cum appetitus labefactione,
 „& mox prostratione neque tardiore virium
 „lapsu, torminibus autem repentino impe-
 „tu ferocientibus: emicabat non solum fre-
 „quens excernendi conatus, sed etiam ali-
 „qualis mucidæ imprimis talis substantiæ suc-
 „cessus; donec tandem etiam cruenta confi-
 „stentia succederet, sensim demum sinceriore
 „etiam sanguine subsequente. Tenesmus sub
 „toto hoc pathemate ingens urgebat, & per-
 „tinax. Breviter: nulla a vera dysenteria di-
 „versitas; quam quod sanguinis liberior suc-
 „cessus pathemata sensim mitigaret, ipse etiam
 „sincerior succederet, & inter omnia reliqua
 „pathemata mitescendo recedentia ipse ag-
 „men clauderet, & apparere postremus cessa-
 „ret. Placet affectum huius generis recense-
 „re etiam a medicis pro dysenteria habitum.
 „Vir juvenis 26. annorum, cholericus-melan-
 „cholicus habitus, plethoricus, Væ. Snibus.
 „semestribus assuetus, proximo vero autum-
 „no iis non usus Decembri mense frigida ad-
 „mo-

„modum tempestate toto pomeridiano tem-
 „pore in laboratorio spatioso, eoque ipso ad-
 „modum frigido inter aliquot numero diver-
 „sas operationes occupatus, quarum una erat
 „præparatio clyssi Oii ♀ sati, & fusiones re-
 „gulorum martialis, atque jovialis. Superi-
 „ore quidem corpore ad sudorem calebat;
 „cruribus autem, & pedibus percellebatur a
 „frigore pavimenti lapidei: rectissime interim
 „habebat, alacris totus, atque vegetus erat.
 „Cum clyssus ille in aliqua copia parandus
 „intra pauciores hasce horas absolvendus es-
 „set, vasorum juncturæ etiam laxæ, atque
 „dehiscentes multum vaporis efflarent, cu-
 „jus nauseabundo, fuliginoso nidore peculi-
 „are fastidium sentiret; absoluto circa horam
 „6. vespertinam toto laborum penso optime
 „adhuc habens, in conclave calidum rediens
 „corripitur paulo post insolitis sibi tormini-
 „bus alvi acutis, quæ mox in deijciendi co-
 „natum procedunt: dejicit etiam liquida non
 „aliter; ac si purgante usus fuisset. Rever-
 „titur ad cœnam, quam cum bono appetitu
 „assumit, recurrentibus interim subinde acri-
 „oribus quibusdam morsibus torminosis sta-
 „tim post cœnam, quæ vix $\frac{1}{2}$ horam excessit
 „rat, corripitur iterum dejectione non aliter;
 „quam a purgante assumpto, quantitate, &
 „qualitate expurgatoria. Increbescunt tor-
 „mina cum intercurrentibus 3tia & 4ta vice
 „liquidis ejusmodi dejectionibus. Ante 9nam
 „vespertinam persentiscit inde sensim insoli-
 „tam quandam fatigationem, cujus æque, at-
 „que

„que continuantium morsuum torminosorum
 „intuitu maturius cubitum ire suscipit. Cum
 „vero in cubiculo frigido dormiret, neque lec-
 „tum concalefacere cordi habuisset, simul at-
 „que in hunc ita frigidum recumbit, corri-
 „pitur statim fortissimo horore vere febrili,
 „mordentibus interim propemodum absque
 „cessatione acribus torminibus. Post $\frac{1}{2}$ vero
 „horam durantis ita jugiter horroris vomitu
 „corripitur, sed uno, et simpliciter eorum,
 „quæ in cœna assumserat, dejiciendi vero
 „conatus non ita multo post revertitur ita
 „importunus, ut etiam sub ipso horrore sur-
 „gendum esset. Cum tandem sensim cessaret
 „horror, atque frigus, succedit æstus, non
 „quidem fervidus, neque tamen exiguus.
 „Tormina sæpe recurrentia, & in dejectiones
 „non solum torminosas; sed etiam tenesmo-
 „des connitentia, non tantum pervigilem fa-
 „ciunt noctem, sed pluribus etiam fluxibus
 „laboriosam. Laboraverat patiens in pueri-
 „tia, & prima adolescentia tribus diversis
 „vicibus dysenteria vera, neque amiserat ejus
 „rei recordationem satis exquisitam. Judica-
 „bat tam e reliquo torminoso; quam inpri-
 „mis tenesmode sensu, quod excretio sine
 „dubio jam dum cruenta prodeat; quod ta-
 „men candela nondum satis dilucescebat, diei
 „vero subsequens lumen satis manifestabat.
 „Continuabat hæc dejectio cum febre conti-
 „nua, leniore tamen, ita in 8 dies, ea ta-
 „men sub differentia, ut & fluxus, & tormi-
 „na rarius potius; quam frequentius proce-
 „de-

„derent, non solum in singulos dies, sed
 „etiam omnino mox a primo die, seu potius
 „nocte illa ita misere anxia, & laboriosa.
 „Tandem cum adstringentibus manifestioribus
 „potius asperior semper; quam ullo modo
 „mitior evaderet, tam fluxus; quam præci-
 „pue dolor, & conatus, lenioribus obsecu-
 „tus est uterque. Differentia a dysenteria
 „reliqua præter modo dictam circumstantiam
 „decrementi mox a primo impetu magis, ma-
 „gisque sensibilis apparebat, etiam in eo,
 „quod nihil neque spumidum, neque ita ul-
 „cerosæ similitudinis compareret, ut in dysen-
 „teria ordinarie fit; contagiosæ vero disposi-
 „tionis ne vestigium quidem comparebat, aut
 „ulla iusta suspicio. Cathartico-hæmorrhoi-
 „dalem hanc fuisse excretionem non est dubi-
 „um; cathartici quidem a copiosæ per re-
 „spirationem hausto illo vapore fuliginoso
 „Clysti ☐ sati, quem nempe alias in liquorem
 „densatum notum est laxativæ imo catharticæ
 „efficaciæ esse (in primis si non æque cu-
 „vini, quam aquosiore menstruo excipiatur.)
 „Qualem autem, & quam penetrantem effica-
 „ciam habeant cathartica magis immediate in
 „massam humorum immissa, chirurgia infu-
 „soria docet.“ Similia etiam R. A. BEHRENS
 (a) observavit, & quidem quo tempore dy-
 sen-

(a) Annal. Vratisl. Tent. 24. A. 1723. Jun. d. 4.
 art. 13. p. 685.

fenteria epidemice est grassata. A. 1721. vir quidam placidissimo hæmorrhoidum fluxu cum diarrhœa laborans, seseque dysentericum esse feratus, Auctoris opera sine remediis convalevit. A. 1723. Majo mense consuluit eundem studiosus 18. annorum, patre hæmorrhoidario progenitus, semper vehementi tussi, cum palpitationibus cordis, ac symptomatibus hypochondriacis, quæ usu temperantium nitroforum, & balsamicorum lenita sensim, ex toto abierunt. Rediit mense Junio, referens se ab uberiori cerasorum esu, haustoque desuper lactis juscule incidisse in diarrhœam, quæ brevi in dysenteriam degeneraverit cum crebris, utut non assiduï torminibus, perpetuoque tenesmo; fecem esse liquidam, & sanguine remixtam; sub qua tamen affectione prioris morbi reliquiæ evanuerint, vigente etiamnum appetentia, viribusque secundum naturam. Ante aliquot annos gravi perinde dysenteria se laborasse. Pensatis autem hæreditaria dispositione, ac symptomatibus hypochondriacis a superveniente fluxu sublatis, viribusque & appetentia integris &c. fluxus pro hæmorrhoidali cum diarrhœa complicato habendus fuit. Data igitur dosi pilul. BECCHERI desinit diarrhœa pergente hæmorrhoidum fluxu aliquamdiu non sine ægri euphoria, qui demum etiam placidissime desinit. Atque ex hactenus quidem allatis casibus criterium ab JUNCKERO datum verissimum esse intelligitur; sed qua ratione illud ad H. SME-

III (a) observationem aptabis? „Homo sexa-
 „genarius, solitus aliquando hæmorrhoides
 „pati, ex longo itinere, victuque intempe-
 „ranti in diarrhœam incidit a Kal. Octobris
 „usque ad CHRISTI natalitia continuantem,
 „qua per remedium suppressa circa umbilicum
 „tormina, anique lancinationes cum excreti-
 „onibus raris secutæ sunt: quam ob rem ac-
 „cersiti Brema medici consilio usus dubia va-
 „letudine in quadragesimam usque se habuit.
 „Recruduit deinde diarrhœa, copiosamque
 „sanguinis excretionem attrahebat. Ad hoc
 „symptoma vocatus . . . Hannoverensium
 „medicus circa finem Martiiprehendit ex-
 „crementa alvi rotunda, dura, cruore since-
 „ro, multoque superjacente, scybalis autem
 „disruptis nihil cruenti intus admistum la-
 „tuisset; nonnunquam tamen liquidis fecibus
 „cruorem undiquaque exacte permistum; pati
 „ægrum in osse sacro ad anum usque, ac tau-
 „rum, imo per penis longitudinem usque ad
 „glandem, dolores vehementes, non conti-
 „nuos quidem, sed ad singulas defecationes,
 „quæ frequentissimæ erant, exacerbantes;
 „excrementa tamen fere pauca, rotunda, &
 „dura fuisse. Adhibitis tandem . . . reme-
 „diis diarrhœam, cruentamque excretionem
 „mitius habuisse, lancinationes interim circa
 „taurum, anum, & os sacrum nihilo remi-
 ssisse

„fisse: assiduam desidendi cupiditatem urgere,
 „ad cuius conatum excrementum sequi cum
 „modico, crassoque cruore. Nuper admodum
 „infuso clysmate post 40. & plura excreta
 „scybala, dolorem tamen permanfisse. Se-
 „quente inde excretionē liquidiorē cruciatum
 „multo; quam ante acerbiorē factum; pro-
 „pendisse autem ex ano quiddam; quod ex-
 „tractum lumbrici instar 18 pollicum longi-
 „tudinē æquabat, idque siccum, durumque,
 „sed in nodulo, quem ad finem habebat, ex-
 „crementum inclusum: manere nihilominus
 „cruciatu offis sacri, ani, penis sibi pror-
 „sus similes.“ Hacce in historia licet cruen-
 tæ, ac liquidæ egestionēs nihil attulerint le-
 vaminis contra JUNCCKERI criterion; reliqua
 tamen morbi adjuncta aperte docent, illum
 fuisse fluxum hæmorrhoidalem cum diarrhœa
 per vices recurrente complicatum.

2. *Hepaticus fluxus*¹ porro cum hodie
 unanimi sententia pro ipso hæmorrhoidali flu-
 xu habeatur, nisi quod humor excretus lo-
 turam carniū (i. e. sanguinem copioso se-
 ro dilutum) referat, qualis in duobus erat fra-
 tribus OVELGÜNNI (a) hæmorrhoidariis: satis
 liquet, nihil in isthac diagnosi esse, quod nos
 magnopere moretur. Haud secius

3. Fi-

(a) Vide §. 135.

3. *Fistulæ ani* in fluxu ab hæmorrhoidali dignoscendo haud aliis opus est indiciis; quam, quæ ex fistulæ ani doctrina petuntur.

4. *Ingesta* quoque fecem alvi cum compactam, tum liquidam interdum tingunt, sicque fluxum hæmorrhoidalem mentiri solent; sed cognita ingestorum indole, & absentibus ceteris hæmorrhoidum adjunctis error facile detegitur; cujusmodi rubella scybala ab assumpto sanguine hircino in juvene vidit H. DELIUS. (a)

b) *Lithiasis* etiam sæpenumero molimina hæmorrhoidalia mentiri consuevit, atque tunc diagnosi non semper est usque adeo expedita, præsertim ob insignem hæmorrhoidum cum calculoso morbo consensum, quem M. ALBERTI (b) erudita dissertatione edita descripsit; verum tamen calculorum, fabulive excretio, ac symptomata hic alia solennia, nec non prægressæ causæ, & eorum porro absentia, quæ ad hæmorrhoidalem morbum concurrere solent, lucem in diagnosi condenda accendent. Longe vero difficilior est diagnosi, ubi utrumque malum, non satis tamen sese prodens complicatur, ut in PEZOLDI

(a) Amœnit. med. dec. 3. Cas. 7. Nro. 1. p. 217.

(b) Diff. de consensu calculi cum hæmorrhoidib. externis.

ZOLDI futore adesse credebatur, ni medici sagacia adfuisset. Omnium vero longe difficilima est diagnosi calculos inter, qui in feminalibus vesiculis delitescunt, ac molimina hæmorrhoidalia; quippe quæ duo mala iisdem pene symptomatibus sese prodant. Memorabilem id genus observationem J. A. HEMMANN literis prodidit: vir 40 annorum genio semper indulgens, ac novissimo vel maxime tempore Qu frumenti abusus incidit sine ullis prægressis symptomatibus in mucosam quandam gonorrhœam ad omnia antivenerea rebellem, nec ullatenus sive sub mictu, sive sub erectione penis dolorificam: donec demum supervenere vehementes dorſi, & abdominis dolores cum tenesmo, ac dysuria, lotio maximam temporis partem guttatim tantum procedente. Colicus dolor subinde tam erat vehemens, ut omnia cultro perſcindi viderentur. Interdum tenesmus, & stranguria omni momento urgebant; alias anus, & vesicæ collum usque adeo constricta erant, ut nec alvûs, nec urina excerni possent; sed lotium ægerrime cathetere elici quiret, non sine summo cruciatu. Penis insuper assiduo erigebatur: gonorrhœa quandoque per hebdomadas etiam disparens iterum deinceps revertebatur; donec aliquot ante obitum hebdomadis rursus ex integro desisset. Cum Stilius & Catheter in vesicam inditi nullum detegerent calculum, affectio pro complicatis hæmorrhoidum symptomatibus & gonorrhœa pro mucosis vesicæ hæmorrhoidibus habeban-

tur. Frustra tamen fuere efficacissima quæque remedia; nihil opis tulere hirudines; plurimum vero; at brevi levamine, juvabant femicupia, & enemata mollia: ad atroces colicas mitigandas opio sæpius opus fuit. Assidui sic dolores cum pervigilio demum lentam febrim attulere, quæ morbum annuum morte finivit. In cadavere intestinum rectum & vesica nihil prorsus vitii exhibuere; sed vesiculæ seminales exiguæ, & contractæ erant apertæque visebantur massa alba, lapidea, rudi, crassoque sabulo simili refertæ, quo exempto aerem per cannulam inmissam nullatenus in urethram usque trans mittebant, idque ob excretorios ductus prorsus concretos (quod urethra dissecta docuit) nullis licet repertis prægressi ulceris vestigiis, præsertim cum prostatæ excretorii ductus; perinde circa verumontanum hiantes, pervii omnino reperirentur. Omnia itaque symptomata hæmorrhoidibus familiaria produxit vesicularum feminalium a massa contenta irritatio, nervis partium vicinarum communicata. Mucus ex urethra profluens ex ejusdem glandulis (aut potius forte prostatidis) ortum habuit ob consensum. Sed hujus prosapiæ casus diagnosing morbi hæmorrhoidalis implicantes tam rari sunt, ut nec Secularia quæque tempora eos afferant, & dum obveniunt etiam, non ita per omnia hæmorrhoidali morbo sunt similes, ut nec dubio cuiquam locum relinquerent; multa sane in postremo hoc casu & adferre

ab hæmorrhoidibus aliena, & adfuere iisdem solennia.

C. *Tumores alii ani, præsertim vero*

1. *Inflammatio*, quæ plerumque eadem cum hæmorrhoidibus furentibus producit symptomata adeo, ut ægerrime duo hi morbi discerni queant, & vero qua in re demum dixeris esse usque adeo diversos? Unde etiam SWIETENIUS (a) non multum hic de diagnosi laborandum esse agnoscit; siquidem utrique huic malo eadem adhibetur medela.

2. *Hæmorrhoides spuria*, ut condilomata, ficus, &c. a cœcis hæmorrhoidibus facile discernuntur, namque L. HEISTERO (b) notante „medici . . . hæmorrhoides cæcas „ . . . rectissime . . . per tactum, & colorem a ceteris ani tuberculis discernunt; namque hæmorrhoides cæcæ sanguine, eoque ut plurimum crasso hic stagnante livent; aut nigricant, depressoque digito vesiculæ liquore repletæ sensum aliquem præbent; quod aliter sese habere in veris tuberculis ac fungis, sive condylomatibus manifestum est.“ Utique cum ista tubercula duriora sint

(a) L. c.

(b) Institut. Chirurg. P- 2. S. 5. C. 167. §. 1. p. m. 1050.

sint pallida, vel rubella, nec satis dolentia, figuramque pressione digiti non mutant; hæmorrhoides vero cæcæ sacculi sint lividi, digitoque compressiles, nisi inflammatio, vel sanguis nimis coactus, crassæque tunicæ eos duriores ad tactum præstent. Probe tamen animadvertendum est, num non hæmorrhoides cæcæ mentiantur cristatas, aliave sarcomata, in quæ illæ aliquando abeunt; (a) quod præsertim noscitur, si præcesserunt lividæ varices, compressiles, quæ longo demum tempore in spuriarum habitum abierunt, ac majore inspiratione facta plus inflantur, plusque vel rubere, vel livere ita inflatæ observantur.

d) *Syphilis* denique etiam ab hæmorrhoidum symptomatibus rite est discernenda, cujus illæ tria vel maxime phænomena æmulentur.

1. *Sarcomata* ani, de quibus paulo ante actum est; porro.

2. *Bubones* inguinales, quorum etiam alias (b) jam injecta est mentio. Denique.

3. *Gonorrhæa*; dum mucosæ hæmorrhoides ex urethra procedunt, ejusmodi casum

(a) Vide §. 6. B. Nro. 1.

(b) Vide §. 47. c)

sum refert R. I. FORTIS (a) de antistite sanguineo - cholericum annum 46. agente, diu jam flatibus ructibusque, præsertim a pastu cum levamine erumpentibus obnoxio, ac paucis abhinc annis, ex quo cioccolatam 3tio. quoque die summere cœpit, ter sævissima tormina, ingentesque lævi hypochondrii dolores perpeffo, quos calor circa caput, faciemque, ac molestissimus earundem partium pruritus pronunciare solebat. In ani venis tantus tumor aderat, ut nisi fascia occursum fuisset, suo pondere laxatum sphincterem extra anum traheret, ac licet sub quavis fecum egestionem sanguinis etiam guttulæ deciderent, immani tamen interdum dolore loca hæc lancinabantur, ne sanguine quidem, haud parce tunc ex iis effluente, sedando. His quandoque tam importunus, accedebat circa pudenda pruritus, ut æger illa usque ad excoriationem scalpere sit coactus. Olim vero occasione laboriosi itineris gonorrhæa quædam oborta est; quæ postmodo sponte quidem iterum desiit, verum iterum sine manifesta causa rediit, ac sponte denuo substitit. Intra tres ultimos annos ter syncope ad $\frac{1}{2}$ horam æger correptus cum motibus epilepticis. Vexabat etiam subinde cephalalgia, & melancholia hypochondriaca. Ex his omnibus abunde liquet gonorrhæam illam bis sponte abortam, ac toties sponte iterum evani-

(a) L. c. 3 Tom. 3. Cent. 2. Consil. 86. p. 256.

evanidam hæmorrhoidalis, non veneræ fuisse indolis, & quod de hac; idem de sarcomatibus ani, ac inguinum bubonibus tenendum est, videlicet: singula hæc symptomata hæmorrhoidibusne, an syphilitidi debeantur, docebunt nos & causæ alterutrius hujus morbi prægressæ, & symptomata unius illorum præsentia, alterius absentia, nisi forte ambo hi morbi eodem tempore simul adfuerint: Verum & tunc juvantia nocentiaque, nec non sarcomatum, aut bubonum, aut gonorrhœæ diversus a syphilitica indole habitus nos a vero aberrare non facile patientur. Pulchre in hoc argumento versatus est I. G. BRENDLIUS. (a)

c) *Cancer*, intestini recti aliquando cum internis hæmorrhoidibus ulcerosis haud parum alit similitudinis facileque duo hæc mala a non satis in arte excultis confundi inter se possunt. Cum enim in cancro atrox dolor, ulcus scirrhosum, tumens, malignum, ichor foetidissimus, & hæmorrhagiæ subinde vix cohibendæ observentur, & hæmorrhoides internæ diu ulcerosæ quandoque non multum abludentibus stipentur symptomatibus: facile utique evenire potest, ut unum horum
pro

(a) De hæmorrhoidibus interceptis morbos venerendorum aphrodisiacos simulantibus (in opusculi medici argumenti P. 2. Diff. 4. p. 73. sqq.) 4to. Götting. 1744. Resp. G. C. WOLFFIO.

pro altero habeatur: id quod accidisse narrat DE LA METTRIE: (a) robustus ruricola multum sanguinis ano egressus. Chirugi se carcinomatolum in recto tumorem tetigisse afferentes hæmorrhagiam inde provenire concluderant. Factis ergo V. S. injectis vulnerariis, & stipticis enematibus deterisivis, datis sudoriferis, non neglecta ipsa $\nabla a \ddagger$, æger nihilominus intra paucos dies obiit. In cadavere pro tumore nil nisi vas hæmorrhoidale in anum paulo interiorius hians repertum est. Hæmorrhagia ergo stipticis facile cohiberi potuisset, si chirugi satis dexteritatis ad vas hæmorrhoidale hians detegendum possedissent.

CAPUT VIII.

PROGNOSIS.

§. LII.

DURATIO hujus morbi solet esse, si paucos quosdam demseris casus, perquam diuturna præprimis regularis hæmorrhoidum fluxus, quem GOETZII (a) sartor a prima pueritia ad provectam usque ætatem est perpeffus, ac molimina hæmorrhoidalia, quæ STORCHII (b) se-

(a) Observ. de Medecine pratique Nro. 11. p. 56.

(b) senem 20. annis affligerunt. Multo plures huc facientes casus passim per decursum hujus operis est reperire; Unde & HIPPOCRATES (c) hæmorrhoidas morbis chronicis accensuit.

§. LIII.

EFFECTUS autem ex hac ægritudine pululantes pro vario ejus statu sunt omnino multifarii, & quidem

1. *Moliminum hæmorrhoidalium*, nisi brevi vel discutiantur, vel oborto fluxu conquiescant, in tanta sæpe functionum læsione consistunt, ut non raro mortem accersant, vel vitam reddant morte ipsa graviorem, præsertim adhibita prava, per sanguinem exagitantia, nervosve laceffentia; medendi methodo. Interdum vero etiam tam rebellis est illarum status, nulla ut arte aut discuti citra fluxum, aut ad fluxum perducì queant, velut in arthritico ALBERTI (d) viro, atque in ejusdem (e) „juniori illustris „stemmatis femina a patre podagrico - nephritico genita, & matre hæmorrhoidaria nata, in qua juniori persona nunquam hæ-

,,morg-

(a) Vide §. 82.

(b) Vide §. III. a.

(c) De morbis Libr. 1. p. m. 447.

(d) Vide §. 114. Nro. 3.

(e) Diff. de hæmorrhoidib. junior. §. 7. p. 25.

„morrhoides ad eruptionem pervenerunt,
 „sed in tali molesto conatu excretorio sub-
 „stiterunt, & cum colicis, hysteriis, hypo-
 „chondriacis, arthriticis, rheumaticis, vo-
 „mibundis, cardialgicis, syncopiticis, &c.
 „afflictionibus alternarunt.“ Quam funestus
 autem diuturnorum id genus moliminum sit
 aliquando exitus, docet Casus ab I. G. ER-
 NESTI (a) descriptus. Vir sensibilibus ha-
 bitus, ad iram proclivis admodum, largis-
 que sudoribus nocturnis; proficuis tamen ob-
 noxiis, semel tantummodo hæmorrhoides
 nactus deinceps vero sola illarum molimina
 perpeti solitus, Februario mense 1724. ex
 perfrigeratione, vel animi perturbatione pre-
 henditur asthmate spasmodico. Pediluvia,
 frictiones, lotionesque thoracis Vcampho-
 rato, & Æs e spermate ceti, rad. pimpin.
 albæ, succino albo, Æio diaph. nitro. ac cin-
 nabar. Hung. levamen attulere, & cum alvus
 obstructa enematibus parum obediret, MRa.
 ex liqu. Væ. fol. Qri, ac pilulis STAHLII
 3. quaque hora ad gtt. 50 data malum pror-
 sus abegit. At Martio mense, cessantibus
 nocturnis illis sudoribus ingruit spasticus pe-
 dum dolor, & Asthma pristinum sæpius re-
 cursans, ad quod tollendum, sudoresque
 revo-

(a) Annal. Vratisl. Tent. 27. A. 1724. Febr. d.
 2. art. 3. §. 3. p. 157. & Mart. d. 2. art. 3.
 §. 5. p. 271. Tum. Tent. 28. A. 1724. April. d.
 2. art. 3. §. 6. p. 394.

revocandos data antispasmodico - diapnoica, ac temperantia, admoti facculi discutientes \mathcal{V} camphorato irrorati, enemata, & pediluvia, sectaque extra insultum in pede vena. Inde quidem asthma remittere visum, at sine constantia; sudor autem, data licet mane essentia alexiph. ex infuso theæ, nonnisi interdum isque parcissimus prolektus: æger calidos cibos, maxime carnes, averfatus, os assiduo viscida saliva refertum habens, omnique mane vomens, in dies magis lanquebat, vaga sese in manibus, pedibusque exserente intumescencia, & urina intense colorata sine ullo sedimento procedente. Data eccoprotica, abstersivo - temperantia, antispasmodica, diapnoica, &c incassum; imo tumor pedis dextri ad malleolos usque sæpius revertebatur, & cum matutina vomituritione jam non tam asthma exquisitum; quam dyspnæa superfuit cum debilitate, lotique imminutione; licet ad istud promovendum exhiberentur; \mathfrak{S} es antispasmodico - diuretici, & arcanum \square ri cum \mathcal{R} a \odot ii \square sata. Alvus plerumque obstructa non raro vel enemate, vel pilulis balsam. STAHL. movenda fuit. Cuncta hæc mala ira superveniens exasperavit. Cumque hirudines ano admoveri non sineret, toto ita mense degebat. Aprili mense ad priora mala accessit capitis, & sensuum obnubilatio, memoriæ lapsus, ac tumor lævi lateris, costis spuriis, dorsum versus, cum gravativo dolore, atque abdominis velut introtracti sensatione. Postmo-
do

lica hæmorrhoidalis; quippe quæ, vel sibi relicta, vel (quod pejus) calidis remediis la-cessita mortem post se trahere sæpenumero sit observata. Sic idem ERNESTI (a) meminit septuagenarii, cui id genus colica in enteritidem ac letalem gangrænam degeneravit. G. CLACII (b) aulicus senex, at robustus, sanusque nisi quod interdum colica hæmorrhoidali vexaretur, dum instante vere decoc- tum quoddam vinosum & ingredientibus san- guinem commoventibus præditum usurpasset, noctu a colica cum vehementi singultu exci- tur, injectum enema cum levamine non diu- turno; namque æger vix horam abhinc in- dormiens a pristino corripitur dolore, cum extensis hypochondriis, singultu, ac vomitibus. Acciti medici bilem (non hæmorrhoi- des) pro causa allegantes, dum singultum le- nibus anodynis, bilem vero absorbentibus & acidulis oppugnant, æger singultiens, & orthopnoicus crescente febre inflammato- ria exstinguitur, victurus, si ex consilio Auc- toris (quod alii rejecerunt) post acriusculum enema hirudines ano applicatæ interneque idonea ad spasmos, stasesque hæmorrhoida- les dissipandas exhibita fuissent. Haud secius
1. I. SCHLIERBACHII (c) vir 40 annorum me-

lan-

(a) Ibid., Tent. 30. A. 1724. Novembr. d. 2.
art. 3. §. 5. p. 486.

(b) Ibid. Tent. 29. A. 1724. Jul. d. 4. art. 13.
p. 99.

(c) Acta. nat. cur. Vol. 6. Obs. 60.

lancholico - sanguineus dorsi, stomachi, ventrisque doloribus hæmorrhoidalibus aliquamdiu detentus, dum eos variis calidis carminativis, sedativisque laceffit, incidit in asciten cum insigni, & in dies crescente superiorum contabelcentia. Tandem ingruit quidem largus hæmorrhoidum fluxus, hydropem aliquatenus minuere visus, at brevi post omnibus in pejus iterum versis homo demum supremum obiit diem. Apud F. HOFFMANNUM (a)

„quinquagenarius corpore spongiosus, & carnosus, ob assiduos muneris labores vitæ sedentariæ deditus ab aliquot jam annis anxiiis cardialgicis doloribus, & circa præcordia constrictionibus, noctu præsertim, subinde fuerat afflictus, alvique ordinario erat strictioris, flatulentiis, ac ructibus obnoxius; dolores quoque lumbarem sæpius obsidebant regionem, urina cum difficultate, & sæpe arenosa procedente. Hinc calculum subesse renalem judicarunt, & varia ad eum proposuerunt amici domestica remedia, inter quæ etiam fuit spiritus baccarum juniperi cum earum roob probe subactus, sacharoque edulcoratus. Ab horum vero usu potius ingravescebant symptomata, mox enim truculentis spasmis, & doloribus inflativis circa hypochondria, & abdomen torquebatur, cum partium extremarum frigore, & inquietudine, qui emollientes, & discutiendi facultate pollentes clysteres etiam eludebant.

Tan-

(a) Med, rat, syst, T, 4, P, 2, S. 1, C. 4. Obf. 5.

„Tandem accedente cum pulsum celeritate
 „internarum partium æstu mitescebant quidem
 „dolores; remansit tamen inflatum abdomen,
 „quod nec tactum manus tolerare poterat ob
 „dolorem. Appetentia cum viribus, persi-
 „stente per 4. septimanas affectu, concide-
 „bant. Celebris tum medicus vocatus cau-
 „sam horum symptomatum hepatis iudicans
 „obstructionem pilulas BECCHER & ♀ii dul-
 „cis aliquot doses præbuit; sed his omnibus
 „irritis præter omnem expectationem alvi
 „fluxus, sine torminibus tamen, foetidæ, cor-
 „ruptæ, & ex atro griscæ materiæ erumpebat,
 „quem animi intercurrents defectio cum ex-
 „trema virium-jactura, tandemque mors ex-
 „cipiebat.“ Duo alia colicæ hæmorrhoida-
 lis calidis exasperatæ exempla, quorum in
 uno mors consecuta est, idem hic Auctor (a)
 commemorat, & apud I. STORCHIIUM (b)
 quinquagenarius sopitam jam id genus colicam
 comesto juscule vinoso resuscitavit, & ex en-
 teritide deinde periit. Discat ex his tiro, quam
 caute cum colicis, aliisque moliminibus hæ-
 morrhoidalibus mercandum sit.

II. *Cæcarum hæmorrhoidum*, ni discus-
 tiantur, vel ad fluxum perducantur, effec-
 tus perinde sunt morbosæ, ac pro varia sede,
 & intensitate illarum, etiam varii, quos in-
 ter præsertim eminent.

2.

(a) Consult. & resp. medic. Cent. 2. Cas. 14. 27.

(b) Obs. clin. ann. 5. Jul. d. 4. p. 174.

2. *Coitus dolorificus* in feminis, quæ varices hæmorrhoidales in vaginam protuberant, velut in ALIXII (a) muliere, & cuius meminit W. COCKBURN (b), cui in quovis coitu intolerabilem dolorem passæ post incassum varia binis a medicis adversus uteri cancerum usurpata accitus Auctor, cum nihil in utero vitii per obstetricem detexisset, hæmorrhoides internas esse ratus, quæ dolorem a vagina, immisso viri pene distenta, varicibusque huc illuc distractis causarent, hæmorrhoidum curam adhibuit eo cum successu, ut simul, ac semel a morbo liberata, virum sine querela deinceps admiserit.

2. *Impotentia motus* præ atrocitate doloris in hæmorrhoidibus furentibus, ut in GOHLII (c) juvene, & HEISTERI (d) quadragenario.

3. *Regurgitatio sanguinis* aliorum. Hanc variæ causæ producunt, inprimis major sanguinis affluentis copia; quam ut omnis ab hæmorrhoidalibus recti valis capi possit, vel animi pathemata v. g. ira, terror, vel styp-
tica

(a) Vide §. 115. Nro. 2.

(b) Medic. Versuche u. Bemerk. von Edinburgh.
2. B. Nro. 27. p. 395.

(c) Vide §. 47. c)

(d) Vide §. 131. Nro. 7.

tica in usum ducta, &c. Hinc fit, ut sanguis hæmorrhoidalis aliorum compulsus vasa ibi distendendo functiones lædat. Nunquam satis tironibus inculcari potest sanguinis hæmorrhoidalis ad hujusmodi regurgitationem singularis proclivitas, cujus numerosa exempla passim inter symptomata reperire est, ac plura etiam paulo inferius (a) occurrent.

4. *Abortus* a furentibus hæmorrhoidibus ex facili evenit, idque partim a regurgitatione sanguinis in uteri vasa, dum uberius ad rectum affluens non omnis ab ejus vasibus recipi potest, partim a febre acuta inflammatoria, tunc morbum stipante, gravidis nunquam non periculosa. Multis hac de re differuit M. ALBERTI. (b)

5. *Ruptura vasorum*, hæmorrhoidali sanguine ultra modum infarctorum. Apud G. BAGLIVUM (c) vir melancholico-hypochondriacus ex sævissimis plurium mensium doloribus circa lumbum dextrum, post omnia remedia irrita, repente decessit. In cadavere circiter ℥vj sanguinis nigri, foetidi, partim concreti; partim extravasati circa lumbares musculos

(a) Vide §. 55.

(b) Dissertat. de hæmorrhoidib. gravidar. & puerperar. §. 6. p. 23.

(c) De fibra motrice specim. L. I. C. 6. p. m. 304.

los, & inter illorum interstitia repertæ sunt. Contra vero (a) caustidicus 50 annorum, intemperans, & calculosus, cum oris fœtore, veluti vitriolico, nares adstantium manifeste feriente, ab eodem plane dolore jam biennium ex intervallis cruciante, ac plurima eludente remedia, imo crescente, oborto tandem hæmorrhoidali fluxu sanguinis nigri vitriolici fœtidissimi ad aliquot libras sub idoneorum remediorum usu convaleuit. In priori ergo ægro cum fluxus succedere nequireret, vasa magis, magisque a sanguine influente distenta demum crepuere. Verum „si huic „ægro . . . post dolores supervenisset sanguinis fluxus per alvum, forsitan sanatus esset“ inquit BAGLIVUS; quamquam ne id quidem semper prospere eveniat; id quod F. HOFFMANNI (b) observatione edocemur: „novimus (refert ille) primipilum . . . Gallum, „qui liberalius utens vino adstringente Francico, quod Pontak vocant, subsistente consueto hæmorrhoidum fluxu, in atrocem dolorem dorsi, & cruciatus infra umbilicum incidit cum febre lenta, purpuracea etiam; „largo sudore, & alvi tam firma constipatione, ut clystere injecto nihil redderet; sed „tormenta potius augescerent. Secta fuit ve-

O 2

„na

(a) Ibidem p. m. 303.

(b) Med. rat. syst. T. 3. S. 1. C. 7. §. 33. Opp. Tom. 1. p. m. 327. sq.

„na, propinata nitrosa, oleosa demulcentia,
 „mannata, aliaque plura: demum simul, &
 „semel aliquot mensuras sanguinis fœtidi, &
 „grumosi per anum ejecit, ipseque lipothymia
 „correptus diem obiit. Neque alia hujus af-
 „fectus, & eventus fuit causa, quam quod
 „farta nimium, & distenta coli, ac recti va-
 „sa dolorem, & rupta funestum profluvium
 „intullerint.“

6. *Prolapsus ani* de quo HIPPOCRATES
 (a) „sedes autem procidit (ait) viris quidem,
 „quibus ora venarum sanguinem fundunt (hæ-
 „morrhoidas vocant), & alvi fluxus corripit;
 „pueris quoque calculosis, & in diuturnis,
 „ac sinceris intestinorum difficultatibus, seni-
 „bus vero, quibus mucosæ quædam concre-
 „tiones affixæ sunt.“ Ratio hujus rei non
 est abstrusa. Plerumque ab internarum hæ-
 morrhoidum varicibus accidit hic prolapsus;
 sanguis enim ad vasa interna hæmorrhoidalia
 uberius affluens ea distendendo cellulosa,
 qua intima recti tunica cum vasculosa cohæ-
 ret, reddit laxiorem, sicque intimæ recti tu-
 nicæ cum vasculosa nexum labefactat: quo
 facto intima tunica rugosa laxius jam cum
 vasculosa cohærens facile ano extruditur,
 præsertim sub vehementi, & assiduo tenesmo.
 Atque hic ani prolapsus sub quavis alvina
 ege-

(a) Prædiction. Lib. 2, p. 106.

egestione accidit BIERLINGII (a) personæ, duobus LEDRANII (b) ægris, tum viro FÜRSTENAUII (c), GERBEZIO (d) ipsi, GOULARDI (e) theologo, MORGAGNI (f) feminæ, OVELGÜNII (g) fratribus, RIVERII (h) insulano, & VLADISLAO IV. Poloniæ Regi, nimium a multis jam annis hæmorrhoidum hæreditate acceptarum fluxum perpeffo, teste A. CNOEFFELIO. (i)

7. *Abscessus fistula ani*, si in furentibus hæmorrhoidibus inflammatio nulla arte benigne sese resolvi sivit, aut diutius neglecta fuit, aut perperam etiam tractata est. Sic J. W. BAUMERI (k) „vir 36. annorum mentis „pathematibus deditus, polyphagus, hydro- „pota, corpus æquitatione multum exercens, „plures annos hæmorrhoidibus largiter laborabat, in ceteris recte valens. His, nescio „qua causa, subito suppressis hæmorrhoidum „cæca-

(a) Vide §. 19. d)

(b) Vide §. 117. β.

(c) Vide §. 53. II. Nro. 7.

(d) Vide histor. 5.

(e) Vide §. 117. β.

(f) Vide §. 126. a) α.

(g) Vide §. 135.

(h) Vide §. 126. b) δ.

(i) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 6. append. p. 1. sqq.

(k) Act. Hassiæ, Vol. 1. Nro. 28. §. 21. sqq. p. 187.

„cæcarum inflammatarum, febre symptomatica
 „stipatarum, adeo vehemente insultu corri-
 „piebatur, ut tumor inflammatorius durissi-
 „mus non solum perinæum occuparet; sed ad
 „scrotum, atque nates sese etiam extenderet.
 „Ex hoc in principio neglecto apostema in
 „perinæo natum, atque postea multo labore
 „iterum curatum fuit.“ LKÜTHNERI (a) quo-
 que seni furentes hæmorrhoides insignem at-
 tulerunt abscessum, & J. H. FÜRSTENAU (b)
 „vir generosus (narrat) 50. annorum tempe-
 „ramenti cholericæ-melancholici, cujus diu-
 „turnam valetudinem sub hæmorrhoidum ve-
 „sicæ elogio alibi delineavi, thermis Aquis
 „granensibus anno superiore interne & exter-
 „ne methodice usurpatis notabile quoad di-
 „ra, quibuscum hætenus conflictatus est,
 „symptomata: dysuriam nempe, tenesmum,
 „mictum cruentum, levamen expertus est, ita
 „tamen; ut nisus quidam spasmodicus vesi-
 „cam versus in ipso pastu & assumpto vix uno,
 „alteroque cochleari, aut cyatho primo vini
 „aut cerevisiæ, calido; an frigido perinde est,
 „vix deglutito aliquamdiu notatus, nondum
 „prorsus remitteret. Circa æquinoctium au-
 „tumnale anni proxime elapsi V. Sem. hæte-
 „nus in pede administratam in brachio cele-
 „brari curavit. Mensibus Februario & Mar-
 „tio

(a) Vide §. 96. e)

(b) Act. nat. cur. Vol. 6, Obs. 4.

„tio anni præteriti hæmorrhoides, quarum
 „hactenus nonnisi molimina, cæcas quippe,
 „albasque, pluries expertus est, nunc primum
 „apertas, & per plusculos dies ex ordine flu-
 „entes cum insigni symptomatum fere omnium,
 „nondum plane cessantium, sed subinde repul-
 „lantium levamine vidit. Circa æquinoctium
 „vernum Væ. Sem. iterum in brachio admisit,
 „& mensibus Aprili, Majo, Junioque medio-
 „criter degit, medicamentorum certe usu im-
 „pune caruit. Mense Julio autem incommo-
 „da quædam in abdomine, & intestino recto
 „persentiscens clysterem domesticum, ex aqua,
 „lacte, furfuribusque triticeis, addito pauco
 „sale, & raparum oleo, admisit; sed chirur-
 „gus in applicatione ejus obstaculum quod-
 „dam offendens vix $\frac{1}{2}$ clysmatis partem inje-
 „cit, qua brevi iterum excreta notabilis simul
 „sanguinis sinceri copia profusa fuit. Repe-
 „titus postridie clysteris usus non parum equi-
 „dem materiæ fœculentæ, & saniosæ eduxit;
 „sed tertio iterum die applicatus aliquamdiu
 „intus substitit, & horripilationem ægroto in-
 „duxit, cum æstu, anxietate præcordiali al-
 „ternantem. Adfuit simul perpetuus ad vo-
 „mendum, egerendumque conatus, quin &
 „alvus, præter voluntatem contenta, acce-
 „dente, vel levissimo stimulo reddidit, & in
 „natibus perpetuus mador, facta brevi post
 „oculari inspectione, una cum rubore inflam-
 „matorio, & vesiculis sero acri plenis, iti-
 „demque madidis observabatur, quarum una
 „facta, mediante specillo, exploratione in
 „ulcus

„ulcus satis profundum, & sinuosum termi-
 „nata est, merumque fistulæ ani fecit; quia
 „tamen repetito, eoque sollicite instituto
 „examine, manu stiloque chirurgi facto, &
 „nulla cum intestino recto connexionem reper-
 „ta, ipsoque ulcere ad consolidationem pro-
 „perante, brevi evanuit. Intestinum vero
 „rectum digito chirurgi tactum haud exiguam
 „quantitatem materiæ purulentæ profudit;
 „quin & concrementa carnea, & membrana-
 „cea in notabili copia, cum & sine fecibus
 „alvinis prodierunt. Cumque omnia in vado
 „esse viderentur, prolapsus ani usque per-
 „severans, & hæmorrhoides cœcæ in orificio
 „ani paulisper inverso, denso agmine propul-
 „santes, inflammatae, hinc exulceratae, a
 „dysuria denuo molesta, multum in meden-
 „do negotii facessiverunt; quæ tamen om-
 „nia lege artis, & topicis magis blandis ex
 „unq. de linar. addito saccharo, ℥i. &
 „camphoræ momento, itemque ol. ovor.
 „mel. rosar. injectionibus ex decoct. scord.
 „millefol. c. elix. p. p. &c. quàm acriori-
 „bus, quæ urgebat chirurgus, v. g. unq.
 „ægypt. fusco FEL. w. & non sine noxa vix
 „tentatis, tractata, & ut par est, mundifica-
 „ta pristinam sanitatem ægro brevi promit-
 „tere videntur, febre præsertim lenta, siti
 „ciborum fastidio, vigiliis, aliisque sympto-
 „matibus hætenus molestis, convenientium
 „usu remediorum fere in totum sublatis.“

Perin-

Perinde C. F. KALTSCHMIEDII (a) vir 44 annorum, cholericus, gracilisque corripitur dolore ani intra 24 horas atroci facto cum levi quidem; at dolorifico tumore, pulsu celeri, duroque; æstu intenso, ac pertinaci alvi obstructione. Post varia domestica quadriduo adhibita erupit per urethram puris $\frac{11}{16}\beta$: unde dolor imminutus quidem; sed per vices ac singulis fere quadrantibus horæ exacerbabatur dolorifico ad mictum nisu, quo præter puris aliquot guttas, parum lotii excernebatur. Porro sub assiduo tenesmo interdum aliquot guttæ sanguinis egerebantur. Ex his liquet, inflammationem recti vesicæ etiam fuisse communicatam, collectumque inde pus in vesicam e vomica rupta devenisse. Fistulas porro ani ex hæmorrhoidibus natas præter eas, quas BIERLINGIUS, (b) HÜNNERWOLFFIUS (c) ac RIEDLINUS (d) dederunt, insuper etiam, apud CHESNAU, (e) CUMMENUM, (f) A. FACKHIUM (g) GOHLIUM

(a) Diff. sistens casum de hæmorrhoidibus cæcis in ulcus vesicæ urinariæ mutatis. 4to. Jenæ 1757. Resp. G. C. HERRMANN.

(b) Vide §. 26. b) β .

(c) Vide §. 117. β .

(d) Vide. sequ. III. A. Nro. 2. 1)

(e) Obs. med. L. 3. C. 11. Obs. 1. p. m. 345.

(f) Mis. nat. cur. dec. 1. ann. 3. Obs. 181.

(g) Ibid. cent. 5. Obs. 79.

UM, (a) HEISTERUM (b) HILDANUM (c) HOFFMANNUM, (d) HOYERUM (e) JOERDENS (f) KALTSCHMIEDIUM, (g) LENTILIUM, (h) STORCHIUM, (i) RONCALLIUM. (k) I. LUZARCHE, (l) innumerosque alios reperire est.

8. *Gangræna sphacelus*, quæ ex vehementi inflammatione, vel neglecta, vel perperam tractata, vel nullis idoneis remediis aut resolvenda, aut saltem ad suppurationem producenda oriri solent. Expertus id fuit I. B. LAMZWEERDII apud I. SCULTETUM (c) Anglus, qui diutino hæmorrhoidum dolore emaciatus demum a muliercularum remediis feбри correptus est cum ani inflammatione in gangrænam sphincteris abeunte; hac tamen percurata sphincter maxima sui parte absumtus ita denuo regenerabatur, ut æger abhinc
ite-

(a) L. c. dec. 1. vol. 4. sect. 6. p. 102.

(b) Med. chirurg. und anat. Wahrnehm. 2. B. Nro. 422.

(c) Obs. & curat. med. chir. Cent. 2. Obs. 75.

(d) Conf. & Resp. med. Cent. 2. Cas. 23.

(e) Act. nat. cur. vol. 3. obs. 17.

(f) Ibid. Vol. 7. Obs. 106.

(g) Diff. cit.

(h) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 5. append. p. 126.

(i) Prax. casual. med. Tom. 1. cl. 4. p. 177.

(k) Histor. morbor. 46. p. 214.

(l) VANDERM. Journ. de medec. T. 1. p. m. 374.

(p) L. c. append. 1. Obs. 49. p. m. 629.

iterum sanorum more alvum egefferit. Idem etiam accidit compluribus ægris apud I. A. BRAMBILLA. (a) UDI ZACUTI (b) BLEGNYII (c) viduæ ac HENNINGII (d) mulieri. Sæpius, quam crederetur, talia eveniunt, dum medici ad hæmorrhoides furentes, autopsia neglecta, quid pro quo præscribunt, id quod F. AB. AQUAPENDENTE (e) narrat „accidisse „cuidam medico non obscuri nominis, qui „curans ægrotantem febre, cœperunt hæmorrhoides dolere, medicus autem oleo rosaceo „inungi iussit, neque locum affectum unquam „perspexit. Tandem post aliquot dies medicus me duxit ad ægrotantem, ego autem „statim locum affectum . . . conspiciens inveniri ex omni parte multo antea ipsum fuisse gangræna affectum . . . & nonnihil in superficie sphacelo, quem servavi statim feramentis candentibus.“ Tristior isto fuit eventus in D. TURNERI (f) sene diu hæmorrhoidario, qui dum aliquando solito majorem pateretur

mo-

(a) Abhandl. von der Phlegmone 2. Band. 6.

Cap. 2. 3. 4. Beobacht. p. m. 144. 158. 171.

(b) Vide §. 120. Nro. 3.

(c) Vide §. 131. Nro. 1.

(d) Vide §. 68.

(e) De chirurg. operat. p. 116.

(f) Abhandl. von den Krankheiten der Haut.

2. Theil. 7. Cap. p. 539. sqq.

molestiam a magna copia putridi ichoris ex affectis locis exsudantis, indusiumque, ac braccas conspurcantis, cum fœtore totum hypocaustum implente Auctorem accersit. Is inter diductas nates reperit condylomata complura, alia insignia, & communis cum cutē coloris; alia ex fusco livida, ac velut studio compressa, calore nativo orba, unum paulo inferius prorsus gangrænosum, ichorē illum putridissimum eructans. Pulsus erat perquam debilis, facies pallida, sudor frigidus, mente non satis sibi constante. Cum vero alius etiam accitus negasset vel gangrænam vel discrimen adesse, Auctor præfagio facto ægrum in alterum diem non supervicturum, quod etiam exitus probaverat, abiit. Interdum gangræna interiora etiam corripit, & I. LIEUTAUD (a) „pro comperto habemus (inquit) „anatomica autopsia edocti hæmorrhoidum „vel externarum phlogosim, & gangrænam „in intestina, mesenterium, aliave abdominis „viscera sæpissime propagari.“ Sic JOUBERTUS in vita RONDELETTI apud T. BONETUM (b) refert, uxorem ejus obiisse intra paucos dies ex hæmorrhoidum inflammatione, quam maritum celare voluit. A morte dum affecta sedes lustratur, extrema miseræi pars gangrænosa est inventa.

9. Occal-

(a) Synops. univ. prax. med. P. 1. L. 2. S. 3. p. m. 393.

(b) Sepulcr. L. 3. S. 15. Obs. 2.

9. *Occallescentia* tuberculorum diuturnorum, de qua LUDWIG (a) „persistunt . . . „sæpius in iis (ait) qui hæmorrhoidalibus insultibus affecti sunt, tubercula callosa, quæ „sine dolore sunt, nec excretionem alvinam „adeo turbant, interdum tamen, dum aliqua „sanguinis abundantia vel dyscrasia has par- „tes urget, & irritat, dolorosa fiunt.“ Atque tunc hæmorrhoides vere spurias, cristatas vel alias mentiuntur, velut in DELII (b) ac DIETERICHSH (c) ægris. IMOM. ETTMÜLLERUS (d) refert e SANCHEZ (e) in muliere ex hæmorrhoidibus cæcis diuturnis mortua intestini recti terminum 6 digitorum longitudine ad anum usque repertum fuisse induratum, & scirrhosum.

III. *Fluxus hæmorrhoidalis* demum effectus boni sunt alias; alias pravi

A. *Boni*, dum is regularis est; ac moderatus, nec nisi aut plethoram, aut cacochymiam tollens: quo fit, ut per illum causæ morborum, vel imminantium, vel præsentium e corpore eliminantur. Hinc etiam

I, HOL-

(a) L. c. p. 400.

(b) Vide §. 55. Nro. 9. h)

(c) Vide histor. I.

(d) L. c. p. 144.

(e) Observ. p. 377.

I. HOLLERIUS (a) „hæmorrhoides (inquit) „universum corpus vacuant aliquando caco- „chymia, aliquando puro sanguine, quippe „sola quantitate peccat.“ Id ipsum A. HÆN (b) fateri coactus est dicens: „hæmorrhoides „duas potissimum tollunt plurimorum morbo- „rum causas, quam alteram plethoram vocant, „alteram cacochymiam.“ Hæc autem ut plurimum atrabilis esse consuevit, de qua HIPPOCRATES (c) „in profluvio (ait,) quod „fit per ora venarum in ano sanguinem fun- „dere solita (Græci hæmorrhoidas dicunt) „velut quiddam atræ bilis affine effluit.“ i. „e. quod non est vel mera, vel matura atra- „bilis, sed vel bono sanguini permista, vel nondum omnes nata atræ bilis dotes; quam tamen semper salubriter per anum excerni observavit dicens: (d) sanguis supra „quidem „qualiscumque fuerit emissus, malus; infra „autem, si niger dejiatur, bonus.“ Dum itaque fluxus hæmorrhoidalis accumulata vel plethoram, vel cacochymiam semper e corpore per intervalla evehit, non potest non esse salubris cum prophylactice; tum therapeutice.

I. Pro-

(a) De morbis intern. Cap. 55.

(b) L. c. Cap. 3. §. 1.

(c) Epidem. L. 6. S. 5. Nro. 24. p. m. 1185.

(d) Sect. 4. Aphor. 25.

1. *Prophylactice*, dum cacochymiam aut plethoram prius tollit; quam functiones lædere queant, sicque constantem tuendo sanitatem ad longævitatē viam sternit. Disertis id verbis asserit HIPPOCRATES (a) „qui „sanguinem per ora venarum, quæ in ano „sunt, profundere solent, neque morbo laterali, neque pulmonis inflammatione, neque ulcere exedente (phagadænam dicunt,) „neque furunculis corripuntur, neque tuberculis, quæ a cicerum similitudine terminthi „dicuntur, ac fortassis ne lepra quidem, forteque neque aliis id genus. Intempestive tamen curati multi brevi huiusmodi morbis „correpti sunt, eamque ob causam perniciose habuerunt.“ Et F. HILDANUS (b) „ego „(inquit) sincere adscribere possum, experientia me comprobasse, eos rarissime apoplexia, epilepsia aut vertigine, & oculorum „inflammationibus correptos fuisse, quibus „hæmorrhoides fluebant.“ Sane G. E. STAHLII (c) vir ob hæmorrhoidum fluxum sanus multos in annos vixit; quamvis non undique caruerit morborum causa. Hinc etiam P. FORESTUS (d) patri suo 50um. agentium annorum robusto, morbum ab incunte ætate vix passio, præter

(a) Epidem. L. 6. S. 3. Nro. 28. & de humo-
rib. p. m. 51.

(b) L. c. Cent. 6. Obs. 28.

(c) Vide §. 99.

(d) L. c. Obs. 3.

ter ani dolorem olim sola cassia sumta abactum,
 nunc vero fluxum hæmorrhoidum nacto longæ
 spem fecit sanitatis; qui etiam nonnisi
 58vo. anno quartanam cito curabilem passus, ab-
 hinc vero hæmorrhoidibus subinde, ac mo-
 derate fluentibus semper sanus mansit, donec
 senex demum obiisset. M. ALBERTI (a) me-
 minit „senis hæmorrhoidarii, qui 90. annos
 „attigit professione Chimici, qui orbem adhuc
 „pererrabat, in dies 1. milliare, aut 1 $\frac{1}{2}$ am-
 „bulando absolverat, animo & corpore ro-
 „luerabili gaudebat, appetitus, & somnus in
 „eodem erant vegeti; cum hanc urbem (Ha-
 „lam) transmigraret, incidit in febrem tertia-
 „nam exquisitè typicam, & legitimam, a qua
 „post 4um. paroxysmum liberabatur. Sed
 „cum superata hac febre debilitatus domum
 „egredi intenderat, cecidit super lapideum pa-
 „vimentum & scrotum ad prominentem lapidem
 „acutiorem allisit. Corripiebatur inde inflam-
 „matione genitalium, a qua post aliquot dies
 „restitutus, iter aliorsum direxit, & quem ad
 „explorandas vires senis (Auctor) per inte-
 „grum milliare comitatus fuerat, quod per
 „6 horas superavit, & postea necesse habuit,
 „quo requie aliquali ad continuandum iter
 „habilis reddatur. Et hic senex singularis
 „longævutatis, de se professus fuerat, quod
 „singulis annis semel & verno quidem tem-
 „pore

(a) Diff. de hæmorrhoidibus longævutatis causa
 §. 4. Tract. de hæmorrhoidib. P. 1. p. 120.

„pore sufficienter hæmorrhoidalem fluxum
 „expertus fuerit, & insolita sanitate fruatur.“
 Hæc de fluxu hæmorrhoidum prophylactice
 salubri; verum haud minus salubris est.

2. *Therapeutice*, dum tollendo vel
 cacochymiam, vel plethoram simul earum
 effectus, sive morbos præsentēs ex illis natos
 tollit. Sic LUDWIG (a) „ex omnibus (in-
 „quit) profecto exemplis, quæ ad mutatio-
 „nes morborum semper attentus observavi,
 „unum inveni virum, qui ab initiis virilis
 „ætatis usque ad summam senectutem inter va-
 „rias diætæ neglectæ causas, morbosque inde
 „perpeßos, tamen hæmorrhoidibus crebrius,
 „& copiose fluentibus sublevatus, & in vehe-
 „mentissimis sæpe morborum insultibus recte
 „restitutus est.“ Inter numerosas autem ægri-
 tudines, quas fluxus hæmorrhoidalis solvit,
 vel maxime notari merentur.

a) *Insania*; nam teste HIPPOCRATE (a)
 „insanientibus si varices, aut sanguinis pro-
 „fluvium, per ora venarum, quæ in ano sunt
 „(hæmorrhoides dicuntur) accesserint; insanix
 „solutio. Porro (b) atra bile vexatis, &
 „phrenitide detentis sanguinis profluvium
 „per ora venarum, quæ in ano sunt, bonum
 „est.“

(a) L. c. p. 412.

(b) Sect. 6. Aphor. 21.

(c) De Judicationib. p. m. 55.

„est.“ Et LUDWIG (a) salubritatis hujus fluxus “ ipse aliquoties in spasmis vesicæ, in „melancholia, & præcipue mania evidentissima exempla cognovit. Perinde nec mihi, inquit F. HOFFMANNUS (b) ignota sunt „exempla, ubi nonnulli gravi melancholia hypochondriaca in juventute affecti in pro- „vectiore ætate hæmorrhoidum fluxu accedente immunes manserunt.“ Hujus quoque loci est, quod refert. I. S. CARLUS (c): vir 50 annorum temperamenti melancholici post toleratas aliquamdiu pressiones ac dolores abdominis, flatulentias, & molimina hæmorrhoidum, brevi incidit in melancholicas anxietates, animi, mentisque perturbationem, qua sibi mortis pœnam imminere imaginabatur. Crescente deliro metu lecto se proripiens ædium superiora petit, satellitibus, a quibus se ad supplicium ductum iri delirabat, fuga se subdukturus. Interea sub his turbis hæmorrhoids turgens crepat, ac sanguinem eructat: quo factò æger mentis compos ocyus redditus ad locum, unde profugit, est rever-

(a) L. c. p. 405.

(b) Med. rat. syst. T. 4. P. 4. C. 8. thes. pathol. §. 33.

(c) Med. und moral. Einleitung in die Naturordnung, oder medicin. Bedenken, 3te Samml. Nro. 3. p. 305.

reversus. Idem quoque delirii eventus fuit in ægro BANGII. (d)

b) *Coma apoplexia.* De posteriore HIPPOCRATES (b) „in fideratis (ait) succedentes hæmorrhoides utiles ; refrigerationes vero, & torpores malum denunciant.“ In gravissimo autem comate insignis hæmorrhoidum fluxus F. HOFFMANNI (c) viduæ præsentissimam attulit opem.

c) *Oculorum morbi.* I. STORCH (d) vidit ab sola varice hæmorrhoidali citra fluxum enata magnati cuidam molestas oculorum defluxiones fuisse mitigatas, quam proinde, cum nec doloris, nec molis esset singularis, ut patienter ferret, est admonitus, ac toto etiam anno, poto præsertim deinceps Liebsteinenfi fonte, ab ulterioribus invasionibus mansit immunis.

d) *Spirationis difficultas.* I. STORCH (e) refert, senem 70. annis majorem reverso fluxu hæmorrhoidali ab anxietate vires admodum pessumdante fuisse liberatum.

e. *Phthi-*

(a) Vide §. 117. β.

(b) Coacor. Nro. 478.

(c) Vide §. 119. Nro. 5.

(d) Prax. casual. med. T. 1. cl. p. 214.

(e) Ibidem. T. 2. d. 4. p. 353.

e) *Phthisis*, de qua ita HIPPOCRATES (a): „sputorum retentiones in tabescentibus mentem ad delira verba commovent; in his sanguinis profluvium per ora venarum in ano sanguinem fundere solita existere posse spes est.“ At non in suppressis modo, verum rite etiam procedentibus phthysicorum sputis salubriter quandoque hæmorrhoides fluere docuit experientia. Sic apud J. RHODIUM (b) „Baro quidam diuturno tempore destillationi falsæ obnoxius tabem verebatur . . . Huic autem hæmorrhoidibus biennium fluentibus omnis causa metus fuit sublata, imo emendatus corporis humor noxius.“ J. C. STUNZER (c) curandum habuit virum, cui sputa purulenta cum tussi continua parum spei reliquere, nihil aut cortice Peruviano, aut pectoralibus medicamentis proficientibus: donec revocatus pilulis hæmorrhoidum fluxus morbum sustulit, æger inde convaluit, carnes recuperavit, ac secundo matrimonio lætus vixit.

f) *Hypochondriaca passio* cum materia, veteribus atram bilem vocantibus, de qua GALENUS (d) „atram bilem (ait) hæmorrhoids plerumque incipientem prohibuisse, & jam
„effec-

(a) Coacor. Nro. 437.

(b) Obs. med. Cent. 2. Obs. 9.

(c) L. c. p. 56.

(d) In epidem. L. 6. comment. 6. Nro. 8.

„effectam removisse, nec non & duratum lie-
 „nem sanavisse conspecta est.“ Et alibi (a):
 „morbum sane melancholiam vocatum per
 „hæmorrhoides levare evidenter constat, mul-
 „tosque clausis illis insanivisse animadverti-
 „mus; quosdam vero non solum semel, aut
 „bis; sed etiam ter, quater, simul; atque
 „hæmorrhoids suppressa sit, in melancholiam
 „incidisse; nonnullos vero & singulis annis
 „hoc vitio tentari solitos, nisi aut per venas
 „hasce præsidium prius senserint; aut atra
 „bile medicamento purgata malum antever-
 „terint. Nempe istorum hominum plurimis
 „ater sanguis per hæmorrhoida profunditur,
 „attamen non omnibus.“ Hinc etiam D.
 SENNERTUS (b) hypochondriacam passionem
 hæmorrhoidum fluxu felicissime curari testa-
 tur, & „si (quis) in eos, qui ex hæmorr-
 „hoidibus commodum percipiunt, inquirat,
 „omnes fere (ait) hypochondriacos esse ani-
 „madvertet.“ Idcirco & M. ALBERTI (c) hæ-
 morrhoides medicinam hypochondriacorum
 nominavit.

g) *Nephralgia*; nam „melancholicis af-
 „fectibus, & renum vitiis succedentes hæ-
 „morr-

(a) Ibidem comment. 5. Nro. 25.

(b) Disp. de hypochondriaca affectione. §. 132.
 137. opp. pr. L. P. 5. Sect. adj.

(c) Diss. de hæmorrhoidib. medicina. hypochon-
 driacor. Tract. de hæmorrhoidib. P. 1. p. 374.

„morrhoides . . . bono sunt“ notante HIPPOCRATE (a) ; quem locum J. HOLLERIUS commentario illustrans „vidimus (inquit) „quemdam, qui intolerabili cruciatu renum „affligebatur, is nulla phlebotomia, nulla purgatione, nullis remediis topicis potuit levare, nisi hæmorrhoides aperta.“ Unus idemque, opinor, æger est, cujus inferius (b) etiam recurret mentio.

h) *Icterus*. Oppido rarum hanc in rem casum refert G. W. WEDELIUS (c) de textore 30. annorum icterico, qui oborto hæmorrhoidum fluxu, prius sibi insolito, ab ictero est liberatus, simulque post hunc morbum aliquo abhinc tempore nactus est facultatem semen in coitu ejaculandi, quod nunquam antea toto quinquenii matrimonio præstare poterat: unde & filiam progeniit. Fluxusne hæmorrhoidum quidquam ad id contulit?

i) *Hydrops*. Novimus, inquit J. L. CHOMEL (d) „mulierem ita ascite laborantem, ut ad paracenthesin multoties celebran-

(a) Sect. 6. aphor. 11.

(b) Acta Hafniens. Vol. 2. Obs. 44. p. 138.

(c) Vide §. 117. β.

(d) HALLER disp. med. pract. T. 4. Nro. 116. ergo tumidis hæmorrhoidib. hirudines. Præf. J. F. C. MORANDO. §. 5. p. 122.

„brandam coacta confugere , curaretur ad
 „tempus , non sanaretur. Ecce autem artem
 „docente natura , curamque suscipiente larga
 „derepente advenit hæmorrhoidum vacuatio,
 „ægramque liberavit ad annos.“

k) *Cutanei morbi.* „Vir quidam maxi-
 me doctus calidi ex calido jecore tempera-
 „menti , & hinc hypochondriaco malo quo-
 „que obnoxius . . . coloris rubri in vultu
 „gutta rosacea conspicuo , remissionem mox
 „sensit , postquam per biduum hæmorrhoidum
 „senferat fluxum , quo ipso primum perterri-
 „tus meum requisivit consilium , cui , ut hoc
 „hæmorrhoidum beneficium diæta , & medici-
 „na in posterum promovere non desisteret ,
 „suasor fui.“ inquit J. C. FROMMANNUS (a),
 & A. C. LORRY (b) vidit ægrum ab herpete
 esthiomene summe pruriente mox , ut fluxus
 hæmorrhoidum ingruit , liberatum.

l) *Articularis dolor* , ut podagra , ischi-
 as , arthritis , &c. Hæc enim vero mala ut
 plurimum nil sunt aliud ; quam hæmorrhoi-
 dum anomalix (c) , quemadmodum hæmorr-
 hoidales colicæ , cardialgiæ &c. , ut proinde
 haud male etiam arthritides , podagræ &c.
 hæ-

(a) L. c. P. 2. Probl. 41. p. 452.

(b) Von der Melancholie. 2. Th. 3. Cap. p. 371.

(c) Vide §. 33. c)

hæmorrhoidales vocari possent, quas fluxus hæmorrhoidum obortus solvere consuevit, præsertim cum id genus articulares dolores interdum in colicos mutantur, priusquam fluxus hæmorrhoidum accidat, cujusmodi exemplum dat V. RIEDLINUS (a) de viro 50 annis majore, cui aliquoties arthritidem perpesso post vitæ genus in minus felix mutatum arthritidis desit; at pristinos ad labores reverso ejus in locum colici dolores recurfabant, subinde vix ferendi. Hos cathartico cedentes fluxus hæmorrhoidum secutus, qui sensim in fistulam ani degeneravit cum dolore fere continuo, & ad pænem usque excurrente, ac purulentorum egestione perquam tenesmode. Cum nihil extra anum cerneretur, digito in anum indito complura tangebantur tubercula dolorifica. Nihil abhinc proficientibus variis remediis, fœtoreque ani usque adeo incremente, ut ab nemine jam ferri posset, æger demum interiit. Articulatorum autem dolorum superveniente fluxu hæmorrhoidali sublatorum exempla multiplicia in historia ischiadis, podagræ, arthritidisque videri possunt; hic aliqua tantum delibabimus. Vidit STUNZER (b) dolentissimam ischiadem, ad omnia contumacem remedia, desisse tandem, postquam æger brevi itinere flu-

(a) Curar. medic. millenar. Obs. 24.

(b) L. c. p. 56.

fluxum sibi hæmorrhoidum causasset. Perinde F. HOFFMANNI (a) vir cholero sanguineus, iræ, vinoque deditus a plurium mensium ischiade gravissima, nullis sudoriferis, catharticis, lignorum decoctis, ☿, opioque fuganda, oborto demum post usum aquarum Hornhusanarum sale, nitroque refertarum, fluxu hæmorrhoidali convaluit. Porro P. FORESTUS (b) „Hollandiæ Præses (ait) cum articulari dolore affligeretur, apparentibus consuetis hæmorrhoidibus, iisque fluentibus, statim prædixi, eum ab omni dolore articulari liberatum iri, neque me fefellit hæc sententia.“ J. C. TRUMPHIO (c) curandus obtigit mense Decembri quinquagenarius vir vitæ sedentariæ, ac potibus spirituosus deditus, qui post 3. hebdomadam arthritidem fixam evasit melancholicus cum anorexia, ac pervigilio, assiduisque doloribus. Circa hepar itidem dolor cum alvo adstricta; & præcordiorum anxietate; noctuque calor, ac sitis insignis, urina intense rubente. Dati primum ℞es antispasmodico-absorbentes, ac ℞a ♂is helleborata cum anima rhei, & liquore ∇æ fol. ♀ri: unde alvus obedientior

(a) Diff. de salubritate flux. hæmorrhoid. §. II. opp. suppl. 2. Part. 2. p. 114.

(b) L. c. Obs. 4.

(c) Commenc. Nor. T. 9, A. 1739. hebdom. 4^a Nro. 2, p. 315, sq.

tior, melancholia nil cedente. Cumque aliquando insultus apoplecticus supervenisset, Væ. Sem. in pede, non multo ante factam, imperavit Auctor, dein catharticum ægro familiare, a quo ter simul vomuit, concessit. Abhinc molestia circa hepar minuebatur, appetentia etiam aliquatenus renata; sed tussis sensim cum corporis macie ingravescens metum iniecit. Interea grumi sanguinis ex hæmorrhoidibus ani subinde egerebantur, doloresque articulorum mitescebant. Idcirco ad crisin isthanc promovendam, aliasque implendas indicationes dabatur ☿ ex ☿ diaph. ☿ li, cinnab. nativa, croco ☿ aperit., ☿ ro ☿ lato, corall. rubr., lapid. 69, C. C. philos., ☉ depurato, ☿ re pector. balsam. WÆDELII; porro *Ra* ☿ helleborata cum anima rhei, liqu. *Væ* fol. ☿ ri, *Qu* ☉ anisat., essent. lignor. & absinth. compos. ol. fœniculi. Imperatum etiam infusum aquosum e rad. glycyrrh., althææ, sarsapar., simphit., chinæ, aristol. rotundæ, ligno sassafras, herbis chamædr., trifol. fibr., cerefolii, hederæ terr., fl: bellidis, chamom. Romanæ, rasura C. C. jujubis, sebesten, passulis minoribus. Quibus ita convaluit, ut nil morbi superfuerit.

„Pertinet huc quoque notabilis historia a . . .
 „STAHLIO mihi, inquit F. HOFFMANNUS (a),
 „communicata: nimirum vir 44. annorum ha-
 „bitus corporis sanguineo-melancholici, diæ-
 „tæ vinosæ, quondam Hungaricis, nuper
 „etiam

(a) L. c. Diff. cit. §. II. p. 114.

„etiam Austriacis vinis largius usus, Væ. Ses.
 „consuetas aliquamdiu negligens, oblati in-
 „terim occasionibus frequentioribus iracun-
 „diæ; corripitur autumnò 1664. coxendi-
 „cum, hinc genuum, hinc pedum, manuum-
 „que doloribus mox incrementibus, & noc-
 „tes, diesque torquentibus per 3. 4. septi-
 „manas, verno primo tempore deinde &
 „proximo autumnò, modo hyeme humidio-
 „re, & languidiore. Cura diligentis medici
 „practici docti, & periti referantur denique
 „hæmorrhoides, quibus per vices, licet non
 „statas, fluere continuantibus omnium dolo-
 „rum podagricorum expers vixit ad annum
 „usque 76. suæ ætatis.“ Alium huicce simil-
 „limum (ni forte idem sit) casum narrat ipse
 STAHLIUS (a): „vir honestissimus cum media
 „sua ætate ischiade, gonagra, chiragra, po-
 „dagra graviter correptus, & in 4. annum 8
 „ad minimum vehementibus insultibus gravi-
 „ter exercitus fuisset; supervenientibus tan-
 „dem & posthac adsuescentibus per hæmorr-
 „hoides ordinatis ventilationibus a 48vo æta-
 „tis anno ad 78vi finem sine ullo amplius
 „arthritico symptomate dolorifico vixit.“ Cui
 merito jungitur gemina observatio podagræ
 per hirudines, & illas tandem secutam men-
 struam hæmorrhoidum exonerationem in po-
 sterum sublata historia a MOUFFETO (b). Hæc
 om-

(a) Diss. de rheumatismo. 4to Halæ 1707. Resp.
 G. MÜLLER §. 73. p. 39.

(b) Theatr. insector. L. 2. c. 41.

omnia eo magis esse vera patet, quod cohibitus hæmorrhoidalis fluxus, dictos dolores revocet. Sic referente STAHLIO (a) „juvenis 27. annorum phlegmatico - sanguinei habitus ex potu vinorum Thuringicorum spirituosorum sub vita multum sedentaria arthritidem incurrit admodum vehementem. Cum variis modis, & methodis nihilo minus subinde recrudesceret, tandem emanfit, coortis tandem circa annum ætatis 30um hæmorrhoidibus largis imo fere continuis. Cum patiens vitæ genus insigniter mutasset, & alio quoque familiam transportasset, quin etiam fluxus nimius apparens, medicationem patienti persuasisset, substituerunt hæmorrhoides. Paucissimo post tempore dextræ coxæ, & femoris, & dolorem, & insignem rigorem incurrit patiens. Nescio quibus autem remediis tractatus in magnam angustiam, & abdominis inflationem, mox etiam in mictum cruentum incidit, quo per adstringentia tractato pedum oedema, & asciticam ventris intumescenciam expertus est. Tandem revocata evacuatione hæmorrhoidali non sine vacillantis valetudinis incommodo annum adhuc vixit.“ Ex his ergo colligitur non male MOLLERUM (b) fuisse opinatum

(a) Diff. de incurabilib. affectib. (4. Halæ 1705. Resp. c. MEISNER) §. 46. p. 25. sq.

(b) Annal. Vratisl. Tent. 6. A. 1718. Novembr. d. 4. Art. 6. §. 2. p. 1873.

opinatum, articulares morbos ibi esse raro-
 res, ubi fluxus hæmorrhoidalis esset vulga-
 tior: „dum hocce autumno (1718) Tokaini
 „morarer (ait), observavi ibi, & in locis cir-
 „cumvicinis hæmorrhoides præsertim inter-
 „nas incolis esse familiariores; quam nostris
 „Neosolii, idque ob causam vini spirituosio-
 „ris, alii, & ceparum, quæis pene quotidie
 „vescuntur. Hæreditarias etiam in juniori-
 „bus hæmorrhoides observavi, toto anno af-
 „fligentes. Atque hæc hæmorrhoidum fre-
 „quentia in causa esse videtur, quod arthriti-
 „des ibi per quam raræ sint, utut vino ge-
 „neroso nobiles pro potu ordinario utantur,
 „aliæque illarum causæ vulgares non desint.
 „Singularem novi casum Jll. viri sanguineo-
 „cholerici circa 43um ætatis annum podagram
 „naçti, quæ annis 1685 - 6. vehementer illum
 „torfit; immoderato autem cum elixirii prop.
 „PARAC: tum vini Tokaini usu anno 1687,
 „procuratus fluxus hæmorrhoidum, ubi ordi-
 „nate continuasset, podagram abegit, homo-
 „que hodieum & a podagra, & ab aliis mor-
 „bis immunis vivit, hæmorrhoidibus fere
 „quovis mense fluentibus. Alius quoque ca-
 „sus non minus memorabilis hæmorrhoidum
 „nimiarum succurrit: Belli-Dux Cæsareus 70.
 „annorum sanguineo - cholericus a 15 annis
 „quotidiano hæmorrhoidum fluxu laborans,
 „iis tamen viribus pollet, ut ad 68 usque an-
 „num bello serviverit. Sæpius is circa æqui-
 „noctia insultus arthriticos, at aliquot tan-
 „tum horarum, experitur, quorum etiam ex-
 „pers

„pers esse posset, modo non quotidie in potu
 „excederet, vinoque Tokaino abstineret.
 „Quovis mane primum aquam frigidam hau-
 „rit, post $\frac{1}{4}$ horæ sumit vasculum chocoladæ,
 „a qua post $\frac{1}{4}$ horæ alvum reddit, postquam
 „notabilis sanguinis fluidi quantitas, sæpe
 „ $\frac{1}{2}$ ij. iij, dejicitur, & abhinc plerumque in-
 „gruit palpitatio cordis, & interdum etiam
 „levis lipothimia. His post $\frac{1}{4}$ horæ denuo
 „cessantibus reliquo diei tempore sanissimus
 „est.“ Posterior casus congruit cum LUDWIGII (a) observatione: „in arthritide habituali
 „hunc fluxum (inquit ille) interdum cum le-
 „vamine accedentem vidi, sed non perpetuo:
 „quando enim nimius fuit, sæpe imbecilli-
 „tatem induxit, ut arthritici insultus vagi
 „magis torquerent, nec veram dissipationem
 „materiæ arthriticæ molirentur.“ Hæc de bo-
 nis hæmorrhoidum fluentium effectibus. At
 sæpe numero etiam sunt.

B. *Mali* varia ratione, si nempe ex

1. *Nimio fluxu* nascentur

a) *Cachexiæ* præsertim hydrops, hæctica
 febris, &c. AETIUS (b) de fluentibus hæmorr-
 hoidibus agens „hæc affectio (inquit) malo-
 „rum

(a) L. c. p. 408.

(b) Serm. 14. Cap. 5.

„rum plurimorum causa hominibus existit,
 „nam & deformitatem, & miseram vitam hæ-
 „morrhoides inducunt, multos vero etiam
 „vita privant: & deformitatem quidem prop-
 „ter coloris totius corporis vitiationem ex
 „evacuatione succedentem; miseram vero vi-
 „tam propter corporis debilitatem: quando-
 „que autem & de vita periclitantur sic affecti,
 „cum ob excedentem evacuationem perfrige-
 „ratum hepar aquam inter cutem operatur.“
 & GALENUS (a) „ex diuturnis (ait) hæmorr-
 „hoidibus, vel suppressis, vel immodica pro-
 „fusione hominem ad extremam frigiditatem
 „ducentibus non semel aut bis; sed sæpe jam
 „aquam inter cutem collectam vidi.“ Cujus
 rudimenta jam in facie, pedibusque inde præ-
 seferibat POMMEI (b) atrabiliaris; imo
 asciten quoque ex immodico hoc fluxu com-
 plures nacti sunt, letalem HOFFMANNI (c)
 æger; sanabilem WEBERI (d) homo. Vidit
 & hydropem M. ALBERTI (e) „in viro hæ-
 „morrhoidario vilioris conditionis, cujus pa-
 „ter erat hypochondriaco - hæmorrhoidarius,
 „qui, cum aliquoties non modo largas; sed
 „et

(a) De facultat. natural. L. 2, Cap. 8.

(b) Vide §. 133. b)

(c) Vide §. 19. b)

(d) Vide §. 93.

(e) Diff. de hæmorrhoidib. excedentib. §. 13.
 Tract. cit. p. 196. sq.

„et superfluas hæmorrhoides expertus esset,
 „tandem ob concursum mali regiminis, & per-
 „versæ diætæ in tympanitidem, & denique
 „hydropem incidit, in quo denuo largum
 „hæmorrhoidalem fluxum subiit, cum multis
 „irregularibus symptomatibus conjunctum;
 „qui vero ut præposterus, & importunus pri-
 „orem affectum magis deterioravit; quam
 „sublevavit.“ Singulare autem hydrocardiæ
 ex nimio hoc fluxu natæ exemplum narrat
 ROBIN apud ROUX (a): juvenis ecclesiastes
 post magnas narium in pueritia hæmorrhagi-
 as, usu demum ꝑis nicotianæ profligatas,
 nactus est fluxum hæmorrhoidum ordinatum
 non sine secunda valetudine. Tandem ante
 7. vel 8. annos, quo die sacerdos consecra-
 tus est, variolis corripitur, sub quarum de-
 cursu haud videtur idoneum servasse regimen:
 hinc & pœnas luit. Namque moderatus hac-
 tenus, ordinatusque hæmorrhoidum fluxus
 evasit inordinatus, & immodicus, qui, ubi
 intra aliquot menses attulisset languorem, de-
 bilitatem, faciei inflationem, & oedema pe-
 dum cum anxietate; ab Auctore idoneis re-
 mediis, præsertim ꝑilibus ad moderamen de-
 nuo reductus est, ordinemque periodicum,
 spiratione facta per acclivia etiam loca libe-
 riore, reversoque sano faciei colore, labio-
 rum

(a) Journ. de Medec. T. 32. p. 44. sqq. Jan.
 1770.

rum rubore, atque oculorum vigore: verbo æger eo usque jam convaluit, ut cuncta sua munia sine molestia obiret, idque tamdiu, donec biennio post curio factus. Tum vero vel ob mutatum cœlum, vel officii negotia vel avulsionem a fratre, vel forte ob variolosi miasmatis reliquias, cœpit hæmorrhoidum fluxus rursus & uberior fieri, & inordinatus, donec sequens illum error nimium effecisset. Januario 1768. rigido in frigore, nivibus ad 18. & amplius pollices lapsis, iter milliaris contexit, via ab nemine adhuc tentata; abhinc vero in dies pejus habens 25ta Februar. 1769. obiit. Symptomata mortem prægressa fuere delirium obcurre, facies pallida e virore flavescens, & inflata, sapor oris perquam amarus, lingua muco flavo obsessa, vomituritio, febricula vix observanda, cum pulsu celeri, & contracto, tantæque pectoris anxietas, ut extra lectum esse nequiret, imo ultimo triduo ne latus quidem mutare valeret; siquidem lævum in latus decubitus præsentissimum subitæ suffocationis periculum intentabat. Sputa exscreabat prorsus viridia. In hepatis regione tumor quidam durus, at non scirrhus, nec dolens tangebatur. Lotium sæpe, ubertimque reddebat, jam aquæ instar limpidum, jam aurantii coloris. A morte in thorace primum aperto non parum quidem aquæ inventum; quin tamen hydrops dici mereretur. Pulmones erant flaccidi, exigui, coloris grisei, vel potius luridi albi, ex quibus cultro

compunctis paucillum sanguinis pallidissimi lintea velut lotura carnis tingentis erupit; lobus lævus costis erat accretus, forte a pleuritide in infantia. Pericardium autem viscebatur admodum tensum, tactuique magnopere renitens, quod apertum, omne ocyus thoracis cavum aqua fontanæ simili inundavit. Cor $1\frac{1}{3}$ solito majus. Diaphragma inculpatum, ventriculus grandis, cetera sine vitio. Hepar $1\frac{1}{4}$ solito majus, non scirrhosum, vesicula felle grandis, viridique bile referta. Nihil vitii in liene, pancreate, vena portæ, in abdominis cellulosa nihil aquæ. Mesenterium, intestina, renes secundum naturam, nisi quod crassa intestina scybalis, & vesica urinaria lotio plena essent. Hæmorrhoidalia vasa nihil notatu dignum præbuere; at vena cava instar intestini recti ampla sanguinem tam aquosum continebat, ut carnis loturam referret. Aorta descendens inculpata. Testiculi solito minores. Apparebat igitur, ægro in vita vix $\frac{3}{4}$ sanguinis veri infuisse. Toto morbi tempore constitit appetentia; ægro lac imprimis appetenti nec alia quæque dissipiebant: bonus etiam somnus mansit; at alvus ut plurimum obstructa fuit. A lactis potu admodum obesus evasit. Obiit ætatis anno 33tio vel 34to. Hæc de vario ex immodicis hæmorrhoidibus hydrope exempla sufficient. Quod autem ad febriculam lentam attinet, THEDENII (a) certe amicum detinuit, & apud

G.

(a) Vide §. 117. 8.

S. H. VELSCHIUM (a) referente P. M. SLEGELIO „juvenis ex immodico hæmorrhoidum fluxu in cachexiam incidit, & febrem lentam, 4. annos perseverantem, adeo sæpe levem, ut vix adverteretur. Accessit per intervalla icterus, tandemque febris gravis superveniens cum rigore vehemente ægrotum intra biduum confecit; frustra enim adhibita tam calida, quam frigida, ipsumque etiam Guajaci decoctum. Aperto cadavere hepar, & renes pallidi sanguinem tenuem serosum fundebant; lien solito rubicundior; cor, pancreas secundum naturam constituta. Sinistro pulmonis lobo inflammationis indicium.“

6) *Spasmi, convulsiones* clonicæ, quibusvis in magnis vacuationibus solennes, velut accidit in KOELICHENII (b) matrona. Refert etiam S. A. TISSOTUS (c) mulierem 45. annorum ex nimio hæmorrhoidum fluxu tanta nervorum debilitate laborasse, ut multas anxietates & singularem totius cutis motum inde sit adepta.

c) *Languor* pallidus ad syncopen usque, velut in Vratislaviensium (d) muliere, FER-

DI-

(a) Consil. med. Cent. 4. Conf. 63. p. 452.

(b) Vide §. 90.

(c) Abhandl. von den Nerven. u. ihren Krankh. 2. Band. 8. Cap. 7. Art. §. 51. p. m. 129.

(d) Vide §. 26. b)

DINANDI (a) femina, LANZONI (b) sacerdote, & gravis quadam F. LOSSI (c) matrona. Apud V. RIEDLINUM (d) uxor mercatoris 40. annorum immodico hæmorrhoidum fluxui obnoxia ante hunc ebullitionem sub præcordiis ortam, ac totum se in corpus diffundentem, æstumque corporis causantem præsentiebat, quem tormina levia, & hæc fluxus sequebatur, cessante ocyus ebullitione, æstuque in frigus abeunte, cui sese animi deliquia jungabant. H. BOERHAAVII (e) sexagenarius cachecticus exhaustis sensim diuturno tali fluxu, cum nocturna diarrhœa complicato, viribus demum extinctus est.

d) *Recidivæ*, ad quas nimius hic fluxus est proclivis, ut ROBINI (f) in ægro, plurimisque aliis est observatum. Sed nullum hanc in rem luculentius in tota historia medica exstat exemplum; quam quod B. GULMANN (g) memoriæ prodidit: mercatori ad 40. annos nato cholerico-hypochondriaco, in iram prono, ac per decennium jam fat-

lar-

(a) Vide §. 25.

(b) Vide §. 49. Nro. 2.

(c) Obs. med. Lib. 3. Obs. 25.

(d) Curar. medicar. millenario Obs. 578.

(e) Consult. med. Vol. 2. Cas. 4. p. 18.

(f) Vide præced. a)

(g) Act. nat. cur. Vol. 2. Obs. 78.

largum hæmorrhoidum fluxum cum euphoria
 passo, iste aliquando post insignem terrorem,
 ac mortis imminientis metum tantus ingruit,
 ut intra 18 dies æger 6. mensuras sanguinis
 amiserit; donec indefesso usu sum temperan-
 tium nitroforum cum cinnabari, paucisque
 stipticis sub diæta gelatinosa conquievit. Sed
 ob labores itineris abhinc sub solis æstu
 emensi coorta sanguinis commotio cardialgi-
 am, cephalalgiam, ac mox fluxum iterum
 causavit, pristinis remediis non amplius co-
 hibendum, quoad amissis intra 3 hebdoma-
 das 7. mensuris sanguinis tandem datis pilu-
 lis ex croco ♂ adstringente, extract. catech.,
 torment., cort. cascarill., ac Gri stomachico
 BIRCKM. cessit, ægro extenuato, ac pene ex-
 animi relicto; qui tamen jusculis gelatinoso-
 analepticis sensim ita appetentiam, somnum,
 viresque collegit, ut suas iterum res aliqua-
 tenus procurare quiverit. Verum finiente
 Decembri 1720. reversus fluxus ægrum intra
 mensem 5 iterum sanguinis mensuris orbavit.
 Anno insequente, utut circa æquinoctium
 V. S. brachii, aliaque in prophylaxin facta;
 graves tamen 4. recidivæ acciderunt, quarum
 ultima 27ma Novembr. eveniens illum pene
 enecuiisset, ni emulsio e sem. 4. frig. maj.,
 papav., & ▽a borrag., plantag., cinnam.,
 cydon., c. corall. r. ppt. unicorn. ver., dente
 hippopotami, nitro, & julepo rosar. præsen-
 tissimam tulisset opem. Amisit his 4. recidi-
 vis æger 23. mensuras sanguinis, totoque an-
 no valetudinarius vires vix collegit. Anno

1722 ob 5. recidivas 20 mensuræ sanguinis amissæ ; quarum in ultima profuit ꝑis ex corall. r. ppt., margarit., nitro ppt., unicorn. vero, & croco ♂tis adstr. Abhinc autem fluxus evasit parcior, ita ut singulis fere annis minus ammissum sit sanguinis, nimirum annis 1723. — 4. mensuræ 8; anno 1725 mensuræ 7; anno 1726. mensuræ $4\frac{1}{2}$; anno vero 1727 nonnisi aliquot molimina, & accessus salubriter semper decurrentes æger est expertus, ꝑibus temper. nitrosis cum cinnab., & stoma-chicis facile obediens. Hinc ita rursus convaluit, ut negotiis suis denuo solis itineribus exceptis, vacare potuerit. Amisit ergo intra septennium $100\frac{1}{2}$ mensuras sanguinis, exemplo, quod sciam, hætenus inaudito. Mali quoque sunt hujus fluxus effectus, quos inde

2. *Ætās junior* experitur, quæ diuturniorem præsertim hæmorrhoidum fluxum raro innoxie ferre solet. Namque „si in junioribus, inquit F. HOFFMANNUS (a), præmatu-
re nimis erumpunt hæmorrhoides, per ali-
quod etiam tempus continuant, & insuper,
ut sæpe simul fieri solet, largius, & copio-
sius succedunt, nunquam fere salutares sunt,
vel in ipso ætatis flore mortem accelerant,
dum

(a) Med. rat. syst. T. 4. P. 1. S. 1. Cap. 1.
epicr. ad Obser. 13. Opp. T. 2. p. 23.

„dum perquam facile a legitimo suo aberrant
 „tramite; variaque fontica pathemata post
 „se trahunt.“ Hinc & M. ALBERTI (a) „re-
 „sticere (ait) nolui, quod . . . hæmorrhoi-
 „des in tenellula ætate perumpentes haud
 „provehctiorem promittant ætatem; siquidem
 „mihi . . . biga exemplorum constat, ubi
 „puella, quæ una rachitide laboravit, per-
 „pusilla, & 5 annorum nata, deinde etiam
 „puerulus ex hoc præmaturo hæmorrhoidum
 „fluxu in atrophiam, miserandam contractu-
 „ram, & hecticam inciderant, quo arduo, &
 „morbofo schemate, etiam brevi occubue-
 „runt.“ Vidit etiam J. P. WAHRENDORFF (b)
 „pulsionem 4 ætatis anno hæmorrhoidum flu-
 „xum nactum, ac 7mo ætatis anno mortuum.
 „Octennis quoque FISCHERI (c) puer ab hoc
 „fluxu pallidus lanquebat, & MÜLLERI (d)
 „sexennis pusio hecticam inde præseferbat
 „dispositionem. Interea tamen non omnibus
 „infantibus perinde est insalubris, ne dum fu-
 „nestus, quandoquidem bene multis nihil inde
 „noxæ emerfit (e). Sic E. E. BERDOTI „puella
 „triennis, phthifica matre nata, diarrhœam-
 „que

(a) Aët. nat. cur. Vol. 1. Obs. 217.

(b) Annal. Vratisl. Tent. 37. A. 1726. Julii, d. 4.
 art. 18. p. 137. sqq.

(c) Vide §. 15.

(d) Vide §. 84. c).

(e) Aët. Helvet. Vol. 5. p. 192.

„que menstruam catameniorum loco sæpius
 „experta ad annum ætatis ætium tenuissimi
 „fuit corporis, habitus, cum insigni macie,
 „incipienteque scabiosa tæbe. Mutato autem
 „per aliquot menses aere adhibitisque demul-
 „centibus, leniterque nutrientibus ex C. C.
 „&c. evanuit scabies: pinquiori dein factò
 „corpore, sed subortis simul hæmorrhoidibus,
 „quovis ab eo tempore mense, præviis cor-
 „poris lassitudinibus, crurum tarditate ad mo-
 „tum, lumborum doloribus, &c. largius flu-
 „entibus; pinquiori nunc, & egregie in ce-
 „teris habente puella nunc fere sexenni.“

3. *Gravidæ* quoque habent, quod ab hæmorrhoidum fluxu pertimescant; quippe qui facile abortum post se trahat. Hinc HIPPOCRATES (α) „in uterum jam gerentibus
 „(ait), fluxiones serpentia oris ulcera cum
 „dolore excitantes, malum denunciant; in
 „his sanguinis per ora venarum profluvium
 „(hæmorrhoids) pessimum.“ Significat enim hic status insignem sanguinis ab acrimonia inductam tenuitatem cum nisu ad hæmorrhoidalia vasa, hisque vicina: unde hæmorrhoids adveniens prælagit & hæmorrhagiam uteri, non multo post affuturam, & abortum. At casus hic paulo est rarior; frequentissimæ autem hæmorrhoidalis fluxus in gravidis cau-
 sæ,

sæ, sunt vel compressio ab utero feto venarum hæmorrhoidalium, vel plethora a catameniiis tunc non fluentibus nata, vel ingesta hæmorrhoides moventia, vel denique fluxus hic jam multo ante habitualis, qui statim sibi temporibus etiam sub graviditate revertitur. In omnibus hisce fluxus hæmorrhoidum innocuus alias, alias vero periculosus evadere potest, qua in re hocce standum est canonic: hæmorrhoidum fluxus placidus, moderatus, nec diuturnus in gravidis innocuus esse solet, contra vero magnis cum abdominis præsertim turbis (ut sunt dolores, tenesmus, febris, &c.) ingruens, copiosus, diuve procedens, plerumque abortum causat, ut recte hæc M. ALBERTI (a) discrevit. Innocui fluxus hæmorrhoidalis in gravidis exempla jam superius (b) in medium allata sunt.

4. *Tenuitas acris sanguinis* ut in hydropticis, diabeticis, hæcticis, phthysicis, scorbuticis, &c. ominosum semper hæmorrhoidum fluxum inducit; quippe qui obortus mortem in propinquo esse significet: ac proinde tunc ut causa, & ut signum malus est. Sic J. S. CARLII (c) „vir 40 annorum, me-
„lan-

(a) Diff. de hæmorrhoidib. gravidar. & puerperar. §. 6. p. 21. sq.

(b) Vide §. 24.

(c) Commenc. Nor. T. 5. A. 1735. hebdom. 15. p. 115.

„lancholico - sanguinei temperamenti , ali-
 „quamdiu dorsi , ventris , & ventriculi dolo-
 „ribus ex congestione sanguinis , & molimi-
 „nibus hæmorrhoidalibus ortis vexatus , va-
 „riis hinc inde corrasis , & propinatis calidis
 „carminativis , & sedativis tractatur ; unde
 „tandem tumor partium inferiorum , sive ascii-
 „tes , & superiorum partium contabescentiæ
 „insignis incresebat. Tandem supervenie-
 „bat hæmorrhoidum fluxus largus , qui initio
 „hydropem imminuere aliquo modo videba-
 „tur ; ast nullo cum successu , quoniam dein
 „omnia fiebant pejora , morsque in propin-
 „quo erat.“ Eundem exitum habuit C. F.
 KÜHNII (a) literatus 45 annorum , assiduus
 lucubrationibus , epulis , vinoque , præsertim
 Gallico , deditus , qui biennio ante fractura
 cruris misere decubuit. Cum is a 4. fere lu-
 stris quotannis acidulas Pyrmontanas maxima
 cum euphoria usurpasset , ab ultimis haustis
 insolitam , nimiamque appetentiam , ac brevi
 post sudores matutinos , ob consuetos labo-
 res quandoque turbatos , tum rheumaticos
 scapularum dolores est expertus : quibus om-
 nibus , ac tumori statim ascitico - tympanitico
 mature V. Sne. catharticis , carminativis , diu-
 reticis , tonicisque obviam itum. Data igitur
 præter \ominus catharticum Anglicanum resina ja-
 lappæ in \mathcal{V} , \mathcal{R} carminativus de tribus \mathcal{R} a
 Oii

(a) Nov. act. nat. cur. T. 1. Obs. 29. Nro. 3.

Œii ☐fata, succini, ☐ri; rad. scillæ, ari,
vincetox. cum salibus amaris digestivis, &
nitrosis, demum & lixivium bened. MYNS. &c.
& aliquamdiu sollicitè continuata, drastice
quoque v. g. cort. med. samb. clanculum simul
suggestis; unde urina, flatusque cum alvo
affatim processere, simulque in 4. dies fluxere
hæmorrhoides ad aliquot libras, at sine tu-
moris decremento, & constanti morbi leva-
mine, quin potius accessit clangosa tussis,
dyspnœa pene ad orthopnœam usque aucta,
fastidium ciborum, sopor, pulsus intermit-
tens, demum & penis, non item scroti, tu-
mor, summæ præcordiorum anxietates, hæ-
morrhoides cœcæ, & ultra modum profusæ,
lotio vix guttatim stillante. His æger op-
pressus malis sedens expiravit. Neque meli-
oris indolis fuere varices hæmorrhoidales in
sene scorbutico J. G. ERNESTII (a) haud ita
multo ante mortem tempore pullulantes.

§. LIV.

DESINUNT hæmorrhoides vel per indu-
cias; vel in perpetuum, idque aut innoxie,
aut metastatice, variis de causis, nimirum

I. Spon-

(a) Annal. Vratisl. A. 1724. Tent. 28. Maji.
d. 2. art. 3. §. 4. p. 492. Tent. 29. Julii.
d. 2. art. 3. §. 4. p. 42.

1. *Sponte natura* citra manifestam causam. Sic J. C. STUNZER (a) plures novit, quæis ante 15, aut 20 annos hæmorrhoides fluxere, abhinc vero non amplius, integra nihilominus valetudine. Novi & ego tales.

2. *Senium* vel maxime morbo hæmorrhoidali finem facere consuevit, ob humoris boni inopiam, vasorum rigiditatem, corporis quietem diuturnam, &c. „Hinc Amatus „(b) hoc morbo affectos notavit, quibus re- „frigerato sanguine temporis successu, & æta- „tis ratione sanguis ex se cohibitus; & recte „habebant.“ Contra ea LUDWIG (c) „noti „mihi (inquit) fuere egregio quidem corpo- „ris habitu præditi viri, qui in ætate adhuc „vegeta inter 40. & 50um annum edendi cu- „piditate excellentes sæpius largius, & victu „jurulento nutriti, vini boni potu; sed sæpe „ultra modum delectati in vacillante sanitate „ex hæmorrhoidibus non quidem statim tem- „pore; attamen semper certo supervenienti- „bus solatium haberent; hi vero omnes post „50um annum hæmorrhoides non amplius „experti hypochondriacis, vertiginosis, & in- „terdum vere melancholicis affectibus excru- „ciati fuerunt.“ Non impune certe C. T. BIER-

LIN-

(a) L. c. p. 103.

(b) Curat. medic. Cent. 5. Cur. 3.

(c) L. c. p. 407.

LINGII (a) seni 65to ætatis anno hæmorrhoides fluere desierunt, quæ antea 3tia vel 4ta quaque hebdomade fluxere; siquidem resistente fluxu dolores spinæ dorsi & intestini recti non mediocres semel, atque iterum est expertus. Ex his igitur liquet, senibus hæmorrhoidum fluxum desinere alias citra noxam; alias haud perinde

3. *Febris* quoque superveniens aut molimina hæmorrhoidalia abolet cum euphoria; dum stases sanguinis resolvendo, circulationis æquabilitatem restituit; aut fluxum jam habitualement suppressit non sine insigni, & subinde funesta functionum læsione. Posterioris eventus exemplum præbet ROLLII (b) factor; prioris autem luculentum casum suppeditat P. H. VOGEL apud A. E. BÜCHNERUM (c): nempe senex 60 annorum sanguineo-melancholicus, robustus olim, carnosus, sanus, multi cibi, ac potus, corpusque in dies movens, ante 7 annos molestam cardialgiam nactus est, mane vel maxime ante egressum e lecto, & a meridie aliquanto post cibationem cum anxietate crebrisque ructibus affligentem, quam remedia *Ωsa* hausta potius au-

(a) Thes. Obs. de cur. med. Obs. 54. p. 712.

(b) Vide §. 55. Nro. 11.

(c) Miscell. phys. med. A. 1730, Maji, d. 4, art. 6, p. 1081, 1092.

auxere accerfendo maciem, angentem sub motu æstum cum sudore, anxietates, dolores hypochondrii lævi, crebras alvi obstructions, ac multum miſtum. Sub his autem ſemel, iterumque ſanguinis pauxillum poſt alvi egeſtionem apparuit, ac ſubinde ſub ſiniſtra mammilla moleſtiſſima preſſio, & in femoribus dolores percipiēbantur. Hæc triennium durarunt aſſiduo, niſi quod interdum uſu pilul. baſam., ꝯ antiſpasm., eſſentiarum roborantium e millefol., cort. ☉, caſcar., pimpin., & Væ. Sbus. in pede lenimen, nunquam autem plenæ induciæ ſequerentur. Fluxit quandoque alvus; quandoque ſcybala continuis aliquot diebus muco griſco incruſtata egerebantur. Anno 1723 intumuit lævus teſtis (varicocele eſſe cenſebatur): tumorem intra 3. hebdomadas abegere phlebotomia pedis, jura radice cichor. hort. alterata, & Œus aperitiv: PENOTI. A. 1724. principio Junii inopinantem vehemens corripit podagra 14. dierum; at ſine priorum ſymptomatum levamine, affligente præſertim multa illa ſub mammilla preſſione. Poſtmodo autem aſſiduæ mutationes acciderunt, & lævi inprimis lateris metaſchematiſmi, affligente jam acerbæ odontalgia, jam otalgia, jam cephalalgia: his autem obtinentibus æger a cardialgia cum ruſtibus prorſus immunis vixit. Vigente autem ſub his omnibus appetitu, excepto podagræ tempore, macies nihilominus crevit cum inſigni virium jaſtura. Tandem A. 1729. poſt aliquot dierum laſſitudinem vespere quodam

dam per 2. horas exhorruit, sequente magno æstu & alterum usque in diem durante cum vehementi siti, anorexia, & pervigilio, donec sinistro in femore erysipelas magno cum tumore, acutoque dolore emerfit prioribus malis levamen afferens. Impatiens æger sequenti vespere tumori applicat frigidissimam fecalis farinam cum dolorum quidem immi-
nutione; sed mox a $\frac{1}{2}$ nocte gravis colica, ac vomitus multis cum sudoribus frigidis, tantoque capitis stupore, ac debilitate secuti, ut æger periturus timeretur. Injectum ocys enema alvum aliquot dies clausam referavit, minuitque anxietates, ac virium deliquium. Inde bezoardicis cum analepticis datis revocatum erysipelas, tanta cum inflammatione, ut sicco fotu gangrena fuerit prævertenda. Abiit illud in duos abscessus. Interea multi sudores, qua calidi, qua frigidi magna cum debilitate, pulsusque debili, inæquali, ac subinde intermittente, & urina rubella semper, sine sedimento, obtinebant; donec maturi abscessus aperti, pusque inde sanguini mixtum eductum insigni cum levamine. Ulcera ambo intra 14 dies invito medico natura consanavit. Abhinc ægri status sic satis evasit tolerabilis; sudores tamen, utut parciores, nec frigidi, satis diu adhuc tremulo, & intermittente cum pulsu, & urinis crudis pergebant, debilitabant, sanationemque morabantur, perstante præsertim anorexia cum rustibus, ac pervigilio, diætæque non satis observata, dum æger fructibus, potuique frigidis

gido indulgebat. Idcirco dato ☿e tempe-
 fante nitrato cum sacharo lactis, ac subiunde
 julapiis acidulatis, hi sudores intra aliquot
 dies minuebantur, & oborta sponte diarrhœa
 moderata, lotioque turbido bonum ponente
 sedimentum plane conquievit. Ex hoc tem-
 pore (7ma morbi hebdomade) omnia in me-
 lius vergebant, somnoque cum appetentia
 reversis vires etiam in dies crevere, ac subor-
 dinata in melius diætâ nec cardialgia, nec
 ructus deinceps redierunt, ægerque meliori,
 quam ante plures abhinc annos valetudine
 est gavisus. Interea femora (crura forte),
 præsertim sinistrum; cum in morbo; tum
 etiam post illum tangebant: quæ primum sibi
 relicta, cum sponte non subsiderent, post
 aliquot hebdomades ad usum ☿ri ☉lati cum
 $\frac{1}{4}$ Oii diaph. ☿lis, & eccoproticorum ma-
 xima pro parte detumuerunt. Ex hac obser-
 vatione satis apparet omnia quæque sympto-
 mata fuisse e censu moliminum hæmorrhoida-
 lium graviorum, quæ febris critica superven-
 iens auspicato discusserat.

4. *Graviditas* etiam interdum hæmorr-
 hoidales molestias submovet. V. RIEDLINUS
 (a) narrat auri fabri uxori non multo post
 innitum conjugium dolores hæmorrhoidum
 occipisse, quandoque ad convulsionum us-
 que

(a) Curar. medic. millenario Obs. 779.

que metum incrementum, instantibus præsertim catameniis; aliquatenus autem lenitos, ubi quid sanguinis ex ani venis excrevisset, donec conceptus cum fluxu mensium dolores simul hæmorrhoidum sustulit. Utrum vero reversis a partu catameniis hæmorrhoidales etiam nifus redierint, operæ fuisset pretium adnotare.

5. *Pathemata animi*, præsertim ira, terror, metus, mœror, hæmorrhoidalem fluxum cohibere solent, at plerumque cum ægrorum detrimento, regurgitans enim aliorsum sanguis infarctum aliis in organis producit, functionesque lædit, id quod LUDWIGII (a) in ebrio accidit, qui cohibito per iram fluxu in furorem incidit.

6. *Vulnera ani*. Occalescentibus nempe inducta cicatrice post sanationem hæmorrhoidibus vasibus, in posterum genesin varicum, fluxumque ipsum, hæmorrhoidum accidere non sinunt, quod post operationem fistulæ ani pluribus evenisse constat, uti & post adhibitam unctionem (b). Sic apud J. STORCH (c) vir cholericus teneræ compagis ex hæmorrhoidibus ani fistulam nactus est, qua ferro,

(a) Vide §. 104.

(b) Vide §. 137. Nro. 2.

(c) Observ. clin. ann. 6. Junii. d. 4. p. 610.

ro, & sectione curata, hæmorrhoides non amplius reversæ, sanguine ad pulmões converso, hæmoptoeu, & ex hac phthisin letalem intulerunt.

6. *Applicata* externa, discutientia, repercutientia &c., quæ plerumque regurgitationem sanguinis ad alia organa morbosque illorum creant. Sic ab humido frigore substitit fluxus sexagenario STAHLII (a), ab lituani discutiente seni ALBERTII (b), & a suffitu adstringente viro STORCHII (c).

7. *Ingesta* adstringentia, vel sanguinem commoventia, vel spasmos abdominis, vel alias vacuationes causantia. ALBRECHTI (d) Ecclesiasti frigidus potus; HOFFMANNI (e) autem præfecto militum, vini Pontak usus hæmorrhoidum fluxum cohibuit, nihil autem promptius eundem sistit; quam improvidus millefolii usus (f).

8. *Vacuationes* aliæ vel spontæ abortæ, vel arte excitatæ sæpissimè non modo molimina,
&

(a) Vide §. 55. Nro. 6. b)

(b) Vide ibid. Nro. 12. c)

(c) Vide ibid. Nro. 13. d)

(d) Vide §. 55. Nro. 7.

(e) Vide §. 95. a)

(f) Vide §. 84.

& varices hæmorrhoidales dissipant; verum etiam ipsum fluxum compescunt, prævertuntque.

a) *Sudores* nocturni spontanei, plerumque molimina, & anomalias hæmorrhoidales averruncare consueverunt; hinc etiam nunquam impune interturbantur. In Annalibus Vratislaviensium (a) -viri 43. annorum sanguineo-cholericum, in hæmorrhagias narium nunquam proclivem; sed pleuritides in vomicam abeuntes sæpius perpeßum, & semestri quovis largis phlebotomiis assuetum, Decembri mense tantus corripuit spinæ dorsi rheumatismus, ut præ dolore, velut ex palo a nucha ad pectus per longitudinem spinæ dorsi trajecto, incedere prono capite, & neutrum in latus convertendo cogeretur, non sine pallore, ac frigore faciei, totiusque corporis, tum aliqua pectoris angustia. Ad frictiones V camphorato calido factas dolor semper insigniter mitigabatur, & succedentibus sudoribus nocturnis demum penitus desit. At non multo post enati sunt novi vehementissimi dolores in hypogastrio, modo in alterutrius jam dextri, jam lævi ureteris regione a tergo desuper versus inguina; modo in urethra; jam in perinæo; jam in unico hypogastrii

R 2

punc-

(a) Tent. 22. Anno 1722, Decembr. d. 2. art. 1, §. 2. p. 631.

puncto, sed moræ transitoriae, ac citra ullum vel alvi, vel lotii impedimentum. Cum æger nunquam aut calculo, aut nephritidi fuisset obnoxius, nec ulla vel muci, vel sabuli, calculive excretio accidisset, symptomata hæc non abs re ad hæmorrhoidum nisus videbantur esse referenda; præsertim cum dolores dicti etiam in ano sæpe fuerint oborti. Verum etiam hæc altera dolorum caterva pedetentim ad uberes noctu succedentes sudores conquievit, sine ullo alio morbofo incommodo, ægerque ad pristinam rediit sanitatem. Magis vero mirum est, ipsum fluxum hæmorrhoidalem ad sudores nocturnos obortos in RIEDLINI (a) mercatore desisse.

b) *Vomitus*. G. DETHARDINGII (b) vir sanguineo-melancholicus, succulentus, 40 annis major; hilaris, liberaliori hæmorrhoidum a fluxu liberari cupiens, emetico sumpto protinus ejus expertus evasit; at non impune: namque lapso sub diætâ lauta, vinosaque, ac vita sedentaria semestri incidit in anorexiam, angustias ad præcordia, & œdema pedum. STEGMANNI (c) quoque civis huc est referendus.

Pty-

(a) Vide §. 55. Nro. 10.

(b) Act. nat. cur. Vol. I. Obl. II. p. 48.

(c) Vide §. 60.

c) *Ptyalismus*. F. ROSSIUS (a) „novit
 „feminam circiter 40. annos natam,
 „gracilis, & parvæ staturæ, ab aliquot annis
 „hipochondriaca affectione molestatam, quæ
 „diuturno hæmorrhoidum fluxu emacerata,
 „cum nihil proficeret Væ. Sbus., purgationi-
 „bus, longo syrupi chalibeati, & aliorum re-
 „mediorum . . . usu, assumpsit tandem . . .
 „12. gr ♀ dulcis, additis 4 granis resinæ
 „jalappæ; a quo cum alvus semel tantum
 „commoveretur, eandem dosin, sequenti die
 „repetiit; sed alvo ab eo iterum semel com-
 „mota incidit in ptyalismum molestissimum
 „per 14. dies durantem, ut nil nisi mortem
 „expectaret. Fluxu tamen ex artis lege se-
 „dato, simul etiam sedatum hæmorrhoidum
 „profluvium; quod tamen post plures septi-
 „manas potu aquarum Ebeshamensium . . .
 „repullulavit, licet minori violentia.“

d) *Phlebotomia* venarum superiorum v.
 g. brachii, &c. Nihil sane tam certo sangui-
 nem a vasis hæmorrhoidalibus avertit, flu-
 xumque inde compescit, ac prævertit; quam
 secta in brachio vena. Apud J. STORCHIIUM
 (b) sexagenarius quadratus, ac robustus sub
 inordinatissimo regimine diætetico sic satis
 tamen ordinatas hæmorrhoides multis annis
 ex-

(a) Obs. med. Libr. 3. Obs. 25.

(b) Obs. clin. ann. 1. Mart. d. 1. Nro. 8. p. 37.

expertus incidit in ischiadem, quam suo consilio Væ. Sc. in brachio, præsentē fluxu hæmorrhoidum aggressus, & ischiadem & fluxum sustulit. Hujus autem in locum successit assiduus tenesmus, cum exeretione materiæ albæ mucosæ, & subinde purulentæ, imo calculorum pisa, fabasque æquantium. Doloribus nunquam intermittētibz, & nec $\frac{1}{2}$ horæ somnum concedentibus crura demum œdema inflavit ac per trimestre cum lunationibus jam increfcens; jam decrefcens tandem in plenilunio mortem attulit. Vir alius (a) 30. annis major ab adolescentia fere ad 30. annum crebris narium hæmorrhagiis, semper tamen levantibus, obnoxius, ex quo iis per aliquot annos caruit, multos flatus, ac borborygmōs patiebat, & a levissima causa diarrhœam, ita ut demum etiam hæmorrhoidum fluxum observaverit. Cum autem copiosæ ab aliquo tempore cerevisiæ potu plethoram sibi causasset, Væ. Sem. in pede celebrare statuit; sed chirurgus persuasit in brachio faciendam: a qua æger (forte ob instantem tunc hæmorrhoidum fluxum interceptum) continuo ventre male habere, tumereque cœpit, non quidem aquoso tumore; sed quasi glandulis induratis abdomen refertum esset. A corporis motu ocyus magnopere languebat non sine scotomia. Postmodo per 14 dies sæpe

(a) Ibidem anno. 2. Oct. d. 4. Nro. 9. p. 467.

sæpe colicæ, & pruritus ani infestabant. Lar-
ga idcirco Væ. Sio. in pede facta, sanguine
nigro educto. Postridie toto ferme corpore
præsertim circa pectus, ac humeros, nescio
quos motus sentiebat, qui cum hæmorrhoi-
dum nisus esse viderentur, datum infusum
millefolii mane bibendum, & quandoque do-
sis pilul. lenium. A. Væ. Snc, } remediisque
pene convalescens cum repente excanduisset
ab ira, in pectoris incidit oppressiones cum
tussi. Datum ea propter,

R. Ræ rhei ʒß.
— □ ʒj.
Ol. anisi ʒß. M.

S. m. & v. gtt. 30. Unde sensim mitius
habens non tamen ante ex toto convaluit;
quam proximo verè, postquam multi in fa-
cie vari, per æstatem numero aucti, effloruif-
sent. Abhinc sic satis recte valebat; sed non
sine ciborum delectu, & mensura, nam a co-
piosis, vel crudis cibis, stomachi semper nas-
cebatur pressio. Tandem vero iterum sese
hæmorrhoides quandoque insinuare cœperunt.
Perinde apud M. ETTMÜLLERUM (a) „mulier
„vegeta, & floridæ faciei, corpulenta, cete-
„ra sana: indeque luxui dedita, ætatis præ-
„ter-

(a) Colleg. consulat. Cas. 13. opp. T. 2. P. 2.
p. 164.

„terpropter 49. annorum, & quod excurrit,
 „conqueritur de dolore lumborum lancinante,
 „& gravative distendente, successive incref-
 „cente, una cum intenso dolore ardente, ro-
 „dente, & nonnihil pulsante in interioribus
 „podicis: hinc laboriosam dejectionem pati-
 „tur in tantum, ut quoties eam exonerare
 „nititur; hoc cum summis fiat doloribus.
 „Accedit tunc extremorum tremor, phlogosis
 „& æstuatio ex præcordiis caput petens, cum
 „faciei rubore intenso, & largo sudoris per
 „frontem, & tempora defluxu. Patitur hæc,
 „quoties alvum liberat, istis prioribus pathe-
 „matis continuo eam torquentibus. Medi-
 „cus ordinarius varia ordinat interna & ex-
 „terna; linimenta & fomenta, clysmata, ve-
 „nam in brachio secatur, &c. Levatur his ma-
 „lum, sed supervenit difficilis respiratio, ita
 „ut quoties parum ambulat, vel aliquot
 „saltem scalas ascendit, spiritus nonnihil
 „intercipiatur, & libera respiratio impediatur
 „cum pulsatione sensibili in temporibus, &
 „pedibus. Molestissimo hoc malo aliquam-
 „diu conflictata, & diversi modo tractata a
 „medico, illud pedetentim evanescit; sed
 „... redeuntibus istis prioribus in lumbis,
 „ano, & vicinis regionibus malis.“

§. LV.

INTERCEPTIO *hæmorrhoidum*, vel fluxu illarum cohibito, vel niſu ad anum elifo, multiplicia mala poſt ſe trahere, ipſamque aliquando mortem cauſare ſolet, præſertim ſi hæmorrhoides vel criticæ fuere, vel habituales. Ac fluxus quidem monente A. C. CELSO (a) „in quibusdam parum tuto ſup-
 „primitur, qui ſanguinis profluvio imbecil-
 „liores non fiunt; habent enim purgationem
 „hanc; non morbum: ideoque curati qui-
 „dam, cum ſanguis exitum non haberet; in-
 „clinata in præcordia, ac viſcera materia ſu-
 „bitis, & graviffimis morbis correpti ſunt.“
 Et narrante J. L. HANNEMANNO (b) „Paſtor
 „quidam . . . hæmorrhoidibus laboravit, &
 „ſi non fluere ſtato tempore, ea ſympto-
 „mata pati ſolebat, quæ patiuntur mulieres
 „in menſium ſuppreſſione.“ Quibus a cauſis,
 hæmorrhoides intercipi ſolcant; paulo ante
 ex ordine vidimus, mala autem inde naſcen-
 tia cum infinita eſſe poſſint; tum præprimis
 illa eſſe ſolent, quæ molimina hæmorrhoida-
 lia conſtituunt. Crebriora ſunt

I. Ver-

(a) L. c. L. 6. C. 18. Nro. 9.

(b) Acta. med. Hafniens. Vol. 3. Obſ. 18.

(c) Vide §. præcedent.

1. *Vertigo*, quam cum cephalalgia quodam in viro L. HEISTERUS (a) observavit. Perinde P. ALPINI (b) „Senator venetus proximo anno a suppressis hæmorrhoidibus, quas multos annos habuit, in affectum scotomaticum incidit.“ Plures quoque insignes vertiginis a restituantibus hæmorrhoidibus, & ad caput regurgitantibus casus refert F. HOFEMANNUS (c): his adde matronam LANCISII (d), virumque TISSOTI (e).

2. *Insania*, ut est melancholia præsertim, ac mania, &c. ut ex GALENO (f) superius meminimus, id quod etiam ZACUTI in gravida (g), viro (h) ac juvene (i) est observatum, quæ omnibus melancholicum delirium ex intercepto hæmorrhoidum fluxu, ac nisu accedit. Et H. LUDOLFF (k) „nota mihi sunt

(a) L. c. Band. Nro. 578.

(b) Med. method. Lib. 2. p. 371.

(c) Med. rat. syst. T. 4. P. 4. C. 3. Obs. 2. 5. 8.

(d) Vide §. 115. Nro. 3.

(e) Vide §. 104.

(f) Vide §. 53. III. A. Nro. 2. f)

(g) Vide §. 115. Nro. 3.

(h) Vide §. 116. Nro. 1. g)

(i) Vide §. 117. β.

(k) Diss. de utilitate fluxus hæmorrhoidalis (4to Erford. 1721. Resp. I. G. BREITHAUPT) §. 48. p. 23.

„sunt (ait) ex propria observatione duo ex-
 „empla melancholia hypochondriaca virorum
 „affectorum, ex malo hæmorrhoidum pro-
 „gressu orta. Primus erat vir juvenis 28
 „annorum circiter, admodum plethoricus,
 „frequentibus narium hæmorrhagiis antehac
 „obnoxius, a prima adolescentia vitæ seden-
 „tariæ propter studia assuetus; cui vitæ ge-
 „neri cum magis, magisque pertinacius in-
 „dulgeret, & motus voluntarios corporis
 „parcissime institueret, corpusque, animam-
 „que scrupulando, meditando, lucubrando,
 „ac judicando eximie defatigaret, incidit in
 „hæmorrhoidum externarum suppressionem,
 „quibusjam aliquoties obnoxius fuerat, &
 „hinc successu temporis varias molestias pres-
 „sorias, tensorias in abdomine. Jungebantur
 „his animi perturbationes, vigilæ, in-
 „somnia anxia, meticulosa, & ubi affectus
 „summe vigebat, vim sibi inferendam confi-
 „tebatur patiens: *es wäre ihm, als wenn er*
 „*sich immer ermorden müßte*. Sed per DEI
 „gratiam restitutus est. Alter patiens sexage-
 „nario major, cholericus - melancholico - ple-
 „thoricus per multos annos hæmorrhoides
 „internas bene fluentes expertus, hinc sani-
 „tate optima, ac laudabilissima per ætatem
 „fruens, incidit in illarum plenariam suppres-
 „sionem, quam mox insecta est melanco-
 „lia hypochondriaca cum furibundis aliquando
 „symptomatibus stipata: hectica jungébatur,
 „& mors post aliquot menses vitæ finem fa-
 „cie-

„ciebat.“ STORCHII (a) quoque mulier juvenis cholero-melancholica, tempore hæmorrhoidum dolentium ira, litibusque assiduus fluxum illarum intercipient, incidit inde vespere quodam in lypothymiam cum cardialgia & delirio. Mane hora 3^{ta} datus ʒis e sale nitro, ac cinnabari cum levamine. Ad horam 5^{am}, cum faucium strangulatio denuo immineret, secta ocyus pedis vena, inducias fecit, & subjuncta *R*a fl. pap. rh. c. liqu. anod. min. agræ pristinam sensum valetudinem reddidit. Alii vero a suppressis hæmorrhoidibus in graviora etiam deliria, ipsumque in furorem aguntur, ut ebrio LUDWIGII (b) evenit, & apud HIPPOCRATEM (c) dum „ALCIPUS per ora venarum, qui in ano sunt, sanguinem fundere solitus curari vetabatur; „curatus insania correptus est, quæ febre „acuta succedente cessavit.“ Memorabilem etiam id genus casum F. HOFFMANNUS (d) narrat: „vir fere 50us ex suppressis per potum aquarum salubrium frigidum, & balnea hæmorrhoidibus podagram, & malum hypochondriacum, & spasticum sibi contraxerat, & . . . me in consilium adscito . . . „multum levabatur, ut etiam hæmorrhoides, „quæ

(a) L. c. ann. 7. Martii. d. 4. p. 410.

(b) Vide §. 104.

(c) Epidem. Libr. 4. Nro. 43.

(d) L. c. T. 3. S. 1. C. 9. §. 18.

„quæ diu substiterant, redirent. Cum ve-
 „ro paulo largius fluerent, enixe a me pe-
 „titi, ut profluvium compescerem, quod ta-
 „men constanter renui . . . sed æger inde
 „magnum periculum, ac debilitatem metu-
 „ens . . . ab extraneo medico me inconsul-
 „to medicinas fluxum supprimentes, quibus
 „opiata, & martialia immixta, impetravit,
 „iisdemque crebro usus est. Jam pulcherrime
 „omnia succedere videbantur; fluxus quippe
 „3tio die subsistebat, æger ambulabat sanus,
 „nihilque damni metuebat, ac residua phar-
 „maca per 4. adhuc dies ingerebat; sed nocte
 „concupiscentia letalibus opprimebatur symptoma-
 „tibus, ac incredibiles primum præcordiorum
 „anxietates, inquietudinem, & atrocissimos
 „ventris dolores per sentiebat cum arctissima
 „alvi constrictione, quæ nec clysteres admit-
 „tebat, tantoque erat vis morbi, ut omnia
 „antispasmodica, cinnabarina, & clysteres
 „oleosos eluderet, ac 3tio die, posteaquam
 „æger adhuc ira correptus esset, aphonia, de-
 „lirio, & convulsionibus funestum sortiretur
 „eventum. Facta postridie sectione vidimus
 „cum stupore non modo intestinum rectum;
 „sed & totum coli tractum in sinistro latere
 „ita contractum, ut digiti crassitiem vix su-
 „peraret, ventriculum inflatum, & in quibus-
 „dam locis inflammatum, ejusque cavitati se-
 „rum sanguinis putridum innatans; reliqua
 „omnia viscera bene constituta.“ Capitis sec-
 „tio non est concessa.

Perinde B. W. ROEDDERI (a) viro illustri hæmorrhoides cæcas perquam inflammatas, ac dolorificas hæctæ, cum interna temperantia, extusque unquentum de linaria cum oleo momordicæ in utrum ducta dolores non ocys abigerent, agyræ consilio unquentum de lithargyrio illitum, eos continuo sustulit; sed postridio phreniticus factus æger adeo furebat, ut rabidi canis instar circum se omnia morsu impeteret, ac larga licet Væ. Sne. facta, 3tio die extinctus est.

3. *Apoplexia.* TRAJANUS Imperator, ita id e D. CASSIO referente XIPHILINO (b) „a represso subito sanguine, qui quotannis „ipso per inferiora secedebat, in apoplexiam „incidit adeo, ut pars quædam corporis inde „resoluta esset; tandem autem in universum „hydropicus factus periit“ Haud secius J. G. BOETICHERI (c) „vir robustus 48 annorum sartor, & civis Hafniensis opulentus, „temperamenti cholericæ - sanguineæ - melancholici, animi morosi admodum, invidi, & „iracundi, ut a levissimis causis vehementer „commoveretur, ex improvise, cum a medicastro

(a) Abhandl. über F. HOFFMANN von der gewissen Vorherfügung des Todes in Krankheiten. §. 15. Anmerk. p. m. 70, sq.

(b) Epitom. histor. p. 350.

(c) Aët. nat. cur. Vol. 6. Obs. 40.

„castro. . . . hæmorrhoidum fluxus, quem
 „singulari naturæ beneficio utpote plethori-
 „cus, & per multos annos hypochondri-
 „cus, ordinate hætenus expertus fuit, ad-
 „stringentibus eidem suppressus fuit, apople-
 „xia satis vehementi non tamen prorsus fune-
 „sta corripiebatur, quæ dein adhibitis con-
 „venientibus remediis in dextri pedis paræsi
 „degeneravit, hacque quoâd maximam par-
 „tem sublata tanta tendinum istius pedis sub-
 „sequebatur rigiditas, ut sine summa mole-
 „stia incedere, & obambulare haud potuerit.
 „Oculi ipsius inde notabiliter minores evase-
 „runt, & intro quasi acti apparebant, hinc-
 „que torvus omnes semper intuebatur ob-
 „vios. Intemperantiæ admodum erat dedi-
 „tus; ideoque, quando vino inebriatus erat,
 „sæpenumero, & tantum non semper epilep-
 „siæ paroxismo graviter tentabatur. Acidu-
 „lis, & thermis Pyrmontanis . . . usus qui-
 „dem fuit; sed magno cum detrimento: si-
 „quidem tendinum, & nonnullorum
 „musculorum pedis rigiditas incrementum
 „non exiguum cum frequentius recurrente pa-
 „roxismo epileptico postmodum cepit; qui
 „antea, tametsi sæpius mero oneratus fue-
 „rit, non adeo vehemens, frequensque fue-
 „rat. Ad historiam morbi paulò accuratius
 „concupiendam recordari non pigebit, quod
 „priora pathemata hypochondriaca cum aug-
 „mento mali potissimum consistere deprehen-
 „derim in copiosis doloribus spasticis, circa
 „hypochondrium præcipue sinistrum, sese ex-
 „seren-

„ferentibus, molestissimo flatuum proventu,
 „intumescantiam sæpius renitentem efforman-
 „te, & ad suffocationem usque cum frequen-
 „ti tussi sicca, urgente, borborygmis multis,
 „tormentis colicis fere similibus, stricture
 „gulæ atroci & frequenti, cardialgia dira, &
 „pertinacissima alvi obstructione, quorum om-
 „nium intuitu solum phlebotomiam in pede si-
 „nistro institui curavi, sed & medicamenta
 „appropriata, ac ad hæmorrhoidalis fluxus
 „revocationem congrua exhibui: quibus etiam
 „morbi ferocia aliquatenus quidem mitigata
 „fuit; sed hæmorrhoidum beneficium nondum
 „conciliari, vel reparari, multoque minus
 „morbus tam inveteratus eradicari poterat.
 „Hinc fluidorum dyscrasiam tollere niteba-
 „mur, remediis alterantibus, cacochymiam
 „bilioso - acido - crassam, viscidam in primis
 „viis, & mesenterio stabulantem incidentibus,
 „præcipitantibus, abstergentibus, & evacuan-
 „tibus, vitia hepatis corrigentibus, prima-
 „rum viarum pariter, ac reliquorum abdomi-
 „nis viscerum spasticam stricturem tollentibus,
 „atoniam autem externarum partium auferen-
 „tibus, easque roborantibus, porro menin-
 „gium cerebri lætam oscillationem, indeque
 „dependentem totius systematis nervosi, &
 „omnium membranarum, fibrarumque motri-
 „cium partim irregularem contractionem spas-
 „modicam; partim etiam atoniam emendan-
 „tibus, & quidem in forma decoctorum, in-
 „fusorum, essentiarum, pulverum, & pilular.
 „non neglectis externis tonicis congruis ex
 „spi-

„spirituosis, oleosis, & balsamicis paratis, ac
 „subinde applicatis: hisque omnibus tandem
 „obtinuimus, ut pedis rigiditas non modo a
 „pristino rigore multum remiserit; ægerque
 „passim in civitate obambulare, suæque offi-
 „cia exequi potuerit; sed & paroxismus epi-
 „lepticus mitior evaderet, rariusque recur-
 „reret, quin & pathemata hypochondriaca
 „leniora persentiscerentur. Pulsus dextræ
 „manus interim durus, inæqualis, sæpe ce-
 „ler, sæpeque intermittens observabatur. Quo-
 „niam vero dissoluta, & inordinata vitæ ge-
 „neri, intemperantiæ, gulæ, & iracundis com-
 „motionibus nimium indulgebat, atque ab
 „hisce vitiis abstinere noluit, apople-
 „xia tandem subito extinctus fuit.
 „Hoc vero præsagium eo certius confirmare
 „potuit eventus, quo manifestius jam erat,
 „quod ob incrementum contractionis oculo-
 „rum, dolorumque pedis, & occipitis spasti-
 „corum, quin etiam ex levi quacunque oc-
 „cassione recurrentem epilepsiam, & pertina-
 „citer continuantem morbum inveteratum ab-
 „dominalem, depravata denique fluida, & pro-
 „stratum solidorum tonum totius machinæ
 „ruina proxime jam jam immineat.“ Perinde
 LANCISII (a) matronæ subsistens hæmorrhoi-
 dum fluxus apoplexiam, & apoplecticum quid
 HÆNII (b) ægro attulit. Soporosa inde

HOFF-

(a) Vide §. 115. Nro. 3.

(b) Ibidem.

HOFFMANNI (a) vidua facta est. Aptè huc etiam J. STORCHII (b) casus referri potest de cholerico 50 annis majore, præcoci iræ, & ad hæmorrhoides proclivi, qui finiente Martio 1729. crurum lassitudinem, & memoriæ imminutionem questus, retulit se ante 4 hebdomadas baryecoiā, & amblyopiam, ac paulo post anorexiam experiri cœpisse, & post 14 dies Væ. Sem. in brachio subiisse sine levamine. Suspiciatur Auctor hæmorrhoides vehementi ira fuisse suppressas, & ad caput regurgitasse, huncque sanguinis nisum Væ. Snc. brachii evasisse pertinaciorē. Frustra autem fuit omnis ad revocandas hæmorrhoides conatus: hirudines ano admotæ, Væ. Sio. in pede circa æquinoctia, ac solstitia facta pilular. BECCH. & ☿ antispasmod. assiduo fere usus, tum aquæ amaræ, ac Liebsteinensis potus nihil opis attulere. Quamvis enim appetitus, visus, auditusque aliquatenus redierint; memoriæ tamen labes mansit eadem. Exacto sic incassum fere anno æger ab aliis etiam opem poposcit, successu nihilo meliore. Tandem 1731. obiit, postquam ultimo vitæ semestri rationis, memoriæque prorsus impos evasisset. Funestiorē isto etiam historiam litteris prodidit, G. E. SCHMID (c)

de

(a) Vide §. 119. Nro. 5.

(b) L. c. ann. 7. Mart. d. 4. p. 86.

(c) Diff. sistens virum apoplexia extinctum ab hæmorrhoidum inconsulta suppressione 4to Altorsii 1723.

de viro aulico, 40. annum egresso, vinosoque, qui ducta uxore juvenicula incidit in uberem, diutinumque hæmorrhoidum fluxum. Accitus veteranus medicus idoneis remediis, ac diæta convenienti id præstitit, ut sanguis nec tanta jam copia, nec quotidie excerneretur, parumque abesset, quin fluxus ad menstruas redigeretur periodos. Sed festinatio uxoris virum perdidit. Clam illa ab alio medico remedia fluxum cohibitura adferri jubet, (in MRa. sapore ☉ ☿, ac terrâ catechu, odore etiam opium detectum), queis per 2 vel 3 dies usurpatis ita omnia e voto processere, ut æger ultimo convivio amicos adhibens abitum domum pararit; sed nocte insequente æger repente aphonia, convulsivo superiorum artuum tremore, ac stertore cum spuma oris correptus anum insuper tam arctè constrictum habuit, ut enema non admiserit. Paulo post exspiravit. Thoracis, abdominisque viscera omnia secundum naturam reperta sunt; solum intestinum rectum, ac potissima sui parte colon usque adeo viscebantur constricta, ut crassitiem auricularis digiti vix multum excederent. Harum partium vasa sanguinea protius vacua fuere; sed in tenuibus intestinis bina erant loca sanguine referta, ac velut inflammata. Sectio capitis non est concessa. In ultimo illo convivio cum vino æger abstinuerit, ciborumque parum admodum assumerit, ut a morte etiam ventriculus & intestina docebant; causa mortis non cibus aut vino, sed cohibito repente fluxui tribuenda

est. Si non idem, simillimus certe est casus hic illi, quem ex HOFFMANNO superius (a) dedi.

4. *Paralysis* vel ex apoplexia, vel per se, eaque vel partialis, vel alterutrius lateris HIPPOCRATES (b) „ex venis in ano (ait) sanguinem fundere solitis aliquantum apparentibus tenebricosæ vertigines obortæ parvam, ac sensim factam partium resolutionem indicant; ex quo liberat Væ. Siō. & quidquid hujusmodi apparere solet, mali aliquid denunciat.“ Apud HILDANUM (c) „septuagenarius quidam . . . a multis annis, singulis mensibus fluxu hæmorrhoidum laboraverat, cum vero tandem in decrepita ætate, & in hyeme suppressus esset fluxus, & æger vernum tempus expectaret, ut eas aperiri operam daret, en quadam die post prandium, cum rotam molæ circum volventem attente inspiceret, vertigine primo, mox quoque paralyti dextri lateris correptus fuit. Ego cum . . . hæmorrhoidales venas aperuisssem, suppressas enim esse probe sciebam) brevi ipsum restitui; quod alioquin in decrepita hac ætate, & tempore frigidissimo, vix fieri potuisset.“ J. D. GOHLIUS (d) narrat

(a) Vide præced. Nro. 2.

(b) Coacor. Nro. 346.

(c) De valetudine tuenda opp. p. m. 645.

(d) L. c. dec. 2. vol. 1. sect. 1, p. 29. sq.

rat medicum melancholico - cholericum 56 annorum ex motu hæmorrhoidum externarum nephriticum calculosum, aliquamdiu hæmaturia, & ischuria laborantem (quæ mala periodicè affligebant), spreto Væ. Snum. prophylacticarum consilio, tandem post modicam, sed insuetam vini Hungarici potationem in lassitudinem cum pressorio intra frontem dolore, tum balbutiem, frigus, ac denique hemiplexiam incidisse, urina, quæ hætenus diu, assiduoque cruore mista erat, sanguinis omnis experte facta, & 9no morbi die vera apoplexia obiisse.

5. *Spiratio difficilis*, ut dyspnœa; quam cum tussi sunt experti PLENCIZII (a) vir, & tinctor WEISZII (b); anxietates asthmaticæ, ut in GENSELII (c) viro; suffocatio orthopnoica, quam ad leviozem etiam corporis motum perpetiebatur STAHLII (d) vir; &c. Horum etiam numero accensenda venit, STORCHII (e) ægra, quæ cohibito magnis dosibus Væ Japonicæ fluxu in spirationis difficultatem incidit

(a) Vide §. 115. Nro. 3.

(b) Vide §. 124.

(c) Vide §. 62. b)

(d) Vide §. 84. c)

(e) L. c. ann. 5. Januar. d. 4. §. 3. p. 25. & von den Krankh. der Weiber. 8. B. Casu 48. p. 199.

cidit. Maxime autem dignus memoria est casus, quem G. E. HERMANN (a) observavit: vir 48 annorum, robustus, sanguineo-chole-ricus, in juventute crebras narium hæmorrhagias cum cephalalgia, & subinde scotomia vertiginosa pati solitus, Væ. Sbus., ac pediluviis semper ab his liberabatur. Postea laboriosam cum assiduís itineribus vitam amplexus 7 fere annis sanissimus vixit. Anno ætatis 31mo ditissimam nactus uxorem cum opipare, ac otiose vivere cœpisset, obesus, pletoricusque evasit: unde anxia insomniâ, facies ruberrima, gravitas, ac lassitudo artuum, vertigo, perfrictiones crebræ cum dyspnœa. V. Ses. cathartica iterata, temperantia, diætâ severior, & corporis motus pristinam restituerunt sanitatem. At cum post aliquot annos in curis, ac mœrore minus iterum corpus moveret, ex improvise incidit in spas- ticos dolores tensivos circa stomachum præsertim, & hypochondria. Tandem nescio qua sensatione in ano prægressa paucis post diebus completo 39vo ætatis anno, furentes hæmorrhoides enatæ sunt, quas cum sacculi herbarum resolventium cum camphorâ, suffitus, et unguent, de linaria discutere nequirent. Auctor sequens sibi sæpe expertum adhibuit remedium

R. Mu-

(a) Primit. phys. med. Polon. Vol. 3. p. 55. sqq.

℞. Mucil. fem. cyd. ▽a. sperm. ran. extr. ʒj.
 ℥ camphorati ʒij.
 Sach. ʒni. ʒj.
 Vitell. ovor. Nro. i.
 Olei. rofar. ʒj.
 Terebinth. pauxillum.

Interna data eccoprotica, & antiphl. temperantia. His æger prorsus convaluit, & abhinc sub ordinato dein hæmorrhoidum fluxu plures annos recte valuit; donec 45to ætatis anno post iram rediisset morbus cum sævo ani dolore. Hic sibi sine remediorum usu relictus nocte quadam disparet, ægerque asthmate corripitur: Mane coryza, tussisque urgent, exscreat viscida. Secta in pede vena, pediluvia, & enemata crebrius, adhibita tumorem aliqualem in ano revocarunt, cui ocyus hirudines admotæ. Ab his spirandi rediit libertas. Verum factis licet ad æquinoctia phlebotomiis, ac pediluviiis, idoneisque remediis internis usurpatis, ex lævi tamen causa renascebantur hæmorrhoides cœcæ, hæque consequebatur humorum ad pectus congestio; integris quidem cum viribus; tum appetentia. Horum æger impatiens opem alius mediçi implorat. Mittit iste pilulas ʒles, cinnabarinas, essent. varias ♂les, nec non species limaturam ♂tis continentes, pro decocto aquoso m. & v. hauriendo. His remediis, dissuadente licet Auctore, per triduum usurpatis corripitur totius corporis tremore, palpitatione cordis, sibilo pectoris, aurium

sufur-

fusurro, & aliqua mentis emotione. Abjec-
 tis ergo his remediis enemata, ac lenientia
 remedia morbum abegere, ægerque iterum
 convaluit; nisi quod ad finem usque 47. anni
 sæpe revocarentur hæmorrhoides cœcæ, &
 humorum ad pectus congestio. Tandem dum
 ob insignem calamitatem domesticam ira in-
 genti exarsisset, quo tempore tumebant hæ-
 morrhoides, repente palbutie & amnestia cor-
 ripitur, lapsuque temporis tanta memoriæ
 jactura secuta est, ut præteritorum vix recor-
 daretur; præsentia vero cum impotentia lo-
 quendi proferret, salvo tamen judicio. Cas-
 sus fuit omnis labor in obtinenda humorum
 ab encephalo revulsione, nec hæmorrhoides
 amplius seu cœcæ, seu fluentes redierunt.
 Post exactas ita 18 hebdomadas repente do-
 lores spasmodici ventrem, pedesque invase-
 runt, in dies increscentes cum pressione ad
 scrobiculum cordis, & alvina abstructione:
 quo facto post 8 dies pristina rediit & lo-
 quendi, & reminiscendi facultas; verum
 succedebat pedum tumor, insomnesque noc-
 tes extra lectum ducebantur. Sub initium
 quartæ hebdomadæ suffocatio coorta brevi
 mortem intulit. Felicior isto fuit J. STOR-
 CHII (a) vir corpulentus, 34 annorum, icte-
 ro colicæque alias obnoxius, & ab restitante
 fluxu hæmorrhoidali asthmaticus factus, quem
 tamen

(a) Obs. clin. ann. 8. Julii. d. 4. p. 545.

tamen auctor idoneis remediis pristinae restituit sanitati. In annalibus Vratislaviensium (a) vir juvenis 20. annis major, patre podagrico, matreque calculosa prognatus, post multas narium in pueritia hæmorrhagias, dein ex peregrinatione, ubi gravi febre acuta continua decubuit, redux uberem, ac per 3. annos fere quotidianum hæmorrhoidum fluxum nactus est, ægre, nec nisi variis tentatis cohibendum; cujus in 3tium jam abhinc annum non reversi locum varia capitis, pectorisque mala sensim successerunt, ac tandem etiam gravis raucedo, & paryecolia supervenit.

6. *Febres* omnis generis, videlicet

a) *Acutæ continuæ.* H. LUDOLFFI (b) vir macer, plethoricus, 40 annis major, vitæ sedentariæ ob studia deditus, internasque hæmorrhoides jam sæpius non sine insigni euphoria perpeßus, cum aliquando fluxum earum profusorem nactus fuisset, medicus illum simul, ac semel suppressit. Quo factò secutæ gravissimæ circa præcordia angustia, ac febris acuta, cum multa mentis perturbatione, quam post paucos suppressionis dies mors excepit.
Per-

(a) Tent. 23. A. 1723. Mart. d. 2. art. 1. §. 2.
p. 260.

(b) Diff. cit. §. 39. p. 23.

Perinde STAHLIUS (a) „in femina illustri hæ-
 „morrhoidales protuberantias, etiam externas
 „per aliquot annos adfuisse meminit, quibus
 „denique resiccatis, mulierum consilio, &
 „ausu persona ipsa cum febre acuta epidemia
 „corriperetur, facta metastasi ad splenem 7mo
 „die nigra copiose vomuit, & mortua est. Ha-
 „bitus erat valde sanguinei, mollis, teneri,
 „status plethorici, aliquoties abortibus in-
 „festata.“

b) *Chronicæ* lentæ, hæcticæ, intermit-
 tentes. Ita refert A. MARCELLINUS (b) e vi-
 vis excessisse VALENTIANUM Imperatorem,
 „arefactis ideo membris, quod meatus ali-
 „qui, quos hæmorrhoidas nunc appellamus,
 „observati sunt gelidis frigoribus concrevisti.“
 Meminit & STAHLIUS (c) senis 60. annis ma-
 joris, robusti, ac hæmorrhoidarii, qui humi-
 da, turbulentaque hyeme incidit in hæmorr-
 hoidum suppressionem, indeque in pathemata
 colica, convulsiva, asthmatica, inflationem
 ventris, cum nausea, & anorexia; queis
 paulo post, cum nil nisi potulenta sumeret,
 febris lenta se jungens hominem confecit.
 Haud multum ab hocce abludentem casum.

J.

(a) Diff. de hæmorrhoid. internar. motu. Cap. 1.
 p. 5.

(b) Lib. 30. p. 427.

(c) Colleg. casual. magn. Casu 14. p. 181. sq.

J. D. GOHLIUS (a) describit & LUDOLFFI (b) quoque senex a suppressis hæmorrhoidibus in melancholiam, febremque hæcticam letalem est prolapsus. Hujus quoque loci est, J. P. WOLFFII (c) observatio: consiliarius 72. annum agens, gracilis, cholericus-melancholicus, inde a juventute motui corporis, præsertim equitationi deditus, sanus, morbosque quosvis facile superans, ab his demum, & aliis gravioribus, oborto sponte sat largo, at ordinato hæmorrhoidum fluxu ad senium usque immunis præstabatur. Tunc vero a vita sedentaria fluxus sponte iterum desit, integro licet appetitu. Lapsa ita semestri, accedente item 6ta Octobr. gravi corporis perfrigeratione, & ira vehementi, senex subito horrore corripitur, dein æstu cum tussi, viriumque & appetitus jactura, contumaci alvi adstrictione, tumore ventris flatulento, ac dyspnœa. His insuper se junxere pressorius pectoris, & ventris dolor, difficilis tenacissimi muci multo sanguine grumoso misti expectoratio, virium in dies major lapsus, carniū insignis extenuatio, urina saturate rubra, pulsusque celer, ac debilis. Alvo enematis non obediente crevit morbus, febrisque 12a Octobris jam pro marasmodè habet-

(a) L. c. dec. 2. vol. 1. sect. 2. p. 61. sqq.

(b) Vid. præced. Nro. 2.

(c) Act. nat. cur. Vol. 9. Obs. 16.

habebatur. Accitus tunc Auctor potui dat
 aquam $\frac{1}{4}$ vini boni, & pauxillo elæofacchari
 citri acuatam assiduo, affatimque bibendam
 ad mucum, & alvum solvendam, æstum tem-
 perandum, ac vires erigendas. Ad dolores,
 flatusque dissipandos data hæc:

R. Empl. carmin, sylv. $\mathfrak{z}\beta$.

Ol. bacc. lauri expressi $\mathfrak{z}\text{ij}$. M.

Applicetur super ovali aluta ventri. Porro

R. Ω carminat. de tribus $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Liquor. anod. min. $\mathfrak{z}\text{ij}$. M.

Sumat ante prandium & cœnam gtt. 40.
 in potu. Pro facilitandis sputis, & dypnoea
 præscriptum

R. \bigcirc puri.

\square ri \bigcirc lati $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Cinnab. nat. gr. xv.

Liquirit. coct. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Ol. stillat. fœnic. gtt. iij. M. F. \mathfrak{z} .

S. m. & v. $\frac{1}{3}$ ex infuso theæ cum se-
 mine badianæ. Porro

R. ∇ x. rosar. & bugloss. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$.

— cinnam. cydon.

— veron. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Flor. benzoës.

Cinnab. nat.

\mathfrak{z} rad. irid. florent. $\mathfrak{a}\mathfrak{a}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Oxymel scillit $\mathfrak{z}\beta$. M.

S. alternis horis cochl. ij. Nox placido somno transacta, & 13a Octobr. melius habuit, pulsu facto tardiore, animo hilariori, levatisque symptomatis. Post insomnem autem noctem die 14a rursus debilitas erat major, siccissimum os, ac pulsus celerior. Prioribus ergo addita:

R. ♂ irid. florent.

— glycyrrh. aa ʒj.

Confect. alkerm. incompl. ʒʒ.

Sachar. canar. ▽a. cinnamom soluti ʒjʒ.

Clyssi ♂ii ♀rati q. s. ad grat. acorem

F. l. a morsuli ad siccitatem tollendam

R. ♀ lil. convall.

— Lavend.

— Matricar. aa ʒij.

℥ camphorati ʒʒ. M.

Ope quadruplicati lintei applicetur vertici, ac temporibus. Nocte inde placido somno exacta, sub diluculum diei 15æ nova iniquies, pulsus celer, siccum os, æstus cum siti major, pectoris pressio, difficilia sputa, variæ a flatibus molestiæ, & dysuria. Renovatum ergo in ventre emplastrum; thoraci vero impositum calidum cataplāsma e cepis in oleo olivarum frixis, & dysuriæ causa data MRa.:

R. ▽æ. cerafor. nigr.

— hyssopi sine vino aa ʒjʒ.

Scm. lycopod. ʒʒ.

⊙ depurat. ʒj.

Syrup. papav. rhœad. ʒijj. M.

S. sapius. cochl. ij. Ab his die 16a omnia symptomata emendata, lotiumque facile missum, copiosum, turbidum, ponens paulo post sedimentum roseum, ac furfuraceum, donec die 19a evasit naturale, conquiescente feбри, reversoque appetitu. Solis ergo nunc primis viis tonus restituendus superfuit. Idcirco in prandio vini puri modicum concessum; reliquo tempore aqua vino anaticæ mista cum elæosacch. citri Data MRa. tonica:

R. R̄æ. ⚔ii ☐fatae.

Essent. succin. aa ʒij.

— Centaur. min. ʒj. M.

S. ter de die gtt. 40. Die 24ta tantæ jam vires, ut $\frac{1}{2}$ die æger lectum reliquerit. Nocte tota dormiit. Ad saburram, si quam forte plenior victus causasset, data potio:

R. M. P. balsamicar. gr. xv.

☐ri. ⚔lati gr. viij. solve in

▽æ fl. acaciæ ʒj. Adde

Syrup. fl. persicor. ʒj. M. D. mane pro haustu. Cum nil præstaret, circa meridiem subjunctus ⚔ ex infuso theæ:

R. ⚔ rad. jalappæ gr. x.

⊖ Epsomens. ʒj. M. D.

Ab hoc octies deiecit cum levamine, ac sub prima mox scybalorum egestione hæmorrhoidum fluxus ultra semestrem jam suppressus
eru-

erupit, & in triduum duravit cum ea euphoria, ut nihil e morbo superfuerit, præter alvum segnem, & flatulentiam, quæ post aliquot dies redibant. Hinc, cessante fluxu ad alvum liberam servandam præscriptum

℞. Fibrar. rad. hellebor. nigr.

Rad. liquirit.

Polypod aa ʒij.

Fol. S. S. S. ʒvj.

Herb. meliss.

Herb. epithym. aa M. j.

Agarici. albiss. ʒiij.

Sem. foenic.

— anisi aa ʒj. M. concisa, contusa, & per aliquot dies quovis mane ʒij. in aquæ fervidæ ʒviiij. infusæ D. U. tepide, addito, si lubet, saccharo. Quotidie inde aliquot dejectiones cum euphoria. Mirum autem, ante fluxum hæmorrhoidis ptyalismum sponte accidisse, & ultra octo dies innoxie durasse, forte a morsulis; donec a sequenti remedio desit:

℞. ℞æ. ♂ii ♀fataæ.

Essent. cort. cascar.

℞. ♂. dulcis aa ʒij. M.

S. rer de die gtt. 40. Cum autem æger appetitui largius indulgens. Sine corporis motu, quem inclementia cœli morebatur interdum a pastu languorem, ac flatus pateretur. diæta parcior imperata sub usu sequentium remediorum.

℞. ℞æ. ♂. hellebor. WEDEL.

Essent. centaur. min.

— — trifol. fibr. aa dr. ʒij. M.

S. ante prandium, & somnum gtt. 40. ex vino. His convaluit, fluxu hæmorrhoidali denuo ordinate, ut prius, statis temporibus procedente.

7. *Alvus clausa* nulla interdum arte humana referenda, id quod vel insuperabilis intestini recti, anique spasmus, ut in HOFFMANNI (a), ac SCHMIDII (b) ægris anatome a morte detexit, & in BEHRENSII (c) literato perinde forte locum habuit, efficit; vel certe abolitio cavi in ano a vasis, & glandulis recti e cohibito sanguinis effluxu tumentibus, præsertim, si & siccitas intestini recti, & scybalorum simul durities ad id concurrant. In Annalibus Vratislaviensium (d) plethoricus quidam ab hæmorrhoidibus multas ad superiora regurgitationes passus, iræque admodum deditus, neglecta Væ. Snc. autumnali, ventris repletionem, tensionemque pati cœpit; inde tota, & febre acuta inflammatoria cum singultu non compescendo, ac tanta alvi obstructione laboravit, quam nec enemata acria, salina, lixiviosa, nec cathartica, nec nitrosa, digestiva, diluentia, aliaque idonea data,

nec

(a) Vide §. 55. Nro. 2.

(b) Vide ibidem Nro. 3.

(c) Vide §. 51. B. a) Nro. 1. §.

(d) Tent. 22. A. 1722. Novembr. d. 2. art. 1.
§. 4. P. 495.

nec externa vel emollientia, vel discutientia, camphorata referare poterant, ægerque demum inde periit. Sic etiam, referente J. B. ALBRECHTO (a) „verbi divini minister 60. „ferme annorum sub mensis Februarii finem „a. c. benignissimum experiebatur fluxum (hæ- „morrhoidum). Cum autem una cum quibusdam „amicis in convivio poculum vini valde fri- „gidum hausisset; alioquin satis tenax diætæ; „excretio statim turbabatur, quam ut promo- „veret, statim, nescio quas, pilulas absorp- „sit, quæ, ut eas gustavi, maximam partem „erant aloeticæ. Ubi etiam postridie in ve- „hementi illius temporis frigore cultui DEZ „publico vacabat; inde autem magis ægres- „cebat; ut illius finem facere cogeretur. „Loco autem quæsitiæ evacuationis : . . 12- „lis alvi obstructio sequebatur, ab intumes- „centia intestini recti; ut ea nullo modo nec „per clysteres repetitos; nec fomentationes, „nec V. Snem. in pede, nec internâ nitrosa, „antispasmodica, & resolventia, discutientia „tolli posset, sed die tandem 12mo mors se- „queretur. Monendum tamen est, obstructio- „nem quatrimum jam durasse; antequam re- „media legitima quærentur; cum interim „varia tentamina non defuisse videantur, qui- „bus ægroti status facile deterior reddi po- „tuit

(a) *Commerc. Nor. T. 10. A. 1740. hebdom. 38. p. 301.*

„tuit.“ Neque isto felicior fuit S. REISELII (a) faber ferrarius, robustus, 30. annis major ultra annum hæmorrhoidum fluxu gavisus, qui illi ligna in flumine colligenti ab aquæ frigore non multo post substitit cum tanta simul alvi difficultate, ut ani speculo aperienda fuerit, per quam modo purulenta egesta cum torminibus doloribusque; modo alvus plures dies clausa cum crebro tenesmo, donec lapidea scybala globulosa (lapides reapse domesticis credita) exprimerentur. Tandem remediorum, præsertim enematum, defectu æger totus emaciatus obiit. In thorace serum copiosum repertum, lævus pulmo accretus spumoso scatebat sanguine putredinem redolente; dexter flaccidus, maculosus, ac purulentus, nulla licet id tussi in vita doceretur. In cordis plane flaccidi thalamo dextro pendulus quidam globulus, pinguedini similis (an polypus?) & albæ quædam fibræ pingues inventæ; in sinistro nihil vitii. In abdomine coli flexus totum ventrem regens brachii fere crassitiem habuit; feces sat coctas librarum aliquot continens, & ad hepar usque porrectus; cetera intestina flatu fuere distenta. In recto autem ab ano usque multæ glandulæ $\frac{1}{2}$ digitum distantes circumcirca adnatæ vera erant alvi adstrictæ, ac purulentæ causa. Venæ fere vacuæ, in colo-

autem

(a) Misc. nat. cur. dec. 2, ann. 2. Obs. 117.

autem; & mesenterio turgidæ, crassæque, uti glandulæ numerosæ ac insignes. Vesicula felle vacua in hepate cetera sano. At non semper tam funesti est exitus alvina hæc obstructio; enim vero G. BAGLIVIVS (a) „novit hominem; cui ex hæmorrhoidum suppressione alvus suppressa, fecesque difficulter prodibant, solutis hæmorrhoidibus statim etiam solvebatur alvus.“ Perinde J. S. ALBRECHTI (b) vir quinquagenarius hæmorrhoidum fluxum alias benigne perpeffus, nunc, ex eodem uno abhinc anno cessante, obstructione alvi, tenesmo, doloribusque nephritico-cólico-hæmorrhoidalibus intensissimis, sitique misere debilitabatur, multas noctes extra lectum insomnes ducens. In hoc ægroto clysmata adigi nequibant; statim quippe repulsa: neque vel minimas fomentationes externe tolerare poterat æger, ob dolorum atrociam. Proinde solum emplastrum de cicuta, illi de meliloto mixtum, imponi tentabatur, in subsidium vocatis interne sibus temperantibus nitrosis, diluentibus simul, emollientibus; carminativis; interdum quoque propinata. BECCHER. pilularum dosi. Quibus tandem post 10. dies elapsos hæmorrhoidalis fluxus largus cum euphoria conciliatus fuit, cum antea lapilli aliquot

T 2

per

(a) De fibr. motr. spec. L. 1. Cap. 1. p. m. 378.

(b) L. c. T. 5. A. 1725. hebdom. 30. N. 1. p. 235.

„per urinam excreti fuissent, viciæ magnitudinem habentes.“

8. *Dysuria, ischuria*, perinde; ac alvi adstrictio, a spasmo sphincteris, ac vasorum hæmorrhoidalium in collo vesicæ infarctu oriundæ. Sic c. VATERUS (a) „novimus (inquit) „senem quemdam hypochondriacum ex ob- „structione, & suppressione urinæ a suppressis hæmorrhoidibus orta subito intra 3. dies „extinctum fuisse.“ Felicius res cecidit in „M. SEBIZII (b) senē decrepito, nonagenario „majore, qui intercepto hæmorrhoidum fluxu, in ischuriam gravissimam, valdeque dolorosam inciderat. Nam cathetere in vesicam immisso, non urina solum emanabat copiosa; sed etiam sanguis plurimus, & ab omni cruciatu liberatus fuit 2da aut 3tia vice „cathetere iterato.“

9. *Tumores variæ indolis*, ac sæpe miri, ab hæmorrhoidali sanguine alias ad partes regurgitante enasci solent, videlicet

a) *Ery-*

(a) Diff. de Hæmorrh. fluxu salut. & morbofo. (4to Witemb. 1717. Resp. I. H. BERGERO) thes. 6. p. 9.

(b) Diff. de urinæ suppress. Resp. M. A. SCHILLING. 4to Argentor. 1651. thes. 67.)

a) *Erysipelas*, *phlegmone*, *furunculi*, seu inflammationes, præsertim intestini recti, in fistulas facile abeuntes, ut superius (a) meminimus. Aliquando vicina loca, ac vel maxime vesicam inflammatio corripit. Sic J. HOFFERI (b) comes sanguineo - cholericus, ac spongioso laxus post 26. annorum militiam domum redux uxore ducta in graves, ac diutinas lites implicitus sub inordinato 6. rerum non naturalium usu sexennem hæmorrhoidum fluxum regularem 44to ætatis anno amissum, biennio impune tulit. Abhinc autem verno tempore in hypochondriaca incidit symptomata, quæ sibi relicta initio Novembr. dolorem sibi junxere circum anum cum sensu corporis duri, totum sphincterem cingentis, in dies usque adeo crescentem, ut æger omnia demum stando tantum exequi deberet, insomnis, lotiumque flammeum spissum reddens, cum tumore duro hæmorrhoidalium, ac spermaticarum venarum, donec insequente februario in gravissimam lapsus est cystitidem, cui scroti, ac penis inflammatio se jungens in gangrænam dextrum etiam inguen corripientem abiit, in læva autem nate abscessus sinuosus erupit, non sine gangrænosa labe. Operose sanatus ter adhuc cystitidis recidivam, nempe Octobr., Martio, ac Nemb. ex ordi-

nc,

(a) Vide §. 53. II. Nro. 7.

(b) Ac Helvet. Vol. 2. p. 50. sqq.

ne, perpeſſus eſt : abhinc ſanatus non amplius hæmorrhoidum fluxum recuperavit. Hepati quoque ſuppreſſio hæmorrhoidalis fluxus male cedere ſubinde viſa eſt, a qua letalem hepatitis J. STORCH (a), & J. G. ERNESTI (b) obſervarunt. Anginam quoque ex ſuppreſſis hæmorrhoidibus natam refert L. MERCATUS (c), & furunculos inde natos VICAT (d) in virgine curandos habuit.

b) *Absceſſus, Ulcera* non ani tantum, de quibus vidimus, verum & aliarum partium, ut articulorum viſcerum, &c. ex prægreſſa nempe vel acuta, vel chronica ibidem inflammatione. Sic vidit C. VATERUS (e) „in viro quodam . . . ex hæmorrhoidibus male curatis, & ſuppreſſis fiſtulam ingentem in „intestini ſuperiore parte per tunicas laterales in veſicam urinariam uſque penetrare, „tantæ magnitudinis, ut etiam feces alvinæ „ſimul cum urina tranſierint; ſiquidem in cadavere ipſius poſt mortem aperto totum fere „intestinum rectum una cum veſica urinaria „ſphacelatum, & perforatum repertum.“ J.

G.

(a) Obſ. clin. ann. 5. Febr. d. 4. Nro. 2. p. 56.

(b) Annal. Vratiſl. Tent. 29. A. 1724. Julii. d. 4. art. 3. §. 4. p. 41. ſq.

(c) De morb. intern. L. 3. C. 7.

(d) Vide §. 62. b)

(e) Diſſ. cit. theſ. 16. p. 15.

Æ. SOMMERI (a) vir suppresso, suspensa inter scapulas radice quadam cichorii radici simili, hæmorrhoidum fluxu debilitante, post semestrem nactus est in perinæo tuberculum, ex quo sponte rupto biennium egrediebatur sanguis cum pure seroso non sine gravissimo dolore. Multis incassum tentatis demum usu thermarum Pyrmontanarum ulcus coaluit, ac dein hæmorrhoides reversæ sunt, quamvis non raro superfluæ. Simile fere est, quod narrat G. E. SCHMID (b) de sene 60 annis majore, succulenti, spongiosique corporis, hæmorrhoidum fluxui æquinoctiali nullatenus molesto, ac totum pene mensem duranti, a multis annis obnoxio, quo aliquando per frigus, ac terrorem suppresso mox humor quidam cum dolore pulsante nascebatur in medio illo spatio, ubi coeuntes nates convalem formant, ita tamen, ut non accurate profundissimo in loco tumor emineret, sed in dextrum magis latus inclinaret. Post aliquot dies tumoris in medio alba efflorescentia maturum pus monstrabat. Cum nemo adesset ulcerum tractandorum peritus, fistula inde nata. Singularem quoque casum narrat, C. T. BURGHART (c) de puero 9num agente annum, sano hæctenus, nec narium hæmorrhagiis

(a) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 1. Obs. 42.

(b) Diff. cit. §. 10. p. 12.

(c) Satyr. files. medic. specim. 3. Obs. 7. p. 50.

hagiis obnoxio, nec unquam vel crustam lacteam, vel aliud exanthema cutaneum passio, qui ex improvise multum sanguinis floridi per aliquot dies iterato deiecit. Mater dysenteriam esse rata variis adhibitis remediis fluxum sistit. Sequitur mox partium circumjacentium inflammatio, ac dein venarum hæmorrhoidalium suppuratio. Ulcus, nescio quibus, remediis aliquanto post clauditur, sed hujus in locum circa poplitem dextrum alii abscessus, ac ulcera fœda pullulant; queis denuo sanatis, cœpere hæmorrhoides rursus quovis mense fluere, quæ, si consueto tempore non statim fluerent, continuo nascebantur vel in facie, vel circa poplitem tumores ex inflammatione pus colligentes; ægro pallido, debili, emaciato, non sine indubia secuturæ mortis prognosi. Utrum autem huc etiam referendum sit ulcus lumbare in viro quodam 32. annorum calculoso, ac hæmorrhoidum fluxum semel experto, ut vult J. D. GOHLIUS (a), viderint alii, siquidem illud & a calculo effici potuerit. Nec etiam satis liquet, num vomica pulmonum in M. E. BLOCHII (b). Ictérico sexagenario, in hæmorrhoidalis fluxus suppressionem ab ira lapsio, huic, an hæmoptysi, cui perinde obnoxius fuit, sit tribuenda, nisi forte & hæc ab illa sit orta, quod

(a) Aët. nat. cur. Vol. 3. Obs. 10.

(b) Medic. Bemerkungen Nro. 12. p. 11. sqq.

quod ibi diserte non refertur. At certe ab
 resistentibus hæmorrhoidibus bis phthisin ob-
 servaverat STORCHIUS (a), & W. VANLIL (b)
 meminit juvenis 19. annorum, prius valde
 plethorici, nunc temperati habitus, profusis
 narium hæmorrhagiis identidem obnoxii, quæ
 illum jam inde ab anno valde debilitarunt.
 Post varia incassum tentata ac Væ. Ses. com-
 plures jam in brachiis jam pedibus factas,
 Auctoris opem petiit, quo tempore utraque
 e nare uberrime sanguis fluebat, non guttatim;
 sed in filo, ad minimum corporis motum,
 donec in syncopen laberetur. Pallor, debi-
 litas, ac macies in juvene tunc præsens non
 ab ultima hac hæmorrhagia $\frac{1}{2}$ horam duran-
 te; sed a prioribus simul sumtis repetenda
 erant, proindeque & novissimam illam hæ-
 morrhagiam non plethoræ; sed vasorum la-
 xitati, ac sanguinis aquosæ tenuitati (qualis
 tunc excernebatur) tribuere oportebat. Cum
 nec turunda Ψ rectificato imbuta utrique in-
 trusa nari, nec injectio ichtiocollæ in aqua;
 & alcohole vini decoctæ hæmorrhagiam co-
 hiberent, interna quoque remedia dari cœp-
 ta, ac primum quidem Ω Oli ex ∇ a frigi-
 da, at sine ullo successu. Cortex Peruv. in
 substantia hæmorrhagiam quidem prohibere
 obser-

(a) Prax. casual. med. T. 1. d. 4. p. 164. 262.

(b) Samml. auserles. Abhandl. zum Gebrauche
 pract. Aerzte. 7. Band. 3. Stück. p. 440. sqq.

observabatur ; sed æger sub ejus usu magnum experiebatur in extremis manuum digitis pruritum , proclivitatem ad lipothymias, & alvi obstructionem ; licet istam eccoproticum datum promte sustulerit. Cortici ergo non satis opitulanti suffectus sequens ꝑis.

R. Aluminis ꝑß.

Sangu. dracon. ʒ. v.

Boli Armen. ʒj. M.

S. alternis horis , quantum digitale capit, ex aqua frigida. Primum quidem anxietates quædam, ac pressio in pectore inde nascebantur ; sed brevi cedebant pectoralibus remediis. Hujus ꝑis quinquies absumpti (ergo. ʒvj, & ʒij.) ulu hæmorrhagia desit, superflite porro etiam alvo adstricta. Post semestre belle exactum nactus est phlegmonen labii superioris cum febre. Cathartico e manna, & ⊖ GLAUB. alvus obstructa referata est ; labio impositum cataplasma resolvens, & supurationem promovens, qua post 6. dies procurata labium ad pristinam suam conditionem reductum est, & febris usui cort. Peruv. prorsus cessit. Juvenis tunc sanus, valentiorque esse videbatur ; at, lapso trimestri, toto corpore efflorescere parvæ pustulæ, quarum aliquæ suppurarunt ; aliæ rursus evanuerunt. Abhinc vero secunda valetudine fruebatur, & aliquanto inde post nactus est hæmorrhoidum fluxum, quem cum spreto Auctoris consilio ad illum non turbandum, empyrici cujusdam ope-

opera cohibuisset, incidit in hæmoptoen, ac phthisin immedicabilem, quæ post 8 hebdomades a cohibito hæmorrhoidum fluxu illum e medio sustulit. Denique non est hic silentio prætereundum, quod sua in chirurgia notavit olim F. WURTZ, nimirum externa quædam vulnera hæmorrhoidum suppressione evasisse incurabilia, dubio procul ob assiduum sanguinis hæmorrhoidalis regurgitantis ad illa affluxum.

c) *Scirrhi* e lento sanguine hæmorrhoidali ad glandulas, vel viscera congesto, quales F. RONCALLI (a) sacerdos in lingua ac sub maxilla. Ictericus Vratislaviensis (b) in hepate post suppressum hæmorrhoidum fluxum sunt adepti. In selectis medicis Francofurt. (c) narratur anus anno 60mo proxima mensium per ætatem deficientium in locum nata fuisse fluxum hæmorrhoidum regularem cum euphoria, quem tandem, ubi immodicus, ac debilitans, & pedum oedema causans evasisset, dum usu tonicorum, & refracta essentia millesfolii dosi cohibuisset, in dextri hypochondrii incidit tumorem, ac scirrhum hepatis, demumque emaciato corpore, ac fatiscentibus

(a) Histor. morb. 7. p. 36.

(b) Annal. Vratisl. Tent. 3. A. 1718. Martii. d. 4. art. 12. p. 837. sqq.

(c) T. 1. Vol. 2. art. 3. Obs. 1. p. 100.

bus sensim viribus e vivis excessit. S. R. E.
COHAUSEN (a) letalem inde ventriculi scirr-
hum enatum commemorat.

d) *Cancer*, e scirrho sensim enatus, ad
quem forte HIPPOCRATIS (b) observatio est
referenda: „Larissæ EUDEMUS valde & diu-
turnum patiebatur sanguinis profluvium per
„ora venarum, quæ sunt in ano (Græci hæ-
„morrhoidas dicunt), adeo ut exsanguis es-
„set, & bilis commota. Leniter tamen ha-
„bebat toto corpore, & alvus deorsum con-
„turbata biliosa demittebat, & hæmorrhoides
„remittebant. Post epotum medicamentum
„deorsum purgans probe repurgatus est, ac
„insuper ptisanæ succum ebibit, & amplius
„alvus turbabatur, dolorque ad præcordia
„aderat. In hoc hæmorrhoidibus manus est
„admota, cum male quodam modo affectus
„esset venter, & amplius curatione opus esset,
„ac vomitus afflixit. Tandem vero ex irrita-
„to medicamenti cancro febris adorta est,
„nec ante mortem dimisit. Interdum quo-
„que cum rigor subiens dimisisset, febris ad-
„fuit, ipsique ex alvo bilis secessit, flatus par-
„tim prodibat; partim intus remanebat, do-
„lorque ventrem affligebat. Hæmorrhoides
„vero

(a) *Commerc. Nor.* T. 43. A. 1743. hebd. 16.
Nro. 2. p. 125. hebd. 17. Nro. 2. p. 134.

(b) *Epidem. Libr.* 5, Nro. 20.

„vëro deinceps a purgationibus extrâ anum
 „emittere cœperunt, & per eas flatus exsiste-
 „bat, quia a sternutatione ortum ducebat.“
 Ceterum tota hæc historia manca est, & per
 obscura.

e) *Steatomata, atheromata*, apud H.
 BOERHAAVIUM (a) filius marchionis DESAINT-
 AUBAN a pluribus annis hæreditarias hæmorr-
 hoides sæpius pati solitus, ceterum longe sa-
 nissimus, cum eas aliquando prætumidas nac-
 tus fuisset, cum atroci dolore, ac uberrimi
 simul sanguinis purissimi ex iisdem in dies
 profluvio, non sine gangrænæ metu, BOER-
 HAAVE illas leni victu, pacantibusque reme-
 diis sine igne, ferro, ac ligatura sanavit, ab-
 hinc Marchio $1\frac{1}{2}$ anno mansit sanissimus; dein-
 ceptis vero steatoma sensim $10\frac{1}{2}$ menses in tho-
 race prope 7 ~~lb~~ enatum truculentissimam or-
 thopnoeam, demum etiam letalem induxit. Oc-
 tiduo ante obitum per biduum hæmorrhoids
 fluxit, cum insigni; at non diuturno morbi
 levamine Atheromatis autem e restitantis
 hæmorrhoidibus casum refert BOENNEKEN (b)
 senior: Ecclesiastes 57. annorum, choleri-
 cus, sanus, hilarisque, lucubrationibus de-
 ditus, virili in ætate hæmorrhoidum fluxum
 una,

(a) Opusculor. histor. 2. p. iii. 113. sqq.

(b) Fränk. Samml. 3. Band. 15. Stück. Nro. 3.
 p. 212. 1qq.

uina, alterave vice est expertus: hoc autem non amplius reverso, sæpius ani pruritus, lenisque ardor cum tenesmo accidit, donec post 48 annum homo cœpit morosus fieri, moestusque cum virium sensim lapsu. Hæc studiis, curisque auctis etiam in dies crevere, fatiscente sensim appetentia, & sibi obrepente, quam vino sedare solebat. Postmodo coxæ, dorsi que dolores, ac per vices flatus molestabant; color faciei floridus mutatus in pallidum, plumbeum, flavescentem. His aliquot annos durantibus se junxit segnis alvus. Demum post usum internorum, externorumque rediit hæmorrhoidum fluxus, at sine levamine: crevit potius tenesmus, ac dolor circa ossa ischii ad collum usque vesicæ excurrens; unde interdum dysuria. A variis iterum remediis breves tantum omnium induciæ obtentæ. Tandem fluxu hæmorrhoidum iterum cessante æger deterior factus, viresque fatiscebant; sed post trimestre ante æquinoctium vernali rediit immodicus fluxus, ne moderandus quidem. Aliquantum post sub scrobiculo cordis tuberculum ortum est cum præssione in dextrum usque hypochondrium se extendente, tactuque ibi hepar durum repertum. Accessit aliquoties vomitus ingestorum, & pressio illa crevit nullis remediis abolenda. Tandem natum œdema pedum, & febris hæctica cum vigiliis, donec æger obiit. In abdomine feri 2. vel 3. mensuræ. Hepar exterius ex fusco, ac flavo variegatum, mole ingens appendit ~~lib~~ x & 3j, mul-

mūltis tuberculis purulentis acuminātis in superficie inæquale, interna sua substantia tota fere in atheroma versa, ita ut cultro incisa vix guttam sanguinis præbuerit. In sima parte sinistri lobi, qua stomachum tangit, aderat tuber pugno æquale, conicum, apice in ventriculo foveam imprimens, totum atheromaticum, lævusque hic lobus trans ventriculum lienem attingens, cum eodem arcte concretus erat. Vesicula fellea semiplena liquido fusco, & crasso, bili parum analogo. In toto tubo intestinali, ac mesenterio passim sanguinis stases, & maculæ gangrænosæ, præsertim in fine recti, sed sine vestigiis ulceris. In abdominis aorta; vena portæ & cava paucus sanguis, omentum atrophicum. Cor vacuum, pulmones accreti. Cetera secundum naturam. Caput secare non concessum

f) *Sarcomata*. Singularem huius rei casum narrat M. ALBERTI (a): Ecclesiastes 58 annorum, cholericus - sanguineus, robustus, obesus, plethoricus, victu pleno, vinoque Hungarico usus, sanus hætenus, ante paucos annos hæmorrhoidalia molimina cum fuisset nactus, eaque fomento e radice acaciæ oppugnasset, rupta hæmorrhoidalia tubercula infig-

(a) Diff. de excrescentia nasi cum hæmorrhoidum anomaliis connexa (4to Halæ 1729. Resp. I. e. SCHIERWASSER) §. 2. p. 9.

insignem sanguinis copiam profuderunt. Ubi
 autem fluxus hic substitit, aliquanto inde post
 intensi nephritici dolores secuti sunt; his fi-
 nitis successit angustia; & oppressio cordis,
 quam superveniens narium hæmorrhagia sol-
 vit. Postmodo numerosa tubercula sanguinō-
 lenta in facie emersere, copiosum pus, ac
 sanguinem excernentia. Demum in lævo na-
 rium latere effloruit macula rubra; successive
 in protuberantiam elata; ad quam auferen-
 dam cum varia spirituosâ adhiberentur, illa
 brevi in grandem excrevit molem, pinnis na-
 rium firmiter adhærescens; dextram narem
 penitus ocludens, in sinistra vero exiguum
 tantum relinquens foramen, pro pauco mu-
 co excernendo, & aere, utūt ægre, attra-
 hendo. Tegebat illa simul totum os, & men-
 ti partem, ut & spirationi, & cibis, potui-
 que ingerendis molestiæ multum faceretur,
 substantia erat carnofo-vasculosa, extrinsecus
 rubra, & numerosis tuberculis verrucosis ob-
 fessa, cujus in mediotallo delitescibat pus in
 saniem jam inclinans, olim forte in cancro-
 sum virus abiturum. Huic malo insolita alvi
 obstructio juncta fuit. Post 3. annos demum
 ferro ablata non amplius recrevit moles: sub
 separatione sanguinis ultra libram effluxit.
 Post plagam ex arte con sanatam ob fluxum
 hæmorrhoidum non reversum gutta rosacea
 faciem non deseruit, & aliquo inde post tem-
 pore æger fieri cœpit spleneticus. Vexabant
 recursantes anxietates, ad præcordia insignes,
 cum pallore fugaci, & imbecillitate memo-
 riæ

riæ, pristinæ tamen diætæ suæ tenax mansit. Alium quoque idem hic Auctor (a) non multum abludentem adfert casum; literatus sanguineo-melancholicus post crebras olim narium hæmorrhagias inter 30, & 40 annum prima vice nactus est hæmorrhoidum fluxum, cui pro dysenteria habito; suppressoque successerunt insolitæ cephalalgicæ cum varosa nasi excresecientia; unde tandem cariosa verruca, valde sanguinolenta dextro in laterè nasi succrevit celeri incremento; præsertim a topicis cosmeticis; acribus, arrodentibus: donec Auctor consultus curam ad hæmorrhoidales motus dirigendo malum profligavit. Permutum hisce anologum est, quod J. S. CARL (b) memorat: viro melancholico-sanguineo, strictioris corporis, hæmorrhoides cæcæ, indeque dorsi, ani, & aliarum partium vagos dolores rheumaticos, arthriticosque sæpe passus; quovis æquinoctio nasi apex insigni cum rubore intumescerebat, leviterque dein compressus aliquot guttas floridi sanguinis profundeabat, cum omnium symptomatum vel abolitione vel insigni remissione. Status hic ubi bene a juventute ad 70um usque annum mansisset; demum desit, succedente impetiosa; & intra biennium letali hæmaturia.

g)

(a) Diss. de hæmorrhoid. insolitis viis (4to Halæ 1718, Resp. T. S. GANZLAND) §. 8. p. 17.

(b) Act. nat. cur. Vol. 4. Obs. 84.

g) *Varices* aliis in partibus, ab ano etiam remotioribus. Rarissimum hujus generis casum vidit A. G. RICHTER (a): „femina 30 circiter annorum, animo, & corpore valde sensibili prædita fluxum menstruum profusum pati solita, Göttingam venit, &, ut tumorem, quem in manua dextra habebat, exscinderem, rogavit. Tumor autem ille magnitudinis nucis juglandis, mobilis, & inæqualis erat. Descendebat ex illo tumore ad papillam series minimorum tumorum, quorum quilibet pisum magnitudine æquabat; sursum autem ex illo funiculus ad axillam procedebat, tensus, durus, digiti crassitiem habens, sensim prope axillam evanescens, ut finis illius distinguere haud posset. Quoties ægra tunc tumorem digitis comprimebat, & fricabat, profiliit ex papilla liquoris subrubri, aquosi insignis satis copia: quo facto evanuit series illa minorum tumorum, major ille mollis, flaccidus, collapsus 2/3 partes magnitudinis suæ amisisse deprehendebatur. Ad pristinam magnitudinem intumuit iterum intra paucas horas. Dolor oriri solebat urens, quoties tumor nimis intumescebat, expresso liquore, collapsaque tumore evanescere iterum. Quam ob rem quovis mane mulgere quasi tumorem ægrota solebat. Continebat ille plerumque

(a) Obs. Chirurg. Fasc. 3. Cap. 4. p. 63.

que §i. ∇ æ. illius subrubræ omnis acrimo-
 niæ, & fœtoris expertis. Funiculus autem
 ad axillam procedens idem semper deprehē-
 debatur. Is autem singularis hujus tumoris
 ortus fuerat: ante plures annos fluxum hæ-
 morrhoidalem profusum passam aliquoties se
 esse ægrota meminit, qui quidem cum vires
 valde exhaustiret, medicus quidam medica-
 mentum quoddam propinavit, quo sumto
 disparuit fluxus, neque rediit: hoc facto
 post aliquot tempus ægrota illam indussi
 partem, quæ mammas tegit, sanguine tinc-
 tam aliquando reperit, nescia, undenam huc
 sanguis pervenerit. Tandem vero forami-
 nulum illa detegit in cute prope papillam,
 ex quo liquorem rubrum prodire sentit.
 Tandem tumor ille apparuit, increascens sen-
 sim ad magnitudinem ovi gallinacci. Diu
 autem jam foraminulum istud aquam rubram
 cructaverat, antequam tumor ille apparuit.
 Elapsis autem aliquot mensibus subito tota
 intumuit mamma mirum in modum ad axil-
 lam usque. Rediit illa sensim sub interno
 cicutæ usu ad pristinam magnitudinem; su-
 persiste autem tumore illo, quem jam de-
 scripsi, nullo remedio discutiendo. Dispa-
 ruit ab hoc tempore foraminulum illud, &
 liquor ex ipsa papilla prodire incepit. Tu-
 morem illum scirrhosæ naturæ haud esse in-
 aprico erat; oriebatur sine dubio ex varico-
 sa valorum quorundam dilatatione; quare
 ægrota operationem flagitanti abnuī. Ex-
 scindi forsitan tuto potuisset tumor ille vari-
 colus

„cosus ; cum vero funiculus ille ad axillam
 „procedens fasciculus esse videretur valorum
 „simili labe affectorum , qui humorem illum
 „subrubrum advehebant , cumque funiculus
 „iste ob situm profundum , dubiamque ori-
 „ginem extirpari vix posset , metuendum fi-
 „ne dubio erat , ne post operationem vel fi-
 „stula remaneret , vel novus tumor oriretur.
 „Exhibui itaque ærotæ varia remedia resol-
 „ventia interna , externaque , ut quidquid for-
 „san callosi , & indurati dilatata hæc vasa cir-
 „cumdaret , dissolveretur. Horum remedio-
 „rum vi factum quoque est , ut imminuere-
 „tur tumor ille ; proſuvium autem ex illo
 „idem semper fuit. An non ex suppressis hæ-
 „morrhoidibus natus esse hic morbus vide-
 „tur ? commendavi saltem ærotæ usum vari-
 „orum remediorum , quibus fluxus ille resti-
 „tui potest ; quibus autem quonam cum effec-
 „tu illa usa sit , hætenus nescio

h) *Hæmorrhoides cæcæ , spuria.* Sæ-
 pissime omnino evenit , ut hæmorrhoidali flu-
 xui suppresso hæmorrhoides cæcæ succedant
 multis cum molestiis , ut in BURGHARTI (a)
 puero , viduaque HOFFMANNI (b) ac milite
 apud THEDEN (c). Spuriarum autem ex veris
 post

(a) Vide præced.

(b) Vide §. 108. 2)

(c) Vide §. 117. 2.

post fluxum suppressum enatarum præter DIE-
TRICH'S (a) etiam H. F. DELIUS (b) exemplum
suppeditat, vir 76. annorum, robustus, eu-
farcus, plethoricus, mansuetus, ad viriles
usque annos assiduus laboribus implicitus,
ante annos circiter 30. vitam quietiorem nac-
tus incidit in malum hypochondriacum & mo-
limina hæmorrhoidum, quarum ad fluxum
provocandum cum frustra varia usurpasset,
demonum usu thermarum carolinarum impetuo-
sus obortus fluxus illum sanum reddidit. Re-
dibat abhinc fluxus 6ta vel 8va quaque heb-
domade iusta copia, præsertim iterato per
plures dein annos ∇ æ. Carolinæ usu, ac Væ.
Sbus. ordinate institutis. Ante 5. circiter
annos fluxus fieri cœpit inordinatus, ac san-
guinis loco aqua rubella cum albo muco ege-
rebatur, non sine dolore dorsi, lumborum-
que; vertigine, ac sæpe turbato somno. Ite-
ratæ Væ. Snes. numerosa enemata, vino sus-
fecta ∇ a. & decocta, ac omni septimana
sumtum \ominus anglicanum ad $\mathfrak{z}\beta$. vel j. aut alia
salia media fluxum revocare nequiverunt; pe-
riit potius appetitus, vires, carnes; & ali-
quot febris intermittens accessiones ingru-
erunt. Dato autem vino iterum ac tonicis vi-
res, & valetudo nuperna receptæ. Ad cete-
ra

(a) Vide histor. 1.

(b) Fränk. Samml. 6ter Band. 32tes Stück. Nro.
2. p. 114.

ra vero symptomata abolenda bibit ∇ as. Seyd-
 schitzenies amaras; at sine ullo levamine,
 quin imo nimia ab iis catharsis revocavit de-
 bilitatem, ac vertiginem, ut ab ulteriori po-
 tu fuerit desistendum, & vires cortice Peruv.
 & aurant. reparandæ. Interea a tempore ∇ a.
 Seydschitzenis potæ 2. vel 3. parvæ ani va-
 rices 30 jam annis præsentēs cœpere nunc
 elongari, ac velut inflari, & in sarcomata nu-
 cem juglandem magna degenerare. Sitæ erant
 introrsum in anum, ac deorsum versus peri-
 næum; circiter $\frac{3}{4}$ pollicis pone sphincterem
 admodum relaxatum, ampliaturumque occipie-
 bat pedunculus durus, calamus scriptorium
 crassus, longitudine ultra $\frac{3}{4}$ pollicem in de-
 cursu extrorsum cum interna recti tunica con-
 cretus, extra sphincterem autem libere pen-
 dulus, & in sarcoma irregulare juglandis mag-
 nitudine intumescens, quod carni crudæ simi-
 le, ad sensum solidum; sed minimo tactu
 sanguinem præbebat, uti & sub incessu, & alvi
 egestionē; siquidem similis alia excrescentia
 minor ab ossis sacri regione descendens totum
 fere orificium ani præcludebat. Tumor hic
 non jam varix; sed condyloma (sine ullis ta-
 men syphilitidis indiciis) indolens erat, quod
 perpetuo madebat. Aeger appetitu, viribus-
 que, somnoque haud carens, cum sanari cu-
 peret, nescio quo Auctore sumit ter quoti-
 die $\frac{3}{4}$ cort. Peruv. 3j. cujus a 10. præbiis ve-
 hemens colica, alvus pertinaciter clausa, mag-
 nique febriles motus coorti, quæ mala non-
 nisi 4. hebdomadam spatio fortibus, enema-
 tibus.

tibusque domabantur, superstite tamen insigni debilitate, anique excrescentiis nil mutatis. Cum paulo ante dicta mala non a cortice nata crederentur; ad hujus usum reditum, sed pejore etiam successu; nam præter priora symptomata totius quoque corporis emphysema supervenit, abactum semper iterum revertens, nec ulla arte præpediendum, Sarcomata etiam ani in pejus ruentia plumbeum colorem, suspectumque odorem contraxere, nullis remediis emendanda, quæ demum æger una cum emphysemate, tumultu intulit,

10. *Exanthemata* varia, præsertim chronica, ut scabies, herpes, vari, &c. Sic W. GABELCHOVERI (a) caupo quamdiu per plures annos hæmorrhoidum fluxum rite, statisque temporibus experiebatur, sanus vixit; ubi vero ille cœpisset fieri inordinatus, ita, ut & insueto tempore, & parcior egeretur; molesta effloruit scabies, qua pruriente, dum se æger scalperet, mox effluebat aqua satis limpida. H. F. LEDRAN (b) consulebatur pro viro 50 annorum, a pluribus annis hæmorrhoidum fluxum statis temporibus pati solito; qui ubi ultimo biennio substitit; semestri post fusurum aurium causavit, suppuratione serum
lac-

(a) Curat. & Obs. med. Cent. 3. cur. 22, p. 35.

(b) Chirurgische Gutachten p. 244.

lactis æmulante sublatum. Abhinc autem effloruere in facie rebelles herpes cum furro sæpe alternantes. Similia quoque in capite nactus est BÆUMLEINII (a) vir. Perinde v. RIEDLINI (b) mercator 40 annorum, renuiorisque habitus a plurium annorum dolore cervicis per obortum hæmorrhoidum fluxum liberatus, isto deinceps sub quavis alvi egestionem apparente, longe sanissimus vixit; donec ætate obortis quavis fere nocte sudoribus fluxus hæmorrhoidum penitus evanisset: quo facto illico rediit cervicis dolor, & hinc inde per corpus exanthemata erysipelacea effloruere, quæ dum externo V usu dispulisset, itaque prægressa acetarium deinde comedisset; nox minus quieta secuta: mane vero vertigine primum, tum vomitu correptus est. Na bezoardica data utrumque sedavit, & pro revocando hæmorrhoidum fluxu data essentia ♂ LUDOV., incertum, quo successu.

II. *Hydropes* varii, de quibus HIPPOCRATES (c): „diuturnum sanguinis profusum per ora venarum, quæ in ano sunt (hæmorrhoidas dicunt), curanti nisi una seruerit, periculum, ne aqua inter cutem, aut
tabes

(a) Vide §. 55. Nrº. 13. d)

(b) Curar. med. millenario. Obs. 465.

(c) Sect. 6. Aphor. 12.

„tabes succedat“ Multi sane funestum huius effati exemplum præbuere, quibus importuna medendi methodo fluxus hæmorrhoidum fuit cohibitus; quos inter G. E. STAHLII: „Vir 40 annorum, habitus corporis sanguineo-cholericus, mutatione tamen diætæ ad melancholicum habitum declinantis, ab aliquot annis verno & autumnali tempore, post aliquot dierum asthnia humidum, & tussim, hæmorrhoidum internarum fluxum experiri assueverat, cum insigni de cetero euphoria, & sanitate satis exquisita. A. 1689 cum sub autumnum dysenteria grassaretur, & ex ipsa ejus vicinia aliquot funera efferentur, eo, que ipso tempore hæmorrhoides ipsi expedite; sed liberaliter procederent, vano metu, ne ab his in dysenteriam facilis fieret transitus, fluxum illarum intempestivo aliquot adstringentium usu simul cum copioso abusu nucis moschatæ præmature suppressit. Cessaverunt hac vice sine insigni incommodo. Subsecuto autem vere maturius coorta tussis cum asthmate intensiore gravius fatigant virum. Consulit medicum empiricum; qui modo opiatis; modo salibus volatilibus; modo regimine diaphoretico per calidiora brevi; sed forti exercens patientem, cum simul ipsi, ubi de hæmorrhoidum adsuétude sibi familiari admonuisset, respondisset, se vel maxime ab ipsis hæmorrhoidibus, utpote morbo eum curare necesse habere, citissime patientem in hydropem conjecit, qui impetuose prævalescens ab aliis medicis

„con-

„contemperatus, & leviter sublevatus post 3.
 „tamen quadrantes anni nonnisi morte cessa-
 „vit.“ (a) Idem etiam fatum habuit ejusdem
 Juvenis (b). Perinde F. LOSSII (c) virgo
 provectioris ætatis, cum pertinacissimam ca-
 tameniorum obstructionem crebro, diuque usu
 aloeticorum oppugnasset, incidit in immodi-
 cum hæmorrhoidum fluxum, quem ubi spre-
 tis idoneis, legitimisque remediis nonnisi to-
 picis adstringentibus repressit, in letalem hy-
 dropem est prolapsa. Haud secius J. J. ROLLÉ
 apud A. E. BÜCHNERUM (d) meminit factoris
 36. annorum, a 20 ætatis anno hæmorrhoi-
 dum fluxui ordinato obnoxii cum integerrima
 sanitate; at postquam biennii spatio 3na sem-
 per 7. hebdomades durante laborasset, eam-
 que remediis domesticis perperam suppressis-
 set, hæmorrhoidalis etiam fluxus substitit;
 unde enatum asthma periodicum, inflatio hy-
 pochondriorum, cardialgia, dyspepsia, calor
 lentus, oedema pedum, imo ipse hydrops,
 & e subsequente viscerum gangræna æger de-
 cessit. Felicior his fuit J. STORCHII (e). Ill.
 femina phlegmatico-cholERICA circiter 33 an-
 norum

(a) Confer. colleg. casual. mag. cas. 14. p. 184.

(b) Vide §. 53. III. A. Nro. 2. f).

(c) L. c. Obs. 26.

(d) Miscell. physic. mod. A. 1730. Aug. d. 2.
 art. 3. p. 1247.

(e) Von Weiberkrankh. 8. Band. Casu 12. p. 63.

norum, quæ post insignes uteri hæmorrhagias jam ab anno ægrescens demum in hydro-
pem pene conclamatum devoluta est. Cognito
vero, quod non multo abhinc aliquoties hæ-
morrhoidum fluxus apparuerit; ad huncce
promovendum data sequentia

R. \overline{R} æ rhei $\overline{3}\beta$.
— \square ri $\overline{3}j$. M.

S. mane quovis gtt. 40. Porro

R. Magnes. alb.
Crem. \square ri aa $\overline{3}j\beta$.
Specif. ceph. $\overline{3}\beta$. M.

Divid. in doses jx. Consulebatur insu-
per vapor lactis, cruribus, & abdomini ap-
plicandus. Ab his brevi sudor largus erupit,
minuebatur tumor, & hæmorrhoidum fluxus
crebrius venit. Deinceps usu \overline{R} æ \square ri, &
eccoproticorum sanatio est absoluta. Vixit in-
de femina 17. annis, ac tum ex angina in-
flammatoria periit. Ita etiam apud J. D.
COSCHWITZ (a) æger a suppressis hæmorrhoi-
dibus varia symptomata perpeffus, cum me-
dicus illorum provocationem renuens multo
potius

(a) Diff. de damnis, ex empyria medica oriun-
dis (4to Halæ 1728. Resp. I. C. EHRLICH)
p. 44.

porius molimina repressisset; incidit in hydro-
pem, non prius sanandum; quam hæmorrhoidibus revocatis.

12. *Dolores* variis in partibus, iis nempe similes, quos molimina hæmorrhoidum producere assolent (a): ut spinæ dorsi, quales pertulit æger FEUERLINI (b) & complures alii, maxime vero solennis hic esse consuevit.

a) *Cephalalgia*, cephalæa, hemicrania, aliive in partibus ad caput pertinentibus dolores. Cephalæam sane ALBERTI (d) Consiliarius; hemicraniam vero VICATI (e) virgo inde pertulit. In viro L. HEISTERI (f) suppressis hæmorrhoidibus successit hypochondriaca passio variis cum symptomatibus, mox in clavum degenerans. Huc etiam perrarus ille pertinet maxillæ dolor, quem J. H. DEGENER (g) in Ecclesiaste sanavit

b) *Car-*

(a) Vide §. 33.

(b) Vide §. 71. c)

(c) Vide §. 75. c)

(d) Vide §. 55. Nro. 1.

(e) Vide §. 62. b)

(f) Act. nat. cur. Vol. I. Obs. 161.

(g) Diff. de clavo hæmorrhoidali 4to Helmstadt.

1734. Resp. I. G. BAULBACH. §: II. p. 15.

b) *Cardialgia*, quam ab hæmorrhoidibus interceptis passi sunt ERNDTELII (a) quinquagenarius, & Centurio MOLLERI. (b)

c) *Colica*. Hanc M. ALBERTI (c) singularem observavit in sene 60 annis majore, „qui ante plures annos proximiores hæmorrhoidales motus, imo incipientes fluxus obtinuit, qui cum ob dolores pruriginosos, & quantisper ardentis viro molesti, & suspecti fuerint, ita permisit quo mediante unguento ex cerussa alba, & oleo præcipitato, bolo, oleo hypericonis, sperm. ran. &c. parato hæc molestia opprimeretur. Abhinc doloribus ischiadicis, & nephriticis, nec non Asthmate periodico corripì cœpit, quibus affectibus hæctenus per multos annos laboravit. Interim harum calamitatum levamen ex usu congruo Væ. Snis. sensit, sed cum per paucos annos in regimine, & reliquo vitæ genere variæ turbæ intercesserint, ita ante triennium æquinoctialibus, & solstitialibus temporibus hac colica affligebatur. Accidit vero, ut ultimo præterlapso solstitio denuo hæc colica, licet mitiori gradu, corripere, quæ tamen mox post alium pilularum STAHL:

„remi-

(a) Vide §. 74.

(b) Vide §. 115. Nro. 3.

(c) Diss. de colica hæmorrhoidali §. 7. Tract. de hæmorrhoid. P. 2. p. 192. sq.

remisit, posteaquam sub aliquot dejectionibus patiens aliquam quantitatem sanguinis hæmorrhoidalis evacuaverat. Præteritò æquinoctio eadem colica mitiori iterum gradu insultavit, posteaquam iterum eximius error in diætâ præcessit, qui liberiores hæmorrhoidum recursus impedit; sed accidit, ut non modo una vice, sed intra decursum 14 dierum quater hæc colica recurrerit, ultima vero vice ita extreme vehementer, ut metus mortis institerit.“ Perinde in Annalibus Vratislaviensium (a) vir 50 annis major, inordinato hæmorrhoidum fluxui obnoxius, & ab hujus per pravum regimen retardatione, asthmaticam præcordiorum angustationem, dolores dorsi, capitis obnubilationem, vertiginemque &c., ac demum suppressionem fluxus, indeque assiduam fere colicam, & arthritidem passus, Julio 1726: rursus vehementi colica prehensus est cum permagna artuum lassitudine, femorumque dolore, ita ut nervi (tendines) justo sibi breviores fieri viderentur, scalasque amplius conscendere requireret. Venter velut ab ingruente hydrope fiebat gravis: Sæpenumero in totius cutis superficie subita oriebatur formicatio; ac si semodius milii ab humero ad femora usque deflueret. Sub his malis æger emacia-

(a) Tent. 37. A. 1726. Julii d. 2. art. 1. §. 2.
p. 30.

ciatus, carens appetitu, somno, viribus; remedium tamen segnis usurpator. ALBRECHTI (a) quoque quinquagenarius ab hæmorrhoidibus interceptis colicos dolores est perpeffus, & apud F. HOFFMANNUM (b) vir 58. annorum post habitum plurium ante annorum hæmorrhoidum fluxum ante 4. annos subsistentem incidit sæpius, maxime brevi ante novilunium, in molestum sub egestione ani ardorem, quem excepit cephalalgia, & atrox colica cum vomitu, & pituitæ cruentæ rejectione. Væ. Sio. in pede circa ambo æquinoctia facta cum insigni semper symptomatum levamine, quin tamen recidivas arcuerit. Inprimis autem observavit, simul ac vel studiis se daret; vel meridianum somnum capite parum perinclinato caperet; protinus floridum sanguinem cum saliva effluere. Illud præterea cruentum sputum secutæ sunt plerumque pectoris pressiones, ac puncturæ ad lævam scapulam tendentes, sinistræ manus refrigerationes, gelidique sudores, sæpius etiam pedes invasit efflorescentia miliaris, quæ evanescens languorem corporis, ac sensum frigoris in pedibus, & dorso reliquit. Alius (c) læterius 62 annorum, corporis strictioris, compagis debilioris, diætæ tenax; at studiis, & quieti

(a) Vide §. 55. Nro. 7.

(b) Consult. & resp. med. Gent. 2. Cas. 15.

(c) Ibidem. Casu. 14.

quieti deditus, satis diu ante circa ambo æquinoctia hæmorrhoidum fluxum per aliquot sæpe menses inhærentem patiebatur; qui ante aliquot annos prava medicatione cohibitus, abhinc inordinate procedere cœpit, sæpiusque molimina tantum illius, maxime circa plenilunium, affligebant, nimirum lipothyriæ, constrictiones & anxietates ad præcordia, tensivi circa dorsum, ac hypochondria dolores, cruenta sputa, & crebræ colicæ. Sic etiam ultima æstate in plenilunio accidit, ut noctu repente ingens colica invaserit, quam anxia compressio ad cardiam; vomituritio, vomitusque ipsi exceperunt. Carminativis, enematribus; litu, & fotibus mollibus, ac discutientibus frustra adhibitis medicus colicam hæmorrhoidalem esse ratus, quod sine victus errore, & solenni turbis hæmorrhoidalibus tempore acciderit; consulit Væ. Snem.; ægro olim semper utilem: hanc cum alii medici, debilitatem virium causati, respuissent, crescebant interea omnia mala, ac paulo post supervenit vehemens horror; huic successit æstus, post paucas horas erupit sudor gelidus, & æger debili factus ac inæquali pulsus, ex hoc bidui morbo obiit.

d) *Ischias* J. STORCKII (a) vir 60 annis major cum ante 15, & amplius annos hæ-

(a) Prax. Casal. med. T. I. d. 4. p. 493.

hæmorrhoides Væ. Snc. in brachio turbasset,
ac suppressisset ; incidit in ischiadem utrius-
que lateris. Datum

R. M. P. BECHER ʒj.
— purgant. ʒß. M.

R. ʒ antispasm. ʒj.
Magnes. alb.
Arcan. dupl. aa ʒß. M.

Ab his dolor desit. Perinde (a) merca-
tor a restitante hæmorrhoidum per plures jam
ante annos habituali fluxu, incidit primum in
dorsi dolorem, qui inde in coxam commi-
grans, per totum femur, & crus ad pedem
usque excurrerat. Dato autem ʒ digestivo,
& cathartico c M. P. purg. ac BECCH aa ʒß
rediit hæmorrhoidum fluxus, dolorque desit.
Haud ita felici licuit esse I D. GOHLII viro.

e) *Podagra*. Hanc ex anomalia hæmorr-
hoidum ter nactus est FRITSCHIUS (b) reverso
illarum fluxu semper iterum cessantem, & P.
FORESTUS (c) refert Hollandiæ Præsidentem 50
annorum ab hæmorrhoidibus sibi familiaribus
suppressis, correptum fuisse tertiana, post 13.
insul.

(a) Ibid. T. 2, d. 4, p. 428.

(b) Vide §. 75 b)

(c) L. c. Lib. 29. Obs. 4.

insultus sponte iterum desinente; non multo autem post nova prehensum febricula incidisse in podagram, & chiragram vehementem, tres continuas hebdomadas durantem. Datum ei eccoprocticum ter, quater alvum solvit; & interposito decocti solventis usu denuo subjunctum multam evexit bilem; pedibus topica emollientia admota cum levamine. Demum alvo sponte soluta fluxus etiam hæmorrhoidum comparens brevi podagram, chiragramque sustulit, ab hoc tempore non amplius reversam. Perinde HOFFMANNI (a) vir a suppressis hæmorrhoidibus podagram cum passione hypochondriaca contraxit, in quam etiam prolapsus est senex HELWICHII (b), germanusque H. LUDOLFFI (c) 30 annos natus, sanguineo-melancholicus, plethoricusque, qui ab aliquot annis hæmorrhoidibus turgentibus sæpius vexatus excreto ex iis sanguine præclare levatus incidit in tertianam sere quadrimestrem, & ad omnia remedia contumacem; cui demum se junxit Oedema pedum genuumtenus. Tandem rheda per 16 milliaria vectus, & aliquot diebus vino Rhenano usus, pergente febre, mane quodam, oborto celeri alvino stimulo, semel, atque iterum sine ullo dolore egerit sincerum sanguinem: quo facto febris

(a) Vide §. 55. Nro. 2. Adde sq. f).

(b) Vide §. 55. Nro. 13. b).

(c) Diff. cit. §. 43. p. 25.

bris illico desit, pristinaque rediit sanitas. Sub uberiori itinere tertium quoque sanguinem dejecit, summo levamine. At mutato dein vitæ genere, statione, climate, post unum alterumve annum fluxus hic rursus desit, reversis tantum sæpius moliminibus spasticis, pressoriis hypochondriacis. Medicus non tam fluxum revocare; quam potius morbum omnem abolere medendo connixus, omnia symptomata exasperat: accedunt dolores dorsi, lumborum, hypochondriorum immanes, non multo inde post motus arthritici, ac denique acerrima podagra, pene funesta. Accitus alius medicus nulla amplius arte potuit hæmorrhoides revocare, & quamquam symptomata subinde mitigarentur; morbus tamen mansit: donec æger petechiis correptus e vivis excessit. Dignus quoque memoria posterorum casus existat apud H. BOERHAAVIUM (a): anus Hiberna 62. ætatis annum agens, post juventutem hilarem, ac tranquillam, sub salubri corporis motu transactam, ad 30 usque vitæ annum nullo tentata morbo, abhinc sæpius colica hysterica laborare cœpit. Paulo post catamenia penitus substituerant, horumque loco hæmorrhœis periodice fluxit. Evenit 13 circiter annis, post violenta quodam exercitia, ut hæmorrhœoides ovorum instar immaniter tumuerint cum summis cruciatibus; cumque

topi-

(a) Consult. medicar. Vol. 2. Casu 24. p. 99.

topicis! admotis intropulsæ, suppressæque fuissent, continuo podagra ægram prima tunc vice aggressa est, a qua liberari deinceps non potuit, valedixit dein solitis exercitiis; unde plethora nata, ac postmodo scorbutus. Aliquando latiores maculæ rubræ, velut a moribus pulicum, toto corpore apparentes, intra 4. vel 5 dies denuo disparebant: ægra doloribus nunquam magis libera erat; quam præsentibus his maculis. Podagra binis præteritis annis nullam corporis plagam intactam reliquit, sed caput inprimis, ac stomachus patiebatur; hinc anorexia, ac post esum subita regurgitatio, & sæpè bilis puræ vomitus insectus, demumque stomachus nihil, ac ne bis coctum quidem panem ferebat, excepta panatella vin. stomach. julepis carminativis, ac spirituosus liquoribus. Inducias dolorum tabaci fumus maximopere adferebat. Nuper indomabilis pruritus tota in cute vexavit, subnascentibus hic illic superficialibus ulcusculis. Consultus Auctor præscripsit quidem remedia; sed eventus quis ab iis fuerit, haud constat.

f) *Arthritis, rheumatismus*. Illa plerumque vaga esse solet, raro fixa, qualem ALIX (a) in se ipso; tum ALBERTI (b) juvenis, &

(a) Vide §. 71. f).

(b) Vide 115. Nro. 3.

& vir GENSELIJ (a) a suppressis hæmorrhoidibus perpeffi sunt. Perinde P. MONAVIUS apud CRATONEM (b) conquestus est; se a suppressio hæmorrhoidum fluxu in arthritidem incidisse, & I. C. STUNZER (c) curandam habuit anum pene sexagenariam, quæ quoties hæmorrhoidum fluxus emanfit, universali arthritide corripiebatur, P. E. DILLENII (d) plebejus 40 annorum sanguineo - cholericus nactus est cœcas hæmorrhoides. Chirurgus tumori dolenti applicat unquentum nephritico anodynum: unde tumor in ano disparuit, sævusque dolor evasit mitior, circa os sacrum tantum jam restitans; sed atrocior, pedes, brachia, nuchamque periodice invasit; ita ut iste gravior fieret, quo prior circa os sacrum mitior evaserat. Arthritis erat vāga. Larga in talo pedis Væ. Sone. balneo vaporoso, vesificantibus ad brachia, & externo & theriacalis camphorati usu, interne vero diaphoreticis, refrigerantibus, cinnabarinis, & anodynis datis æger convaluit intra 14 dies. Externe & dictus; interne MRa simplex plurimum profuere. Perinde F. LOSSII (e) matrona juvenis, sedentariæ vitæ, sabulo rhenum,

&

(a) Vide §. 62. b)

(b) Epist. 236.

(c) L. c. p. 61.

(d) Misc. nat. cur. cent. 7. Obs. 53.

(e) L. c. Obs. 24.

& leucorrhœæ obnoxia, post enema, dein catharticum, tum brachii phlebotomiam, demum apozematis purificantis, eccoprotici usum, denuoque venam pedis tufam, ac tandem jura aperientia, lenientiaque, interposito rursus cathartico, ubi ∇ as ♂ les haurire cœpisset, a prioribus quidem malis minus passa est; sed hæmorrhoides cœperunt dolere, dein fluere, ita ut per aliquot annos sub quavis dejectione sanguinis ad $\text{℥} \text{iiij}$, ac plures excreverit: unde minus vegeta, & pallida evasit. Tandem fluxu sponte cessante ab arthritide sæpius affligebatur. Apud F. HOFFMANNUM (b) vir sanguineus 47 annorum laute; sed sub mobili vita nutritus ad 30 annum sanus, dein ex assidua sessione, & lucubrationibus incidit in angustam spirationem; meteorismum, tormina, & ossis sacri dolores; quæ arte provocatæ hæmorrhoides sustulere, abhinc 10 annis quovis mense affatim fluentes, interdum etiam cum diarrhœa. Istam ante 7 annos pota ob imbecilitatem stomachi ∇ a sedlicensis effecit annuam cum virium jactura, nonnisi ∇ a Egrana dein cum vino sub epulis pota sedandam, sed simul hinc turbatæ hæmorrhoides: unde podagra periodica nata, cui ante biennium depulsæ successit arthritis vaga, & huic demum etiam ante semestre desinenti contumax oculi dextri ophthalmia cum ejus lateris hemicrania, post

octo

octo dies lævum in latus commigrantes, atque hinc post 14 dies in dextrum iterum latus redeunt, quæ alternatio fere singulis 14 diebus accidit. Varia his malis medicatio facta, vario perinde successu. Ejusdem (α) femina 50 annis major post menses penitus amissos ante 2 annos enormes quandoque uteri, anique hæmorrhagias perpeffa, ubi ab his phlebotomiis, remediis temperantibus, antispasmodicis, leniterque diaphoreticis, & infuso millefolii, libera evasisset, procedente tempore incidit in dolores ischiaticos, & lumbares, nec Væ. Se. nec ecëoproticis, nec temperatis diaphoreticis, nitrosisque leniendos; donec sponte loco mutato mox ad scapulas, & pectus, mox ad gentia transirent, indeque in pristinam denuo redirent sedem. Calculorum quoque interdum excretiones cum latio molestæ successerunt, calculosis, rheumaticisque doloribus crebrius alternantibus, qui tamen a motibus animi, ac varietate tempestatis semper acerbiores facti ægram ita afflixere, ut & vires, & carnes decesserint, malo jam ultra annum durante. Notatu vero dignum fuit, quod cum ægra ad leniendum aliquatenus assiduum, & gravem lumborum, & coxarum dolorem situm dorsi curvum sibi elegisset, inferiorum dorsi vertebrarum ligamenta usque adeo relaxata fuerint, ut illæ

e

e situ suo quodam modo protrusæ præmirent, & ipsa sine dolore erecta incedere vix posset. Sollicita dein Auctoris ope ægra pristinam recuperavit sanitatem. Apud eundem (a) Causidicus, 30 annis major, gracilis, at fibrosus, ultra 15 annos pene singulis mensibus hæmorrhoidum fluxum habuit, toti suæ familiæ ita solennem, ut non modo uterque parens eum continuo pateretur; sed liberi quoque, imo & feminæ circa 12 & 15 annum, rite licet fluentibus catameniis, eidem essent obnoxie. Hoc fluxu a 4 mensibus non reverso insignis animum, corpusque languor invasit, simulque dolor tensivus, & constringens in sterno; ac thorace cum frigore, ac spiratione præsertim a motu difficiliore, & alvi segnitie est obortus; 4. Væ. Sbus. pedis non abolendus. A fortiori autem corporis motu cum aliquando fluxus, exiguus licet, rediisset, omnis ocysus dolor, ac molestia desit, non sine sensatione calidi cujusdam humoris a thorace ad pelvim sensim descendentis, cessante autem fluxu dolor pristina loca repetiit. Haud multum ab similem historiam narrat J. J. FORTIS (b) de Abbate annum 51 agente, parentes hypochondriacos nactus, qui ipse multis abhinc annis malo hypochondriaco obnoxius a moderato quandoque hæmorrhoi-

(a) Ibid. casu 8.

(b) L. c. Cent. 3. Conf. 11. p. m. 328.

hoidum fluxu oborto levabatur. Post graves autem animi motus incidit in immodicum hæmorrhoidum fluxum cum lipothymia; quo suppresso statim supervenit intensissimus lævi thoracis dolor maximo cum fervore, ac dyspnœa, lotioque multo, crudo, aquoso. Sedato dolori successit febricula levis, imo vel 2do die iterum soluta, omnia hæc mala ter rediere, & quidem semper ab animi pathematibus cum pondere quodam in anno ad perinæum usque protenso, dolore dorsi, & stomachi imbecillitate.

13. *Hæmorrhagiæ vicariæ* omnis fere generis; quæ inhibitum hæmorrhoidalem fluxum refarcire solent, cujusmodi sunt inprimis.

a) *Narium Hæmorrhagia*. Duò ejus luculenta exempla narrat M. ALBERTI, ac primo quidem loco (a) tabellarius 46. annorum, sangüineo-melancholicus juvenis crebras narium hæmorrhagias passus, dein multis itineribus deditus; dum hyeme quadam domesticam rem proëurat, externas nactus est hæmorrhoides, quæ post paucum fluxum iterum desiere. Insequente hyeme cœcas adeptus hæmorrhoides cum gonagra, & ischiade, simplicia tantum usurpavit auxilia, artificiosis abstinens; vere autem peregre profectus, post
vini

(a) Diff. de insolitis. hæmorrhoid. viis. §. 16.

vini Thuringici in via potum, dolorem pul-
 satilem, ardentem, & lancinantem externum
 circa anum in distantia 2 digitorum latorum
 sensit, demumque sub alvi defectione inter
 eundem urgente, in loco dolente perruptio
 spontanea accidit; & ad venulam in superfi-
 cie loci affecti sitam per aliquam moram satis
 insignis sanguinis quantitas guttatim effluxit,
 summa cum euphoria; fluxuque dein sponte
 iterum cessante homo abhinc nunquam am-
 plius vel hæmorrhoides cœcas, vel dolorem
 coxæ, genuve passus est; sed hæmorrhagiæ
 narium aliquoties iterum per annum, præser-
 tim vere, & autumnio, succedebant, queis
 sub negligentiori diætâ, & regimine intermit-
 tentibus vel erysipelas capitis, vel acer rheu-
 matismus nascebatur. Alter (a) „Parochus
 „ . . . 30 annorum, sanguineo-melancholi-
 „cus, ob frequentiorẽ usum vini Hungarici
 „hæmorrhoidarius redditus; qui vero incon-
 „grua diætâ hoc hæmorrhoidale negotium
 „turbavit, abhinc narium hæmorrhagias, quæ
 „in pueritiâ ipsi familiares fuerant, repetitas
 „expertus fuit; quas vero utpote in officio
 „suo molestas . . . cõhibuit. Inde tubercu-
 „lum sanguinolentum in extrema narium su-
 „perficie obtinuit; quod frequenti compres-
 „sione adeo irritatum fuit, ut in majus con-
 „crementum transierit. Id ipsum vero, dum
 „Væ.

(a) Diss. cit. de excrescentia nasi &c. §. 4. p. 17.

„Væ. Snes. repetitæ in pede institutæ, hæ-
 „morrhoides denuo revocatæ, & in ordinem
 „deductæ, & tandem desiccativa remedia ex-
 „trinsecus, nec non revulsoria alia admini-
 „cula applicata fuere, iterum successive eva-
 „nuit; licet jam in satis magna mole exstite-
 „rit.“ Pari modo ab hæmorrhoidum suppres-
 sione narium hæmorrhagiam SCHURIGII (a)
 vir, ac SCHWERDTNERI (b) pater perpeffi sunt.

b) *Palati* quoque e venis profluvium san-
 guinis ab hæmorrhoidum interceptione litera-
 to ZETTERMANNI (c) accidit, & C. HELWI-
 CHII (d) viro annum 30 ætatis agenti, san-
 guineo-melancholico, qui in Itálico itinere
 ex abusu generosi vini 27mo ætatis anno hæ-
 morrhoides nactus fluentes; ubi eas supprimi
 sivit, abhinc jam gravativo circa sacrum os
 dolore, jam spasmis vagis; jam gravibus an-
 xietatibus, imo & lipothymiis; aliisque ma-
 lis afflictus est; donec aliquo post tempore
 lancinantem primum circa uvulam dolorem;
 ardoremque sensit, quo brevi iterum desinen-
 te aliquanto post per biduum sanguinem scre-
 avit sensim, & per intervalla citra ullius af-
 fec-

(a) Vide §. 133. a)

(b) Vide §. 104.

(c) Vide §. 108. b)

(d) Miscell. nat. cur. dec. 3. ann. 9. Obs. 118.
 p. 214.

fectus indicia. Variis adstringentibus adhibitis efficere nequivit, quo minus hæc oris hæmorrhagia aliquoties rediret circa illas ipsas lunæ phases, quibus antehac hæmorrhoidalis fluxus contingebat. Veri quoque est simile, propolam AMATI (a) huc perinde, non ad hæmoptoicos, esse referendum. Luculentissimum autem hujus commatis casus memoriæ prodidit J. W. F. BOENNEKEN (b): faber ærarius 49. annorum, cholero-sanguineus, nullis vel hæmorrhagiis, vel morbis periculosis obnoxius, serius & levia scorbuti symptomata sentire cœpit, & conqueri simul interdum de doloribus lumborum, anoretica flatulentia, & alvo obstructa. Cœcas insuper hæmorrhoides, interdum & stillantes cum acerrimo tenesmo experiebatur. His autem, nescio cur, réstitantibus cum aliquando ex itinere frigido, nebulosoque rediisset, salivam cruentam sputare cœpit: quod malum cum a collutoriis stipticis potius invalesceret, inspecto postridie ore, visebatur linguæ apex & latera, gingivæ, velum pendulum turgidissimis varicibus undique obsessa, ac sanguis non ex his modo; sed etiam raninarum finibus copiosus profluere; imò & ex linguæ superficie leviter pressa, velut e madida spongia sanguis floridus egrediebatur, ac, si quæ varicu-

(a) Vide §. 115. Nro. 3.

(b) Act. nat. cur. Vol. 8. Obs. 41.

riculæ creparent, novæ mox succrescebant.
 Porro toto corpore præsertim in pedibus,
 ac pectore rubicundæ, scorbuticæ petechiæ,
 in brachiis vero maculæ latæ, lividæ, dolo-
 rificæ adfuere. His omnibus febriles motus
 se junxerunt. Sanguis e pedis vena educ-
 tus, ubi coivit, lividus erat, viridis, gelatinosus,
 crusta tenaci, velut corio, coopertus. Væ.
 Snem. syncope ter, quater secuta. Cum bina
 collutoria adstringentia sanguinem non cohi-
 berent, revulsio, & hæmorrhoidum revoca-
 tio tentata acriori enemate; sed latentes in
 recto intestino flatus minimum ejus admise-
 runt. A meridie diei 3æ cum ad compescen-
 dam oris hæmorrhagiam nec novum colluto-
 rium, nec Æs temperantes, nec litus antisepti-
 cus, nec ptisana hordei cum scordio quid-
 quam opis ferrent, nec dolores faucium, ac
 tonsillarum externis epithematibus lenirentur,
 media nocte spongia marina cocta semicircu-
 laris figuræ collutorio imprægnata ac linguae
 subdita hæmorrhagiam paulisper minuit, ac
 horæ somnum procuravit; sed a cohibito in
 vasis sanguine lingua plus tumuit cum dolo-
 rifico, & quasi igneo ardore, ac rigiditate.
 Diei 4æ mane spongiis suffecti sacculi ex her-
 bis vulnerariis, & adstringentibus, datumque
 eccoproticum, quo bis alvus mota. A meri-
 die læto omine dolor in lumbis obortus cum
 tenesmo: ad promovendas igitur hæmorr-
 hoides injectum enema, & pro sacculis oris
 linteola stiptico liquore imbuta pro obvol-
 venda lingua adhibita, hæmorrhagiam oris

paulatim cohibuere. Interne data MRa. e temperantibus, diapnoicis cum opio. Circa $\frac{1}{2}$ noctem febriles motus orti mane iterum desiere. Pro inflammatione veli, & uvulæ pene gangrænescente præscriptum gargarisma antisepticum. Mane diei 5æ datæ $\mathcal{R}æ$. rhei ∇ sa. ʒiij. cum liqu. ∇ æ. fol. \square ri. ʒj. alvum semel moverunt, & a meridie hæmorrhoids stillare cœpit: idcirco iterata enemata. Subortæ autem tunc dysuriæ, & ischuriæ occursum $\mathcal{R}a$. \ominus . \square ri. & fotu e fl. samb. & chamom. in lacte coctis ano, perinæoque admotum, quo fluxus hæmorrhoidum redditus uberior somnum etiam accivit. Die 6a nonnisi tenax mucus vix ullatenus cruentus excreabatur; rursus ergo datæ $\mathcal{R}æ$. rhei ∇ sa. ʒvj. pro dosi, & ad assiduos lumborum dolores mitigandos imperatus usus infusi e millefolio, adianth. alb., cort. citr., & sem. fœnic. Hodie primum a lingua, palato, & gingivis corruptæ partes abscedebant, & mundificatio occepit non sine dolore, & ardore partium læsarum, cui perinde provisum. Sub noctem febriles motus graviores non insalubres coorti. Die 7a rursus $\mathcal{R}æ$. rhei ∇ sa. ʒß. exhibita, præter infusum lenissime diureticum. Hodie screatus mucosus, & maculæ illæ scorbuticæ pallidiores. Vesperi ad præcavendam febrim data MRa. antipyreta. Die 8vo desit oris, anique hæmorrhagia, curatio ulterior ad oris ulcera, vires & scorbutum directæ, ægerque con sanat. Minus vero molesta fuit id genus hæmorrhagia palati in j. c.

SÜNDELLI (a) viro mediæ ætatis, a juventute tubercula in ano jam plus : jam minus tumescencia gestante, at sine ullo molesto symptomate. Horum nonnulla cum aliquando solito magis intumuisse cum vehementi dolore, omnia quæque topica eludente, maximum ex iis aperiri jussit : quo facto egressus mediocri copia sanguis coactus illico dolorem solvit, simulque præter apertam varicem aliæ quoque duæ collapsæ sunt. Post aliquot hebdomadas in medio maxillæ superioris pone dentes incisivos ex vena eadem sponte rupta sanguis scaturiebat, semelque tam ubertim, ut hiatus linteo carpto fuerit obturandus. Nullus vel oris, vel capitis præibat dolor. Fluxus triduum durans, sua semper iterum sponte conquiescebat superstitè in loco vesicula, quæ post 6. vel 8. horas rursus crepans, novam causabat hæmorrhagiam. Desinens postmodo malum in biennium jam non revertit, neque etiam intra hoc tempus anni tubercula tumescebant.

Aurium e meatibus enatam ab hæmorrhoidibus interceptis hæmorrhagiam raro exemplo refert S. LEBELIUS (a) : eruditus juvenis 30 annorum, hypochondriacus, continuæ alvi constipationi obnoxius, 4to tantum quo-
vis

(a) L. c. 15. Beobacht. p. 70.

(b) Miscell. nat. cur. dec. 3. ann. 5. Obs. 265.

vis die desidens, menstruum hæmorrhoidum fluxum ab aliquot annis patiebatur cum levamine, quo ob neglectam diætam aliquando suppresso, secuta 8. dierum suppressio alvi, dolor hypochondriorum, cephalalgia, anorexia, sitis, ac vigiliæ. Variis remediis parum opitulantis cephalæa immanis in plures hebdomadas affligebat, donec eam insignis ex auribus hæmorrhagia oborta solvit in momento. Lapso mense rediit idem hic fluxus eodem cum fructu; sed eum revocatus aperientibus, ac præsertim **Ræ.** metallorum fluxus hæmorrhoidalis demum abolevit, recurrente nihilominus itentidem, in primis a cibus flatulentis, & excessu in potu, cephalalgia.

d) *Hæmoptoe* vero multo sæpius hæmorrhoidum suppressioni succedere consuevit, in quam prolapsi sunt SCHMUKERI (a) complures ægri, AMATI (b) homo, ac duo STUNZERI (c) viri, quorum posterior (d) post fluxum suppressum, cum diætam non mutaret, hæmoptoe correptus est; quam pediluvia, & Væ. So. in pede compescuere, abhinc, ubi salem amarum, enemata mollia, pediluvia, ac pedis phlebotomiæ fluxum revocassent, æger
ut

(a) Vide §. 115. Nro. 3.

(b) Vide §. 115. Nro. 3.

(c) Vide §. 148.

(d) L. c. p. 100. sq.

ut ante sanus vixit. OETHEUS apud J. SCHENKIIUM (a) alius meminit viri, qui a suppresso hæmorrhoidum fluxu posthac menstruum semper hæmoptoen patiebatur. BERCHELMANNUS (b) quoque curandum habuit Pastorem 67. annorum, qui per 25. annos hæmorrhoidum fluxui obnoxius ubi hunc amisisset, in sputum, vomitumque cruentum incidit; Auctoris tamen opera pristinam recuperavit sanitatem. Perinde J. STORCHII (c) homo 38. annorum, sanguineus, eufarcus, utroque parente phthisico natus, multis junior narium vexatus hæmorrhagiis, A. 1718 ætatis 26 multum equo, & curru vectus hæmorrhoides nactus est, qua cæcas, qua fluentes, queis adstringente suffitu repressis, crebra, ac diuturna, utut non copiosa, successit hæmoptoe. Quot annis quidem 4. Væ. Ses. institutæ; sed confusæ jam in brachio; jam in pede, hinc iterum hæmorrhagiæ narium indicia redibant. Septembri 1727. consultus Auctor suasit æquinoctiales, & solstiales Væ. Ses. per plures annos, semper in pede, ac minimum ad 3viii — x. Porro per mensem, bis quavis hebdomade, pilulas vel BECCHERI, vel STAHLII; ad tussim vero 3rem pectoralem cum infuso herbarum, in paroxismo

(a) Obs. med. L. 3. P. 1. Obs. 159.

(b) Fragmente zur Arzneikunde. 3. Päckchen n. 8. p. 74. sqq.

(c) Obs. clin. ann. 8. Decembr. d. 4. p. 668.

mo autem ꝥem e nitro, & corall., ac pediluvia. Decembris 10ma A. 1730. referebat, se per biennium hoc sic satis bene valuisse, parca interdum, nec periculosa hæmoptoe recursante. A Dominica 1ma post trinitatis laboravit 18. hebdomadam 4na, in medio triplici, ad ꝥes, essentias, electuaria cum vino ante insultum sumta, pilulasque catharticas, quæ sæpe alvi loco vomitum civere, contumaci; demumque ꝥe sem. Lycopodii ad ʒj e ꝓ frumenti, ante accessionem sumto profligata, relictis tamen post se sudoribus nocturnis. Ante 8 circiter hebdomades a dosi ꝥis antispasmodici vesperi sumti hæmoptoe jam ab anno quiescens revertit; sed ꝥe ex nitro, & coralliis, ac pediluvio iterum sopita. Post 4. hebdomades rediit gravior cum vehementi dolore in quadam dextri lateris plaga, mox sub costis. Admoto ad locum dolentem fottu ex aceto vini, in quo folia ros. rubr. intabuere, & Væ. Se. brachii hæmoptoe denuo quidem substitit, sed ex illo tempore homo spasmos in pectore sensit, & dolores dextro in femore, ac dorso ab humeris ad anum usque protensos cum insigni raucedine, sæpe revertente. Post 4 alias hebdomades hæmoptoe iterum revertit, æger noctu excreabat cum sanguine rutilo multum mucii lentii, qui interdum strias tantum sanguinis vehebat. Cum frustra ꝥem ante proficuum cum potu pectorali subadstringente usurpasset, nec plus opis tulissent adstringentia ab his; ab illis glutinantia, trachomatica; ab aliis opiata præscripta, hæmoptysi. 10mo quovis die re-

curfante, confultus denuo Auctor, cernens naturam tot remediis, inprimis adstringentibus confufam, jubet ægrum feponitis omnibus remediis aliquamdiu abftinere, & aliquot paroxifmos fub leni regimine, tenuique potu perpeti; in declinatione imperat Væ. Sem. in pede, & hirudines ad anum. Ab his plus; quam ab omnibus hætenus ufurpatis, profecit, & iterata ante vernum æquinoctium Væ. Sne. in pede, toto infequente anno penitus fere liber ab hæmoptoe effectus eft. Aliis autem id genus hæmoptoe magno ftetit. Vir certe J. C. BÆUMLINI (a) inde phthificus demum periit. L. WOLFSTRIGELII (b) vir 49 annorum, melancholici habitus, & per aliquot annos hypochondriaco malo admodum vexatus, præprimis de dolore hypochondrii lævi conqueri folitus, poft fuppreffum hæmorrhoidum fluxum, quo alias levare folebat, hæmoptoe bis intra femeftre correptus eft, qua 3tio reverfa interiit. Lien ei magnus erat, lividus, flaccidus, vafa mefenterica, & gaftro - epiploica atro fanguine turgida, & quafi varicofa; ren finifter dextro & minor, & flaccidior, dexter autem in parte fuperiori extrofum, cyftidem habuit, luforiæ inftar pilulæ, turgidam fero fubflavo, quod ex ea diffecta cum impetu erupit; nullaque via erat

con-

(a) *Commerc. Nor.* T. 13. A. 1739. hebd. 52.
Nro. 2. p. 413.

(b) *Miscell. nat. cur.* dec. 1. ann. 1. Obf. 43.

conspicua, qua illuc pervenit. Pulmones turgidi & inflati erant a sanguine nigro, fermentescente, qualis etiam in liene, & confiniis venæ portæ, ac dextro cordis ventriculo repertus est. Hanc ipsam observationem dissimulato veri Auctoris nomine inter suas retulit S. BLANCARDUS (a). Paulo diutius vitam traxit J. D. GOHLII (b) bibliopægus ex interceptis prava medicatione hæmorrhoidibus perinde hæmoptoicus, donec demum occubuisset.

e) *Hæmatemesis* si non frequentius; certe æque frequenter, ac hæmoptoe ab interceptis hæmorrhoidibus progigni solet, præprimis autem a præpostero emeticorum usu, ut accidit in ALBERTII (c) viro, ac cive STEGMANNI (d), quorum isti etsi nihil a vomitu cruento mali evencrit, plerisque tamen aliis ille funestus esse observatur. Sic apud H. BOERHAAVIUM (e) Marchio pater DE SAINT AUBAN post hæmorrhoides prætumidas igne, ferroque extirpatas integro anno recte valens bimestrem deinde nactus est dyspnoe-

(a) Prax. med. cap. 4. opp. med. theor. practic. T. 2. p. 83.

(b) L. c. dec. vol. 10. Sect. 3. p. 50.

(c) Vide §. 60.

(d) Ibidem.

(e) L. c.

pnoeam, cui enormis 10 dierum vomitus cruentus superveniens, cum e medio sustulit. Perinde J. C. GÖRZLIUS (a) refert senem 75. annorum vegetum post suppressas pravo regimine hæmorrhoides in inflammationem internam, & hæmatemesin letalem incidisse, postquam illum biennio ante iisdem malis correptum auspicato morti eripuisset. In Annalibus Vratislaviensium (b) vir post depulsam podagram & suppressum hæmorrhoidum fluxum, prius uberem, incidit in hæmaturiam, anxietates, spirationem brevem, capitis inflationem, & obnubilationem cum vomitu primum contentorum, dein etiam sanguinis, præsertim post usum calidorum elixiriorum contra priora symptomata. Post Væ. Snem. in pede data temperantia nitroso - cinnabarina, & eccoprotica; sed cum homo demum ob messem properans curationem abrupisset nondum triduanam, domi e suffocatione cum epilepsia repente exspiravit. Perinde F. HOFFMANNI (c) „generosus vir 45 annorum, temperamenti sanguineo - melancholici, aulicæ vitæ deditus, assuetus victui duriori, vino liberalius utens, lumborum dolore vexatus, in hæmorrhoidalem fluxum incidit, quo ipse
„do-

(a) Act. med. Vol. 2. Obs. 190.

(b) Tent. 36. A. 1726. Junii. d. 2. art; 1. §. 2. p: 667.

(c) Diff. de salubritate fluxus hæmorrhoidalis. §. 10. opp; Suppl 2; Part. 2. p. 114;

„dolor sensim conquiescit. Post 4 annos ces-
 „santibus hæmorrhoidibus, & omissa
 „Væ. Snc. cui alias assuetus erat, dictæ diæ-
 „tæ indulgens, infestabatur dolore sævissimo
 „sinistri lumbi, ut insomnis multas noctes
 „traduceret; urina mingitur rubicunda, vires
 „prosternuntur, appetitus cessat; alvus ad-
 „stringitur. Medicus calculi præsen-
 „tiam suspicatus Num salis, nec non essen-
 „tiam Zedoariæ volatilem ad flatum dissipan-
 „dos propinat per longum tempus: dolor in-
 „dies augetur, fixiorque redditur cum mag-
 „na anxietate, animique crebra defectione,
 „alter medicus in consilium adhibitus prop-
 „ter venarum turgescientiam, & sanguineum
 „corporis habitum suadet Væ. Snem. in pede,
 „maxime cum antea æger ei assuetus fuit, &
 „hæmorrhoidali fluxui ante aliquot annos ob-
 „noxius: qua celebrata sanguis cum impetu
 „erumpit ad ulnam usque exsiliendo; dolor
 „postea lumborum pauxillum remittit; vires
 „interim fractæ manent, circa sinistrum hy-
 „pochondrium tandem dolor sese magis ex-
 „tendit, vomitu æger tentabatur, frustra da-
 „tis omnibus abstersivis, balsamicis, aperien-
 „tibus, stomachicis internis: tandem cruentæ
 „vomitiones sequuntur, quibus etiam animam
 „expirat.“ Multo hisce felicior fuit Vir J.
 G. BRENDÉLII (a) „qui hæmorrhoides paulo
 „lar-

(a) Diff. de cholera humida. 4to Götting. 1747.

Resp. J. T. BELIO. §. 5. p. 13.

largius fufas pro dyfenteria habitas acceptis
 „ab empyrico adstringentibus cum coercuif-
 „fet; in vomitum cruentum magna cum car-
 „dialgia, torminibusque incidit, inter quæ
 „dum laxantur iterum hæmorrhoides, etfi
 „fluxus uterque terrere videretur, multum
 „tamen levaminis fenfit, blandeque fedato
 „demum utroque, a pedum oedematibus,
 „quibus ante laborabat graviffimis, vindica-
 „tus fuit.,

-f) *Umbilicalis hæmorrhagia*, cujus non
 vulgarem L. G. KLEIN (a) fuppeditat obser-
 vationem: „puer ex primo in mundum introi-
 „tu corpore plenus, parentibus natus habi-
 „tus ftricti, non hæmorrhoidariis, quadrien-
 „nis, subito experitur fanguinis e recto inte-
 „ftino fluxionem haud affiduam; fed perio-
 „dicam, & fub alvi depositione duriore certis
 „temporibus, non autem regularibus notabi-
 „lem. Transibat tandem eadem in ftillidum
 „finceri fanguinis continuum. Confulebantur
 „medici, atque chirurgi varii; tandemque per
 „fuffumigium ano admiſſum male ſiſtebatur, poſt-
 „quam biennium duravit. Aſt quid? Umbi-
 „licus mirum protrufus plorat pedetentim ſan-
 „guinem ſincero, mox vero cumulatioſe pro-
 „fluſit iſte. Applicantur ſpecies nervinæ vino
 „incoctæ, quibus prominens umbilicus retra-
 „hitur; ſuperhabentur ſes ſtiptici; ſed incaſ-
 ſum.

(a) Aët. nat. cur. Vol. 10. Obſ. 71.

„sum. Qua de translatione morbosa adiit
 „mater miseri medicos varios; præscribere
 „multa, nihil vero mutatum de morbo. Puer
 „cum haberet 11 annos, & meum poscit au-
 „xilium ipsius mater. Profluvium jam tum
 „per quinquennium durans contingit pedeten-
 „tim quotidieque promanante sanguine puro.
 „Puer corpore tener est, ac consumtus, men-
 „te docilis, facie pallidus, statura parvus,
 „dextri hypochondrii juncta est durities non
 „dolorosa, in abdomine incidunt spasmodicæ
 „sensationes, calor intercurrit volaticus cre-
 „bro cum horripilationibus alternantibus, ur-
 „get totius corporis languor, sitis, som-
 „nus profundus, appetitus vagus, ventriculi
 „gravitas, ex dyspeptis assumtis, alvus ple-
 „rumque debite exoneratur, tussis ægrum-vel:
 „xat periodica, magis vere, atque autumnò
 „pulsus celer est, pedes semper frigent; Præ-
 „scribo 1mo) elix. viscerale balsami temper.
 „HOFFMANNI. cum liq. ♀a fol. ☐ri, essent.
 „millefol., cascarill. aquos., \mathcal{R} a ☉li ♂
 „LUDOV. 2do) infusum theeforme ex mille-
 „fol., agrimon., hyperic., virg. aur., sem.
 „fœnic. 3tio) frequentiore pediluviorum,
 „atque enematum simplicium usum, 4to) diæt-
 „tam exactissimam, regimenque temperatum.
 „Nil faciunt eadem; clysmata autem omisere:
 „quin lassitudo increfcit, diarrhœa cum dolo-
 „ribus infimi ventris accedit. Appetitus ci-
 „borum quandoque excedens est. Præbeo
 „apozema ex plantis aperientibus pauco lacte
 „caprillo remixtum. Suadeo, ut aliquot hi-
 „rudi

„rudines intestino recto admoveantur clysmate prævio. Commendo Selteranas pro solenni cura junctis pediluviiis domesticis. Negligit mater consilium: fato relinquitur puer. Cum in præsentī habeat annos 24, tandem percipio certius Parisiis, ubi degit, filere fluxionem umbilicalem, neque etiam recruduisse hæmorrhoidalem, istamque ætate crecente successive sponte cessasse.,

g) *Hæmaturia* quoque non infrequenter suppresso hæmorrhoidum fluxui supervenire afolet, cujusmodi exemplum VANDERMONDE (*a*) suppeditat, pluraque ejusdem generis etiam alibi (*b*) occurrent, queis & HOLLERI (*c*) nobilis, & ISENFLAMMII (*d*) senex, & plures SCHMUKERII (*e*) ægri, & SCHURIGII (*f*) vir, et STORCHII (*g*) mulier, & Vratislaviensium (*h*) homo addendus.

h) *Stymatosis* denique etiam interdum, utut rarius, suppressarum hæmorrhoidum in locum successisse est observata, velut in RAIMAN-

NI

(*a*) Journ. de Medecine T. 1. p. m. 168.

(*b*) Vide histor. hæmorrhoid. vesicæ §. 10.

(*c*) Vide §. 117. β.

(*d*) Vide histor. hæmorrhoid. albar. §. 16.

(*e*) Vide §. 115. Nro. 3.

(*f*) Vide §. 133. a)

(*g*) Vide §. 75. c.)

(*h*) Vide præcedent. c).

NI (a) & SEGNERI (b) viris, & I. A. GENSELII (c) miles gregarius post subsistentem familiarem sibi hæmorrhoidum fluxum, incidit in involuntarium, & copiosum sanguinis puri ex pene fluxum, etiam in somno citra mictionem, ardorem, aut dolorem, cum tensione tamen subinde abdominis, ac virium post mensem prostratione. Datis autem absorbentibus, temperantibus, emulsis nitrosis, & alcalinis, ac demum tonicis fluxus hic substitit, ægerque convaluit.

14. *Agmina symptomatum* complicatorum, & interdum satis mirabilium, dum sanguis hæmorrhoidalis ab ano quasi repulsus, quaqua versum in alias corporis partes regurgitat, earum functiones simul, ac semel lædit. M. ALBERTI (d) meminit juvenis theologi 21. annorum, melancholico - sanguinei, valdeque plethorici, & ante 4 annos largum hæmorrhoidum fluxum passi, qui secta ante aliquot tempus brachii vena, cum substitisset ejus loco magnus sanguinis in venis orgasmus natus est, in quibus æger insolitum ardorem, præcipue in brachiis, & palpitabundum in iisdem venis motum etiam sensit. Ventriculus
in-

(a) Vide §. 84. d)

(b) Ibidem.

(c) Miscell. nat. cur. cent. 3. Obs. 51.

(d) Dissert. de hæmorrhoidib. juniorum §. 4.

insuper læsus erat, ægro in dies magnam sputi visceri ex gula ascendenti copiam excernente. Junxit se his gravis passio hypochondriaca, & pertinax alvi obstructio. Perinde A. LOEWII (a) pharmacopœus 50 annorum ex familia hæmorrhoidibus masculo sexui hæreditariis obnoxia, juvenis adhuc fluxum hunc nactus est, menstruum & cum euphoria; quo resistante continuo supervenit corporis lanquor, tormina, gravitas ad os sacrum, æstus p. n. quasi continuus, defluxiones capitis biliosæ, ophthalmia; &c. virili autem in ætate fluxus excedere cœpit, namque singulis pene hebdomadis recurabat, sanguine ad libras manante cum virium lapsu, faciei colore subviridi, coxarum gravitate, crurumque debilitate, ut vix homo incedere posset. Sisti tamen cito non debuit, secus ocyus præcordiorum anxietates, dyspnœa, & cordis palpitatio aderant, lente autem ac circumspecte medendo obtenta est moderatio fluxus per multos annos. Numerosa quoque symptomata simul inde perpeffi sunt ALIXII (b), GENSELII (c) ac HERMANNI (d) ægri, HOFFMANNI (e) vidua,

(a) Aët. nat. cur. Vol. I. append. Nro. 1. Constit. epid. Sempronienfis A. 1706, p. 60.

(b) Vide §. 71. f)

(c) Vide §. 62. b)

(d) Vide §. 55. Nro. 5.

(e) Vide §. 108. a)

dua, plurimique alii, inter quos nobilis quidam apud G. H. VELSCHUM. (a)

§. LVI.

REVOCATIO *hæmorrhoidis* intercepta nulla subinde arte obtineri potest, obtenta vero tempestive tollit plerumque morbos a suppressione natos: at ubi sero nimis obtinetur, vix quidquam opis adferre visa est. Judiciose profecto, ut solet F. HOFFMANN (a) „quam facile (inquit) & expeditum est, & „mensium, & hæmorrhoidum fluxum sistere; „tam arduum, & difficile erit eundem revocare, inque ordinem redigere, & quidem „eam ob rationem, quia constrictis extremis „vasis, & partibus, per quas fluxio fit, & vasorum & nervosarum partium motus statim „invertitur, & versus interiora; & superiora declinatur: qui motus alienissimus, si diu „durat, quasi in habitum abit, & ægerrime emendatur. Hinc fluit ratio, cur mala illa „spasmodica a retento, vel intempestive cohibito mensium, & hæmorrhoidum fluxu „tam pertinacia, ac fere insanabilia sint, nisi „mox inter initia convenientibus remediis iis „occur-

(a) Consil. medic. Cent. I. Nro. 7:

(b) Med. rat. syst. T. 2. P. 3. C. 6. §. 21. Scholio:

„occurramus.“ Exemplo sit M. ALBERTII (a) Serenissima quædam ægra, cui cessans hæmorrhoidum fluxus, varias accivit ægritudines, variis quidem artis subsidiis leviores primum effectas; verum cum diæta, & regimen therapiam non adjuvare, afflictio increvit. Quam ne mineralium quidem aquarum usus emendavit; imo auxit, ut ab ulteriori aquarum usu fuerit desistendum. Plura alia id genus exempla passim hocce opere lectori occurrent. Revocato autem mature satis fluxu gravissima quæque mala ocyus, aut insigniter imminuta, aut penitus sublata fuisse docent plurimi casus, ut ALBERTII (b), ALIXII (c), ALBRECHTI (d), SOMMERI (e), BERCHELMANNI (f), KLEINII (g), STAHLII (h), &c. J. J. SCHLIERBACH (i) meminit pueri choleroico-sanguinei, gracilioris, qui

IIIMO

(a) Diff. de hæmorrhoidum prudenti therapia per acidulas, & thermas. §. 8. Tract. cit. P. 2. p. 172.

(b) Vide §. 55. Nro. 13. a)

(c) Vide §. 71. f)

(d) Vide §. 55. Nro. 7.

(e) Ibidem Nro. 13. d)

(f) Ibidem. f)

(g) Ibidem Nro. 9. b)

(h) Vide §. 84. c)

(i) Act. nat. cur. Vol. 8. Obs. 49.

Imo ætatis anno præviis dorsi, ac ventris doloribus nactus est hæmorrhoidum fluxum quovis mense per 3 annos rite revertentem illæsa sanitate; sed ubi dein per 4 periodos non rediit, successit colica cum doloribus dorsi, sequente brevi post lotii ardore, & insigni scroti tumore, quem chirurgus pro scrotali hernia habens discutit herbis aromaticis in vino coctis; inde emplastrum stipticum, fasciamque apponit, interne præbet, nescio quem spirituosum liquorem, quo sanguis magnopere commotus: hinc anxietas ad præcordia, temulentia, pavores in somno, puerque noctu surgens hinc inde per domum sui inscius oberrabat. Sed Ære temperante nitroso aliquoties dato symptomata omnia conquievire, tandemque fluxu etiam reverso puer omnino convaluit.

§. LVII.

PROVOCATIO *hæmorrhoidum* ambigui semper est eventus, & periculosa. Ex omnibus enim hæcenus dictis probe expensis, & ad se mutuo collatis sponte fere sua fluunt sequentia corollaria, quæ præsentem thesin veram esse probant.

I. *Hæmorrhoides semper sunt morbus.* Enim vero „quocunque modo accidunt hæmorrhoidalia pathemata, inquit M. ETTMÜLLERUS

LERUS

„LERUS (a) omnia sunt præter naturam, cum
 „hæmorrhoidales affectus naturaliter nemini
 „contingant, adeoque semper eorum affectus
 „præsupponunt statum præter naturalem, &
 „morbidum, hinc sicuti mulieribus vitio
 „mensium supervenire solent.“ &c. In eandem
 sententiam abit LUDWIG (b) dicens: „cum
 „hæmorrhoides in sanis, & robustis homini-
 „bus nunquam fluant: sed in his tantum,
 „qui aliquam sanitatis speciem præseferunt,
 „ob varia diætæ vitia, interdum excitentur;
 „facile concluditur, hunc fluxum, in primis
 „nimium, semper ex causis morbosis oriri,
 „ideoque etiam effectus ejus nunquam saluta-
 „res esse posse. Dyscrasia humorum, & te-
 „nuis serosa cum acrimonia sæpius conjuncta,
 „& atrabiliaria tenacitas, acrimonia nun-
 „quam destituta; in laxitate & rigiditate so-
 „lidorum cacochymiis his convenienti simul
 „se monstrant, ideoque varias dispositiones
 „morborum foveant. Quamquam vero in ri-
 „gidityte solidorum cum genesi atræ bilis
 „conjuncta hæmorrhoidalis fluxus auxilium
 „est; tamen perquam raro moderatus cog-
 „noscitur: quemadmodum igitur nimis par-
 „cus molestus est; sic ex altera parte copio-
 „sa sanguinis excretio, quoniam acrimoniam
 „non tollit; sed tenuitatem & defectum cruo-
 „ris

(a) L. c. p. 144.

(b) L. c. p. 413.

„ris boni inducit, sanitati infensa est.“ Si itaque a morboſo tantum corporis ſtatu hæmorrhoides ortum trahunt, liquet ipſas etiam morbum eſſe debere, atque huiusmodi ſtatum, ſi prius non adfuit, provocatione hæmorrhoidum arte facta induci absque periculo non poſſe. Cum autem hæmorrhoides ſemper ſint morbus, utpote effectus corporis morboſi, tunc

2. *Criticæ hæmorrhoides etiam ſunt, minus tantum malum, collatæ cum morbis, quorum ſunt criſis*; at ita, ut facile in majus degenerare, idque vel exceſſu, vel defectu, queant. Nam cum malum hoc admodum mutabilis ſit indolis; facile in nimium fluxum, vel ſuppreſſionem utrumque periculi plenum, deturbari poteſt. Unde non abs re S. A. D. TISSOTUS (a) „raro (ait) beneficium, „& flebile quidem beneficium ſunt, hæmorrhoides.“ Hunc ſecutus HILCHEN (b) „hæmorrhoides ſuas & ad cœlum uſque extollant (ait); nobis ſane laus hæc ſemper merito, & ex jure ſuſpecta erit; eſt enim hæmorrhoidalis fluxus vacillantis ſanitaris comes, & aurei illi montes, quos ſibi hæmorrhoidarii medici pollicentur, parturiunt sæpe pœnitendos morborum ſucceſſus.“ His
binis

(a) Epist. ad ZIMMERMANN. Obſ. 2. Nro. 8.

(b) Diff. de dolore coxæ. §. II.

binis, quæ ex ipsa istius fluxus sponte etiam oborti natura eruuntur, prius expensis, videamus nunc ecquid ipsa provocatio mali directe causare valeat.

3. *Provocatus arte fluxus potest esse incongruus morbo* : i. e. quoniam diagnosis moliminum hæmorrhoidalium non semper absoluta haberi potest, ob signi pathognomici defectum, facile evenire potest, ut ad præsentiam quorundam symptomatum hæmorrhoidalia molimina mentientium, & ex longe aliis interea causis enatorum, animum quis præfertim, qui ubique hæmorrhoides clam subesse suspicatur, adjiciat ad hasce provocandas, sicque unum curaturus morbum per alium pro uno duos efficiat, prioremque illum deteriorem etiam reddat. „Præconcep-
 „ta opinio, inquit HAEN (a), ubique hæ-
 „morrhoidas quærendi id damni praxi intui-
 „lit, ut vera causa dolorum in lumbis, in ano,
 „in vesica urinaria prætervideatur, homines-
 „que neglecta vera æumnarum causa fru-
 „stra ad hæmorrhoidas torqueantur. Con-
 „tingit videre in praxi sic dispositiones cal-
 „culosas, sic recti intestini inflammationes,
 „desperatas relaxationesque esse neglectas, ne-
 „glectu fere esse reddita.“ Porro dum fluxum provocare satagimus, non raro

4. *Pro*

(a) L. 6. §. 19. Nro. 6. p. 37.

4. *Pro fluxu hæmorrhoides cæcæ furentes oriuntur* cum discrimine, nedum utilitate, eo, quod ad fluxum facilem, moderatum, ac placidum nec vasa sæpe disposita sint, nec sanguinis aut indoles, aut motus localis. Quam autem gravia symptomata, ac perniciosi inde effectus sæpe oriantur, satis superius (a) vidimus. J. G. HOYERI (b) vir vitæ delicatæ, & uberi vino assuetus quandoque dysarethesi vexabatur: medici Væ. Ses. cathartica, aliaque idonea dantes motum quoque crebriorem cum strictiori diætâ imperarunt, donec alius superveniens hæmorrhoidum provocatione opus esse persuasisset: idcirco pilulas balsamicas, essentiam dulcem, hirudines, frictiones ani, &c. diu in usum duxit; at sperati fluxus loco nil nisi fistulam ani letalem obtinuit. Sed ut demus, erupturum adhibita arte sanguinem, num per anum ideo semper erumpet? Imo vero

5. *Stymatosis, hæmaturia, hematemesis, hæmoptoe, &c.* perinde evenire poterit. Cum enim hæmorrhoidalia vasa non modo per intestinum rectum; sed vesicam etiam, vaginamque uteri, ac penem discurrant, evenire utique potest, ut major forte in harum partium; quam ani vasis adsit dispositio ad hæmorrhoidalem sanguinem excernendum. Tum-

(a) Vide §. 53. II.

(b) Act. nat. cur. Vol. 3. Obs. 17.

tumne autem est sanguinis ex vesica urinaria profluvium? At demus etiam hæmorrhoides ipso ex ano fluxuras, ipse hic

6. *Fluxus frustraneus vel noxius esse potest*; enim vero præpostero ordine potest oboriri vel

a) Internarum hæmorrhoidum fluxus, ubi externis opus est, vel vicissim: „male sæpius videmus, inquit HÆNN (a), eorum succedere conatus, dum oriante plane natura illi non piceum illum, qui forsan tota morbi causa, sanguinem educunt, sed eum, qui ex iliacorum vasorum propaginibus floridior, vegetiorque, & quo homo miser maxime indignisset, profluit: unde efficitur, ut ille longe debilior, mœstior, magisque attractibilis reddatur.“ Quod si vero etiam ex iis, unde opus est, sanguis erumpat vasis, potest utique fluxus accidere.

b) *Nimius* vel mox initio, vel certe deinceps; quandoquidem id variæ, ac leves sæpe causæ homini non semper evitandæ (ut ira, motus, potus, &c.) efficere solent: unde pessimæ sequelæ (b). Alias

c) *Parcus* vel *mucosus* tantum elici potest, qui nullatenus; aut non magnopere symptomata, morbumque levat. Porro poterit esse

d) *Non*

(a) L. c. Nro. I. p. 35.

(b) Vide §. 53. III. B. Nro. I. a. b. c. d.

d) *Non levans*, utut sufficiens, certum enim est, haud semper oborto fluxu symptomata sopiri; sed sæpenumero pergere: quis autem a priori dixerit fluxum profuturum? denique etiamsi initio levans fuerit, morbumque prævium sustulerit; habitualis tamen factus, si deinceps

e) Suppressus fuerit, quid est uspiam morboſi, quod non accersere valeat (a)? Id autem nullatenus a nostro pendet arbitrio, ut pro libitu hunc fluxum vel conservemus, ne unquam subsistat; vel suppressum ocyus, facileque revocemus; quippe qui nulla sæpe arte sit revocabilis, ut ante dictum (b) hinc etiam GALENUS (c), ubi varia fluxum hæmorrhoidum concernentia expendisset. Subdit demum „aliter autem non est assuefaciendum ei, quæ fit per hæmorrhoidas, evacuationi, ut quæ periculosam habeat utramque immoderantiam, sive supra modum sanguis excernatur; sive ex toto supprimatur.“

(a) Vide §. 55.

(b) Vide §. 56.

(c) In HIPPOCRAT. Aph. comment. Nro. 25.

E r r a t a.

Pag.	lin.			
1	5—6.	hæmorr-hagia	lege	hæmo-rrhagia.
2	8	appellatione		appellatione
	10	clarum, id omnino		clarum id omnino,
	23	unde		unde unde
3	1	απόσταξις		απόσταξις
3	21	HAMBERGIO		HAMBERGERO
4	18	autichorosi		aut ichorosi.
5	penu.	juxta		juxta
8	15	referrenda		referenda
12	4	distribuntur		distribuuntur
14	14	protrusæ		protruso
16	6	oblegat		ablegat.
	17	deductum		detectum.
17	9	alliis		aliis
	15	prudenda		pudenda
22	8	Christæ		Cristæ.
	9	DIEIRISCH		DIEIRICHS.
30	13	annum		anum
31	22	anomalis		anomaliis
33	18	Frax.		Prax.
36	18	puella		puellæ
40	9	conuatu		conatu
	18	tenuo		denuo
44	5	pro divitatem		proclivitatem
47	5	prodividatem		proclivitatem
55	14	apud		Apud
56	12	quod rare		quadrare
66	13	uleus		ulcus
70	11	dispnæa		dyspnœa
74	14	Ulmenfia		ulmenfis
75	14	fistul		fistul.
77	13	hæmorrhagialium		hæmorrhagiarum.
78	17	quieverit		quiverit
	penul.	clim.		clin.
79	7	stereore		stercore
	8	molis		mollis
	11	profluere		profluere
90	5	coralliorum		coraliorum
93	25	maleatione		malleatione
97	6	accensetur		accensetur
116	31	apra		apta
123	2	fixi		fixi
	22	acidere		accidere
126	13	non		nomen
129	23	ne		nec
133	22	viro		viri.
142	20	succusatoris		succussatoris

E r r a t a

Pag.	lin.		
159	2	tuberculum esse lege	turbeculum ingui- nale
161	5	I. E. DRANII	LEDRANI.
162	3	moles	molles
167	3	integro	integroz
	6	unde triginta	undetriginta
169	20	referatur	referantur
172	9	firpandorum	firpandorum
178	10	spelo	speculo
180	16	iliaco	iliaco
	19	pereptat	perreptat
189	6	horore	horrore
190	18	copiosæ	copiose
191	7	semper	super
195	14	errectione	erectione
197	3	C.	c.
199	10	pronunciare	prænunciare
209	1	2	1
216	2	quia	qui
222	3	quippe	quique
254	15	grisco	griseo
256	penul.	innitum	initum
257	17	Occalescentibus	occallescentibus.
261	4	hipochondriaca	hypochondriaca
262	ult.	sana :	sana,
269	19	tantoque	tantaque
270	8	postridio	postridie
272	8	solum	non solum
	18	viscidam	viscidam,
274	16	facta	facta,
	17	affiduo	assiduus
278	23	39vo	39no
	26	unguent,	ungvent.
279	13	asthmate	asthmate
280	9	palbutie	balbutie
284	13	dypnoea	dyspnoea
287	27	indulgens. Sine	indulgens sine
	28	morebatur	morabatur,
288	6	referenda	referanda
289	25	quadridum	quatriduum
293	ult.	Nemb.	Novembri
301	3	quia	qui
	17	sensim 10 1/2	sensim per 10 1/2
305	24	bene	pene
319	17	parum perinclinato	parumper inclinato
	penul.	Jeterius	Jetus.
322	20	fere	fere
323	27	quodam	quædam
332	8	casus	casum.

WENCESLAI TRŇKA

DE KRZOWITZ

S. R. I. EQUITIS MEDIC. DOCT. IN REG. UNIVERS.

PESTIN. PRAX. MED. PROF. P. O.

HISTORIA

HÆMORRHOIDUM

OMNIS ÆVI OBSERVATA

MEDICA CONTINENS.

VOLUMEN II.

OPERIS POSTHUMI

EDITIONEM PROCURAVIT

FRANCISCUS SCHRAUD

IN EADEM UNIVERS. INSTIT. MED. PROF. P. E.

VINDOBONÆ,

APUD CHRISTIAN. FRIDERIC. WAPPLER:

MDCCXCV.

SERIES OPERIS.

P A R S II.

PROLEGOM. §. 57. summa curationis	pag.
	1

SECTIO I PHARMACA.

CAP. I. §. 58. Emetica, eorumque	-	-	8
— 59. 1. Indicantia	-	-	9
a) Cruor in stomacho	-	-	—
b) Saburra	-	-	10
— 60. 2. Contraindicantia	-	-	14
CAP. II. §. 61. Cathartica eorum	-	-	17
— 62. 1. Indicantia	-	-	—
a) Molimina, cœcæ hæm.			18
b) Suppressione, aut	-		19
c) Nimia	-	-	21
— 63. 2. Delectus	-	-	24
a) Epsoniensis sal.	-	-	26
b)			

IV

	pag.
b) ☉ Fulminans - -	26
c) Tamarindi - -	27
d) Rheum - -	—
§. 64. 3. Cautelæ - -	31.
a) Iteratio - -	—
b) Tamarindi præ rheo	32
c) Tonica addenda, vel	—
d) Antiseptica - -	34
CAP. III. §. 65. Diaphoretica - -	—
CAP. IV. §. 66. Solventia maxime - -	39
— 67. 1. Nitrum - -	41
— 68. 2. Arnica - -	43
— 69. 3. $\mathcal{R}\mathfrak{e}$ ♂ii cum liqu. anod.	44
— 70. 4. ♀ flores - -	45
— 71. 5. ▽æ foteriæ, ut - -	48
a) Bourbonenfes - -	51
b) Carolinæ - -	52
c) Heilsbronnenfes - -	54
d) Helmstadienfes - -	55
e) Luchonienfes - -	56
f) Wernarcenfes - -	58
g) Wisbadenfes - -	59
CAP. V. §. 72. Emmenagoga - -	—
CAP. VI. §. 73. Aloetica, ut - -	61

	pag.
§. 74. 1. Elixir. propriet. - -	62
— 75. 2. Pilulæ - -	64
a) Ruffi - -	—
b) Beccheri - -	65
c) Stahlii - -	66
CAP. VII. §. 76. Antispasmodica - -	72
— 77. 1. Olea pressa - -	—
— 78. 2. Oleum Dippelii - -	73
— 79. 3. Valerianæ radix - -	75
— 80. 4. Vinum - -	—
— 81. 5. Scrophularia - -	76
— 82. 6. Opium - -	78
CAP. VIII. §. 83. Tonica - -	85
— 84. 1. Millefolium ad - -	89
a) Molimina - -	91
b) Cœcas hæorrh. vel - -	93
c) Nimias - -	96
d) Stymatofin - -	103
— 85. 2. Bdellium - -	105
— 86. 3. Chelidonium minus - -	107
— 87. 4. Glandes - -	108
— 88. 5. Rosarum syrupus - -	110
— 89. 6. Sorbi roob. - -	—
— 90. 7. Sanguisorba - -	111

	pag.
§. 91. 8. Urticæ succus - -	111
— 92. 9. Granatorum grana - -	112
— 93. 10. Simarubæ cortex - -	113
— 94. 11. Terrea styptica - -	114
— 95. 12. Martialia, ut - -	—
a) Crocus - - -	115
b) Limatura - - -	116
c) Tincturæ - - -	—
d) Aquæ - - -	117
— 96. 13. Cortex Peruv. Indicat - -	119
a) Laxitas - - -	—
b) Spasmi - - -	—
c) Febris intermitt. - -	121
d) Periodica hæmorrh. - -	122
e) Ulcera hæmorrh. prava - -	—
f) Gangræna varicum - -	123

S E C T I O II.

CHIRURGIA.

CAP. I. §. 97. Sanguinis missio, quam - -	124
— 98. A. Indicat - - -	125
a) Prophylaxis - - -	—
b) Therapia, dum adest - -	—
— 99. 1. Plethora i. e. - - -	—
a. Vacuatio, sangu. omissa - -	128

	pag.
β. Hæmorrhagiæ cessantes	128
9. 100. 2. Molimina - -	131
— 101 3. Cæcæ hæmorrhoides -	132
— 102. 4. Furentes præsertim -	133
— 103. 5. Aquæ foteriæ potæ -	—
— 104. 6. Suppressus fluxus -	134
— 105. 7. Hæmorrhagiæ vicariæ -	138
— 106. 8. Nimia hæmorrhoides -	139
— 107. B. Selectus vaforum -	144
— 108. 1. Brachii, si adest -	146
a) Ninius fluxus -	—
b) Morbi capitis, pectoris	151
c) Abolendæ hæmorrhoides	154
— 109. 2. Pedis, ubi adfunt -	158
a) Molimina - -	—
b) Cæcæ hæmorrhoides	159
— 110. c) Morbi a suppressio fluxu	162
— 111. d) Fluxus - - -	163
α. Instans - -	—
β. Suppressus -	165
— 112. 3. Ani, quam procurant	—
— 113. a) Hirulines. Has -	166
— 114. α. Contraindicant -	167
1) Inflammatio -	—
2) Varix grandis, -	—
3) In-	—

	pag.
3) Internæ?	169
§. 115. β. Indicant vero	171
1) Molimina	—
2) Varix minor	179
3) Suppressæ hæorrh.	190
— 116. γ. Cautelæ	203
— 117. b) Acies ferri, dum adest	209
α. Prolapsus ani	—
β. Varix vetus &c.	210
— 118. c) Vicaria ferri, & hirud.	225
CAP. II. §. 119. Enemata, (suppositoria).	227
1. Emollientia	—
2. Anodina	230
3. Eccoprotica	231
4. Tonica	233
5. Acria	235
— 120. Cautelæ	237
— 121. Balani	238
CAP. III. §. 122. Topica	241
— 123. A. Emollientia	—
— 124. 1. Aquosa	242
— 125. 2. Mucilagines	244
— 126. 3. Pinguia	245
a) Axungia	—
α. Canina	—
β. Ca-	

			pag.
	β. Caprilla	- -	246
	γ. Suilla	- -	—
b.	Butyra	- -	247
	α. Cacao	- -	—
	β. Ung. terreum	- -	—
	γ. Ung. de loto	- -	248
	δ. Unquent. nummulariæ		249
c)	Olea	- -	250
	α. Ovorum	- -	—
	β. Scarabæorum	- -	251
	γ. Millepedum	- -	253
	δ. Cineratum	- -	254
	ε. Ferratum	- -	255
§. 127. B.	Anodyna	- -	256
	1. Opium	- -	—
	2. Hyosciamus	- -	—
	3. Belladonna	- -	257
	4. Solanum nigrum	- -	—
	5. Momordica	- -	—
	6. Scrophularia	- -	258
	7. Linaria	- -	—
— 128. C.	Discutientia	- -	261
	1. Calor ficcus	- -	262
	2. Fumi	- -	—
	a) Terebinthinæ	- -	—
	b) Un-		

	pag.
b) Ungulæ equinæ -	263
c) Rajæ - - -	—
d) Testæ testudinis -	265
3. Aceti vapor - - -	—
4. Vinum - - -	—
5. V ^s . - - -	—
a) Simplex - - -	—
b) Cum ficubus -	266
c) Stercoratus -	—
6. Saliva - - -	267
7. Urina - - -	—
8. Pomi pulpa, succus	268
9. Chelidonium minus	—
10. Cepæ - - -	269
11. Olea - - -	—
a) Mustelæ - - -	—
b) Jupiueri - - -	270
c) Buxi - - -	—
d) Aurantiorum -	271
e) Balsam \triangle - - -	—
f) Vernix pictorum	273
12. Mercurialia - - -	—
13. Saturnina - - -	274
§. 129. D. Styptica - - -	275

	pag.
1. Calor ficcus urens	275
2. Plantæ adstringentes	276
3. Colcothar - -	277
4. Atramentum - -	278
5. V rectificatus	279
§. 130. E. Referantia - -	—
1. Colocynthis - -	—
2. Cyclamen - -	280
3. Cepæ - -	—
4. Bilis taurina - -	—
§. 131. F. Composita varia - -	281
§. 132. G. Vulneraria - -	293
CAP. IV. §. 133. Balnea (infessus, lotiones)	294
a) Calida - -	—
b) Frigida - -	299
CAP. V. §. 134. Cucurbitæ siccæ - -	301
CAP. VI. §. 135. Repositio ani - -	303
CAP. VII. §. 136. Ligatura - -	305
CAP. VIII. §. 137. Ustio - -	307
1. Corrugans - -	308
2. Escharotica - -	310
§. 138. Cautela - -	316
CAP. IX. §. 139. Apertura abscessus - -	325
CAP. X. §. 140. Ulcera arte facta - -	327
CAP. XI. §. 141. Amuleta, transplantiones	330
b	§.

	pag.
§. 142. 1. Amuleta	331
a) Chelidonium minus	—
b) Cyclamen	—
c) Hellebori nigri folia	—
d) Polygonum	332
e) Scrophularia	—
f) Telephium	333
g) Gemmæ	335
§. 143. 2. Transplantatio	336
a) Chondrilla	—
b) Hæmorrhoidalis herba	337

SECTIO III.

DIAETA.

CAP. I. §. 144. Alimenta	338
CAP. II. §. 145. Aer	341
CAP. III. §. 146. & 147. Motus, quies	343 & 345
CAP. IV. §. 148. Pathemata animi	346

HISTORIÆ SELECTÆ:

1. Dietrichs	348
2. Hoffmanni	352
3. Sidren	356
4. Riverii	359
5. Gerbezii	361
6. Turnerii	365



HISTORIÆ HÆMORRHOIDUM.

PARS II.

DE METHODO MEDENDI HÆMORRHOIDIBUS.

PROLEGOMENON SUMMA CURATIONIS

CAPITA.

Si ullo uspiam in morbo, priusquam manum ad medendum appuleris, omnia sollicitè circumspicienda, & providenda futura sunt, ne secus; quam res exigit, remedia adhibeantur; hæmorrhoidali mehercle præprimis in morbo ad id animum advertere oportet: quippe ubi vel levissimum sæpenumero qua in medela; qua diætetico regimine admissum errorem ægri graviter & cum vitæ ipsius quandoque jactura luere solent, ut id allata deinceps exempla satis superque docebunt. Ap-
TRNKA Hist. Hæm, Vol. II, A prime

prime itaque in hæmorrhoidum curatione trias illa therapeutica: *indicans*, *indicatio*, *indicata*, & memoria probe tenenda, & acri, sagacique judicio practico inspicienda est, quam proinde rite ordinatam, præmittam.

§. LVII.

I. INDICANS est hæmorrhoidalis morbus: hinc

II. INDICATIO multiplex, nempe ut

A. Fluxus hæmorrhoidum, si est.

a) Salubris vel necessarius ob habitum,

1. Instans (evidentibus notis) leniter promoveatur;

2. Præsens vero jam, isque

α. Moderatus non turbetur; ne vel nimius evadat, vel supprimatur

β. Difficilis facilitetur obstaculis remotis
v. g. spasmis, lentore, &c.

γ. Nimius minuatur, vel cohibeatur caute:

3. Suppressus denique

α. Re-

α. Revocetur, si eum natura vel poscit, vel molitur denuo (sublatis obstaculis, & motu sanguinis ad vasa hæmorrhoidalia determinato); sin minus,

β. Compensetur arte.

b) Insalubris, inutilis, non necessarius.

1. Instans discutiatur;

2. Præsens prudenter abigatur;

3. Recidiva præcaveatur.

B. *Symptomata* mitigentur, tollantur

C. *Effectus* hujus morbi solennes

a. Futuri & prævisi prævertantur;

b. Præsentis vero jam tollantur

III. INDICATA hocce in morbo primaria duo esse vult L. F. B. LENTIN (a) nempe

1. *Solventia* & *moventia* stases viscerum infarctorum,

2. *An-*

(a) Beobacht. einiger Krankh. Nro. 25.

2. *Antispasmodica*; sed multiplici hic sæpe remediorum apparatu opus esse satis innuunt indicationes variæ paulo ante dictæ rite expensæ.

IV. CONTRA INDICATA denique, seu morbum ipsum seu symptomata spectes, sunt universim duo.

1. *Acria* omnia nervos gravius laceffentia, &

2. *Calida* motum sanguinis augmentia.

Ab his enim & morbum & morbi causam intendi constans docuit observatio. Hinc tironibus alte, serioque inculcandus est sequens therapeuticus canon: *omnis morbi hæmorrhoidalis therapia esto ordinata & placidissima*, id est: curatio hæmorrhoidalis cujusvis affectionis duas habeat dotes oportet, scilicet & ordinate & placidissime instituitur, summopere cavendo ne vel tumultuosa, vel impetuosa sit. Ad tædium pene duo hæc passim suis in dissertationibus inculcat observanda M. ALBERTI haud ignarus, nunquam iis satis aures tironum imbui, ut videre est in diss. de hæmorrhoidibus longævitatæ causa §. 28.(a),
de

(a) Tract. de hæmorrhoidib. P. I. p. 148.

de hæmorrhoidibus excedentibus §. 25. (a),
 tum de hæmorrhoidibus cœcis §. 23. (b) &c.
 Ante omnia vero in diss. de hæmorrhoidum
 salubri, & insalubri promotione (c) rem ner-
 vose urget in hæc verba: „negotium hæmorr-
 „hoidale utpote sensibile, & in anomalias
 „valde pronum nihil minus; quam tales in-
 „consideratas, præcípites, & audaces inva-
 „siones perferre potest: inde ut plurimum
 „evenit, ut ejusmodi motuum hæmorrhoida-
 „lium aggressiones, atque impulsus non di-
 „rectum effectum, & scopum assequantur; sed
 „periculosas sanguinis orgasticas commotiones
 „acerbiores, graviores, & tenaciores viarum
 „stricturas spasmodicas, sanguinis denique
 „exitiosas incarcerationes causentur. Ab
 „ejusmodi imperito ausu aliquando in sub-
 „jectis de cholericó temperamento paulo lar-
 „gius participantibus illud suspectum prove-
 „nit phænomenon, ut loco promotionis hæ-
 „morrhoidum pertinacissima alvi obstructio,
 „atrocissimi interni ardores, angores, & do-
 „lores consequantur, ut talis extrema cala-
 „mitas aliquando statum, & casum propinati
 „veneni . . . æmuletur. Quid quod accidit,
 „ut oblata remedia hæmorrhoidum fluxum
 „im-

(a) Ibidem p. 211.

(b) Ibidem p. 301.

(c) §. 10, p. 29. sq. Resp. 1, c. WORT. 4to.
 Halæ 1726.

„impellentia post excitatam tenacem alvi oc-
 „clusionem plane alienas evacuationes, velut
 „mictum cruentum, extreme angentem stran-
 „guriam, periculosam dysuriam, aut exce-
 „dentes vomitus, vel iliacæ passionis pro-
 „dromos, & schemata excitent & causentur.,
 Quæ hic a tumultuaria & impetuosa in pro-
 motione moliminum hæmorrhoidalium thera-
 pia consequi notat Auctor, his similia & gra-
 viora etiam ab ejusdemmodi curatione in pro-
 vocandis, revocandisve, aut referendis cœ-
 cis hæmorrhoidibus evenire solent, imo in
 ipsis etiam symptomatibus perperam tractatis,
 id quod Ill. STÖRK (a) meminisse ab se visum
 „dum urina (inquiens) a dolore hæmorrhoi-
 „dali retinetur; vitanda sunt omnia fortiora
 „diuretica, solis decoctis ex radice althææ,
 „& glycyrrhizæ utendum est, & venter, &
 „partes circa anum debent emollientissimis
 „cataplasmatibus involvi, foveri. Vidi a
 „dato his in circumstantiis spiritu terebin-
 „thinæ urinam magis fuisse retentam, intu-
 „muisse ventrem, ortum esse enormem in
 „pelvi dolorem, & ægrum 3tio die post mul-
 „tas anxietates, & post cruciales mingendi,
 „ac alvum deponendi tenesmos obiisse. To-
 „tum intestinum rectum, & pars vesicæ huic
 „adjacens erat inflammata, aut gangrænosa.,
 Terebinthinæ Jus acre, & impetuose agens
 reme-

(a) Ann. med. II. p. 153 sq.

remedium, dum sanguinem ad vasa recti, & vesicæ hæmorrhoidalia, jam alioquin turgentia uberius, & perpetim compulit, non potuit non exitialem his partibus statum induxisse. Hocce itaque tirones exemplo admoniti sapiant, oportet. Queis breviter præmissis ad omnis generis in hæmorrhoidalium affectionum therapia solennia indicata perconsenda transitum faciamus, quæ a multiplici experientia clarissimorum in arte virorum sese commendarunt; vel quæ usus docuit, esse vitanda.

S E C T I O I. P H A R M A C A.

C A P U T I. E M E T I C A.

§. LVIII.

I. EMETICA num unquam hæmorrhoidalibus in affectionibus præbenda sint, merito ambigere licet; quando quidem non modo impetuosæ sint remedia, quæ paulo ante dictum est excludi a therapia nostra oportere, sed etiam humores ab ano sursum ciendo sanguinem hæmorrhoidalem ad superiora regurgitare cum pessimis ægri rebus faciant, ut postmodo danda clare docebunt exempla (a).

§. LIX.

(a) Vide §. 60. 54. Nro 8. (b).

S. LIX.

I. *Indicant* nihilominus emeticorum lenium usum duo sequentia :

a) *Cruor in ventriculo extravasatus* vomitu spontaneo non eluendus, quem suppressæ, vel anomalæ hæmorrhoides illuc effuderunt. Unde M. ALBERTI. (a) de curatione hæmorrhoidibus suppressis facienda differens „excludimus (ait) itaque quascunque „immoderatas commotiones, & evacuationes, „in primis vero emeses, quæ facile motus „hæmorrhoidales tam ad ventriculum, quam „superiorem corporis regionem ducunt, & ad „vomitum cruentum disponunt, aut in hepar „& lienem periculosos effectus, & affectus „provocant. Si vero contigerit, ut artifex „prudenter, & certo judicare poterit, quod „ob hæmorrhoidum perturbationem, aut suppressionem non modo molimina ad cruentum „vomitum pertinentia orta sint, sed & actualis eruptio sanguinis intra ventriculum successerit; sanguis vero intra ventriculi cavitatem profusus per vomitum non evacuetur, „sed in ventriculo delitescat, & multis angoribus ansam præbeat, tunc & non aliter „nisi in hoc maxime reservato casu, & statu „con-

(a) Diss. de hæmorrhoidib. suppressis §. 24.
Tract. de hæmorrhoidib. l. c. p. 244.

„cedimus mitissimam vomitus provocationem,
 „quo radicem ipecacuanham commendamus,
 „quæ post lenem, quem provocavit, vomitum,
 „subtilem stricturam in affectis locis relinquat.“
 Utrum vero uspiam aliquo in praxi exemplo id Auctor exploratum habeat, me præterit; nec ullo id alius observatoris casu assertum facere licet. Meliori autem jure emeticum poscit.

b) *Saburra* biliosa, vel alia quævis primis in viis collecta; qua emetico excussa ille continuo cum euphoria minuitur, aut prorsus conquiescit. Sic B. HERMANNI (a)
 „Vir honestus 40. & aliquot annos natus,
 „hæmorrhoidum fluxui non raro, sed tum in primis & copiosiori, & diuturniori obnoxius,
 „cum ex officii civilis ratione Baccho vel plus, vel sæpius solito litare tenetur; tali enim prægressa causa non dies duntaxat aliquot; sed integras septimanas nonnunquam duravit cum inappetentia, virium lapsu, colore faciei decolore, &c. Sumpta itaque aliquando a dicta causa occasionali, & appetitu prostrato indicatione ☐ri emet gr. jv. sat alias robusto exhibui, & en! vix dum cessante vomitu hisce concitato omnis illico fluxus, qui a 14. diebus jam continuaverat, cum euphoria cessavit. Quo successu permotus

(a) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 5. Obs. 216.

„tus aliquot postea vicibus in simili casu si-
 „mili usus remedio, simili quoque semper i.
 „e. optato gavissus est successu.“ Huc etiam
 referre licet C. PEZOLDI (a) Equitem Saxo-
 nem 45 annorum, sanguineo - cholicum,
 iræ, gulæque impotentem, & a 16to ætatis
 anno menstruo hæmorrhoidum fluxui obnoxii-
 um tam uberi, ut raro infra **16**. jv. quavis
 periodo sanguinis amitteret. Hic in Silesia
 hyemem inter lautas epulas, vinique Hunga-
 rici computationes exigens post hæmorrhoi-
 dum fluxum paulo diutius restitantes capi-
 plenio, & hæmorrhagia narium corripitur;
 sed promotis Væ. Sne. in pede hæmorrhoidi-
 bus utrumque desit. Demum 3tia Martii iter
 ingressus sub hæmorrhoidum fluxu, hunc suc-
 cussionibus corporis, & madore pedum ab
 aquis nivosis sæpius transvadatis, ita auxit,
 ut sanguis ex ano velut e gutturnio rueret cum
 virium lapsu, & hæmorrhoidum tumore do-
 lorifico. Secta a balneatore brachii vena,
 tumentibus hæmorrhoidibus apertis impositum
 emplastrum sarturninum; sed his non satis
 opitulantibus 8va Martii Vratislaviam petiit,
 collapsa valde facie, amissisque (ut rebatur)
 ex ano pene 64 **16**. sanguinis tam acris, ut
 cutem, & papyrus eroserit. Recursante idem
 fluxu cum debilitate, & 6 dierum te-
 nesmo inter desidendum tremorem omnium

ar-

(a) Obs. med. chir. 51.

artuum ad eclysin pene causante, nec nisi flatus proliciente, datus interne ☿ ex ☿ ♂, ☉, corall. cinnab. eff. cit. sicc. tum *MRa.* ex eff. millefol., & cort. ☉, cum ♀. ☉. dulc. Externe adhibitus fatus ex verbasco., chamom. &c. in lacte coctis. Ab his a meridie pulsus paulo fortior; sed æger a somno aliquamdiu subdelirabat, pergente fluxu, & lotio ad vitri latera copiosas crysallos deponente. Die nona a somno iterum subdelirus, ab ira bis deiecit, tenesmo sine ullis fere jam flatibus, at cum magno totius corporis tremore pergente, hæmorrhoidibusque cum dolore protuberantibus. Die 10. ter multa deiecit, tota nocte pervigil. Tenesmus cum tremore in desidendo ad eclysin fere, flatibus iterum cum sanguine prodeuntibus. Datae 2 doses ☿is contra abortum Aug., & spec. de hyac. cum ☉., & eff. cit. sicc. cum levamine, & a suffitu e verbasco. cum colophon. ac mastich. multa pituita alba alvo excreta. Die 11. a somno bono creber tenesmus cum tremore, & hæmorrhoidum dolentium fluxu. Datus prior ☿is sine ☉. Die 12. post suffitum, & sumtum mane ☿em dolor pectoris cum anxietate non ferenda. Idcirco datis pilulis *STAHLII*, die 13. post aluum rediit hæmorrhoidum fluxus cum tenesmo, & ardore in Recto. Injeto enemate ex decocto furfurum tritici cum verbasco ac V. O., datus ☿ ex ☿ ♂, dente hippopot. ☉o., corall., cinnab. & eff. citr. sicc. Die 14. somnus bonus, pulsus magnus, plenusque, &
hæ,

hæmorrhoides fluxere sine ullo tumore, ac superstitite adhuc dolore ac tenesmo, cum dejectionibus. Injecto ergo enemate datum infus e millefol. cum cinnab., & mac. Die 15. omnia pristina cum anxietate post pastum. Datus ꝑ̄is prior, ac elixir. stomach. cum balsamico HOFFMANNI, & ꝑ̄u mastich. Die 16. omnia eadem. Postridie uritanus in ambitu, & vestigia quædam adhuc sanguinis in alvo visa. Anxietati a pastu sublata successit dolor pedis. Ex ꝑ̄e priore corallia omissa, & suffecti lap. 69. Die 18. sudor tota nocte; dolor pedis desit; cum alvo sanguis tenuis, aquosus redditus, hæmorrhoides denuo cum pruritu protuberabant. Multus iterum die postero sudor. Die 21. decedente omni hæmorrhoidum tumore, ac fluxu superfuit pruritus. Hodie ac biduo præcedente purulenta quasi sanies alvo prodibat. Ager bene habens medicum dimisit; at pruritus ani non prius omnis desit; quam post duodecim vomitus, & 6 dejectiones biliosas frustis biliosis intermixtas a datis ꝑ̄ri emet. gr. iij. abhinc vero homo plane convaleuit, hæmorrhoidibus posthac omni iterum mense rite fluentibus. Satis itaque apparet, uberem hunc fluxum si non ex toto, magna saltem sui parte a biliosa colluvie ex ingluvie, ac ira in itinere provenisse, cujus reversuri indicium ani pruritus mansit, quoad emetico excussa ano, catoque bile demum desisset, abacto simul recidivæ periculo.

§. LX.

2. *Contraindicant* vero emeticum omnia alia adjuncta præter sanguinem, & saburram stomachi adeo, ut illo dato quævis hæmorrhoidalis affectio in anomalias degenerent. Unde & M. ALBERTI (a): „vomitória hæmorrhoidariis valde sunt inimica, quæ eximiam anomaliam motibus hæmorrhoidalibus communicant, & totum processum in sensibilibus præcipue naturis adeo corrumpunt, ut ægerrime redintegrari queant“. Enim vero emeticum in moliminibus hæmorrhoidalibus exhibitum tantum abest, ut ista adjuvet, ut multo potius motum sanguinis ab ano ad superiora invertat. Lugubrem id genus casum suppeditat M. ALBERTI (b): „Vir 40 circiter annorum, temperamenti melancholico - cholericum aliquot ab annis affectibus pectoris hæmoptoicis detinebatur, qui successu temporis in dolores cardialgicos, emeticos post assumptos cibos quotidie magis incrementales, non obstante usu Væ. Snum. in pede, desinebant. Hos in consilium vocatus Practicus, dato annotericos motus
„di-

(a) Diss. de hæmorrhoid. salubri & insalubri promotione. §. 9. p. 26.

(b) Diss. de fluxus hæmorrhoidal. provocatione (4to Halæ 1719 Resp. A. HERRMANN) thes. 17. p. 10.

„divertente ꝯe rhabarbarino juncto stimulo
 „colocynthiaco præsentaneè sustulit; redibant
 „tamen post aliquot dies, & disparuere rur-
 „sus sub iterato ꝯis usu cum levamine, in-
 „constanti tamen. Suadetur hirudinum usus;
 „quem tamen recusabat: potius alium adiit...
 „medicum. Hic postquam pravitatem ven-
 „triculi incusasset, vomitorium præbet; cuius
 „usum hyperemesis secuta, accedente ama-
 „rosi, & actuali excretionè sanguinis, sub qua
 „cruentam evomuit animam“. Haud secius
 proxime instantem præsentemve fluxum hæ-
 morrhoidum cohibent, sanguinemque earum
 ad viscera superiora alliciunt, ac non raro
 cruentum inducunt vomitum. Sic A. STEG-
 MANNI (a) „civis rite fluentibus quo-
 „vis vere, & autumnò hæmorrhoidibus opti-
 „me se habuit per aliquot annos. Accidit
 „autem, ut quodam tempore vernali, & qui-
 „dem instante fluxu hæmorrhoidali propter
 „inappetentiam ventriculi vomitorio (nescio
 „cujus consilio) usus sit; vomuit etiam, &
 „per 3 continuos dies sanguinem rejecit ni-
 „gerrimum. Steterunt exinde hæmorrhoides
 „fluentes, & illas exceperunt furentes, quas
 „tunc temporis sopivit externis lenientibus.
 „Appropinquante vero autumnò redeunt
 „hæmorrhoides furentes cum insigni præcor-
 „diorum anxietate, metu suffocationis, &
 „sin-

(a) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 4. Obs. 102.

„singultu molesto . . . ordinabam illi optima
 „quævis interna, & externa, verum sine ullo
 „levamine, & effectu. Refugi itaque irritis
 „omnibus aliis medicamentis ipsa sic jubente
 „natura ad vomitorium, quo dato sanguinem
 „crassum, & nigrum rursus rejecit, evane-
 „scentibus non longe post cunctis symptoma-
 „tibus. Quoties hinc ver, & autumnus re-
 „deunt, & vir hic insigne pondus in dorso,
 „lumbisque sentit; toties utitur vomitorio,
 „& ejecto exinde sanguine liberatur a præ-
 „dictis affectibus“. Hocce in casu unus quis-
 que mihi ultro dabit, emeticum, quemad-
 modum anomalo facto morbo evasit, neces-
 sarium; ab initio fuisse contraindicatum,
 exemplumque hoc vix esse imitabile ob sin-
 gularem suam infrequentiam. Eo etiam for-
 midabiliora sunt emetica drastica, præprimis
 mobilioribus ægris propinata, ut cholericus
 quidam hæmorrhoidarius, cujus casum C. F.
 DANIEL (a) literis mandavit, est expertus.

CAPUT

(a) Beiträge zur medicinischen Gelehrsamkeit,
 2 Th. 10. Abhandl. 1 Fall. p. 255. 1799.

CAPUT II.

CATHARTICA.

§. LXI.

II. **C**ATHARTICA in omni omnino hæmorrhoidalj affectione locum habent, nec nisi in placido, moderatoque hæmorrhoidum fluxu præsentē contraindicantur, ne forte illum ultra modum augeant, nimiumque efficiant. In reliquis autem hæmorrhoidum malis cathartica triplici præprimis scopo adhibentur, videlicet: ut

1. *Alvus* dura, segnis, reddatur facilis, liberaque.

2. *Biliofa cacochymia* educatur.

3. *Fluxus hæmorrhoidum* excitetur, quatenus actione purgantis humores uberius ad vasa intestini recti derivantur. Quorum itaque trium casuum cum præcipua ratio in hæmorrhoidum medendi methodo sit habenda, erunt.

§. LXII.

1. *Indicantia* cathartorum sequentes affectiones hæmorrhoidales:

a) *Cæcæ hæmorrhoides vel molimina* earum triplici ex causa utilitatem ex catharsi capiunt; primum enim alvum expediunt, ne a collecta fece, durataque non sine magnis editis nixibus egerenda compressio venarum sedalium, & infarctus proindeque tumor, dolor, &c. hæmorrhoidum augeatur: tum etiam sanguinis uberiorem copiam ad vasa recti derivando fluxum salutarem imminemtem promonent, suppressumque revocant (i. e. regurgitantem sursum sanguinem ad recti vasa denuo reducant): denique & humorum copiam alias imminuunt, sicque ipsum vasorum sedalium infarctum minuunt vel prorsus etiam tollunt. Ad posteriora duo pertinet, quod GALENUS (a) narrat: „Romæ . . . L. MARTIUS . . . „quotannis incidere in melancholiam consueverat . . . cum nihil (ab aliorum medicorum opera) proficeret . . . Ego . . . ex „solo colore feci de noxio humore conjecturam, ipsumque esse melancholicum cognovi: „itaque eum ipsum evacuavi, & statim LUCIUS „est melancholia liberatus. Huic (b) homini „expurgatione ambo hæc optima eveniunt, „quod & superfluitates expelluntur, & quod „ex acritudine eorum, quæ excernuntur, pa-
rum-

(a) In lib. HIPPOCR. de humorib. Comment. 3. Nro 12.

(b) Ibidem in HIPPOCRAT. aphor. Comment. 6. Nro 47.

„rumpèr aperitur os venæ, quam vocant
 „hæmorrhoida, per quam excernitur pars ali-
 „qua sanguinis vitiosi consueti evacuari; quò
 „retento supervenit melancholia. Purgo igi-
 „tur ipsum non vere tantum sed etiam au-
 „tumno . . . si ex contemptu aliquando pur-
 „gationem omiserit, & morbum non anticipa-
 „verit, casus persentit passionis.“ Pro aver-
 tendis sane hæmorrhoidalibus incommodis,
 præsertim sanguinis sursum regurgitantis, nil
 utilius est, quam vere autumnoque & sangui-
 nem (si opus sit) demere, & alvum ducere, id-
 que vel maxime æquinoctiorum tempore.

b) *Suppressæ* quoque hæmorrhoides du-
 plici de causa catharsin exigunt, nimirum ad
 mala suppresso ex fluxu enata abigenda, tum
 ad fluxum ipsum (re ita poscente) revocan-
 dum. Utrumque perficitur humoribus à ca-
 thartico anum versus motis. J. A. GENSELII
 (a) viro „36. ætatis suæ annum agenti ex sup-
 „pressionē . . . fluxus hæmorrhoidalis tam
 „atrox cordis palpitatio, cardialgia, asthma,
 „tussis, anxietates ad usque deliquium animi
 „ingruebant, ut morituum confestim time-
 „rent, quotquot intuebantur, singuli; aperta
 „vero laxantibus alvo statim restitutus est.
 „Cum vero maturius; quam debebat, curæ
 „se

(a) Annal. Vratisl. Tent. 8. A. 1719 Jur. l. 2:
 art. 3. §. 3. P. 674.

„se subtraxisset, orgasmo humorum incarce-
 „ratorum, nec sufficienter adhuc expurgato-
 „rum nondum plane sopito in rheumatismum
 „arthriticum lapsus est, ex quo non nisi lon-
 „go tempore eluctabatur.“ Eandem cathar-
 seos in fluxu hæmorrhoidum suppresso revo-
 cando, malisque a suppresso illo ortis abigen-
 dis utilitatem experta est apud P. R. VICAT (a)
 virgo 40 annorum, e scrophulosis parentibus
 orta, phlégmatico - sanguinea, dudum vale-
 tudinaria, quæ post nimium hæmorrhoidum
 fluxum cohibitum in biennalem incidit rheu-
 matismum, hemicraniam, aliosque dolores
 per vices torquentes. His silentibus succes-
 sere in aliquot menses furunculi complures
 grandes; alius ex alio, modo singuli, modo
 numerosi difficillime & quidem plerumque post
 40 primum dies suppurantes, apice aliquot
 ante rupturam diebus nigrescente, acerbissi-
 meque dolente. Ruptus tumor saniosum pus
 diu admodum, & cum rosionis sensu fundens
 ægerrime claudabatur. Tandem 10ma Octobr.
 varix hæmorrhoidalis ano protuberans post
 multos cruciatus crepat cum levamine, pro-
 fuso paucio sanguine viscido. Menses item
 a 10 diebus retardati simul fluxere; at parce.
 Eodem tempore furunculus, dudum in ingui-
 ne apertus, brevi coivit. Abhinc ægra dies
 ali-

(a) Delectus observ. pract. append. obs. 28.
 P. 284.

aliquot commodius habuit, donec 18va Octobr. denuo de anorexia, debilitate, vagisque imo in ventre doloribus quereretur. Quæcum instantem vel mensium, vel hæmorrhoidum vel amborum fluxum portendere viderentur, hunc Auctor promoturus præbet horis ante pastum cochlearia ij. infusi rhei vinosi cum ꝓro solubili, cujus post tridui usum varix rursus oborta, ac rupta, copiosiori nunc sanguine profuso, omnia ante dicta levavit mala. Vires valde exiguæ restaurabantur, finemque curationi imposuit usus \mathcal{R} æ \mathcal{O} ii regulinæ LUDOLFI ter in dies ad gtt. 40. imperatæ, ex decocto sequenti:

\mathcal{R} . Saponar :

Cichor aa \mathfrak{z} ijß.

Polypod \mathfrak{z} j. concis. coqu. in

∇ æ \mathfrak{t} ß vj. sub finem adde

Cort. cinnam. \mathfrak{z} ij. colat. \mathfrak{t} ß jv. D. U.

Horum ab usu ægra post 8 dies optime se habuit.

c) *Nimix* denique etiam hæmorrhoides non raro catharsi cedunt, quando nempe occasionalis earum causa primis in viis hæret, quæ ut plurimum colluvies biliosa esse consuevit. Hinc L. RIVERIUS (a) de curatione immo-

(a) Prax. med. L. 10. C. 10.

immodici hæmorrhoidum fluxus agens, „pur-
 „gatio etiam blanda (inquit) humores bilio-
 „sos sanguini impetum conciliantes ad inte-
 „stina derivat.“ Perinde F. HOFFMANN (a):
 „quando cum virium jactura, & nobiliorum
 „functionum læsione effusior fluxus diu persi-
 „stit, incipiensque viscerum labe subest, &
 „magis serosi, aquei; quam consistentis, fi-
 „brofi sanguinis copia delinquit, conferunt
 „quam maxime ea, quæ succos vitiosos, ac
 „biliosos clementer, paulatimque per alvum
 „educunt, simul atque humorum motum a re-
 „cto intestino ad tunicas, & glandulas reliquo-
 „rum intestinorum alliciunt.“ Denique unus
 omnium instar audiendus hic O. BORRICHIVS
 (b) quærens: „an fluentibus liberaliter hæmo-
 „rrhoidibus liceat uti cathartico? Dubitandi
 „ratio (subdit) inde proficiscitur, quod pur-
 „gantia turbent aperiantque, & hoc pacto
 „ampliorem profusioni sanguinis videantur ape-
 „rire fenestram. Contra humorum acrimonia
 „interea suadet catharticum, ne illi incubitu
 „longiori hæmorrhoidas patefaciant largius.
 „In hoc bivio tutius purgari; quam abstinere
 „docuere me experimenta; fuere enim ex æ-
 „gris meæ fidei commissis, qui menstruis ejus-
 „modi evacuationibus vexati cum viderent se
 „tan-

(a) Med. rat. Syst. T. 4. P. 2. S. 1. C. 4.
 Curat. §. 2.

(b) Act. med. Hafniens. Vol. 2. Obs. 64.

„tandem debilitari non criticis; sed symptomaticis his excretionibus, opem flagitare: quibus ego frequenter infuso rhabarbari succurri, observans ternis alvi solutionibus inter purgandum vix tantum cruoris effundi; quantum una vice extra purgationis tempus excerni solet; imo sæpe in ipsa purgatione ne guttam sanguinis profluere, aversa alio humorum rodentium acrimonia.“ Et vero aliorum id quoque comprobat experientia. Apud G. W. WEDELIUM (a) „vir primarius per aliquot menses fluentibus hæmorrhoidibus molestatus assumpto leni purgante alias ipsi familiari plurimis evacuatus est sedibus per biduum, nec post feces aliud subsecutum est; quam liquor plane biliosus: unde illico hæmorrhoides substitere, nec per plures septimanas post vel minimum de illis sensit amplius.“ Imo interdum similis hæmorrhoidum fluxus vel nullis aliis; quam purgantibus cedit remediis; vel saltem non sine noxa alia medendi methodo tentatur. Sic „memini, ait R. SOLENANDER (b), me ANNAM ex Ducibus Clivenſium prognatam gravissimo hæmorrhoidum, diuturnoque fluxu curantem magna diligentia, summoque nisu, quia viderem viribus labefactatis, spiritibusque dissolutis summum discrimen imminere, pro-

„fluvi-

(a) Opiolog. L. 2. S. 2. C. 5.

(b) Consil. 22. Sect. 4.

„fluvium obfirmasse (cohibuisse). Verum cum
 „illa inde, imo die recreata, sequentibus mi-
 „rifice gravari, & circa præcordia tumere,
 „atque inflari inciperet, revocatus 6to die,
 „coactus venis reclusis profluvium rursus mo-
 „vi; neque potui secure, & tuto stringere;
 „priusquam corpori lenibus evacuationibus,
 „hepatique necessario aliis alterantibus, at-
 „que roborantibus prospexissem“. Atque ex
 his, pluribusque paulo post dicendis abun-
 de liquebit (opinor), quanti sint usus ca-
 thartica in immodico hæmorrhoidum fluxu
 compescendo. Verum quantamvis proficua
 hic sint; tamen nec sine selectu, nec sine
 cautelis ea præbere oportet.

§. LXIII.

2. *Delectus* autem talis esto, ut qua-
 cunque in hæmorrhoidali affectione, ubi al-
 vus ducenda est, mitissima sint eccoprotica,
 sive lenitiva aut minorativa olim dicta. Nam-
 que monente L. RIVERO (a) circa hæmo-
 rrhoidum dolorem, „purgantia potentiora in
 „hoc affectu non conveniunt; quia humorem
 „ad partem attrahunt, & tumorem irritant;
 „attamen alvus continuo emollienda est;
 „quia dura excrementa & cum aliquo conatu
 „emissa dolorem exasperant“. Perinde i. c.

FROM-

(a) L. c. Cap. II. p. M. 376.

FROMMANNUS (a) de cœcis hæmorrhoidibus curandis agens „lenientia autem semper (ait) „præferenda sunt purgantibus fortioribus, & „ad hæc non nisi per gradus progrediendum; „quippe hæc majorem ad vasa jam ante affe- „ra affluxum concitando obstructionem, & „hinc dolorem pariter, ut in obstructione „alvi pertinaciore, mirum quantum possunt „augere“. Quid mirum? quando quidem drastice purgantibus hæmorrhoides cœcæ nondum præsentēs haud raro procurantur (b). Et quoniam ab iisdem visus est immodicus hæmorrhoidum fluxus induci (c); tanto etiam minus convenient ipso jam præsentē, ne eundem reddant profusissimum, & immedicabilem. Sed neque in suppresso fluxu revocando valentiora cathartica adhibere satis tutum est, ne, dum fluxum intendimus provocare moderatum, is aut immodicus accadat, aut ejus loco hæmorrhoides cœcæ dolentissimæ, furentes progignantur, serio enim superius (d) est inculcatum, placidissimam medendi methodum in omni hæmorrhoidali affectione tenendam

(a) Tract. de hæmorrhoidib. P. 2. Probl. 30. p. 393.

(b) Vide §. 19. (d).

(c) Ibidem.

(d) Vide §. 57. IV.

dam esse „siquidem (a) negotium hæmorrhoidale ita delicatum, atque facillimis anomalis expositum est, ut vel levissima causa pro turbis eminentibus concitandis satis faciat, quæ posthac non ita facile emendari, & placari possunt“. Commendatissima vero plurimorum suffragio hic sunt cathartica sequentia :

a) \ominus *Epsomense*; quippe quod testante I. D. GOHLIO (b) „minores molestias semper creare solet in subjectis hæmorrhoidibus, cœcis laborantibus“.

(b) \odot *Fulminans*, quo nil efficacius expertus est S. T. QUELLMALZ (c) ad hæmorrhoidum fluxum vel excitandum, vel suppressum revocandum: „non semel (inquit ille) auri hanc calcem extractis quibusdam amaricantibus laxantibusque parce adjunctam, viris quibusdam athletico alias habitu corporis præditis præscripsi, & mirum est dictum! quam unica tantum dosis hæmorrhoides perrenni,

(a) M. ALBERTI diff. de hæmorrhoidib. excedentib. §. 25. Tract. de hæmorrhoidib. P. I. p. 211.

(b) Act. med. Berolin. dec. 2. Vol. I. Sect. 2. p. 78.

(c) Commerc. Nor. T. 5. A. 1735 hebd. 39. Nro 2. p. 306.

renni, quamquam lenissima, diarrhœa stiptas excitare potis fuerit“. At sine salibus mediis remedium dandum est, cum iis enim hypercatharsin cum intestinorum spasmis creat.

c) *Tamarindi* vero præprimis in immodico hæmorrhoidum fluxu palmam aliis præripere creduntur FROMMANNO (a) teste, non tam quod præter virtutem purgantem etiam aliquatenus stiptici sint; quam quod ad biliosam colluviem, cui toties immodicus hæmorrhoidum fluxus debetur (b), auferendam par sibi remedium non habeant: Hinc etiam docet H. MERCURIALIS (c) tamarindos præcipue ad compescendum huiusmodi sanguinem fluentem miram quandam potestatem habere, tam decoctos; quam in substantia usurpatos; imo pruna nostratia acidula, quæ aliquo modo tamarindos æmulantur, frequenter esitata ante alios cibos huic rei etiam conducere.

d) *Rheum* autem hocce in morbo omnium eccoproticorum princeps est, omnium pene medicorum suffragio; quod præter vim catharticam etiam tonicam (in affectionibus hæ-

(a) L. c. Probl. II. p. 260.

(b) Vide §. 22.

(c) RIVER. l. c. Cap. 10. p. m. 274.

hæmorrhoidalibus curandis perutilem) possideat. Solus illi, crebrius præsertim sumto diffidit L. F. B. LENTIN (a): „sæpe enim „sumtum (ait) singularem post se relinquit in „nervis debilitatem, quam ipse sum exper- „tus. Hac occasione monendum duxi cum „rheo in feminis debiles nervos nactis, & ad „spasmos pronis caute admodum esse mercan- „dum: verum est, a ꝥ rhei ante somnum sum- „ti huncce tam placidum sequi, ut cum som- „no ab opio non sit conferendus; at exper- „rectus æger peculiarem per omnes artus per- „cipiet sensationem, haud injucundam qui- „dem; sed aliquali tamen cum virium jactura „conjunctam“. Interea nemo (quod sciam) alius practicum hæc eadem observavit, indubiisque constat exemplis, rheum in immo- dico præsertim hæmorrhoidum fluxu compe- scendo miracula sæpe patrasse. M. ALBERTI (b), postquam varia eccoprotica ab aliis commen- data memorasset, demum „nos (ait) hoc loco „præferimus rhabarbarum, quod præ reli- „quis probatum, & securum est, & hoc vel „in substantia, vel in simplici infuso lauda- „mus. . . Et tale quidem rhabarbarum licet, „si hæmorrhoidum fluxus diuturniori successu „excessum commiserit, repetito ordinare“. Perin-

(a) L. c. p. 162. fq.

(b) L. c. p. 212.

Perinde apud F. HOFFM. (a), eodem in casu commendantur „rhabarbarina cum passulis minoribus, & tamarindis, vel (quod idem) cum cremore tartari, si corpus est biliosum, in potione, elæosaccharo citri condita.“ Ad-damus observationes M. ETTMÜLLERI (b), „puer 12 annorum dolore, & fluore hæmorrhoidum internarum laborabat. Licet igitur „alvus quotidie esset aperta, idque forsan „occasione doloris stimulantis, dedit tamen „sequentem ꝯem cum euphoria (præmissis „♂libus, sed irritis):

R. ꝯ rhabarbari ʒj.

Corall. r. ʒß.

Lap. hæmat. gr. V. M.

„Inde enim omnia evanuerunt symptomata;
„& cum post aliquot septimanas idem malum
„recurreret, eodem ꝯ denuo curabatur“. Pa-
riter L. HEISTERUS (c) anniculo puero ube-
rem ab aliquot diebus hæmorrhoidum fluxum
post alvi dejectionem patienti (præviis ante
obortum fluxum torminibus) dedit:

R. Animæ rhei ʒß.

Su-

(a) L. c.

(b) Obs. med. 303. Opp. T. 2. P. 2. p. 435.

(c) Medic. chir. u. anot. Wahrnehmung. 2. Band.
Nro. 221.

Sumat mane, versus meridiem, & 6ta
vesperi gtt. xij. ad xv. Porro

℞. Lap. 69. citrat. ʒij.
Corall. r. ppt. ʒj. M. F. ☿.

S. vesperi ad cultri cuspidem. Ab horum
usu fluxus desinens cum non multo post redi-
isset; imperatus ulterior horum remediorum
usus. Idem (a) seni 60 annis majori assidu-
um a semestri hæmorrhoidum fluxum multis
cum doloribus, extenuatione, viriumque la-
psu passo, post multa ab aliis medicamenta in-
cassum data præscripsit:

℞. Rhei ʒj.
Θ ☐ri ʒj. coqu. in
▽æ font. ℥ij. Colat. ʒviiij. adde
▽æ Cinnam. c. v. ʒj. M.

S. mane, 3tia a meridie, & ante somnum
Cochl. j. Intra 14 dies fluxus, doloresque
fere prorsus conquievire, & appetentia, hac-
tenus omnino nulla, rediit. Ab ulteriori
itaque remedii m. & v. usu senex convaleuit.
O. BORRICHIVS (b) tantum rheo confusus
est, ut neque gravidis immodico hæmorrhoi-
dum fluxu laborantibus obfuturum censuerit.

„Quo-

(a) Ibidem Nro 466.

(b) L. c.

„Quoties autem (dicit ille) gravidæ supervenit fluxus hæmorrhoidum (ut fit quandoque), & is nec quiete, nec leniter adstringentibus sistitur, ægra interim quotidie languidiore, ambiguum est, utrum rhabarbaro locus sit? Sed certum, potius isthuc veniendum; quam cum evidenti periculo vel foetus, vel puerperæ, vel utriusque rem naturæ beneficio permittendam. Qui fortioribus hic insistit, raro ita circumspecte rem transigit, ut non alterutri immineat exitium“. In aliis vero extra graviditatem casibus quantum ægris solum rhabarbari infusum commodi attulerit in immodico hæmorrhoidum fluxu, paulo ante ex eodem Auctore vidimus (a).

§. LXIV.

3. *Cautelæ* denique in catharticiis adhibendæ tamquam corollaria e præcedentibus sequentes eruuntur:

a) *Iterantur*, si opus sit; cathartica in diuturniori, ac rebeli hæmorrhoidum fluxu, ut id superius (b) M. ALBERTI cum rheo faciendum præcipit.

b) *Ta-*

(a) Vide §. præced., (c)

(b) Ibidem (d)

b) *Tamarindi* rheo præferuntur, vel certe junguntur, ubi manifesta colluviei biliosæ signa præsto sunt, ut id recte a F. HOFFMANN (a) est notatum

c) *Tonica* pulchre catharticiis junguntur, ubi alvus dura, difficilisque cum intestinorum laxitate hæmorrhoides vel causat, vel fovet. Hujus commatis exemplum R. LENTILIUS (b) literis prodidit mulier ad 24. annos nata, leucorrhœam diu passa, quater partu levata, post difficilem ante trimestre partum cœpit alvi constipatione vexari cum laboriosissima durorum scybalorum egestionem. Post 6 hebdomades accessit hæmorrhoidalis tenesmus cum varicibus ani. Alvus quotidie cum vix tolerando labore, ac dolore feces cum sanguine reddebat. Ardor lotii aderat. Lactabat puerum; menstruis carebat, quæ semper alias lactans experiebatur. Cetera & appetebat, & dolore cessante bene habebat. Cum a bolo e pulpæ cassiæ ʒß. cum ꝯ Haly rec. ʒj., & laud. op. gr. j. sumto nil levata fuisset, postmodum stridie datum electuarium;

R. Conf. fl. symphit.

— — Salv. aa ʒß.

Pulp. Cassiæ ʒj.

Thur.

(a) Ibidem.

(b) Jatromnem, theor. pract. P. 2. C. 7. p. 402.

Thur. masc. succ. a. ppt.

Corall. a. ppt. āā ʒj.

⚔ Haly. rec. ʒij.

Syrup. rosar. sicc.

— de Symphit. FERNEL āā q. S. F.
elect. molle. S. M. & V. juglandis magnitu-
dine.

Anus & varices ungantur calide sequen-
ti litu:

℞. Unq. SCRETÆ ad rhagad ʒjß.

Mucil. sem. cydon. ▽a malv. extr. ʒj. M:

Ab his ægra sensim integram recuperavit
valetudinem, sola superstite leucorrhœa. Lu-
culentior etiam est casus I. C. SPROGELII (a):
civis hæmorrhoidibus cœcis laborans repente
insigni stranguria calculum vesicæ mentiente
corruptus est, cum tanta sphincteris vesicæ
contractione, ut catheter calculi præsentiam
detecturus spasmus, ac dolore prohibentibus
nullatenus indi potuerit. Unde cum malum
non tam a calculo; quam hæmorrhoidibus
ortum esse liqueret, datum 3tio quovis die
per 3., vel 4. vices eccoproticum ex ⚔ti dul-
cis gr. v. cum s. q. conservæ rosarum, inter-
positusque usus Ræ. ♂. cum vino malva-
tico

(a) Misc. nat. cur. Cent. 7. Obs. 67.

tico factæ. A prima catharſi mox omnis veſicæ dolor, ac ſtranguria deſiit, continuatiſſime cathartico, & $\overline{R}a$ ♂ æger ab hæmorrhoidibus cœcis eſt liberatus.

d) *Antispasmodica* quoque pulchro cum ſucceſſu adduntur eccoproticis. Hinc euporiſtus eſt nonnullis ♂is ſequens in omni affectione hæmorrhoidali:

$\overline{R}x$. ♂ antispasmod. rubri.

Magneſiæ \odot .

Rhei electi. \overline{aa} ʒij. M.

S. bis terve de die cochlear j. caſſeaceum.

CAPUT III.

DIAPHORETICA.

§. LXV.

III. **D**IAPHORETICA quoque hæmorrhoidariis interdum utilia eſſe cenſuit F. HOFFMANN (a), idque in immodico præſertim hæmorrhoidum profluviio, ſi a vitioſa ſanguinis tenuioris conſtitutione provenerit; enim vero, tum quoque temperatiora diaphoretica
(in-

(a) L. c.

„(inquit ille), corrigendo, & expellendo
 „acres humores, officium faciunt opportunum;
 „ibi maxime, ubi scorbutici, vel purpuracei
 „aliquid, aut alius exanthematicæ materiæ san-
 „guinis, & feri contextui altius inhæret. Ho-
 „rum in numero sunt C. C. ustum, . . . unicornu
 „fossile, diaphoreticum ♂, acetum vini cum
 „lap. 69. mixtum, ▽^a galegæ, florum sam-
 „buci, cardui benedicti, theriacalis, simplex
 „MRa, diascordium FRACASTORII, quæ in
 „portionem lege artis possunt redigi. Nec pro-
 „letaria virtus est, liquoris anodynii minera-
 „lis cum 4ta liquoris bezoardici BUSSIANI
 „parte nupti, infusi item theiformis ex mille-
 „folio, veronica, pilosella, aliisque concin-
 „nati, & cum dispositione in lecto, aut con-
 „clavi ad blandum sudorem poti. Atque etiam
 „non possumus non hoc loco merito commen-
 „dare refractam camphoræ dosin ad gr. f,
 „præsertim quando nitrosis & bezoardicis
 „♂bus commiscetur; hac enim ratione acris,
 „& caustica materia, quæ sæpe spasmodum
 „æqualem sanguinis comitatum turbantium,
 „& hæmorrhagiam largam inducentium causa
 „est, obtunditur, & foras ejicitur, simul ad-
 „stringentium, & anodynorum vis tantisper
 „ne noceat, refroenatur. Itaque non ineptus
 „censendus ille Veterum mos, quo campho-
 „ram præcipuis ad sistendas etiam hæmorrha-
 „gias medicinis commiscuerunt, ut ut exigua
 „admodum dosi, cujus generis sunt species de
 „hyacintho, diatrion santali, diatrion Abba-
 „tis, trochisci de carabe, sperniola CROLLII,

„nec non famigeratissimus HEURNII ad sistendum sanguinis fluxum pulvis“. Omnia hæc ut vera sint; nihil tamen effatu dignum a diaphoreticis in hæmorrhoidalibus malis præstitum apud observatores reperi; nisi forte titulo camphoræ cum *TRa* ⊕ ii exhibitæ huc referenda est F. HOFFMANNI (a) observatio: „Judæus annorum 50, natus patre hæmorrhoidario, & ipse a prima statim ætate sanguinis stillicidiis, in variolarum quidem, & „morbillorum morbo e naribus, ac postea „hæmoptysi obnoxius, 40 anno cœpit primum pati hæmorrhoidalem fluxum, qui postea singulis fere mensibus, ac nonnunquam „sub fortiori, in itinere maxime, corporis „commotione rediit effusior. Quod cum sine „sanitatis detrimento contingeret, tulit patienter; sed cum aliquot abhinc annis insisteret profluvium diutius, idque largum; „inde admodum fuit debilitatus, & appetentia cum digestionem labefactata. Quare ut „auxilium quæreret, fuit coactus ad moderandum fluxum; ex variis autem, multisque remediis obtinuit nullum. Optimum „tamen tulit ⊕ *TRa*. ex ⊖ e ⊕ ri, & regulo ⊕ ii parata, & non tam acris; quam quæ „cum ⊙ o conficitur, in cujus uncia soluta „camphoræ 3ß, & mane, vesperique cum „aquæ frigidæ haustu sumta ad gtt. 20“. Am-
bi-

(a) Ibidem Observ. 2.

biguum quoque est, essentiæ ne alexipharmacæ STAHLII, an unguento debeatur apud P. H. G. MOEHRINGIUM (a) curatio septuagenarii proceri, macri, turgidis vasis præditi, qui in hyemē post ventris dolores, & anorexiam, crebrosque meteorismos hyberno solstitio sub frequenti tenesmo feces cum sanguine egere cœpit; abhinc vero ad 19am Junii usque jam serum subcruentum; jam flavescent liquor; jam sanguis merus prodibat, meteorismo nunc factō molestiore, tumidisque varicibus per vices ex ano prostantibus: donec ante novissimum triduum ani inflammatio illi accidisset cum tanto hæmorrhoidum fluxu, ut periturus videretur. Pergente ergo jugi adhuc fluxu cum magno cœcarum hæmorrhoidum ardore, præscripsit Auctor:

R. Mucilag. sem. fænugr.

— — psyll.

— — cydon aa ʒß.

Mastich.

Camphor aa ʒß. vel. q. s. pro unguento ano applicando. Interne vero datæ ter quotidie gtt. 50. essentiæ alexiph. STAHLII.

Ab his brevi post dolores, & fluxus desierunt, varicesque evanuerunt sine ullo in triennium

(a) Histor. medic. Obs.; 23. p. 176. sq.

ennium inde alio malo confecuto. Paratur autem effentia dicta (a) huncce in modum:

R. Rad. imperatoriæ
 — angelicæ
 — helenii āā ʒj.
 — hirundinariæ
 — pimpinellæ
 — carlinæ āā ʒjß.
 Herb. scordii ʒiij.
 V rectif. ℥ ijß.

Post sufficientem extractionem exprimantur, & per filtrum trajecta effentia servetur. Dosis a gtt. 40. ad 50. Non est autem hic omit-tenda MRa *tonico-nervina* STAHLII dicta, quam D. W. TRILLERUS (b) hunc in modum conficiendam sistit:

R. Ræ ʒii regulinæ ʒij.
 Ω C. C. rectificati ʒj. M.

Præparationem autem TRæ ʒii, quam STAHLIUS (c) alcalinam acrem vocat, apud ipsum videre est. Neque vero proportio horum duorum semper esse debet, ut 2. 1; nam
 pro

(a) TRILLER dispens. pharm. T. 2. p. 270.

(b) Thesaur. medicam. T. 2. p. 414.

(c) Colleg. casual, magn. Cas. 69. p. 686.

pro re nata jam unius; jam alterius copia major sumi potest (a). Præfert autem Auctor hoc remedium in cohibenda quavis hæmorrhagia omnibus aliis cohibentibus, & adstringentibus, quod istis multo illud sit securius, & cito, facileque illas sistat, aut certe moderetur, si ter quaterve per diem exhibeatur ad gr. 30. 40.: id quod multiplici se experientia edoctum esse testatur (b).

CAPUT IV.

SOLVENTIA.

§. LXVI.

IV. **S**OLVENTIA ex *incidentibus*, ac *diluentibus* conflata in hæmorrhoidali morbo summi sunt usus; quando quidem hæmorrhoides symptomaticas ex lentore, & obstructione viscerum enatas, cum cæcas; tum immodicas tollunt, criticas vero promovent, suppressas denique ob lentorem provocant, acrimoniæque humorum emendant, &c. Hinc recte

G,

(a) Ibidem casu 39. p. 411.

(b) Ibidem casu 4. p. 88, casu 6. p. 108. casu 14. p. 183. &c.

G. G. LUDWIG (a): „primaria medici cura
 „eo tendat, ut liberam sanguinis circulatio-
 „nem quemadmodum in corpore universo, sic
 „in systemate venæ portæ præcipue restituat,
 „ideoque elaborationem humorum omnium
 „non solum ratione primæ digestionis; sed
 „etiam in massa sanguinis, & omnibus inde
 „deductis humoribus adjuvet. Hoc resollen-
 „tia efficiunt medicamenta diluentibus juncta;
 „quæ cum diversissima sint, dispositioni cor-
 „poris ægri omnino accommodari debent“. Id est, pro variâ lentoris in humoribus natura varia etiam solventia locum habent. Namque in mucosa diathesi salina blanda cum aquosis profunt; sed „quoniam . . . pituitosa humo-
 „rum indoles, inquit LUDWIG (b), rarissime
 „hæmorrhoides conjunctas habet, ad atrabi-
 „liariam præ reliquis respiciendum est, quæ
 „tenacitatem summam monstrat, & nigrum,
 „nimisque crassum cruorem offert. Hanc au-
 „tem dispositionem corrigunt potissimum ama-
 „ra plantarum extracta, gummi saponaceis
 „juncta; cum in his vis nervina simul emine-
 „at, quæ spasticas tensiones corrigit, & inde
 „(in primis ubi diluentia, leniter resolventia
 „in ptisanis simul addi possunt) circulum hu-
 „morum omnino liberiores reddunt“. Contra

(c) Adversar. med. pract. Vol. 2. P. 3. S. 1.
 p. 396. fq.

(b) Ibidem p. 397. fq.

tra ea, ubi hæmorrhoides cum phlogistica sanguinis spissitudine, ac febre inflammatoria furunt, antiphlogisticis, subacidis, nitrosisque opus est. In hæmorrhoidali illa Ill. STÖRCKII (a) febre post sanguinem pro magnitudine morbi demtum „si dein decoctis antiphlogisticis, nitrosis, subacidisque alvus leniter „aperta, & fluxilis reddita est, tunc morbus „cito levabatur. Qui decocta subacida, & „nitrosa ferre non potuerunt, his demulcentia, emollientia, & oleosa profuere“. Sunt autem ex classe solventium aliqua, quæ in hæmorrhoidali morbo præprimis se commendant, nempe

§. LXVII.

1. *Nitrum* hic præcipue laudatur, non modo, quod ad omne lentoris genus subigendum; verum etiam, quod ad orgasticum sanguinis motum temperandum sit eximiarum virium; quo posteriore scopo teste G. E. STAHLIO (b), „omnia alia medicamenta facile post se relinquit“.

HELWICHII (c) sacerdoti e S. J. nimium hæmorrhoidum fluxum cum æstu vago, aliisque symp-

(a) Ann. med. 2. p. 151. fq. confer. §.

(b) Diss. de hæmorrhoid. internar. motu Cap. 6. p. 26.

(c) Histor. morborum Vratisl. p. m. 22.

symptomatibus ad omnia rebellem præscripti ad domandam sanguinis ebullitionem ꝯis ① si una dosis ocys minuit, altera prorsus cohibuit. Nitrum ideo ciunabari addita, est summe temperans, & nitroso cinnabarina scopo temperante STAHLIANIS, ac HOFFMANNIANIS usitatissima fuere. Pauca quædam exempla e STORCHIO videamus. Viro (a) sanguineo, & eusarco 60 annorum, subinde insultus podagræ pati solito, & ob hæmorrhoides solito parcius procedentes ab aliquot hebdomadis dysorexia laboranti, a sequenti pulvere promotus hæmorrhoidum fluxus paulo post appetitum reddidit:

- ℞. ꝯ antispasmod. ʒj.
 — arcan. dupl.
 — magnes. alb. ʒā. ʒj. M.

Divid. in 5 doses. S. m. & v. unam. Porro (b) vidua hæmorrhoidas immodicas cum tenesmo, ad syncopen usque vehementi, passa, ab usu sequentis ꝯis convaluit:

- ℞. ꝯ antispasm.
 — ① purifs. ʒā. ʒj.
 — magnes. alb. ʒij. M. div. in 8 doses.

Deni-

(a) Prax. casual. med. T. 2. cl. 4. p. 445.

(b) Ibidem p. 444.

Denique (a) opifici 30 annis majori, ac macro hæmorrhagia narium, hæmoptoë, ac hæmorrhoidibus simul sine causa manifesta laboranti hæmorrhagiæ omnes desistere ab usu hujusce ꝑis :

℞. ⚡ antispasm.
 — ① puriss. āā. ℥j.
 — corall. r. ℥j. M.

Divid. in 7 doses. S. quavis 3. vel 4. hora unam ex aqua fontis. Nescio quid singularis virtutis abditæ insit salibus mediis præter vim solventem ad spasmos quoque sedandos, hæmorrhagiasque compescendas; de sale certe communi eadem hodie, quæ nitro tantum STAHLIUS attribuit, referuntur. SCHIPPEN teste MICHAELIS apud A. G. RICHTERUM (b) vehementissimum ex ano sanguinis profluvium exhibito salis vesci cochleari stitit, & SCHIELE intra pauca momenta horrendam hæmorrhagiam eadem illius dosi cohibuit in viro, quem in via reperit.

§. LXVIII.

2. *Arnica* quantis polleat solventibus viribus, docet insignis ejus efficacia in contusio-

(a) Ibidem p. 406.

(b) Chirurg. Biblioth. 7. Band. 3. St. 2. Beytr. p. 583.

fionibus ad grumofum fanguinem attenuandum: plurimum proinde etiam in liquando fanguine coaſto atrabiliario ab eadem eſt exſpectandum. Idcirco ſi ab nimio ejus lentore, ac ſpasmis concurrentibus hæmorrhoidalis fluxus fuerit interceptus, arnica, cum & ſolvens, & nervina ſit, utrique medebitur, attenuatoque cruore, ac ſpasmis ſublatis fluxum procurabit. I. F. HENNING (a) decoctum hujus herbæ ad revocandum hæmorrhoidum fluxum ſemper cum fructu præbuit uſurpandum. „Muller e metaſchematismo hæmorrhoidali incongrue concitato ſtaſin ſanguinis circa venam hæmorrhoidalem internam incurrens ſphaceloſam, inſigne levamen ſenſit ab uſu herbæ noſtræ infuſæ (ut ut: ob ſubſequentem ſphaceloſam vicinarum partium corruptionem non potuerit omnino malum tollere), ſiquidem quoties adhibuit iſtam, non ſolum molimina excretoria ſuborta; ſed etiam aliquoties ſanguinis grumofi foetidi corrupti per ſedes expreſſio cum levamine. Si mature mali cura fuiſſet habita, ægra indubie fuiſſet curabilis“.

§. LXIX.

3. *TRa* § ii *aeris cum liqu. anod. min.*
HOFFM. in ſuppreſſo hæmorrhoidum fluxu re-
VO-

(a) Annal. Vratiſl. Tent. 22. A. 1722. Novembr. cl. 4. art. 15. S. 2. p. 581.

vocando probatissima esse a G. SCHÜSTERO (a) perhibetur. „Duo senes sexagenarii (narrat ille) hæmorrhoidalem fluxum hæcenus „regulariter experti, nunc vero eodem destituti auxilium meum rogabant, ejusque restitutionem desiderabant. Consideratis, probeque „perpensis circumstantiis utrique præbui „TRam ℥ ii acrem cum æquali proportionē „liquoris anodyni conjunctam, hujusque „MRæ gtt. 40. bis vel ter quotidie sumere „jussi. Optatus votis respondebat eventus, „dum paucorum dierum vix elapso intervallo „consueta hæmorrhoidalis recurrebat excretio, „debitoque ordine dein cum euphoria continuabat, similemque dein effectum hoc remedium in aliis etiam subjectis præstabat“. Sane si MRa hæc ex incidente TRa ℥ ii , & antispasmodico liquore anodyno conflata cum arnicæ indole conferatur, liquebit ratio, cur suppressas hæmorrhoides revocandi vi polleat.

LXX.

4. Flores \triangle ad stases hæmorrhoidales discutiendas, ortaue ab iisdem symptomata mitiganda ultra fidem pene sunt efficaces, præsertim vero ad alvum adstrictam-tenesmoden facile referendam. Hosce in usus flores, aut
lac

lac sulphuris commendat P. G. WERLHOF (a) „plerumque (inquiens) ad $\frac{1}{2}$, integramve „drachmam, imo sæpe ad aliquot drachmas „datum, & repetitum (\triangle regeneratum seu „flores \triangle) aluum cum foetore sulphureo sol- „vit, & asthmaticæ oppressioni, & colicis do- „loribus, cardialgicisque . . . egregium leva- „men præbet“. Imitatus hoc consilium I. C. STUNZER (b) præbens in alvo adstricta, & inter desidendum dolorifica m., & v. florum \triangle 3ß. „levamen, ut in plerisque ægris ob- „servavi. (ait), admodum celeriter consequi- „tur“. Haud secius LENTIN (c) testatur do- lentissimum tenesimum, qui alvi excretionem excipit, lacte sulphuris quotidie ad \mathfrak{zj} dato, enematisque ex herbis emollientibus cum semin. Siliquæ dulcis coctis, fuisse lenitum. A. HÆNIO hisce in malis familiare fuit se- quens electuarium :

Rx. *Pulpæ* tamarind.

— cassiæ āā $\mathfrak{z}ij$.

Nitri puri

Fl. \triangle āā $\mathfrak{z}j$. M. S. omni mane $\frac{x}{4}$ par- tem, superbibendo feri lactis calidi $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{ss}$.

In-

(a) Obs. de febr. Sect. 3. §. 6. Opp. P. 1. p. m. 131. sq.

(b) Ueber die goldne Ader p. 70.

(c) L. c. p. 164.

Infunt huic formulæ tamarindi superius (a) jam laudati, tum nitrum (b), & \triangle ris flores, omnia ad alvum apertam tenendam, lentoremque, & stases auferendas probatissima. Et sane cum salibus mitibus sulphur hic junctum longe evadit efficacius, optimeque ei vel nitrum, vel cremor \square ri adjicitur. Posterio rem utiliter sequenti in casu junxit A. DUNCAN (c): olitor 47. agens annum, robustus, florida facie, totius primum cutis pruritu; & cephalalgia cum levi vertigine correptus est, queis post aliquot hebdomades evanidis successit vehemens, & assiduus circa anum dolor, ab incessu, & alvi egestionem auctior, & post quamlibet alvi dejectionem sanguis plerumque prodibat fere semper purus, ac liquidus. Anum tubercula parva leviter inflammata obsidebant, e quibus dolorem, & sanguinem rebatur proficisci. Pulsus, calor, appetentia, alvus secundum naturam. Præscriptum:

R. \oint crem. \square ri
Fl. \triangle aa $\overline{\text{3}}$ ij.

Syrup. Simpl. q. S. M. F. Electuarium.

S.

(a) Vide §. 63. (c).

(b) Vide §. 67.

(c) Cas. medic. 9.

S. ter de die 3j. Mota inde leniter alvus, dolor, & sanguinis excretio imminuta, ægerque intra octiduum convaluit, levi tantum externo dolore superstite. Eadem miscela feliciter usus est F. C. KREBS (a) in proVectioris ætatis muliere cœcis hæmorrhoidibus ardentibus vexata, quæ sumpta pro potu communi ptisana e radice centinodiæ, adhibitoque ad varices ope spleniorum litu ex liquore vegeto-minerali GOULARDI; & oleo liliorum alborum anaticæ mistis (a quo ardor brevi leniebatur), nec non sequenti ☿e usurpato, evanidis post aliquot dies, varicibus, plane convaluit;

R. Crem. ☿ri 3j.

Flor ☿ris 3ß. M. F. ☿ dividendus in doses xvj. S. ter vel quater de die Nro: j.

§. LXXI.

§. *Aquæ soteriæ* denique summo huc jure sunt referendæ, ut quæ & incidenti suo salino principio, & diluente aquoso vehiculo solventem suam indolem prodant, maloque hæmorrhoidali præclare sæpe medeantur. Verum & delectu quodam earum, & cautelis quoque sub usu opus est, ne dum prodesse volu-

(a) Medic. Beobacht. 1. Band 4. Heft. 3, Beob. Nro. 5. p. 23.

volumus, magis æger inde lædatur. Quantum ad illarum delectum; cavendum est, ne nimis aut diuresin, aut catharsin cieant; „nunquam enim“ monente M. ALBERTI (a), „tam eximiam fiduciam in aquas sic dictas „soterias conjicere libet, quæ dum frequen- „torem alvi, & urinæ excretionem alliciunt, „motus hosce hæmorrhoidales, si semel im- „moderati sint, in hisce régionibus confir- „mant, ne dum quidem principali causæ leni- „endæ, & cum constanti effectû mitigandæ satisfaciunt“. Porro etiam cavendum, ne per initia, quæ tonicæ magis; quam solven- tes sunt, usurpentur; prius enim lenti hu- mores liquandi; deinceps vero vasa roboran- da sunt, secus enim inverso hocce ordine obstructions ars producet: nec nisi sub finem curationis aquis tonicis, ut sunt ♂les, lo- cus dandus. Hinc apposite ad rem LUDWIG (b): „curatio, quæ fit per aquas medicatas, „thermas Carolinas potissimum, & acidulas „Egranas, in hisce ægris nonnunquam ex „voto succedit; sæpius tamen præstat tenaci- „tatem humorum, antequam aquæ ingeran- „tur, ope medicamentorum, quæ antea com- „memoravi ad resolutionis initia ducere, „quo

(a) Diss. de hæmorrhoidib. hæreditariis (4to Halæ 1727. Resp. F. G. MEYERNBERG)
§. II. P. 33.

(b) L. c.

„quo illæ promptius per corpus transeant. In-
 „primis & quidem tum, cum viæ viscido te-
 „naci scatent, aquas Scydschützenfes cum
 „pilulis ex amaris, gummi saponaceis, & sa-
 „pone ipso paratis præmittere juvat, quo po-
 „stea purgante medicamento idoneo exhibito
 „ ∇ æ ♂ les Pyrmontanæ, vel Spadanæ sub-
 „jungantur. Requiritur enim in aquis pene-
 „trabilitas aquæ subtilis, moderata vis salina
 „resolvens, et tandem ♂ le principium robo-
 „rans“. Tum ubi de Væ. Se. sub usu harum
 aquarum necessaria (de qua alibi dicitur)
 monuisset, subdit: „hac medendi methodo
 „pro varia ægrorum indole varie ordinata
 „sæpe molimina hæmorrhoidalia ita dissipata
 „sunt, ut venæ varicosæ, & nonnunquam tu-
 „bercula bene magna disparuerint“. Prudenti
 ita aquarum foteriarum delectui plurimum
 etiam tribuit F. HOFFMANNUS (a) in immodico
 hæmorrhoidum fluxu, si ab obstructis visce-
 ribus oriatur, compescendo. „Nil vero (in-
 „quit ille) ad expedienda obstructa aqueis,
 „& diluentibus est præstabilius: unde quam
 „optime in usum trahuntur minerales aquæ
 „subtilitate, atque temperie nobiles, quarum
 „classeni ducunt Antonianæ, Vildungenses,
 „& Selteranæ, vel cum, vel sine lacte potæ.
 „Et certe prudens ac moderatus harum aqua-
 „rum ad aliquot hebdomades sub debito re-
 „gimine,

(a) L. c. §. 3. curat.

„gimine, & interpositis pilulis dictis (BE-
 „CHERI, rheo tamen in locum aloes suffecto
 „largius), nec non elixirii balsamici tempe-
 „rati ♂is pharmaci mixtura acuatı usu con-
 „tinuatus potus palmam præripit reliquis cun-
 „ctis“. Haud multum tamen G. E. STAHLIUS
 (a) his aquis in affectionibus hæmorrhoidali-
 bus defert dicens: „usus acidularum . . . uti
 „corporibus alio quam poroso, sanguineo
 „prædominante habitu præditis nunquam sua-
 „dendus est; ita habet hoc incommodi, quod
 „vix ad annum levamine, si quod adfert, se
 „extendat; imo communissime; nisi vertente
 „illo anno, & pluribus deinceps repetatur,
 „non solum eadem sed graviora in dies sym-
 „ptomata subsequantur“. Verum quousque
 vel hæc STAHLII; vel illa aliorum observata
 vera sint, optime (opinor) nos variæ apud
 varios fontes foterios collectæ a Practicis
 ægrorum historiæ edocebunt; & ne universi
 orbis fontes in medium adferamus, suffecerit
 aliquos tantum hic nominasse, quos inter
 pertinent.

a) *Bourbonenses* thermæ, quarum in
 Hb dicuntur inesse salis mediı mitissimi gr.
 63, terra absorbens cum paucis selenite, ac
 pauxillo ♂is. De harum efficaciam sequentem
 refert

(a) L. c. p. 27.

refert CHEVALIER apud ROUX (a) observatio-
nem: virgo 22 annorum a 5 vel 6 annis do-
lores stomachi & intestinorum ter, vel qua-
ter quotannis patiebatur. Menses inordinate
fluebant cum animi defectionibus imperfectis
quidem; sed diuturnitate sua admodum fati-
gantibus. Inquies, melancholia, magnaue
puellæ alias alacris, & excitatæ inertia, atque
isthæc accidentia unam, duasve hebdomades
durantia, ac bidui, triduiue tenesmo cum in-
ternis hæmorrhoidibus finienda, concomitans,
præcedensque spasmodica abdominis tensio,
affligebant. Adhibitis incassum domesticis bal-
neis cum calidis, tum frigidis, aliisque re-
mediis, nec plus opitulante biennali aquarum
de Luxeuil interno, externoque usu tandem
pôtis anni insequentis vere, & autumnio
aquis de Bourbonne puella prorsus convaluit.

b) *Carolinæ* thermæ ad provocandas,
vel suppressas hæmorrhoides fluentes revo-
candas teste F. HOFFM. (b) sunt longe effica-
cissimæ: „in iis . . . malis (inquit iste), quæ
„a suppresso, deficiente, vel minus recte
„succedente mensium, vel hæmorrhoidum
„fluxu pendent, non certius, non securius,
„non

(a) Journ. de Medec. T. 33. Juillet. 1770. p.
39. Obs. II.

(b) Med. rat. Syst. T. 3. S. 2. C. 5. §. 8.
theorem. 6. Opp. T. 1. p. m. 440.

„non efficacius præsidium deprehendi prudenti
 „aquarum mineralium in præmis thermarum
 „Carolinarum mitiorum interno, & Tœpli-
 „censium externo usu, qui omnibus medendi
 „indicationibus apprime satisfacit; potu quip-
 „pe thermalis aquæ humores lenti inciduntur,
 „& evacuantur, obstructions minimorum tu-
 „bulorum expediuntur; balneo vero aquæ
 „Tœplicensis, quæ omnium levissima, con-
 „stringente terreo principio orbata stricturæ
 „remittuntur, ipsaque vasa ampliantur, ut
 „sanguinem affluentem promte admittere, ca-
 „pere, iterumque eructare possint“. Neque
 id quidem mirum, cum ∇ a harum thermarum
 salem catharticum, & σ em, a quibus par-
 tium inferiorum hæmorrhagiæ cidentur, con-
 tineat, quæ etiam DELII (a) viro molimina
 hæmorrhoidalia ad fluxum cum euphoria per-
 duxit: unde non sine providentia medica
 hujus ∇ æ usus est præscribendus; vetan-
 dus vero iis, qui ob vasorum plenitu-
 dinem ad uberiores vel catameniorum, vel
 hæmorrhoidum fluxum sunt proclives. Ita
 apud M. ALBERTI (b) „mercatoris cujusdam
 „conjux . . . lautæ, & luxuriosæ vitæ dedita
 „non

(a) Vide §. 55. N. 9. (h).

(b) Diss. de hæmorrhoidum prudenti therapia per
 acidulas, & thermas (4to. Halæ 1719. Resp.
 I. H. WACHSMUTH) §. 12. Tract. de hæ-
 morrhoid. P. p. 177.

„non modo largis menstuis; sed & frequen-
 „tibus lochialibus fluxibus purgabatur, & post
 „mensium cessationem strenuum hæmorrhoi-
 „dum fluxum experiebatur; quæ vero hujus
 „fluxus pertœsa ad thermas Carolinas migra-
 „vit, sub quarum usu non modo fluxus hæ-
 „morrhoidalis cum impetu recurrebat; sed &
 „hæmorrhagiam uterinam in consortium suum
 „ducebat, ut necesse fuerit ab usu illarum
 „thymarum abstinere, & alia auxilia in subsi-
 „dium adhibere. Rediit hæc femina tota ta-
 „bida, oedematosa, & asthmatica, neque ul-
 „tro thermas illas adire anhelavit.“

c) *Heilsbronnenses* in referando hæmo-
 rrhoidum fluxu perinde efficaces teste G. C. FE-
 VERLINO (a), cujus „vir quidam 48 anno-
 „rum, staturæ gracilis, & mediocris, vitæ
 „sedentariæ addictus, jam inde a 6 vel 7 an-
 „nis hæmorrhoidibus, per intervalla non sine
 „magna subinde molestia, & doloribus fluen-
 „tibus, laboraverat. Quod si non succede-
 „ret fluxus, adeo male in dorso habebat;
 „tamquam fustibus contusus fuisset. Post-
 „quam fons noster iterum repertus fuit, il-
 „lius aquis læpe usus est pro siti sedanda, &
 „infuso theæ parando, indeque hunc fructum
 „retulit, ut hæmorrhoides promte, facileque
 „fluant. Idem mihi retulit, se nosse amicum
 „in

(a) Comm. re. Ner. T. I. Spec. 41. Nro. 5. p. 325.

„in nostra vicinia, qui eundem effectum an-
 „notaverit; quin a certis hominibus se per-
 „cepisse; quod aliqui plebeji homines, qui
 „hæmorrhoidale negotium non cognitum ha-
 „bent, aquarum nostrarum usum propterea re-
 „formident, quod viris lumborum doloribus
 „obnoxii sanguinem per alvum educat.“

d) *Helmstadiensis*, de quarum efficacia
 sequentem casum refert. L. HEISTERUS (a):
 „vir 45 annorum, temperamenti choleric-
 „sanguinei, diætæ vinosæ assuetus, aliquot
 „jam annos podagricus, & fluxu hæmorrhoi-
 „dali vexatus, corripitur autumnō anni præ-
 „teriti fluxu hæmorrhoidali nimio eum in
 „modum, ut sæpius in die duas, & ultra per
 „vasa hæmorrhoidalia effuderit libras. Con-
 „iunctus simul erat dolor spasticus in abdo-
 „mine, præsertim in regione hypogastrica fi-
 „xus. Facies, ac reliquis habitus corporis
 „externus evaderebatur cachecticus; tumor ad-
 „iungebatur pedum oedematosus; appetentia
 „demum magis adaucta; quam imminuta. Va-
 „ria per totam hyemem, ac veris initium huic
 „morbo opponebantur remedia a præstantissi-
 „mis in arte viris præscripta; quæ quidem sæ-
 „pius magnum attulerunt levamen; morbum
 „au-

(a) Diff. de fonte medicato prope Helmstadium
 (4to Ibid. 1756. Resp. G. E. RAHLWES)
 §. 30. p. 50.

„autem perfecte superare haud potuerant.
 „Proprio interim consilio, magnaque in hunc
 „fontem fiducia adductus . . . in die, ad-
 „dita salis anglici amari $\bar{z}j$, assumit $\mathfrak{H}j$; se-
 „quentibus autem diebus dosi semper magis
 „adaucta quotidie $\mathfrak{H}ij$, & ultra bibit. Primo
 „die quidem per alvum (uti huic fonti in
 „multis aliis mos est) magis operationem
 „suam præstitit; reliquo autem tempore per
 „diuresin optime processit, maximumque attu-
 „lit levamen: color enim faciei pallidus, &
 „cachecticus mutabatur in vividiores; pedum
 „intumescencia plane cessabat; dolor spasticus
 „intestinatorum remittebat, ac fluxus hæmo-
 „rrhoidalis sensim imminuebatur, sic ut nunc of-
 „ficio suo absque dolore, alioque incommo-
 „do fungi possit.“

c) *Luchonienses* thermæ ad molimina
 hæmorrhoidum dissipanda, vel salubrem ea-
 rum fluxum provocandum perutiles, quemad-
 modum id CAMPARDON apud ROUX (a) plu-
 ribus in hæmorrhoidariis observavit. Potu-
 enim earum e' scaturigine Reginæ, calidoque
 balneo per 8 vel 9 dies adhibito Canonicus
 55 annorum a pluribus jam annis hæmorrhoi-
 dalia symptomata (scilicet spasmodicos dorsi
 horrores, dolorificos, caput petentes vapo-
 res, ac tenesimum dysenterico similem) pas-
 sus

(a) Journ. de Medec. T. 19.

sus insigniter est relevatus, plus etiam levandus, si & diutius earum usui institisset, & sub curatione, ac postea sibi ab zelo confessiones audiendi, aliaque ecclesiastica munia obeundi temperasset. Hujus collega 25 annos natus perinde a compluribus annis hæmorrhoides patiebatur, quarum tubercula identidem inflabantur, subitoque iterum regurgitans ex illis sanguis caput petebat cum vehementibus, ac minacibus symptomatibus: ea propter ad Væ. Ses. in pede, aliaque idonea præsidia æger confugiebat; donec potu aquarum e scaturigine Reginæ cum aquis albis mistarum, & balneis, quæ quotannis revisebat, sic satis a periculoso suo statu est liberatus. Tertius erat vir 55 annorum, hæmorrhoidum symptomata a multis pariter annis expertus, nempe: dolores lumborum, stomachi, pectoris, capitis, vagosque artuum, cum eorundem torpore; ab iterato autem harum aquarum in, & externo usu plurimum profecit. Quartus agricola 45 annorum, fluxu hæmorrhoidum cum cephalalgia, a vehementi corporis motu exacerbata, & dolorifica stomachi imbecillitate per 10 annos vexatus, ab interno, externoque harum aquarum usu, quotannis repetito, semper levabatur. Denique senex 66 annorum hæmorrhoides ab 18 annis passus, ani tuberculis omni fere mense tumescentibus, & quandoque etiam fluentibus, ab hujus aquæ potu fluxum hæmorrhoidum nactus est, qui per 5 annos dein ordinate quovis mense redibat cum euphoria:
unde

unde senex quotannis ad fontem revertebatur; secus omnia pristina mala recurrebant, soli resumto iterum aquarum usui cedentia.

f) *Wernarcenses* in represso hæmorrhoidum fluxu restituendo celebres, quod binis casibus ostendit M. F. ALIX (a): „cuidam
 „fluxerant hæmorrhoides (inquit); post ob-
 „stipabantur & excitabant dolores, & oppres-
 „sionem pectoris, appetitus, somni defe-
 „ctum, & alia innumera. Remediis generali-
 „bus præparatus aquis Wernarcensibus in, &
 „externe utebatur, tanto autem cum effectu,
 „ut 12mo jam die symptomata evanescerent,
 „& hæmorrhoides sicut olim effluerent. Fluunt
 „adhuc, & vir bene valet, dum hæc scribo.
 „Idem in me ipso expertus sum A. 1774. Sa-
 „nitate mea variis ex causis tunc labefactata
 „versus hæmorrhoidum periodum ferocibus
 „doloribus afficiebar, quia enim non pote-
 „rant perrumpere, excitabant cephalæam,
 „pectoris oppressionem, vagos artuum, & ab-
 „dominis dolores, vigilias, appetitus defe-
 „ctum, debilitatem, tussim perennem, & an-
 „xietates, amabam autem solitudinem. Re-
 „mediis generalibus præparatus aquas Wer-
 „narcenses potabam, in iisque balneabam.
 „Mox convalescebam, & hæmorrhoides re-
 „dibant. Remanente autem debilitate A.
 „1775

(a) Obs. chirurg. Fasc. 3. app. Obs. 5. p. 125.

„1775, aquas Brückenauenses, quas anno
 „præterito tolerare haud potueram, in, &
 „externe adhibebam. His plane sanabar, &
 „multo melius; quam unquam valeo.“

g) *Wisbadenses*, quarum vi soluenti,
 & obstructiones referanti LENTIN (a) tantum
 tribuit, ut de hæmorrhoidum discussione agens
 dicat: „saponacea remedia cum aqua Wisba-
 „densis fontis simul usurpata fere semper,
 „etiam in morbo jam inveterato, profuere.“

C A P U T V:

E M M E N A G O G A.

§. LXXII.

V. EMMENAGOGA porro hæmorrhoidas a ca-
 tameniis, vel iusto parcioribus, vel plane co-
 hibitis obortas dissipant promoto, revocato-
 ve illorum fluxu; modo ne ejusmodi sunt,
 quæ simul hæmorrhoides movere possent, v.
 g. aloetica. Sic J. G. SEGNITZII (b) puellæ
 rusticæ biduum jam fluentia catamenia ex la-
 psu in dorsum, natesque post brevem inde do-
 lorem

(a) L. c. p. 162.

(b) A. E. BÜCHNER miscell. phys. med. A. 1729.
 Novembr. cl. 4. art. 5. p. 725.

lorem ocysus substiterant. Evoluto mense appetente periodo fluxus oborta vehementia tormina cum dorsi dolore, & insolito sensu pressionis in intestino recto ad alvum crebriorem cogente, quo tempore aliquid etiam sinceri sanguinis aliquoties ano prodiit. Post aliquot dies ipsa etiam catamenia cum prioribus doloribus apparuere: sed vix notanda copia; quæis brevi iterum post subsistentibus dolores increvere: nec abhinc amplius catamenia in ordinem redigi poterant; perquam molestus autem tenesmus graviter continuabat. Varia remedia domestica, incassum adhibebantur, persistente assidua illa in ano pressione cum spasmodicis abdominalibus. Consultus demum Auctor octiduo ante fluxus periodum imperat pediluvia ex fl. chamom. herb. artemis. rub. furfurib. hordei, & pauculo sale; interne præbuit doses aliquot pilularum polychrest. HOFFM., & MRam. antispasmodicam ex ess. balsam. SLEVOGT., ess. croci, & castorei. ab his pressio in recto, ac tenesmus remisit, ac menses paulo uberiores; sed adhuc cum doloribus processere. Præmissa ergo Væ. Sne. in pede, & aliquot eccoproticis data aliquoties MRa. leniter pellens e sale volat. oleoso, ess. croci, & castorei, a qua tenesmus, & spasmi abdominis prorsus conquieverunt; catamenia vero rite, justaque copia prodierunt, quæ interdum aliqui tensivi abdominis dolores comitabantur; sed etiam hi sensim ex toto abierunt.

CAPUT VI.

ALOEETICA.

§. LXXIII.

VI. **A**LOE, ubi fluxus hæmorrhoidum vel instans eliciendus; vel parcius promovendus, vel suppressus revocandus venit, est specificum remedium: proinde nunquam alias, quam ubi fluxus dictus est omnino necessarius, attingendum. Eapropter cum jam non pauca de singulari aloes vi ad hæmorrhoides movendas superius (a) fuerint memorata; tum & illud hic adjiciendum, quod non abs re LUDWIGIUS (b) tironibus inculcat: „aloeticis (ait ille) hoc in morbo multum tribuunt, „& tentamina crebriora cum fructu facta esse „confirmant; magis etiam exiguis dosibus in „variis pilulis, & elixiriis distributis fluxum „hæmorrhoidalem promoveri dicunt; cum tamen potius de avertendis incompletis „nisi- „bus hæmorrhoidalibus cogitare oporteat. „Etsi vero majores, & salinis junctæ aloes „doses obesos, præsertim si viscidis humoribus scatent, bene purgant, & in his etiam „hæmorrhoidum accessum avertunt; siccantis „tamen hujus remedii effectus caute tantum „ten-

(a) Vide §. 19. e)

(b) L. c. p. 396.

„tentandus est; cum expertus sciam, ejus
 „usu & obesos sæpius, & laxos ad molimina
 „hæmorrhoidalia dispositos fuisse.“ Unde sa-
 tis liquet, quam circumspecte, ac provide
 cum aloeticis mercari oporteat. Ubi vero
 omnia rite pensata illorum exposcunt usum,
 probe porro dispiciendum superest, cum in-
 cidentibusne aloe, an catharticis, vel utris-
 que, & qualibus præprimis sit exhibenda. In-
 ter varia composita pharmaca aloen recipien-
 tia, & ad scopum præsentem indicata primas
 tenent sequentia.

§. LXXIV.

1. *Elixir proprietatis* tam dulce; quam
 cum acido paratum, cujus compendiosissimam,
 & maxime concinnam formulam complectitur
 pharmacopœa Austriaco - provincialis (a):

℞. Essentiæ croci ℥iij.

— — myrrhæ

℞æ. Aloes āā ℥vj. M.

Si hujus elixirii dulcis singulis unciis ad-
 dideris ℞us Δ ris, seu Φ li gtt. x, habebis
 elixir proprietatis cum acido. Monet autem
 G. E. STAHLIUS (b) elixir hoc provide, pru-
 den-

(a) Pars 2. pag. 149.

(b) Colleg. casual. magn. Casu 14. p. 189.

denterque esse usurpandum ob myrrham, & crocum, ne sanguis iis nimium commoveatur. Tempestive autem, ac circumspecte datum præclare sese multis in casibus gerit. G. W. WEDELII (a) æger quidam „hæmorrhoidibus „suppressis laborans dnobus curabatur remediis, ꝑ cachectico, & elixirio proprietatis.“ Earundem quoque virium est elixir proprietatis cum rhabbaro paratum. C. H. BRNDTEL (b) de febre catarrhali A. 1720 epidemica agens meminit viri quinquagenario proximi, sanguinei, & actu plethorici, qui ex itinere 40 milliarium rigida hyeme confecto hac eadem febre laboravit; in qua licet ab idoneis remediis tussis, inquires, æstus, ac febris brevi evaserint mitiora; tamen in aliquot adhuc dies permolesta superfuit cardialgia gravativa, & anorexia cum alvo a longo jam tempore constipationi obnoxia: datum igitur elixir proprietatis cum rheo paratum, & cum Œu Ori dulci remixtum, a quo & cardialgia mitescebat, & cum appetitu hæmorrhoidum simul fluxus ab aliquot jam annis suppressus, nec internis ante medicamentis, nec hirudinibus admotis revocandus, præter omnium expectationem reversus est, ægerque non multo inde post plane convaleuit.

§. LXXV.

(a) Amœnit. mater. med. L. 2. S. 1. C. 6. p. 257

(b) Warsav. physice illustrat. p. 216.

§. LXXV.

2. *Pilulæ aloëticæ variæ, inprimis*

a) RUFFI *pestilenciales* dictæ, quæ etsi a variis varie describantur, solam hic formulam Pharmacopœæ Austriacæ (a) dare visum est; quippe quæ doceat, eas nil esse aliud, quam elixir. propr. forma solida:

R. Aloes succotrinæ ℥iij.

Myrrhæ electæ ℥jß.

Elixir. propriet. dulcis q. f.

De harum virtute A. HAEN (b) „massa „pilularum RUFFI (ait) sola quotidie ad gr. 5, vj. sumta restituit quandoque intra paucos „dies retardantes hæmorrhoides“. Hic tamen non de modo descriptis pilulis, quæ reipsa non RUFFI sed EMMANUELIS *pilulæ* audiunt; sed de iis intelligendus est, quæ ex gummi ammon. & aloes succotr: ʒi ℥j, myrrhæ rubræ ℥jß., & mithridatii q. f. constantur, ut videre est in veteri Dispensatorio pharmaceutico Viennensi (c).

b) BE-

(a) L. c. p. 211.

(b) Prælect. ad H. BOERH. instit. patholog. §. 1236. T. 5. p. 373.

(c) Class. 11. p. m. 148. 152.

b) BECHERI majoris etiam energiæ a multis habitæ: quarum formula est (a):

R. Extract. aloes succotr.

— angelicæ

— hellebor. nigr.

— millefol.

— rhabarbari

— Scordii aa ʒj.

Succi cochlear. expr., & inspiss. ʒij.

⚬ Succin. alb. ppt.

— Myrrhæ

— rad. pimpenell. alb.

— — gentian. aa ʒj.

Cerussæ antimon ʒiij.

Ⓞ. depurati ʒjß.

Elixir. propr. dulc. q. f. M. F. c ʒj pilulæ Nro. xx. Erant hæ pilulæ familiares admodum J. STORCHIO, cujus ex innumeris pene casibus, ubi profuere, unicum ac brevem (b) sisto; hæmorrhoidarius corpulentus, & sanguineus, 50 annis major ab suppresso hæmorrhoidum fluxu incidit in lævi brachii rheumatismum; sumto vero M. P. BECHER., & purg. aa ʒß. in duo præbia diviso rediere hæmorrhoides cum rheumatismi levamine,
Per-

(a) Ibidem p. 146.

(b) Obs. clin. ann. 4. Octobr. d. 4. §. 3. Nro. 3. p. 529.

Perinde I. C. FRITSCH (a) „ego (inquit), qui „per 36 annos ex dispositione matris hereditaria fluxu hæmorrhoidum laborabam, ter „ex anomalia hæmorrhoidum podagram experiebar. . . . Simul ut dolorem, ac tumorem sentiebam, STAHLII ꝯem salinum „ex hujus ipsius methodo per ternas horas „assumeram, & sub tempus dormiendi dosin „unam pilularum BECHER. receperam. Post „methodum hanc 3, aut ad summum 4 dies „continuatam hæmorrhoides aderant, atque „omnis simul dolor cessabat &c“. Tumor superstes idoneis sensim cessit remediis.

c) STAHLII *balsamicæ* denique decantatissimæ, quas Auctor, ejusdemque discipuli ad omnes hæmorrhoidum anomalias procurandas impense laudantes omnibus aliis remediis prætulerunt. Harum in laudem STAHLIUS (b) meminit aulici 50 annorum, vino dediti, variasque affectiones colicas tenesmodes cum alvo subpurulenta, ac fece rubella submucida, non tenaci; sed tragacanthæ simili, & quandoque sincero etiam sanguine prodeunte, passi, qui quovis mense in triduum sumtis his pilulis fluxum sinceriorem promovit summo cum levamine. Affeberat

STAH-

(a) *Commerc. Nor. T. 3. A. 1733. hebd. 40. Nro. 2. p. 314.*

(b) *L. c.*

STAHLIUS, si vel leviter quis ad hæmorrhoides dispositus sit, ab iis istas provocari, & revocari: exempla hominum novit, molimina tantum hæmorrhoidalia passorum, qui si 6, vel 8 dies pilulis usi sunt, tantum inde in intestinō recto turgescētiā perceperunt, ut præ meru staseos ab iis abstinere decreverint. Luculentum etiam ab illis effectum vidit I. STORCH (a) in macra muliere 50 annorum, crebris ante defluxionibus obnoxia, & per aliquot abhinc annos hæmorrhoidum fluxum experta, quem subsistentem mox miētus cruentus secutus est. Martii 8. cum horripilatione, dorsi que dolore clinicæ tactæ datum:

R. ♂. ☉. amar. ʒj.

— antispasm. ʒj. M. pro 4. dosibus, Imperati simul dorsi, & hypogastrii foras exacte cum insigni levamine; sed extenuatæ jam nimis ægræ parum spei supererat. Die 10. observat quotidie horrorem, ac dein æstus ingruentem una semper hora anticipare, urinæ mutatæ nil amplius inerat sanguinis, & dolores dorsi, ac sub miētū desiere; continuatus ♂. Die 11. horripilatio emanfit. Data TRa ℥i cum ☉. dulc. ʒij. ad grt. xxv. Die 12. Eucharistia sumta melius habuit, emendatioque die 13. crevit, manente tamen

(b) Obs. clin. ann. 7. Mart. Cl. 4. p. 412. sq.

tamen pristina debilitate. Die 19. ob vehementes iterum dolores sub mictu lotii paucissimi, albidi, tenui filo exeuntis præscriptum:

℞. *TRæ* propr. M. ʒj.
 — \square ri
 Ω. \ominus . dulc. ʒā ʒj. M.

℞. \oint \ominus . amar.
 — antispasm. ʒā ʒij. pro 4. dosibus.

℞. Ol. Scorpion. ʒij.
 — petr. alb. ʒj. M. & aliquot guttis umbilico instillatis ureterum regio illinatur: unde egregium levamen. Die 25. ob anorexiam perpetuam data elixirii propriet. cum rheo ʒj. pro duabus dosibus, unde sub vesperam semel deiecit cum euphoria. Hinc *MRa* postrema iterata. Aprilis 1. novos motus febriles cum debilitate quovis vespere ingruentes questæ datum:

℞. \oint antispasm. ʒij.
 Arcan. dupl. ʒj. M. pro 3 dosibus.

Postero autem mane \ominus amari ʒj. imperata. Die 4. amictæ jam, & obambulantia præter *MRam* refrigerantem consulta simul ʒtio quovis die dosis pilul. balsam. *STAHLII* sumenda, & omni vespere dosis ex ejusdem \oint antispasmodico. Die 17. nunciat se ab octiduo omni vespere hæmorrhoides habere, semper

perque in melius proficere: sicque toto illo anno sine medicatione ulteriori sana mansit. Egregie sese etiam hæ STAHLII pilulæ gesserunt referente M. ALBERTI (a) in sexagenario cholero-melancholico, qui ex corruptis motibus hæmorrhoidalibus aliquamdiu insolita cephalalgia vexabatur; datis autem dictis pilulis non modo probe alvus aperta; sed etiam copiosus sanguis grumofus alvo excretus cephalalgiam illam mire sustulit. Neque minus energiæ his pilulis ALBERTI (b) adscribit in immodico hæmorrhoidum fluxu compescendo dicens: „eximiae . . . & singularis „efficaciæ ad hæmorrhoidalem excessum non „modo temperandum; sed & justum in ordinem restituendum sunt pilulæ balsamicæ „STAHLIANAE, quæ in hoc negotio abunde „usui, & experientiæ satisfecerunt; ita ut iisdem secure uti liceat; optandum modo esset, quo laudatæ illæ pilulæ in tali casu ad manus essent, ne in defectu earundem aliæ, quæ sub hoc nomine circumferuntur, ingerantur; quarum posteriorum effectus non nisi malus, & dolosus esse deprehenditur, cujusmodi odiosa exempla passim prostant. . .

Neque

(a) Diss. de hæmorrhoidum consensu cum capite, & pectore. (4to Halæ 1718. Resp. I. WEISBRODT) §. 8. p. 21. sq.

(b) Diss. de hæmorrhoidib. excedentib. §. 26. Tract. de hæmorrhoidib. P. I. p. 213.

„Neque peccant, aut damnum inferunt, qui
 „sub excessu hæmorrhoidum aliquoties pilulis
 „illis utuntur; sane constant nobis ejusmodi
 „calus, ubi patientes ob excessum hæmo-
 „rrhoidum, & imminentem statum modo ca-
 „checticum, modo extenuatum, & tabidum
 „pro derelictis habiti, & ultimis fatis com-
 „missi . . . per solum usum earundem pilu-
 „larum non modo a tali funesto eventu præ-
 „servati; sed & ab hæmorrhoidum excessu li-
 „berati in justum fluxus hæmorrhoidalis suc-
 „cessum promoti, & translati . . . integræ
 „sanitati restituti fuerunt, ut nullo adstrin-
 „gente, tonico, roborante, evacuante vel
 „sopiente remedio opus fuerit, atque suspecta
 „symptomata, quæ aderant, iterum placide
 „evanuerint“. Sed quoniam tanti est pilulas
 „has genuinas esse, quæ igitur vera est earum
 compositio? Haud scio, utrum uspiam ex-
 stet, nisi quam J. STORCH in STAHLII col-
 legio casuali magno ab se edito literis pro-
 didit (a),

R. Gumm. ammon. aceto Scillit. soluti

Extract. card. ben.

— fumar. aa ʒj.

Aloes succorinæ

Myrrhæ optimæ aa ʒi.

Gummi hederæ ʒʒ ad ʒij.

ʒ croci gr. xv. M. F. pil. Dosis gr. xv.

Paulo

Paulo aliter in Pharmacopœa Austriaca
(a) descriptæ exstant, nempe

℞. Gummi hederæ
— juniperi āā ʒijß.
Extr. aquosi aloes
— — Myrrhæ āā ʒij.
— card. bened.
— trifol. fibr.
— absinth. āā ʒxv.
— fumaris
— hellebor. nigr.
— rhei. āā ʒv.
Terebinthinæ ʒj. M. F. massa.

Exstant denique & *pilulæ aperitivæ*
STAHLII, quas ex J. H. SCHULZIO (b) exci-
tat D. W. TRILLERUS (c) :

℞. Aloes rosatæ ʒj.
Extr. panchymag. ʒß.
Limat. ♂is alcoholisat. ʒij. M. F. pil.

Dosis a gr. 5. ad 10. vesperi sumta al-
vum liberam servat, & hæmorrhoides pro-
mover,

CAPUT

(a) P. 2. p. 210.

(b) Prælect. ad dispens. Brandeb. p. 229.

(c) Dispens. pharm. univers. T. 2. p. 477.

CAPUT VII.

ANTISPASMODICA

§. LXXVI.

VII. **A**NTISPASMODICA hæmorrhoidalibus in malis profligandis tantæ sunt necessitatis, ut raro admodum sine illorum adminiculo medicinam hæmorrhoidibus facere sit integrum. Cum enim omnis pene hic morbus vel a spasmis originem trahat, vel certe symptomata producat spasmodica & gravia, & numerosa, quotiescunque cum turbis ingruit; satis patet, antispasmodica remedia ab hæmorrhoidum therapia expungi non posse, præsertim ubi atroces dolores ægrum discruciant, ad quos mitigandos anodyna, emollientia, paregorica, &c. adhibere oportet. Horum autem in censum vel maxime referuntur,

§. LXXVII.

I. *Olea pressa* blanda ad rigorem partium spasmo contractarum imminuendum, & fluxum inde vel suppressum revocandum, vel difficulter succedentem facilitandum, ac promovendo-

movendum. Apud C. F. PAULLINI (a) „ple-
 „bejus ad referandas hæmorrhoides suppressas
 „gem ex fl. Verbasci, & linariæ, ac radicis
 „ononidis in decocto millefolii usurpabat, &
 „paulatim stillare cœperunt; sumto demum
 „oleo lini recens expresso cum cerevisia ca-
 „lida summo cum levamine fluxere. Subsecu-
 „tus autem mox tenesmus: contra quem
 „theriacam cœlestem CASS. dedi.“

§. LXXVIII.

2. *Oleum DIPPELII*, de quo ita I. E.
 HFNNING (b): „vir temperamenti sanguineo-
 „cholerici, hætenus moliminibus hæmorrhoi-
 „dalibus e longinquo vexatus obtinebat a me
 „cubitus iturus olei anodynii grt. 20. in cere-
 „visia frigida hauriendas. Somnus insequens
 „interruptus erat absque jectitatione, & ulla
 „molestia, pulsus magnus, & paulo frequen-
 „tior, nullus caloris interni p. n. sensus.
 „Mane erectio genitalium absque libidinosa
 „cogitatione contigit, postea lenis, placidus,
 „gratissimusque prorupit sudor, pulsu tum
 „temporis maxime quieto. Corpus hinc to-
 „tum levatum; motus tamen hæmorrhoidales
 ple-

(a) De theriac. cœlest. S. 2. P. 3. M. 2. C. 7.
 §. 3. p. 235.

(b) Annal. Vratisl. Tent. 21. A. 1722. Jul.
 Cl. 5. art. 3. p. 115.

„plenarie hac vice non sopiti. Urina naturali
 „simillima; aures cerumen fluidum præbebant;
 „gravedo autem affligens sublata, & bene
 „fluida facta. Flatus nulli, ut & ructuum
 „ordinariorum defectus. Ventriculus citius,
 „quam antea appetere incipiebat, alvo etiam
 „tardius succedente. Sic hac vice resolutio-
 „nem spissitudinis sanguinis notabilem obti-
 „nuimus, motuumque naturalium secretorio-
 „rum, & excretoriorum consuetam directio-
 „nem. Jam ulterius huic medicamento insi-
 „stendum putavimus, præcipue cum tam egre-
 „gium inde persenserimus effectum. Quia ita-
 „que nauseosum admodum, jam sub saccharo
 „occultare voluimus. Ergo altera vespera
 „dedimus itidem gtt. 20. Nox fuit phanta-
 „sias plena, ac si opium æger sumisset, pulsu
 „cordis, arteriarumque frequente, ac magno,
 „cum levissima quadam angustia præcordio-
 „rum, calore interno in volis manuum mani-
 „festiore, motibus vero hæmorrhoidalibus
 „vix sensu perceptibilibus. Mane ut heri
 „sudore erumpente gratissimo insigne corpori
 „dabatur levamentum; pulsus fiebat iterum
 „naturalis; fauces ante sudorem siccæ, ut &
 „nares, postea humescebant, cerumine au-
 „rium & hodie iterum fluido & copioso;
 „urina naturalis consistentiæ absque odore
 „alterato, sub insigni tamen ad venerem sti-
 „mulo; appetitu vegeto, motibus hæmo-
 „rrhoidalibus ultra annum spatium doloribus
 „dorsi, sedis, colicisque torminibus flatuo-
 „sis constanter molestis plane consopitis. Quo
 „simul

„simul attendendum, ante huius olei adhibi-
 „tionem medicamenta alia non applicata fuisse,
 „excepto per vices, idque rarius contra do-
 „lores ☿ antispasmodico STAHLII.“ Ad
 spasmotica igitur hæmorrhoidalia molimina
 discutienda Oleum hoc est perquam efficax.

§. LXXIX.

3. *Valeriana* major, „ad spasmos, in-
 „quit LENTIN, sopiendos nullum adhuc
 „remedium reperi, quod Valerianæ majori
 „æquiparari potuisset. Sed hic etiam neces-
 „sarium est discrimen in sanitate cuiusvis in-
 „dividui observandum: unde jam lac ☿ris,
 „jam Θia media, etiam Θm absinthii, ad-
 „miscui, totiesque præbui, donec turbæ
 „(sub queis nullum solvens agere valet) con-
 „quievere. Istanc medendi methodum longo
 „jam abhinc tempore optimam sum exper-
 „tus. Patientia tantum opus est, & exacto
 „pro quovis ægro proprio diæterico regimine,
 „ad quod imprimis pertinet, ut ad hæmo-
 „rrhoides proni veneris in usu sibi temperent,
 „ad quam nunquam magis; quam ingruente
 „periodo hæmorrhoidali stimulantur.“

§ LXXX.

4. *Vinum*. Idem LENTIN (a) „in colica
 „hæmorrhoidali sæpius observavit extraordi-
 „narium

(a) Ibidem p. 164.

„narium vini desiderium, quod aliquibus,
 „qui se inscio illud biberunt, admodum be-
 „ne cessit.“ Sed religioso hic opus est &
 vini delectu, & ægri corporis examine,
 ut ex causarum (a) notitia facile quisque
 dabit.

§. LXXXI.

5. *Scrophularia* viroso suo fœtore, &
 amarore similis opio jam dudum ad leniendos
 hæmorrhoidum dolores impense commendata
 fuit: unde I. H. SLEVOGT (b) omnium alio-
 rum remediorum in locum „scrophulariam
 „modo solam; modo cum linaria combinatam,
 „& in forma infusi, decocti, fots, unguenti-
 „que usurpatam suffecisse ubique. . . serio
 „testatur, & optat, ut in reliquis etiam mor-
 „bis remedia huic quoad certitudinem, &
 „celeritatem operationis paria a summo Nu-
 „mine nobis concessa sint.“ Non abs-re-
 igitur planta hæc a MINDERERO (c) morbi
 hæmorrhoidalis domitrix nuncupatur, cui il-
 lum natura prorsus addixit, subiecitque. Ea-
 propter etiam *scrophularia* Gallis *herbe de*
Siege,

(a) Vide §. 19. (a).

(b) Diff. de *scrophularia* (4to Jenæ 1720 Resp.
 H. C. EHRLICH) §. 37. p. 27.

(c) Medic. milit. p. 274.

Siege, ou *Fesses* (herba ani vel natium) audit. De externo illius usu plura inferius dicentur; hic pauca ad internum pertinentia memorabimus. R. SOLENANDER (a) perhibet chirurgum in hæmorrhoidibus tumentibus juxta, ac fluentibus dedisse potui m. & v. cerevisiam, in qua crassulam majorem, & scrophulariam cum radice, ac herba concisas maceravit. Porro H. HEER (b) „non celabo „(ait), quod. . . a castrensi quodam Pa- „store edoctus sæpissime expertus sum: si quis „hæmorrhoidum cæcarum insano dolore tor- „queatur, minimum quid scrophulariæ, vel „radicis, vel foliorum cum cibo, aut potu „capiendo statim dolore liberatur, siue ipsam „plantæ substantiam siccam, aut viridem, siue „decoctum ejus assumat.“ Et M. ETTMÜLLERUS (c) „feminæ secunda vice gravidæ, tu- „mentibus hæmorrhoidibus afflictæ, ita ut „alvum intra annum sine summo dolore de- „jicere non potuisset, suavit radicem scro- „phulariæ coxæ alligare, folia vero omni „mane cum butyro, & pane comedere, ali- „amque radicem ejusdem modulo inclusam „potui infundere; & felix inde effectus in- „secutus est.“

§. LXXXII.

(a)

(b) Obs. med. 20. in fine p. m. 244.

(c) L. c. Obs. med. 300.

§. LXXXII.

6. *Opium* tutone unquam hæmorrhoidariis præbetur? Ad sævos dolores leniendos, immodicumque hæmorrhoidum fluxum refrœnandum, post alia quævis, præsertim nequicquam tentata, illud valere nemo ambigit. GALENUS (a) theriacæ vires percensens „educit eadem in mulieribus menstruum sanguinem (ait), & suppressas uteri, sedisve sanguinis excretiones frequenter aperit, ac „(quod admirabilius est) immoderatas ejusdem sanguinis ejectiones detinet.“ Perinde C. E. PAULLINI (b) in „D. I. KLEYEN Isenacensi „(inquit) ex frequentiori pilularum Francofurtenſium aloen recipientium usu largum earum (hæmorrhoidum) fluxum notavi; alio die in eodem affectu gr. jv. theriacæ cœl. „CASS. dissolvebat in lacte caprino calido, „q. fluxum stitit, doloresque sustulit.“ Neque in nimio hæmorrhoidum fluxu opium reformidat debita cum cautela datum F. HOFFMANNUS (c) „cum hypnoticis (inquiens), opiat, & narcoticis mercandum est cautissime, „quippe quæ tanto magis intempestive data, „insā-

(a) De theriaca ad PISON. Cap. 15.

(b) L. c. §. 2. p. 235.

(c) Med. rat. syst. T. 4. P. 2. S. 1. C. 4. Cautel. §. 7.

„insaniam plane inducere apta sunt. Ex optimis, si locus, est illa M. P. a WILDEGAN-
 „sio nomen gerens, quæ etiam cum fructu
 „exhibetur, quando atrox dolor, & spas-
 „mus sub prima lumborum vertebra nimiam
 „sanguinis effusionem movet, eaque propter
 „est placandus.“ Et vero TILLINGII (a) quoque historia tutum hic opii esse usum docet: „Capitaneus quidam (narrat ille) immo-
 „dicum patiebatur cum dolore atrocissimo hæ-
 „morrhoidum fluxum. Ad hunc vocatus præ-
 „missis . . . in brachio . . . Væ. Snc., ac
 „leni alvi evacuatione statim ipsi præscripti
 „MRam sequentem ac linimentum, quod ex-
 „terius applicabatur:

R̄. Philonii Persici ʒij.

Trochisc. de ∇a sigill.

— — carabe.

C. C. usti, & ppt.

Corall. rubr., & ppt.

Lap. hæmat. alcohol.

Sangu. drac.

Spec. diarrhod. Abbat.

Croci ♂ adstr. aa ʒß.

Laud. opii gr. v.

Syr. corallor.

— myrtini.

— de ros. sic. aa ʒß.

∇æ

(a) De laudano opiato. P. 4. Cap. 9.

▽æ plantag.

— portulac.

— burfæ paf.

— cichor aa 3j. M. F. MRa . . .

„de qua pro libitu cochl. unum, aut alterum
„fumit.

Rx. Ungu. populeonis.

Olei violar.

— ovor.

— verbasc. aa 3ij.

Pingued. gallinæ,

Mucilag. sem. cyd. }

— fænugr. }

— psyllii. }

▽a plantag.
extr. aa 3jß.

Vitell. ovor. No j.

Sangu. drac.

Boli Armen ver.

Thuris opt.

Mastiches electæ.

Aloës hepat.

Trochisc. de carabe.

Lap. calamin. ▽a rosar. triti aa 3ß.

Laudan. opiat gr. viij. M. agitentur

„in mortario plumbeo, & fiat linimentum.

„Hisce fluxus ille nimius sedatus est, ac do-

„lor omnino evanuit.“ Neque minus in cœ-

cis hæmorrhoidibus furentibus, post alia præ-

missa, si dolor, aliaque spastica mala peritent,

opium iudicatur. Sic A. STÖRCK (a) de hæ-

mo-

morrhoidali febre epidemica agens „nimii (ait)
 „vomendi conatus, dolores colici, & tenesmi
 „si emollientibus non cesserunt, tunc reme-
 „diis paregoricis debebant mitigari, suppri-
 „mi . . . si adfuit ingens dolor (ani), & te-
 „nesmus admodum molestus, ac anxius, tunc
 „opio erat utendum.“ Generatim tamen cœ-
 cis in hæmorrhoidibus, earumque molimini-
 bus cavendum est, ne ad mitiganda sympto-
 mata, ac præsertim tenesmium opio abutamur;
 namque ut G. YOUNG (a) recte animadvertit,
 „in hæmorrhoidali morbo opium manifeste
 „obest, quatenus alvum reddit difficilem,
 „stercusque in colo, & recto indurat: unde
 „hæc intestina plus calent, & irritantur, san-
 „guinisque per venas hæmorrhoidales re-
 „fluxus impeditur: hinc major tuberculorum
 „his in venis distensio necessario sequitur.
 „Liquet etiam hæmorrhoides augeri debere,
 „si ab opio rarefactio sanguinis intenditur.
 „Vasa hæmorrhoidalia in, & externa quan-
 „doque tantopere distenta sunt, ut æger as-
 „siduum tenesmium cum intolerabili dolore
 „patiatur. Mihi ipsi id aliquando contigit
 „post vulneraria balsama his partibus prius
 „admota, simulque sensatio aderat velut
 „duritiei cujusdam ano impactæ cum continuo
 ad

(a) Abhandl. vom Opium 17. Abschnitt:

„ad desidendum stimulo : hunc insignis opii
 „dosis minuit ; sed postmodo vehementior
 „revertitur ob distensionem majorem effectam :
 „imo vehementi in tenesmo opium ne
 palliando quidem proficit.“ Memorabile hu-
 jus rei exemplum R. A. BBHRENS (a) addu-
 cit : literatus 40 annorum a vita sedentaria,
 minusque exacta diæta post varia hæmorrhoi-
 dalia molimina, inter quæ palpitaciones cor-
 dis usque ad syncopen, fluxum nactus est
 hæmorrhoidum sine euphoria, siquidem flu-
 xus continuo evasit inordinatus, fere 3tio
 quoque recurrens die, simulque hæmorrhoi-
 des intumuerunt, ac multum puris collecti,
 ubi crepuere, fuderunt. Emplastro, nescio
 quo, admoto visum est ægro ulcus prorsus
 coaluisse; verum cum chirurgi oculos, ma-
 nusque ab examine ani semper arcuisset, nil
 certi eatenus constabat. Assiduus interea, &
 vehemens tenesmus ægrum cruciabat, quem
 ipse longo satis tempore ab initio obsecun-
 dando effecit pene habitualementem, ita ut omni
 $\frac{1}{4}$ horæ aliquoties desiderare, & alvum ponere
 cogeretur. Quem abacturus, quod acrimoniæ
 humorum, & stomachi cruditatibus deberi
 videbatur, omnibus cum leguminibus; tum
 oleribus repudiatis, reliquos cibos absque
 sale,

(a) Annal. Vratisl. Tent. 22. A. 1722. Octobr. d. 4.
 art. 14. p. 455. sqq.

sale, & aromate paratos edebat. Verum peragenti, & ingravescenti fere malo medicus cum primum opponeret Æ es absorbentes, ac tonicos absque levamine, cœpit iis addere laudanum hystericum rostum; & remittente inde tenesmo præbuit ejusdem Æ ris Ḑj ex ∇ is still. in 2 doses diremtum pro 2 haustibus vespertinis ex intervallo aliquot horarum assu-
mendis, idque sentel; iterum, ac tertium. Cumque tenesmus cum dejectionibus inde rarior effectus, evanescente opii energia, deinceps vehementius iterum, crebriusque urgeret, medicus solum laudanum hystericum ad aliquot grana sub vesperam præbuit in 3 hebdomades eodem semper effectū, procuratis nempe bihorii induciis. His malis interdum difficilis quoque mictus accessit; quem accitus demum Auctor Væ Sne, ac discutientibus topicis ubi sustulisset, ulteriori opii usu, cibusque dyspeptis, ac flatulentis ægro interdixit, non item Θ e & aromate q. s. conditis, ob consuetudinem pristinam, & fractum opio intestinorum tonum similia poscentem. Imperat simul in biduum quotidie bonam pilularum STAHLII dosin, & in sequente biduo ab omni medicamento abstinentiam, ut quid pilulæ dictæ valeant, clucescat; sin nihil effecissent, die 3tio in brachio venam secandam suasisit ad revulsionem ab ano. Omnia facta, at sine levamine. Idcirco præscripta variâ discutientia, nervina, & intestinorum tonum restaurantia cum Æ bus temperantibus, & absorbentibus per 14 dies, ac

postmodo data rursus dosi pilularum STAHLII, a qua suppressæ hæmorrhoides postridie uberius fluxere cum levamine, sed tenesmus cum crebris dejectionibus pristinum obtinebat vigorem; cuius causa opii ne præcedens usus, an læsio intestini recti esset, dum ambigit Auctor, ecce detegit, opii usui clam toto curationis tempore, ut ante hanc, instituisse, ita ut ad novissimum usque theraphiæ diem jam laudani hysterici assumeret ultra 340 grana, proinde ultra 3vij. Unde liquebat, ab opio tenesmi causam ita sensim invaluisse, ut vix fuerit medicabilis. Reprehensus idcirco æger ab opio porro abstinuit, curatioque denuo cœpta, interpolatis indentidem STAHLII pilulis, eo cum successu, ut dejectiones evaserint paulo rariores, nec nisi finiente digestionem crebrius molestarint, solis etiam quandoque flatibus erumpentibus; ægerque jam domo prodiens medico valedixerit. Verum lapsis vix 3. vel 4. hebdomadis repente obiit. A morte innotuit, ægrum, nescio cuius consilio per 2. vel 3. hebdomadas pro omni alio potu bibisse decoctum myrtillorum siccatorum ubertim interdium, & vesperi quoque ad 7. vel 8. vascula theata, imo quandoque etiam baccharum ipsarum coctarum unum, alterumve cochlear absumpsisse. Quo factum, ut crebræ ante dejectiones degenerarint in alvi obstructionem exitialem. Nam etsi primum enema alvum quatrinduo clausam reseravit, altero tamen quatrinduo rursus constipata erat alvus cum dura ventris inflatione, & oborta ab altero

altero enemate anxietate vehementi cum colica æger post 6. vel 7. horas exspiravit, excreta in agone adhuc aliqua sanguinis quantitate. Neque ad mitigandas cardialgias, colicasque hæmorrhoidales opium impune præbetur; nisi illud extrema necessitas medico extorserit: namque I. C. GOETZ (a) refert, sartorem 60 annorum, macrum, strigosum, curis & egestate tota vita confectum, nullis sanguinis missionibus assuetum, a prima pueritia ad senium usque fluxu hæmorrhoidum laborasse, nullo unquam ad eas indoneo regimine observato, quæ a nimia sessione in cæcas abibant cum dolorifico mictu cruento, præsertim ex animi turbis, ac frigore. Donec tandem ab imprudenti ad colicam hæmorrhoidalem narcoticorum usu letalem in hæcticam prolapsus est. Ex quibus satis, superque intelligitur, quam circumspecte opium hæmorrhoidariis præbendum sit.

(a) Act. nat. cur. Vol. 2. Obs. 186.

CAPUT VIII.

T O N I C A:

§. LXXXIII.

VIII. **T**ONICA *roborantia*, *adstringentia* perinde ut alia hætenus dicta remedia in curatione affectionum hæmorrhoidalium summi sæpe sunt usus, quem præprimis indicat

1. *Laxitas* solidorum, quæ morbum vel induxit, vel aliunde natum fovet.

2. *Irritabilitas* nervorum p. n. in hystericis, & hypochondriacis, quorum spasmi vel produçunt hæmorrhoides circulatione turbata, vel hæc aliunde ortas, ubi iis complicantur, reddunt graviores, pertinacioresque, & ipsi etiam ab hæmorrhoidibus excitantur cum crebriores, tum vehementiores.

3. *Immodicus fluxus* hæmorrhoidum a tenuitate sanguinis, vel solidorum laxitate, vel spasmodicis turbis proficiscens. Cum autem fluxus excedentis aliæ quoque causæ concurrentes esse possunt, ut biliosa colluvies, plethora commota, Obstructio viscerum, &c. facile intelligitur, ad tonicorum usum in fluxu hæmorrhoidum immodico compescendo haud prius esse transeundum, quam post præmissas (si opus) vacuationes, refrigerantia, anti-spasmodica, solventia, &c. ita ut vel Kene-
angia

angia jam præsens, vel sola prægumena mali
 causa superstes iis relinquatur oppugnanda;
 secus vel frustra esse solent, vel restrictus ab
 iisdem fluxus utcunque excedens pessima post
 se mala trahit. Aurea plane hanc in rem
 sunt verba F. HOFFMANN. (a): „sicuti nun-
 „quam hæmorrhagia, licet fuerit enormis,
 „quando a causa interna proficiscitur, forti-
 „ori medicina stiptica reprimenda est, ita
 „multo magis id in hæmorrhoidibus nimium
 „fluentibus observandum; si quidem non mo-
 „do . . . inde hydropis, vel tabis metus;
 „sed & aliorum gravissimorum affectuum (b)
 „ . . . periculum nascitur, idque eo magis in
 „iis accidit, qui jam per ipsum copiosum
 „fluxum, vel aliis ex causis imbecilliores facti
 „sunt. Etenim hanc regulam practicam quis-
 „que medicorum, ut curæ, cordique habeat,
 „vehementer optarem, videlicet nihil ad per-
 „niciem magis perducere; quam valde debili-
 „tatis corporibus adstringentia, opiata, vel
 „alia fortiora remedia exhibere. Neque cor-
 „poris humani natura a validiori sanguinis
 „effusione unquam tantum patitur; quantum
 „damni ab importuna sistente medicina acci-
 „pit

(a) L. c. T. 8. §. 1. C. 9. §. 19. opp. T. 1. p. 344.

(b) Confer. §. 35.

„pit . . . (a). Quæ cum ita sint, valide ad-
 „stringentium usus utique sit cautissimus; ne-
 „que etiam in principio; multo minus quando
 „vires cum sanguine jam exhaustæ, utilem
 „locant operam ac potius in corporibus inbe-
 „cillis, & exquisitius sentientis naturæ spas-
 „modica pathemata, convulsiva, animi deli-
 „quia, summas præcordiorum anxietates cum
 „tremore, & palpitatione cordis concitant.
 „Quod si itaque fluxum compescentibus uti
 „necesse, consultum est, non vi, & magnis
 „dosibus id perficere, ne noxam inferant,
 „Oportet quoque subungere diluentia, tem-
 „perantia, & leniora laxantia, inter quæ præ-
 „stantissimum est asininum lac, vel serum
 „lactis dulce. Potissimum vero præstat mar-
 „tialia liquida cum ipsis diluentibus assumere.
 „Quando tamen sanguinis ex hæmorrhoidali-
 „bus locis fluxum subito sublatum summæ
 „præcordiorum anxietates, inflationes cum
 „inquietudine, & angustia excipiunt, revo-
 „candus is est lenioribus elicientibus, & la-
 „xantibus, clysteribus quoque emollientibus,
 „ac suppositoriis“: quemadmodum id præ-
 „stare coactus est R. SOLENANDER (b). Unde
 etiam tironibus M. ALBERTI (c) sedulo incul-
 cat,

(a) Med. rat. Syst. T. 4. P. 2. S. 1. C. 4. caute)
 §. 5. 6.

(b) Vide §. 62. (c).

(c) L. c. §. 23. 25. sq. p. 209. sqq.

cat, ne in fluentibus immodice hæmorrhoidibus valentiora mox stiptica, præsertim repente, præmature, solaque offerant sicque uno velut ictu fluxum supprimant, & aluum constipent; sed illum successive per mitiora leniant, & conquiescere demum faciant, qualia imprimis sunt absorbentia (ut C. C. ustum, corall. rubr.) cum nitr. & cinnabari, &c. prudenti manu, ac dosi exhibita. Verum quoniam hæc non semper voto faciunt satis, ad efficaciora etiam est procedendum. Laudantur vero in variis affectionibus hæmorrhoidalibus vel maxime sequentia tonica:

§. LXXXIV.

1. *Millefolium* (herbula in hæmorrhoidum therapia perquam celebris) duplici præditum virtute, scilicet antispasmodica, & blande adstringente, ita ut minore dosi exhibitum dolores spasmodicos sopiat, largiore autem fluxum compescat. Hinc M. ALBERTI (a) de mitigandis cæcarum hæmorrhoidum symptomatibus agens „cum internæ (ait) commotiones strictoriæ, & spasmodicæ commu-
„niter etiam exorbitantes concurrant; prop-
„terea ordinamus remedia antispasmodica,
„& quidem 3̄s usitatos nitroso digestivo-
„cinnabari-

(a) Diss. de hæmorrhoidib. cæcis §. 24. Tract.
cit. p. 302.

„cinnabarinos repetito exhibendos; præcipue
 „vero ad compescendas irregulares tales com-
 „motiones convenit usus millefolii, modo an-
 „tea alvus aperta sit. Præstat vero hac her-
 „bula uti in decocto, in dies aliquid hujus
 „decocti assumendo, & per triduum, aut qua-
 „triduum continuando; non æque necesse,
 „neque etiam securum est juxta quorundam
 „commendationem per integrum mensem mil-
 „lefolio uti, uti ARNALD DE VILLA NOVA
 „voluit, quod de eodem etiam allegat P.
 „PACHREQUUS; quia facile suspectas internas
 „adstrictiones inducit, imo motus hæmorrhoi-
 „dales immoderate supprimit, & ad periculo-
 „sos affectus chronicos, hepaticos, cacheti-
 „cos, hæcticos, ictericos, asciticos, & œde-
 „matosos disponit: unde RIVERIUS (a) mil-
 „lefolii decoctum per triduum commendat
 „haud ulterius hauriendum. Ut autem ab justa
 „dosi non aberretur, sciendum est, ad infusio-
 „nem requiri summitatum millefolii pugillos
 „iij, ∇ æ Hß , essentiam vero inde paratam
 „præberi quotidie m., & v. ad gtt. 40. vel 55.
 „Notatu tamen hic digna est observatio G.
 „SCHUSTERI (b) asserentis magnam esse in mil-
 „lefolii infuso, & essentia, quoad effectum,
 „diversitatem: „infusum nempe theeforme herbæ
 „millefolii cum summitatibus probe saturatum
 „hæmo-

(a) Prax. med. L. 10. C. 11.

(b) Nov. æst. nat. cur. T. 2. Obs. 4.

„hæmorrhoides cœcas . . . egregie discutit,
 „doloresque lenit; essentia autem ex hac
 „herba parata, si sub eodem statu exhibetur,
 „intolerabiles excitat dolores, quod sæpius
 „observare mihi licuit.“ Verum non ita sem-
 per id se habere; licebit ex paulo post ad-
 ducendis aliorum observatis colligere. Cum
 itaque duplex millefolio insit virtus, nempe
 stiptica, & antispasmodica discutiens, usum
 ejus indicabunt vel maxime

a) *Molimina hæmorrhoidum dolorifica*,
 (utpote a spasmis nata), si illa discutere
 oportuerit; quam in rem sese millefolii
 usus magnopere commendavit, & L. RIVE-
 RIUS (a) „decoctum (inquit) millefolii
 „in potu ordinario per triduum exhibitum
 „hæmorrhoidum dolorem feliciter solet di-
 „scutere.“ In Annalibus Vratislaviensium (b)
 vir 30 annis major, molimina hæmorrhoidum
 citra fluxum sæpius expertus (nempe hepatis
 infarctus juncto interdum etiam ictero, ce-
 phalalgiam multam, nocturnis tamen sudori-
 bus leniri solitam, pravum habitum externum,
 multos flatus, & anorexiam), incidit mense
 Julio in vehementes dolores abdominis, præ-
 fertim in spina dorsi, qui se usque in femora,
 &

(a) L. c.

(b) Tent. 37. A. 1726. Julii d. 2. art. 1. §. 2.
 P. 29.

& brachia extendebant, simulque per dorsum sursum propius thoracem, ac latera; ardorem, & puncturas, imo quandoque in temporibus insanos capitis dolores causabant, vix perferendi. Junxit se his vehemens vomitus, quin tamen multum humorum elidetur præter magna mucī albi, qui per alvum etiam (ut ut rarius solutam) abibat, frustra. Aeger jacuit magna in debilitate, corde, arteriisque admodum subsultantibus. Periit somnus & appetentia; ab assumtis autem remediis potuve post obortos ructus insequabatur dicti ante mucī vomitus sine omni ferebile. Ob alvi segnitiei injecta quandoque enemata sincera iterum excernebantur sine intestinorum relaxatione. Lympha in os affluebat, ægerque in dies ultra ~~h~~^h mucī albi, lentique excernebat. Unde emaciabatur, albumque oculi flavescebat. Medicus consultus dedit eccoproctica, ℞es Salinos, & essentiam millefolii, succini, pimpinellæ cum infusis theatis, a quibus alvus reserata ordinate procedebat, somnus cum appetentia reversus, arteriæ minus subsiliebant, venæ minus turgebant, corpus renutriebatur, ægerque ita sibi redditus discessit, cum monito, ut ante æquinoctium Væ Snem in pede celebret. Perinde I. G. ERNESTI (a) refert virum 40 annorum molimi-

(a) Ibidem Tent. 23. A. 1723. Febr. d. 2. art. 3. §. 4. p. 152.

moliminibus tantum hæmorrhoidum obnoxium correptum fuisse rheumatismo, ac vehementi spinæ dorsi dolore, ac si culter ab imo sursum per eandem fuisset adactus, ut loco sese movere nequiverit, a quo eum aliquatenus Æs antispasmodico - temperantes, & subjuncta essentia millefolii cum $\mathcal{R}a$ $\mathfrak{G}ii$ \square risata, & \mathfrak{U} C. C. remixta liberavit. Aliis colica hæmorrhoidalis molesta fuit; sed $\mathcal{M}Ra$ laxans ex oleo amygd. dulc., manna, & spermate ceti, enemata mollia cum oleis lenientibus, nec non essentia millefolii, & chascarillæ, interpolatis tamen \mathfrak{G} bus nitroso - cinnabarinis, levamen attulere.

b) *Cæcæ hæmorrhoides* dolentes, ad quarum dolorem leniendum, stasesque sanguinis tollendas millefolium est eximium, de quo P. PACHEQUUS apud RIVERIUM (a) „multi (ait) „in hoc cœli tractu æstuoso cæcis, internis- „quæ hæmorrhoidibus laborant, quibus sum- „mus dolor creatur. Ab excrementis etiam „induratis, & suppressis propter tumorem il- „larum intestinum claudentem sævissimus ex- „citatur cruciatus. Vulgus medicorum cassia „ventrem emollit, ut liberius alvus deponat „sua excrementa; sed male profecto. Cum „enim venæ inflentur in sede potissimum „propter insitam mollitiem, qua paratæ sunt „san-

(a) Obs. communic. 3.

„sanguinem recipere, accidit, ut usu cassiæ
 „ita molliantur, ut in posterum luxuriantem
 „sanguinem facile recipiant, effectumque hoc
 „modo magis augeant. Ego vero a mulier-
 „cula stipem emendicante didici infundere
 „millefolium in aqua fervente, & bibere in-
 „fusionem illam per mensem integrum, aut
 „diutius, & omnes tali affectu laborantes sa-
 „nati sunt. D. DUMASIA male habita a tu-
 „mentibus venis sedis, uxor . . . chirurgi
 „fuerunt hac arte curatæ. Tandem hoc ipsum
 „remedium reperimus apud A. DE VILLA NOVA
 „(a). Id ipsum remedium ad fluxum illarum
 „immoderatum valde confert, si prædicto
 „ARNALDO credere est, & ratio etiam suadet.“
 Hæc ille. Per mensem quidem non; sed tri-
 duo tantum, infuso hoc utendum esse, jam
 ante monitum fuit; nisi forte minus meracum
 infusum fuerit, quod Auctor præbuit: cete-
 rum ex pugillis iij in ∇ æ ℥ss infusis paratum
 remedium haud ultra 3 dies est hauriendum,
 quod feliciter cessit ægro cuidam G. E. STAHLII
 (b). „Accidit (refert ille), ut vir ple-
 „thoricus, & eufarcus ab hæmorrhoidibus
 „cœcis, ac tumoribus, quibus jam bis, terve
 „dolorifice ægrotavit; in præsentī male ha-
 „beretur. Post aliquot dierum dolores ita
 tole-

(a) Cap. de hæmorrhoid. dolorib.

(b) Colleg. casual. magn. Cas. 10. p. 125. sq.

„toleratos consulor. Misi quidem ¶ es nitro-
 „sos; sed irradicata jam restagnatio levibus his
 „remediis non cessit: dedi itaque summitatum
 „millefolii ad pugillos vj, quorum tres in ∇ e
 „bullientis ¶ ß infundi, bibique jussi. Po-
 „stero mane nunciat, nil se inde levatum esse.
 „Miranti, ambigentique, num rite e præscri-
 „pto remedium fuisset usurpatum, & inquirenti
 „refertur, tantummodo pugillum i fuisse in-
 „fusedum. Impero igitur in posterum pugillos
 „iij. Eodem die ad ii. horam in platea
 „mihi homo fit obuius, non satis valens ce-
 „lebrare, & laudare remedium, omnis jam
 „doloris expers. Sub cœna etiã multum
 „vini hausit, sine ullo incommodo; licet il-
 „lud alioquin sanguinem commoveat.“ Mul-
 „tum quoque hoc remedium profuit L. HÆ-
 „STERI (a) Ecclesiasti tuberculum hæmorrhoi-
 „dale avellanam æquans, & vehementer do-
 „lens habenti, quod ubi aceto lithargyrii
 „calido fovisset, bisque per diem hausisset in-
 „fusedum ex herbæ millefolii cum florib. M. j.,
 „a morbo convaluit. Perinde (b) magnati 24
 „annorum ab hæmorrhoidum dolorificis tuber-
 „culis plurimum passo consuluit, ut Væ Sem
 „quovis vere, autumnoque, tum eccoproiti-
 „cum, dein ¶ em temperantem, litumque
 „hnum & ex essentia millefol., ac fumar. ¶
 3iij

(a) Medic. chir. Wahrnehm. i. Band. Nro. 442.

(b) Ibidem Nro. 616.

ziii m., & a meridie gtt. 40 ad 45 ex thea, vel caffèe in usum vocaret.

c) *Fluxus immodicus* earundem usu millefolii perinde pene certo, citoque cohibetur, ut ex VILLANOVANO (a) jam constat. Et M. ALBERTI (b) „ad coercendum (ait) „nimium impetum circa venam portæ succedentem, & subinde ad refrenandam excessivam profusionem hæmorrhoidalem conducit millefolium, cujus essentia cum essentiis temperatioribus carminativis, & ess. chartæ maritæ ad 30, aut 40 gtt. exhibita eosdem usus offert: & licet hoc millefolium pro effectu tali inducendo admodum quadret; tamen subinde maxima circumscriptio adhibenda est, ne ex liberali illius usu simul, & semel hæmorrhoides opprimantur; alias pessimos effectus post se trahit: quare convenit illud modeste, & parce, neque nimis frequenter adhibere; deinde etiam expedit illius usui remedia temperantia, & diluentia, ut & laxantia subordinare, ne suspectam stricturam post se relinquat; utpote quæ essentia millefolii tunc magis conducit, quando ejusmodi excessui hæmorrhoidali colici, & intensius strictorii effectus complicantur.“

STAHL-

(a) L. c.

(b) Diff. de hæmorrhoidib. excedent. S. 27. Tract. cit. p. 214.

STAHLIUS (a) quoque oculatus auctor, & parcus specificorum encomiastes fatetur specifici quid huic plantulæ ad hæmorrhagias, præsertim venarum sedis, cohibendas inesse, & a 20 annis multum adstringenti ejus vi, imprimis forma infusi dati, confusus est, a quo brevi optatus effectus observatur. Sed „mono (subdit), ut provide, cauteque usurpetur, præsertim in sexu masculino, namque „in hæmorrhoidariis effectus producere valet, „ac reipsa producit, haud semper imitandos. „Medicus quidam seni 70 annorum hæmorrhoidario dedit (volens genuinam imitari „M. P. STAHLII) pilulas, queis extractum „millefolii infuit; unde suppressæ hæmorrhoides hydropem letalem acciverunt.“ Perinde alteri ægro medicus scopo moderandarum hæmorrhoidum præbebat interdum millefolium: quo factum, ut illæ plures deinde annos abfuerint, ægerque in dies pejus habens demum e vita migrarit. Ipse STAHLIUS viro cuidam uberem, ac fere continuum hæmorrhoidum fluxum passo post incassum exhibitum ab aliis medicis crocum ♂is adstring. ad 3j. (unde fluxus potius increvit, nisi quod sponte subinde remisit), hectico, ac tabido medicinam faciens, cum per lenia medicamenta fluxum effecisset moderatiorem, tandem exhibuit dentis Hippopot. 3ß. in aliquot doses divisam, & mille-

(a) L. c.

millefolium: unde hæmorrhoides ocysus sub-
 stitit; sed abdomen inflabatur variis cum
 symptomatibus. Si enim vel in lecto sese
 erigeret, vel manus levaret, suffocationis
 fere periculum incurrebat; quod etiam a da-
 tis pellentibus experiebatur. Interea febris he-
 ctica crevit. Sed appetente autumnali æquino-
 ctio præter Væ Snem data lenia interna, externa-
 que stimulantia hæmorrhoidum fluxum revo-
 carunt; unde œdema evanuit, ægerque pri-
 stinum ad statum rediit. Si igitur a tam levi
 suppressione fluxus tanta mala, quid a largo,
 diutinoque millefolii usu non est verendum?
 Provide ergo illo utendum esse, ne fluxus
 omnino supprimatur, prudentia poscit; atque
 ita administratum non pœnitendos edit effe-
 ctus. L. HEISTERUS (a) meminit matronæ
 28 annorum, cui post ultimum puerperium
 dolorificus hæmorrhoidum fluxus accidit, præ-
 sertim sub, & post alvi dejectiones clamorem
 invitæ exprimens, usque adeo, ut nec ince-
 dere, nec sedere valeret. Sub quavis deje-
 ctione prodibat aliquid sanguinis multo, &
 ardente cum dolore, ac sensatione, ac si in-
 testinum rectum coarctaretur, ut nihil sine
 vehementi dolore excerni posset. Consultus
 Auctor, data potui ▽a pura, vel decocto
 panis cum pauxillo citri, præscripsit:

R.

(a) L. c. Nro. 329.

℞. Conch. acet. ppt.

Lap. 69. citr.

Arcan. dupl.

☐ri ⊕lati āā 3ij.

⊙ puriss. 3j. M. F. ☿is temperans

S. m., & v. ad 2. cuspides cultri ex ▽a.

Porro

℞. Essent. millefol. 3vj.

S. hora ante cibationem gtt. 40. ad 55.

℞. Herb. millefol. cum florib. M. ij.

Flor. 4 cordial. āā. p. j. M. concis.

D. species pro infuso bis per diem ad 3, vel
4. vascula bibendo.

℞. Ol. infus. solani.

— rosar āā 3ß.

Acet. litharg. 3vj. M. tritis in mortario.
plumb. adnutriti consist. adde

Saeh ℥ni 3ß.

Camph. gr. vj.

Opii gr. iij. D. m., & v., & urgente
alias dolore ut loca dolentia illinantur. Si
alvus obstrueretur, imperatum enema ex la-
ctis ℥bj. cum sacch. 3j. (vel mellis cochl. ij.)
& butyri cochl. j.; dolore autem nimium sæ-
viente, ut balanus ano inderetur ex recenti
butyro ▽a frigida densato ½ digitum longus,
crassusque. In cibum concessa mollissima ole-
ra, fructus horæi cocti, variaque jura mollia,
& blanda, vetita omnia in cibo, potuque
adstringentia, siccantia, calefacientia, & acria.

Ab his convaluit. Non male etiam adduntur millefolio plantæ aliæ in pacandis hæmorrhoidum turbis efficaces, ut scrophularia, telephium, chelidonium, &c. quemadmodum M. GERBEZ (a) in se ipso est expertus. „Refero „(ait ille), quid ego in memetipso iis (hæ- „morrhoidibus) tam dolentibus; quam flux- „entibus præ aliis remediis proficuum fuisse „expertus fuerim. Patiebar autem earundem „(interpolatum tamen) fluxum jam fere per „15 annos, priusquam eæ mihi dolere, vel „nimio fluxu molestæ esse inceperant; post- „quam autem ante triennium ex itinere equo „facto nimium incaluissem, eis subinde adeo „dolueram, ut dolori sufferendo vix par fue- „rim. Transierat vero successive tamen rur- „sus dolor hic; sed qui post annum circa idem „fere tempus ad simillimam ex equitatione „incalescentiam cum non impari molestia ta- „men rursus redierat, & præterea cum ea „sanguinei fluxus continuatione, & diarrhœa, „ut inde pessumdata ventriculi digestionem, & „attritis viribus vix non succubuerim, non „obstantibus quam plurimis protunc in subsi- „dium vocatis remediis. Demum eisdem ta- „men tantum effeceram, ut successive rursus „me utcunque recollegerim. Quod pertime- „skerem vero, ne sæpius recurrens tam peri- „culosum malum me demum præcipitaret, co-
gitan-

(a) Misc. nat. cur. Cent. 1. & 2. Obs. 131.

„gitandum mihi esse rebar de certioribus re-
 „mediis, quibus ulteriori recidivæ obviam
 „irem, & deprehenderam; quod scrophularia,
 „telephium, chelidonium minus, & millefo-
 „lium præ aliis talia essent, quæ hoc malum
 „cicurare, & demum etiam radicitus extir-
 „pare valerent. Resolveram propterea eorum
 „effectum experiri; atque quod commodissi-
 „mus eorum usus mihi videretur esse in de-
 „cocto, ea cum toto minutim concisa in aqua
 „instar herbæ theæ decoquere solitus eram, &
 „cum tantillo sacchari singulis, vel saltem
 „alternis matutinis quantitate § circiter un-
 „ciarum calide forbillare: & sancte dico, me
 „intra 2 menses (observata interea proba vi-
 „ctus ratione) rem . . . eo perduxisse, ut
 „jam in alterum annum, etsi interea pluries
 „equo peregre profectus fuerim, inde peni-
 „tus nullam perpeffus fuerim molestiam; quin
 „potius inde notabiliter carnosior, & colo-
 „rator effectus veluti renatus esse mihi vi-
 „debar, fluxu earum quidem subinde interea
 „tamen recurrente; sed moderatissimo, & mi-
 „nime molesto.“ &c. Simili quoque ratione
 I. M. MÜLLERUS (a) millefolii plantis aliis
 remixti, ac decocti, refractaque dosi dati
 ope nimium hæmorrhoidum fluxum ad mode-
 ratum ac rariorem reduxit: „cauponis filio-
 „lus sexennis per semestre a convivis quo-
 tidie

(a) Ibidem Cent. 8, Observ. 36.

„tidie fere ad vinum meracius bibendum, &
 „quidem in majori copia; quam talis tenella
 „ætas perferre potest, allectus mente . . .
 „Majo fluxu hæmorrhoidali quotidiano corri-
 „pitur sat copioso, cum dispositione hectica,
 „&c. Quod cum perterriti parentes animad-
 „verterent, meum exposcebant consilium.
 „Statim omnem vini usum plane dissuasi,
 „adque potum ordinarie sumendum cerevisiam
 „utilem judicavi, in qua nodulus ex

R. Herb. chelidon. min.

— millefol.

— capill. ♀.

— hepat. nob. āā M. j.

Ras. lign. sassaf. ʒvj.

Passul. min. ʒj, suspensus sit. Item

R. Extract. millefolii

— plantag.

— agrimon āā ʒj.

— ♂ pomat. ʒij.

▽æ hepat. nob.

— cichor. āā ʒijß.

⚔ rad. scrophular.

— viperin.

⊙. depurat. āā ʒijß.

Syr. Symphit. ʒj.

De qua MRa mane, & pomeridie 2. cochl. cap.

R. Unqu. de linar. ʒß.

Olei expr. hyosc. ʒijß.

⚔ rad. scrophular. ʒij. Pro ungu. ad
 podi-

„podicem ordinavi. Hisce aliquamdiu continuatis pinguior, vegetiorque factus, ac fluxus hæmorrhoidalis imminutus fuit; quo in statu ad plura medicamenta assumenda non amplius persvaderi potuit, licet hæmorrhoides ad hodiernum usque diem quandoque, sine ulla tamen molestia, apertæ sint.“ Eadem cum cautela millefolium puellæ trimulæ HOFFMANNUS (a) præbuit.

d) *Stymatosis* hæmorrhoidalis. Ita I. A. RAIMANNUS (b) stymatosis ex suppressis hæmorrhoidibus ortam decocto millefolii profligavit: „contigit mihi (ait) hanc nuper in viro peregrino ex Tyrolia oriundo observasse, qui pro more suæ gentis nundinatorem peripateticum agens, mercesque suas bajulando, venum differe adsolens, ad mercatum hujus loci annum, & solennem suis cum sociis quadragenario major cum comparuisset, emanente sibi familiari hæmorrhoidum fluxu floridissimum sanguinem non quidem micturendo reddebat; sed eundem indolenter tenui, eaque interdiu æque, ac noctu perenni scaturigine emicare, & per penem propullulare animadvertibat. Neglexit autem malo huic statim facere medicinam, bene scilicet memor, quod ante annum circiter parem paucorum

(a) Vide §. 21.

(b) Act. nat. cur. Vol. 6. Obs. 3.

„corum dierum hæmorrhagiam innoxiam ha-
 „buerit; cum autem eundem plus ultra incre-
 „bescere cerneret, metuque majoris forsan
 „successuræ noxæ angeretur, medicam tandem
 „implorare voluit opem. Inciderat vero in
 „medicum, qui discrimen activas inter, &
 „passivas hæmorrhagias nullum esse ratus præ-
 „missa Væ Sne revulsoria auxiliis diversis hæ-
 „mostaticis, non neglectis urethræ quoque
 „syringationibus, cito eidem, etsi incassum,
 „mederi satagebat. Inanem ergo medentis
 „esse operam per 3 hebdomadarum de-
 „cursum dum æger experiretur, conclama-
 „tum de sua esse salute. . . persuasus, ut ma-
 „num naufrago absque mora . . . porrige-
 „rem, anxius rogat . . . Postquam factò
 „examine originem, & causam ejusdem inti-
 „mius perspexissem, facile convincebar, pro-
 „cul abesse tam fonticum, quale sibi æger im-
 „minere metuebat, periculum, præsertim,
 „dum omnis actionum (si pallorem vultus,
 „viriumque aliquem languorem excepero)
 „intemerata perstaret integritas; tranquillo
 „proinde eundem esse jussi animo, datisque
 „qbus nonnullis tonico-antispasticis; & præ-
 „scripto decocto equiseti, & millefolii sca-
 „turginem hanc cruoris paucos intra dies ex
 „voto suppressi . . . Abiturientis vero firma-
 „vi in ulteriora pericula animum, auctorque
 „fui, ut restitante parco hæmorrhoidali fluxu,
 „nisi in idem rursus vertente anno discrimen
 „venire velit, vel Væ Sbus vicariis, vel hi-
 „rudinibus sibi consulat.“ Similem etiam ca-
 sum

sum videre est in I. A. SEGNERO (a), nempe viro post quemvis coitum styomatosis ob suppressas hæmorrhoides per vagas periodos accidebat. Sub ipso igitur fluxu scarificata summa femora; post aliquod vero dies ad reddendum vasis tonum datum decoctum millefolii cum ligno lentisci: deinceps aloetica, aliave idonea remedia exhibita, auctaque, instantibus moliminibus hæmorrhoidum. Fluxere inde hæmorrhoides ex ano, simulque adhuc ex pene; verum eadem medendi methodo repetita styomatosis ad fluxum hæmorrhoidum desit.

§. LXXXV.

2. *Bdellium* quoque tonico scopo, ad immodicum præsertim hæmorrhoidum fluxum compescendum, sese commendat. L. RIVIERUS (b) de eodem fluxu agens „valde (inquit) laudantur ab Auctoribus pilulæ de „bdellio; quas tamen rejicit RONDELETIUS „propterea, quod vero bdellio pharmaco- „pœi careant, & illius loco myrrham usur- „pent, quæ sanguinis fluxum promovet: ve- „rum

(o) Diss. de morbis ex interceptis hæmorrhoidibus potissimum rariorib. (4to. Gotting. 1741. Resp. I. I. GRUMBRECHT) §. 74. p. 30.

(b) Prax. med. L. 10. C. 19.

„rum huic obstitit SOLENANDER, illiusque
 „experientiæ propriam opponit, asserens se
 „in usu harum pilularum, ut sunt præscriptæ,
 „atque cum usitato bdellio compositæ, esse
 „ctum, quem promittunt, tam evidentem
 „comprehendisse, ut de compositione dubi-
 „tare vix queat; nisi quis putet ab adjectis
 „siccantibus, & adstringentibus hoc quale-
 „cunque, quod recipiunt, myrrhæ obtusum,
 „superatumque esse. His addere possumus,
 „BAUDERONIUM in pharmacopœa aliosquæ
 „recentiores asserere, verum hodie bdellium
 „DIOSCORIDIS descriptioni conveniens ex
 „Judæa nobis afferri, & a myrrha non diffi-
 „cile distingui. Illarum pillularum usus talis
 „esse poterit:

R. Pilul. de Bdellio ℥j.

Trochisc. de carabe

— — — ▽a sigill. aa ℥j. cum

Mucilag. sem. cyd. extr. cum ▽a rosa-
 „cea F. M. P. de qua capiat ℥j bis in die, ante
 „prandium, & coenam.“ Confectio autem pi-
 „llularum de bdellio ita se habet (a):

R. Ammeos parum tosti ℥iij.

Myrobolan. chebular.

— — Indarum,

Myro-

(a) I. H. IUNGKEN corp. pharm. chym. medic.
 Sect. 3. C. 20. p. 705.

Myrobolan. Bellicar.

— — Emblicar.

Conchar. venerear uſtar.

Charabe ʒʒ ʒijß.

Bdellii ʒijß.

Maceretur bdellium in ſucco foliorum porri,
& formetur maſſa.

§. LXXXVI.

3. *Chelidonium minus*, de cujus virtute
ita R. SOLENANDER (a): „ego adhuc adole-
„ſcens vidi . . . empyricum, omne vitium
„hæmorrhoidum curantem chelidonio minore
„ . . . Is ſecrete herbam integram ſiccata,
„in manipulos collectam, injectamque cere-
„viſiæ macerabat, eamque propinabat. Et
„aquam ejus exſtillatam adhibebat lotionem,
„& ſotu exterius per linimenta. Poſtea ego
„illa herba multis modis ad hunc effectum fe-
„liciter ſum uſus. Succus frequenter illitus
„expeditius id facit; quam aqua. Herba
„etiam tuſa appoſita medetur. Novi, qui ſa-
„narunt, quos nimium proſtium fere con-
„fecerat, ut hydropis periculum adſeſſe vide-
„retur; exhibita hujus herbæ aqua deſtillata,
„ſed quia acris eſt admodum, libentius utor
„herba iſta (ut dixi) cereviſia vel etiam vino
„ſuo loco macerata. Flores quidam, alii
„her-

(a) Conſil. 20. Seſt. 4.

„herbam commiscent, ovi vitello coquunt,
 „& in placentula mane edunt. Huic' herbæ
 „ego ad hæmorrhoidum vitium mirabilem
 „efficaciam tribuo.“

§. LXXXVII.

4. *Glandium decoctum* (Eichel Coffée).
 Abusum calidorum potuum, ut causam laxitatis venarum sedis hæmorrhoidariis dissuadens
 1. C. STUNZER (a) mirabantur (inquit) „aliqui, dum iis prophylactico scopo decoctum
 „ustulatarum glandium quercus in locum potius Coffée consulerem, veriti obstructions,
 „indeque venarum hæmorrhoidalium intumescentiam; sed morbus eorum a laxitate fuit
 „enatus: obediendo convaluere.“ Confirmantur hæc singulari casu observato ab S. H. A. KAISER (b): Vidua 55 annorum, nunquam catamenia nata (& idcirco 18 annis conjugii sterilis) horum loco a juventute hæmorrhoides patiebatur, quæ ingravescente demum ætate anomalæ factæ, varia causarunt symptomata, quæ inter crebra post præviam semper vomituritionem vertigo, sæpe cum syncope, consecuto

(a) L. c. p. 83.

(b) Fortsetzung des Unterrichts von dem Nutzen und besonderer Heilungskraft der Eicheln &c. 3. Abtheil. 5. Krankengeschichte p. 54. sqq.

secuto vomitu cessans, assidua ventris inflatio, lassitudo, ac debilitas, appetentia jam exigua; jam multa, cui si multum indulset, summa semper stomachi inflati tumescentia, ac tensio sequebatur. Alvus post diutinam obstructionem dura, semper cum vehementi tenesmo egerebatur. Lingua pro parte alba, urina cruda aquosa, pulsus jam debilis, jam contractus. Animum alias hilarem melancholia oppressit. Interdum ex nisu sanguinis in anum perquam dolorifica intestini recti orta inflammatio cum ani prolapsu gangrænam citam minante; sed Væ So, vapor calidæ, aliaque externa malo semper medebantur. Væ So princeps erat remedium, ad vehementissima molimina hæmorrhoidum, gravemque inde tenesmum ortum leniendum. Præ debilitate primarum viarum nullos potus vidua perferre potuit; nam infusa ex tonicis etiam herbis stomachum plus relaxabant; Caffée vero æstum, & humorum rarefactionem causabat. Placuit igitur glandium decoctum experiri. Quod ex glandium ℥iij, & caffèe orient. ʒj. paratum mane & a prandio cum saccharo, ac lacte potui datum. Primis diebus meteorismus; ac tensio ventris crescere videbantur; sed copiosi, ut ut raro erumpentes, flatus emissi tensionem minuebant. Post 14 dies alvus evasit ordinata sine ullo tenesmo, ac deinceps ferme quotidiana. Hinc decocti usus in annos commendatus, & si forte præsentē plethora hæmorrhoidum anomalix occiperent, Væ Snie, vel aliis pro re nata remediis quies procurabatur.

§. LXXXVIII.

5. *Rosarum ficcârum syrupus* P. BORRELLUS (a) „sartor (ait) castrensis tanto hæmorrhoidum fluxu aliquando detinetur, ut „ad 10 ℥ , & quasi torrentes sanguineos effundat; est autem vir quadratus, & joviali „præditus temperamento. Syrupo de rosis „liccis nimius ille fluxus cohibitus fuit meo „consilio.“

§. LXXXIX.

6. *Sorbi roob*, de quo S. LEDELIUS (b): femina robusta statis temporibus per plures annos mensium, hæmorrhoidumque fluxum cum euphoria experta incidit in trimestrem hæmorrhoidum tumorem cum inflammatione, sævisque cruciatibus, & virium inde prostratione; quæ mala menses subsistentes auxere etiam. Post infinita frustra tentata remedia, tandem ex vetulæ consilio cœpit uti roob sorbi aucupariæ, cujus ab usu omnis mox abiit dolor, tumor, & inflammatio, pristinaque rediit valetudo.

§.

(a) Hist., & Obs. med. phys. Cent. 4. Obs. 58.

(b) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 4. Obs. 50.

§. LXXXX.

7. *Pimpinellæ sanguisorbæ decoctum* cujus efficaciam C. KOELICHEN (a) in sistendo immodico hæmorrhoidum fluxu est expertus: nempe matrona 50 annorum deficientibus jam catameniis patiebatur quovis mense fluxum hæmorrhoidum per aliquot dies citra ullam virium, sanitatisve jacturam. Tandem ubi malignam febrem nata ab eadem convaluisset, paucis post diebus tempore solito ingruit hæmorrhoidum fluxus cum debilitate summa, convulsionibus, vitæque discrimine. Auctor in potum præscribit decoctum sanguisorbæ, quo fluxus cohibitus est. Viribus, aliisque symptomatibus per alia provisum fuit.

§. LXXXXI.

8. *Urticæ succus* in aliis quoque hæmorrhagiis compescendis decantatissimus, de quo sequentem casum refert L. RIVERIUS (b): „consiliarius immodico hæmorrhoidum fluxu „laborabat a 5 vel 6 diebus, quo sanguinis „3viij, vel x. singulis diebus profundeabat. Post „Væ Snem julepos refrigerantes, & incras- „santes, aliaque remedia interna, & externa „frustra

(a) Act. med. Hafniens. Vol. I. Obs. 81.

(b) Obs. med. Cent. 4. Obs. 81.

„frustra exhibita cum res urgeret, & æger
 „admodum debilitaretur, præscripsi succum
 „urticæ levi ebullitione depuratum ad $\bar{5}$ ij cum
 „paucō saccharo, & hoc solo remedio fluxus
 „omnino cohibitus est.“ Perinde apud DE
 LA METTRIE (a) vir comesto calidissimo
 jure factō ex vino Hispanico, cinnamomo,
 croco, saccharo, sentiens velut calidum hu-
 morem e stomacho descendentem, implevit
 matulam alvina dejectione cum sanguine. Sin-
 gulare fuit, toto morbi tempore sanguinem
 alvo nonnisi ab enematibus prodiisse, quem
 post Væ Snem data adstringentia stitere; sed
 maturius purgato ægro hæmorrhagia recrude-
 scens alteram Væ Snem poposcit. Fluxum
 denuo stitit succus urticæ datus. Sanguis post
 usum ejus excretus referebat coagulum ipis-
 sum, ac viscidum adeo, ut figuram a cellulis
 coli conciliatam retinuerit. Tandem æger post
 multa remedia, severamque diætam sensim con-
 valuit.

§. LXXXII.

9. *Granatorum grana.* F. BARTHO-
 LINUS (b) „viro, (narrat) cui ante modera-
 „tius ad uncias sanguis ex hæmorrhoidibus
 „fluxe-

(a) Observ. de Medec. pratique Nro. 80.
 p. 126.

(b) Act. Hafn. med. Vol. I. Obs. 51.

„fluxerat, jam nescio, qua sanguinis acrimonia, vel viarum laxitate ad libras manat ad animi fere deliquium. Tentata ad revulsi-
 „onem Væ So, aliaque remedia solita advo-
 „cata, sed frustra. Tandem præsens auxi-
 „lium grana granatorum succulenta submini-
 „strarunt, quibus masticatis, succoque de-
 „glutito cessavit periculosus sanguinis fluxus:
 „cujus idcirco remedii certitudinem sæpius
 „in se factis experimentis deprehendit.“
 Haud fecius Baroni R. LENTILII (a) e nimio
 fluxu hæmorrhoidum debilitato nil æque pro-
 fuit; quam eadem grana succulenta frequen-
 ter masticata.

§. LXXXXIII.

10. *Simarubæ cortex*. C. WEBER (b)
 „quadragenarium ex nimis hæmorrhoidibus
 „sanguineis per aloetica, carminativaque
 „promotis intra 12 septimanas asciticum
 „factum cum chinæ chinæ, simarubæque cor-
 „ticibus, & rhabbaro sanavit; alium 30
 „aliquot annorum virum ex illis intra 16.
 „hebdomades plane fere emaciatum unice
 „per simarubæ corticem restituit.“

§.

(a) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 9. Obs. 124.

(b) Obs. med. Fasc. 2. Obs. 13. p. 58. sq.

§. LXXXXIV.

11. *Terrea stiptica* non in tenera modo; sed adulta etiam ætate sæpe in cohibendo immodico hæmorrhoidum fluxu non pœnitendo cum successu præbentur. Sic I. C. GRIMM (a) „contigit sæpius (ait), quod „puer quidam annorum sex laboraverit hoc „fluxu; interim nulla adfuere symptomata, „nam vegetus erat, nullumque sensit dolorem. „In hoc casu adhibui lacticiuia cum terreis.“ Huc etiam D. CORNARI (b) casus est referendus, quem paulo post dabimus.

§. LXXXXV.

12. *Mars*, ejusque præparata, vel corpora illum continentia. Illum quippe ad obstructions a laxitate vasorum, & viscido sanguinis lentore enatas, qualibus hæmorrhoidalis debetur morbus, referandas, sanguinemque rutilum, ac fluidum reddendum, esse efficacissimum nemo ignorat. Hinc mars & molimina morbi sæpe discutit, & nimium fluxum compescit, & suppressum a vasorum debilitate, sanguinisque lentore viscido revocat. Hos itaque in usus conveniunt.

a)

(a) Misc. nat. cur. Cent. 9. Obs. 92.

(b) Vide §. seq. (c)

a) *Crocus* ♂ is varius, vel solus, vel aliis junctus. C. F. PAULLINI (a) Pastori cuidam ex crebro aloes usu hæmorrhoides immodicas, dolentesque nacto pilulas præbuit:

R. Extr. tormentillæ

Croci ♂. adstr. aa gr. jv. M. F. pil. 8 pro dosi. Perinde F. HOFFMANNI (b) „præfectus militum quadragenario major, natura „sanguineus, atque robustus, a multis jam „annis expertus fuerat hæmorrhoidum fluxum „cum euphoria; sed cum a sueto vini Rhenani „potu transfret ad vini Gallici Pontak potum, „elapso aliquot mensium spatio hæmorrhoides „præter morem sunt retentæ, & successerunt „dolores atrocissimi in lumbis, & abdomine „cum virium dejectione, inappetentia, vi- „gilia, pulsuque celeri, & frequenti: exhi- „bita vero ter laxante potione ex tama- „rindis, rhabarbaro, & passulis minoribus „non modo soluta est alvus; sed et ingens „nigri, & congrumati sanguinis copia excreta „summo cum levamine. Diutius tamen; quam „par erat, perdurabat fluxus sanguinolentus; „quo quia vires nimium atterebantur, datum „est electuarium ex rosarum conserva, specie- „bus de hyacintho, succino, croco ♂ tenui, „&

(a) L. c. §. 2. p. 234. fq.

(b) L. c. Obs. 4.

„& granatorum syrupo, cujus usu ad hebdomadem continuato ad sanitatem traductus est æger.“

b) *Limatura* ♂ v. RIEDLINI (a) virgo 30 annorum rite semper menstruans per integrum fere annum intermedio inter catameniorum fluxum tempore immodicum hæmorrhoidum fluxum patiebatur non sine expallescencia, viriumque majori in dies jactura; quem cum data essentia ♂ cum lenibus stipticis ne minuisset quidem, data limatura ♂ cum conveniente extracto in pilulas redacta, quæ vix aliquoties usurpata malum sustulit, & continuatus deinceps remedii usus recidivam præcavit.

c) *Ræ* ♂ variæ. G. W. WEDELIUS (b) „observavimus (inquit) aliquot ægros, qui fluxum hæmorrhoidalem aliquoties experti cum per aliquot tempus uterentur *Ræ* ♂ aperitiva temperatori, illas non sensere amplius.“ Perinde (c) quidam illius „vir magnificus aliquoties fluxum hæmorrhoidalem expertus cum per aliquot tempus uteretur *Ræ* ♂ aperitiva, illum non sensit amplius in hunc diem.“ P. H. VOGEL apud

A.

(a) Lin. med. ann. 3. Febr. 23. p. 124.

(b) Opiolog. L. 2. S. 2. C. 5.

(c) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 3. Obs. 22.

A. E. BÜCHNERUM (a) quadrimuli meminuit pueri, qui e febre catarrhali cum lateris dolore repente medicamentis cedente in hæmorrhoidum fluxum incidit, ita, ut quotidie alvum bis, terve ponens semper etiam sanguinis aliquid excreverit, cetera sanus & alacris; sed quia fluxus in 17 hebdomades durans metum injecit, ne cum tempore fiat profusior cum sanitatis discrimine, datis bis omni die \mathcal{R} æ ♂ is cum succo pomor. gtt. 25, sensim aulpicato est abactus.

d) ∇ æ ♂ les nativæ, aut arte per chilibis extinctionem paratæ. Inter illas eminent spadaneæ, de quibus P. L. de PRÉSSEUX (b) „quamquam (ait) hæmorrhoides absolute „aquis nostris curatas nunquam viderim; at- „tamen asserere possum harum potum magnam „illis attulisse levamen: non mirandum est ergo; „si quotannis plurimi hæmorrhoidibus obnoxii „Spadam veniant. Pouhontius (fons) nimiam „sanguinis jacturam temperat, doloresque „hisce hæmorrhagiis causatos sedat; Jeron- „sterinio (fonte) in dispositis excitatur harum „fluxus, vel suppressus resuscitatur. Consan- „gui-

(a) Misc. phys. med. A. 1730. Decembr. d. 4. art. 6. p. 1522. sq.

(b) De aquis spadanis. Obs. med. 23. in append. ad R. ZAFFII Synops. Observ. med. de select. medic. virib.

„guineum habeo, qui omni mense magnum
 „sanguinis dispendium per hæmorrhoides fa-
 „cit, quæ suppressæ Jeronsterinio excitantur,
 „quem per 5, vel 6 dies potat, qui ipsi sem-
 „per plures annos profuit.“ In mineralium
 aquarum defectu ∇ a chalibeata simplex sub-
 stitui potest, quam practici remediis, cibis,
 potuique loco simplicis aquæ substituunt, ve-
 lut in D. CORNARII (a) casu videre est: vir
 nobilis post quadrimestrem colicam, epilepsi-
 am, brachiorum paralysem, & vomitus cum
 alvo obstructa, e vino præsertim Hungarico
 uberius poto repente corripitur hæmorrhagia
 narium, & ani sine dolore & debilitate, imo
 cum euphoria. Ex naribus excretæ per 4 vi-
 ces intra diem sanguinis circiter ℥ij , & qua-
 tridui alvino fluxu fere nil nisi sanguis purus
 cum grumis circiter ℥vj . prodiit. Alvus in-
 terdum fuit naturalis, compacta, & incru-
 enta. Ab his hæmorrhagiis symptomata sine
 ullo remediorum usu desiere. Ad compescen-
 das vero hæmorrhagias (ani præsertim) se-
 quentia a medicis imperata sunt: 1.) sacculi
 farcti florib. rosar. rubrar., & verbasci: fo-
 liisque plantaginis, ac vino rubro chalibeato
 calido imbuti, ano applicandi; interdum
 etiam 2.) suffitus ex ℥e troch. de carabe,
 mastichis, thuris, myrrhæ, ano admissi.
 Fluxu ab his non remittente 3.) enemata
 stiptica

(a) Observ. med. 26,

stiptica injecta, v. g. decocti in ∇ a ferrata plantaginis, portulacæ, rosar. rubrar. folior. quercus, flor. balauft. consol. maj. \S iv. cum $\oint \nabla$ æ sigill., vel boli Armen., vel troch. de carabe \S js. Retinebantur per $\frac{1}{4}$ horæ. 4.) illitum dorsum unguento Comitissæ. 5.) nutrimenta omnia pro ∇ a simplici, paranda fuere cum chalibeata, queis pro re nata admiscebatur $\oint \nabla$ æ sigill., boli Armen., C. C. &c. Nutriebatur autem contusis pullorum asporum, gallinarum, caponum, ptisanâ amygdalarum dulcium; potui datum vinum rubrum cum ∇ a chalibeata. 6.) Boli quoque subinde ex \oint bus ∇ æ sigill., C. C., boli Armen., cum conserv. rosar. rubrar. vetusta a prandio, & cœna dati. His convaluit.

§. LXXXXVI.

13. *Peruvianus cortex* denique hæmorrhoidalibus in malis vario præbetur scopo, præsertim vero illum iadicant

a) *Laxitas* vasorum causans, vel certe fovens hæmorrhoides.

b) *Spasmi* fluentium hæmorrhoidum comites, seu fluxus hæmorrhoidum cum motibus anomalis spasmodicis, cujus rei singulare exemplum narrat P. G. WERLHOF (a):
„vir

(a) Obs. de Febr. S. 5. §. 9. opp. P. 1. p. 248. sq.

„vir nobilis , macilentus , hæmorrhoidum
 „fluxu , ac motibus anomalis , tussi sicca , hæ-
 „moptysi , catarrhis , flatibus sæpe afflictus ,
 „qui ante biennium , & iterum antegressa
 „hyeme ex pleuritide satis periculosa emer-
 „serat , corripitur mense Julio A. 1727. Fe-
 „bri zana epidemica , quæ postquam cum ter-
 „tia accessione in duplicem haud plane inter-
 „mittentem degeneravit , & hæmoptysin cum
 „tussi violenta comitem adscivit , non tuto
 „permitti posse judicata , sed cortice cum pa-
 „paveris albi syrupo in bolos redacto ex
 „methodo profligata est. Nondum penitus
 „convaluerat æger , cum abire hinc , operis-
 „que ad aquarum exundantium aggeres præ-
 „esse iussus fuit. . . Dimisi illum ea lege ,
 „ut præsertim sub paludosorum effluviorum
 „hauriendorum necessitate insisteret medelæ ,
 „donec me de valetudinis statu per literas
 „certiorem fecisset , quod post paucos dies
 „facturum se esse recepit. Verum nihil de
 „ipso comperi ; donec sequentis anni mense
 „Januario epistolam accepi , qua egregie se
 „valere perscripsit , & consilium petiit , num
 „corticis usui amplius insistere deberet , cujus
 „quotidie quinquies ʒß assumere nondum
 „intermiserit ; quia licet semper detentus
 „operis aquariis , alias sanitati suæ molestif-
 „simis , firmitatem in dies majorem valetudi-
 „nis a multis annis debilioris persentiscat ,
 „hæmorrhoidibus sine molestia identidem sub
 „medicatione promanantibus. Annum , &
 „diem datarum literarum male me intellexisse ,
 „&

„& forsan vetustiores alicubi neglectas jacuisse
 „putabam. Ubi autem veram rem esse, & ma-
 „gnam viri in remedium fiduciam reperi, qui-
 „esceret quidem alternis hebdomadibus ab
 „ejus usu; sed alternis idem ter adhuc repe-
 „reret, suasi, appropinquante præsertim æqui-
 „noctio, quo hæmoptysin alias pati consue-
 „vit. Exinde vero . . . optime quidem &
 „longe melius; quam diu antea habuit, cor-
 „poris etiam habitu vivido magis, & pin-
 „guiori factio.“

c) *Febris intermittens* prægressa ut cau-
 sa, laxitatem vasorum hæmorrhoidalium post
 se relinquens, cui, nescio, quid, febricosi
 adhuc superest, ad quod abolendum Peru-
 vianus cortex est efficacissimus. P. G. WERL-
 HOF (a) „quibusdam hæmorrhoides cœcæ
 „(ait) cum tenesmo molesto, & alvo adstri-
 „cta prodeunt; sed tempore, & continuato
 „remedii (corticis Peruviani) usu facile, &
 „certo evanescunt, adjectis, aut interposi-
 „tis forte medicamentis ex nitro, aut quæ
 „virtute salina, amara, cathartica ejus natu-
 „ram æmulantur, floribus item vel lacte sul-
 „phuris, & ipso millefolii decocto, & quod
 „singulariter vel solum profuisse scimus, du-
 „obus forsan ℥ii dulcis granis vespertinæ
 „cuius corticis dosi additis.“

d)

(a) Ibidem S. 3. §. 6. p. 121. sq.

d) *Periodicæ hæmorrhoides cœcæ*, earumve molimina; præsertim si ad febrium larvatarum censum pertinent. Atque hujus forte loci est observatio VANDERMONDII (a): non nemo laboravit a biennio cœcis hæmorrhoidibus externis, quovis mense ad catameniorum instar revertentibus. Consuluit Auctor Peruviani corticis usum, & Væ Snem cum exacta diæta ob plethoram; imo vivendi rationem prorsus mutandam suavit. His omnibus factis morbus desit. Ambiguum tamen hic est, affatimne sumto cortici, vel diætæ frugali, multove motui curatio tribuenda sit?

e) *Ulceræ* prava hæmorrhoidalia: usu enim corticis pus emendari, putredinemque corrigi neminem latet, & efficaciam illius hac in re sensit I. A. LEÜTHNERI (b) sexagenarius hypochondriacus sanguineus, sobrius, potu parcissimo usus, vitæ mobilis, & laboriosæ, qui nunquam hæcenus morbum expertus a neglecta Væ Sne solenni incidit in hæmorrhoides cœcas inflammatas cum pertinacissima alvi, lotiique suppressione, solennibusque utrique symptomatibus. Enemata, ecco-protica, semicupia, & Væ Snæ ubi alvum, lotium-

(a) Recueil. T. 6. p. m. 208.

(b) Praktische Heilungs - Versuche der Milzdünste 1. Th. 2. Abschn. Nro. 4. §. 39. p. 78. sqq.

lotiumque sensim ad pristinam libertatem revocassent, interea ani quoque inflammatio in abscessum abiit, ex quo sponte rupto incredibilis vis ichoris nigri foetentissimi erupit. Pluribus ejus cavis sectionis ope in unum redactis datus interne cortex peruvianus, & ptisana sanguinem depurans, interpolataque eccoprotica, diæta simul vegetabili imperata. Ichor ocysime in pus bonum versus, & æger sensim plane convaleuit.

f) *Gangræna hæmorrhoidibus inflammatis superveniens.* I. A. BRAMBILLA (a) meminit virginis 28 annos natæ, & ob copiosum sputum pro phthisica habitæ, cui circumcirca hæmorrhoides tumuere strangulatæ adeo, ut intra paucos dies gangræna supervenerit. Factæ ergo incisiones, & deligatio ope unguenti digestivi, ac basilic. æquis partibus mixti; interne datus cortex Peruvianus. Ab his gangræna substitit, mortuoque a vivo paucos intra dies abscedente ægra spatio 3 hebdomadam prorsus est persanata.

SECTIO

(a) Von der Phlegmone 2. Th. 6. Cap. 4. Beobacht. p. in. 185. sq.

S E C T I O II.

C H I R U R G I A.

CAPUT I.

SANGUINIS MISSIO.

§. LXXXVII.

I. **S**ANGUINIS *missio* in hæmorrhoidalibus affectionibus omnium fere præsidiorum est princeps, seu effectum spectes, quem præstat rite administrata, seu frequentiam, qua indicatur. Interea multi omnino abusus in mittendo hæmorrhoidariis sanguine committi solent, quos LUDWIGIUS aurea prorsus dissertatione (a) complexus est, usque adeo, ut nullo perinde in remedio, atque in hocce,

(a) Diss. cit.

hocce, peccetur, seu tempora sanguinem demendi spectes, seu vasa, &c. Multis profecto hæmorrhoidariis unica sæpe sanguinis missio perperam instituta magno stetit. Ne proinde hic tiro tam facile aberret, certis opus est regulis, juxta quas missionem sanguinis vel præcipiat, vel vetet.

§. LXXXXVIII.

A. *Indicant generatim sanguinis missionem*

a) *Prophylaxis morbi*, præsertim ad prævertenda ejus molimina, vel suppressionem fluxus a plethora. Usu obtinuit, ut prophylacticæ id genus sanguinis missiones vel maxime circa solstitia, & æquinoctia instituantur; quippe queis temporibus vulgo hæmorrhoidales turbæ alioquin ingruere solent, ni missio ante sanguine antevertantur.

a) *Therapia præsentis jam hæmorrhoidalis affectionis variis in casibus missionem sanguinis exposcit*, quorum præcipui sunt:

§. LXXXXIX.

I. *Plethora* tam universalis; quam topica, præsertim ea, quam sanguis hæmorrhoidalis ab ano ad alias partes organicas (v. g. vesicam, pulmones, caput, &c.) regurgitans ibidem producit, earumque functiones ob infarctum valorum lædit. Universalis
plethora

plethora hæmorrhoides & producere potest nunquam ante toleratas, & easdem, si jam adfuere, anomalas reddere valet, dum nempe fluxum earum vel nimium efficit, vel etiam supprimit, dum sanguine multo, mora viscidiori facto, vasa usque adeo dilatantur; ut eidem propellendo, & excernendo evadant imparia: hinc sanguinis missio in plethoricis, hæmorrhoidas nondum expertis, hasce prævertit; in iis vero, quibus rite, & cum euphoria diutius jam fluxere, cavet, ne fluxus vel supprimatur, vel nimius evadat. Sic „viri „meminimus, inquit G. E. STAHLIUS (a), „qui in 75 usque annum, & hæmorrhoidali „stato menstruo plus minus fluxu, & bis in „singulos annos (vere nempe, & autumnus) „admissis Væ Sbus ita sanus vixit, ut a 44 „circiter anno, quo hæmorrhoides procedere „cœperunt, usque ad hanc ætatem nullo „morbo laboraverit; nullo interim reliquo „robore corporis conspicuus; sed valde mediocris staturæ in omnem dimensionem, nec „etiam re ipsa ad paulo notabiliores diætæ „errores memorabili sensibilitate destitutus. „Cum autem dicto ætatis anno e sinistra Væ „Snis operatione periculosa brachii inflammatione contracta deterritus postea esset ab „usitata repetitione, cœpit tunc demum mani „festius

(a) Diss. de fenum affectibus (4to Halæ 1710.
Resp. I. C. MICHAELIS) §. 38. p. 28.

„festius incommode habere, & successive per
 „3 annos languescere: donec tandem sub finem
 „78 anni ætatis ceu marasmo quodam deces-
 „sit.“ Similem quoque casum suppeditat a
 BAIERO communicatum G. E. SCHMID (a):
 „Parochus septuagenario major, hæmorrhoi-
 „dum fluxu jam antea tentatus, eodem non
 „rite succedente dolorem coxæ vehementem,
 „ac diuturnum perpeffus, inde per sanguinis
 „missionem in pede lateris affecti, & medi-
 „camenta congrua liberatus, redeunte incer-
 „tis quidem intervallis profluvio isto se bene
 „habuit per aliquot annos, repetitis circa æ-
 „quinoctia phlebotomiis, & purgationibus.
 „Cum vero ante biennium in autumno san-
 „guinem mittere vano senectutis metu ne-
 „glexisset, circa brumam subito apoplexia,
 „& dextri lateris paralyfi correptus est. In
 „auxilium vocatus ego statim e brachio fini-
 „stro mittendum sanguinem institui; sed prop-
 „ter ipsius crassitudinem vix paucæ effuxe-
 „runt guttæ: manum igitur aquæ præcalidæ,
 „& quam æger, si sensum habuisset, difficul-
 „ter omnino tolerasset, imponendam curavi,
 „unde incisa vena salvatella sanguis quidem
 „liberaliter prodiit; sed adeo spissus, ut in-
 „ter effluendum in ipsa aqua tam calida, sta-
 „tim coagularetur spermatis ranarum instar,
 „& tenaciter concretus in altum attrahi po-
 „tuerit.

„tuerit. Servatus tamen, & superstes adhuc
 „est, nulloque resolutionis membrorum ve-
 „stigio relicto fungitur suo munere jam sex
 „supra 70 annos natus. Nuper autem in hæ-
 „morrhoidum vicem superveniente mictu cru-
 „ento laborare cœpit, quem applicatis ad
 „anum hirudinibus, et interna medicina suf-
 „flaminari, aut certe imminui posse non ina-
 „nis hætenus spes fuit.“

*a.) Sanguinis vacuationes solennes ne-
 glectæ, ut Væ Ses, scarificationes, &c., a
 queis hæmorrhoidales affectiones vel indu-
 cuntur, vel exasperantur (a): proinde mox,
 ut isthæc percipiuntur, illæ denuo sunt in-
 stituendæ. Perinde*

*β) Hæmorrhagiæ naturales (ut menses,
 lochia,) justo parciores, vel subsistentes cum
 manifestis plethoræ hæmorrhoidas molientis,
 vel exasperantis indicibus missionem sanguinis
 exposcunt; alioquin vero prudentia opus est
 in sanguine demendo: enimvero „in pletho-
 „ricis sanguineis, inquit LUDWIGIUS (b),
 „catamenia raro largiter fluunt, & tum nifus
 „hæmorrhoidales immiscentur. In his inter-
 „dum sanguinis missione tempestive admissa
 „cata-*

(a). Vide §. 29. a)

(b) Diff. cit. p. 417.

„catameniorum fluxus liberior redditur, &
 „molimina, quæ aderant, hæmorrhoidalia sup-
 „primuntur. Sed cum in feminis crebrior
 „plethora a debilitate solidorum oriunda;
 „quam vera sanguinea animadvertitur, judi-
 „cium medici difficile redditur. Phlogoses in
 „feminis crebrius excitatæ, & cephalalgia
 „cum his conjunctæ sæpe magis impedimenta
 „liberæ circulationis; quam copiam sangui-
 „nis produnt, & indignatio, vel ira transi-
 „toria, haustus vini, vel aliæ leviores causæ
 „vix nocerent; nisi humorum movendorum
 „inertia, ut causa prædisponens, habitualia
 „hæc incommoda redderet. Væ So prophyl-
 „actica speciosum auxilium affert; attamen
 „transitorium; cum enim subsidia cruoris recte
 „densandi, & ad elaborationes reliquorum
 „humorum adaptandi deficient, tenuitas san-
 „guinis oritur, quæ per Væ Ses crebriores
 „fovetur“: unde hæ interatæ plus obsunt;
 „potiusque tunc sedentaria vita in activam
 „mutanda indicatur. Dum vero per ætatem
 „cessantibus catameniis in sanis feminis (a)
 „plethoræ signa apparent, Væ So prophyl-
 „actica una, vel altera per annum, imo 3tia &
 „4ta ex symptomatibus abortis urgentur. Sed
 „in iis etiam feminis, quæ evidentia plethoræ
 „signa non monstrant, subita catameniorum
 „cessatio

(a) Ibidem p. 418. sq.

„cessatio postulat, ut si gravia contraindicantia non obveniant, Væ. So prophylactica instituat. Hoc eo magis necessarium est; quo evidentius molimina hæmorrhoidalia sentiuntur. Etsi enim hac in re medicus non ad plethoram solam; sed etiam ad humorum dyscrasiam hæmorrhoides efficientem respicere debet, quo eandem aptis remediis corrigat; nequaquam tamen noxium fuerit, convenientem sanguinis copiam subducere, quæ & dyscrasie corrigendæ favet, & irregulares sanguinis motus dirigit.“ Quod si vero a catameniis non tam per ætatem desinentibus; quam aliunde cohibitis hæmorrhoides oriantur, neque illorum fluxum revocare propter varia adjuncta (v. g. graviditatem præsentem) liceat, plethora Væ Se est minuenda, quoad edito partu catamenia fuerint reversa. „Si vero post puerperium demum, lochiis etiam recte fluentibus, molimina hæmorrhoidalia urgent, tunc quidem alia auxilia correctionis, & liberioris circuli humorum negligenda non sunt; quamquam Væ So ut præcipuum ex his quoque suadenda sit“ (a). Porro etiam sanguinis missionem indicant.

§. C.

(a) Ibidem p. 419. sq.

§. C.

2. *Molimina hæmorrhoidalia* graviora, quæ ut plurimum plethoræ vel universali, vel topicæ debentur; licet non semper causæ illius manifestæ præcesserint. Quantum in his missio sanguinis valeat, docet F. HOFFMANNI (a) vir 30 annis major, sanguineus, & spongiosi habitus, ante semestre incipientes hæmorrhoides nactus. Hic lautæ, vinosæque diætæ indulgens, incidit demum in diros lumborum, & abdominis dolores cum pressione ad præcordia, anorexia, cephalalgia, tremore manuum, extremorum frigore, & alvo adstricta, colorisque faciei rosei in flavum, ac lividum mutatione. Aliis calculum, cachexiam, & hepatis obstructionem; vel malum hypochondriacum aliis diu, & nec quicquam, excepto aliquo levamine, curantibus, dum morbus abhinc semper circa æquinoctia rediret atrocior, nec hæctenus vena ægro fuisset secta; prudentior tandem postremus medicus imperat usum carolinarum aquarum & quatuor quotannis in pede Væ Sectiones; unde æger diu a vehementia mali evasit immunis. „Ecquis est (subdit Auctor), qui re, bene „considerata addubitare velit, immanes hos, „qui

(a) Diff. de imprudenti medicatione multorum morborum, & mortis causa §. 6. opp. T. 6. p. 297.

„qui præcordialem, & abdominis regionem
 „fatigarunt, spasmosa plethora, & sanguine
 „in visceribus, & plexibus meseraicis stagnan-
 „te, qui per sedis venas moliebatur exitum,
 „subortos fuisse, quos utique & matura, &
 „crebrior Væ So potuisset avertere“. Plura
 huc facientia exempla passim (a) deinceps oc-
 current.

§. CI.

3. *Cæcæ hæmorrhoides* dolentes, & re-
 centes, quæ tempestiva sanguinis missione
 sæpe celerrime abiguntur. I. WEISZII (b)
 „mercator succulentus de vertigine, spinæ
 „dorsi, & lumborum dolore, ardore tubercu-
 „lorum hæmorrhoidalium lamentabatur; aver-
 „satur sanguisugas: alvus obstructa est, Væ
 „sectio, & manna cum pulpis in sero lactis
 „acido dissoluta cum nitro medelam attulere.“
 Quod si vero tubercula vetusta jam sint, nec
 nisi quandoque ex infarctu vasorum doleant;
 tunc topica sanguinis missione potius opus
 est vel per hirudines, vel per incisionem;
 qua de re suis inferius (c) locis dicetur.

§. CII.

(a) Vide §. 109. a) b) c). §. 115. Nro 1.

(b) Pyretol. pract. continuat. I. C. I. §. I. p. 20.

(c) Vide §. 113. 115. 117.

§. CII.

4. *Inflammati* earundem; hujus enim præcipuum est sanguinis missio præsidium. Hæc vero in exigua etiam ani parte inflammata negligenda non est; siquidem LUDVIGIO (a) monente, & facile augetur, & in abscessum abit.

§. CIII.

5. *Solventium usus*, præprimis aquarum Soteriarum, dum hæmorrhoidalis dispositio dissipari debet. Nam „cum non raro accidat, „inquit LUDWIG (b), ut sub hac ipsa medendi methodo hæmorrhoides fluentes appareant, rarissime tamen ea constantia, ex qua „verum commodum percipiat æger; id consultius semper habui, ut post resolventium „priorum usum cum fructu adhibitum sanguinis missio institueretur. Hanc sæpenumero „postulat plethora, quæ in hac medendi ratione pulsu pleniore cognoscitur; nam & per „Væ Snem sanguinis circulo liberiori reddito, ∇æ medicatæ reliqua impedimenta „ex lentore sanguinis nata dissipant“.

§. CIV.

(a) L. c. p. 423.

(b) Ibidem p. 398.

S. CIV.

6. *Suppressæ hæmorrhoides* cum functionum læsione, a sanguine hæmorrhoidali aliorum regurgitante, plethoramque cum universalem, tum topicam, & sanguinis lentorem causante. Sanguinis enim tunc missio hæmorrhoidum fluxum vel revocat, vel certe compensat. Interea ubi innocue fluxus hic conquievit, nihil omnino est moliendum; imo nec semper, ubi leviora incommoda fluxum suppressum excipiunt, sanguinis missione sunt oppugnanda; nam „si in homine, „inquit LUDWIG (a), cui hæmorrhoides antea, & satis regulariter fluebant, fluxus „substitit causa vel cognita, vel obscura; „medicus signa omnia cum cessante fluxu apparentia attente observet. Nam cum tensio „abdominis, alvus sicca, & sæpe tarda, ponderis sensus ad os sacrum, pruritus ad „anum, phlogoses, interdum etiam tensus, & micturitus adfunt, tunc motu corporis moderato, tenui victu, potu sufficiente magis aquoso; quam fermentato impetus nimii moderandi sunt, & alvi interea „libertas per mannata, salina, & alia leniora „purgantia medicamenta, clysmatibus interdum interpositis, servetur. Impeditur quidem interdum hac medendi ratione regressus „hæ-

(a) Ibidem p. 409.

„hæmorrhoidum, constante tamen sanitate.
 „Ubi autem affectus capitis, imprimis cepha-
 „lalgia, & vertigo symptomatibus nunc com-
 „memoratis se junxerunt; tunc sanguinis mis-
 „sio omnino instituenda est... Viro ex ebrie-
 „tate cum Summa iracundia hæmorrhoides
 „supprimebantur, qui inde adeo furibundus
 „factus est, ut fasciis ad lectulum adstringe-
 „retur. Non potuimus alio in loco; quam
 „in talo venam incidere, sanguinemque co-
 „piosum emittere: languidus tunc æger post
 „aliquot horas mentis iterum compos fiebat,
 „& cum hæmorrhoidalis fluxus denuo appa-
 „reret; post aliquot hebdomadas iterum sa-
 „nus factus est. Attamen & hic ex fluxu
 „hæmorrhoidali parum solatii accepit; nam
 „cum diætam nunquam servaret, 36. ætatis
 „anno cachecticus, & tabidus obiit.“ Effi-
 „cax perinde fuit Væ So in c. F. SCHWERTT-
 „NERI (a) patre 74 annum agente, eufarco,
 „sat vegeto, summe plethorico, & ab adole-
 „scentia annuæ Væ Sni assueto, atque per plu-
 „res annos hæmorrhoidum fluxum passio, quo
 „subsistente vires senis summopere prosterne-
 „bantur, musculis colli, ac cervicis usque
 „adeo flaccescentibus, ut totum caput antror-
 „sum nutaret, cervixque magnopere doleret.
 „Frustra variis topicis nervinis collo admotis,
 „hæmorrhagia narium, at parca, superveniens
 mitten-

(a) *Commerc. Nor.* T. 5, A. 1735. hebdom. 35.
 Nro. 2. p. 274.

mittendi sanguinis necessitatem ostendit. Secta itaque vena paucis post diebus hæmorrhoidum fluxus rediit, viresque sensim increvere, ac cervicis dolor desit, superstitæ tantum capitis antrorsum nutatione. Quin imò in læsis a suppresso hæmorrhoidum fluxu functionibus encephali quandoque non mediocris, & iteratis etiam vicibus copia sanguinis est demenda, cujus rei insignem casum S. A. TISSOTUS (a) memoriæ prodidit, nimirum: forti robustoque viro 53 annorum ad 30 usque annum insignes hæmorrhagias, & abhinc hæmorrhoidum fluxum passo, ex abusu demum spirituosorum cum fatigiis, vigiliis, ac triennii molestiis animi fluxus hæmorrhoidum prorsus substitit, quem anno post subita, vehemensque vertigo excepit. Væ sectio facta cum levamine; sed post trimestre gravior vertigo rediit cum difficili loquela, & insigni crurum imbecillitate. A sanguine tantum parce demto, exhibitoque emetico æger aliquot dies languebat cum dysorexia, magnaque siti: unde sola aqua alebat sese non sine levamine. Catharticum datum haud magno effectu. Convalescens demum æger uno, alterove dein mense mitius habuit; assidua nihilominus vexatus cephalalgia, parumque dormiens nulli negotio diu vacare potuit. Post 10 ab ultima

(a) Abhandl. von den Nerven u. ihren Krankh.
4. Band, p. m. 180, sqq.

tima invasione hebdomadas vertigo rediit
 multo vehementior comite lævi brachii para-
 lyfi. Larga Væ So malum utrumque sustu-
 lit, superflite cephalæa. Invalescente interea
 mœstitia æger liberalius vino indulfit; unde
 crescentibus cephalæa, & vigiliis vertigo fere
 assidua evasit. Adhibita salia volatilia, me-
 dicamenta spirituosâ, similesque fœtus capi-
 tis, ac dorsi, & vesicantia. Interea spatio
 6 hebdomadum quinquies insignes convulsio-
 nes in brachio est expertus, & post bihorii
 decubitus magna cum inquietudine toto cor-
 pore convellebatur, citra ensuum tamen ab-
 olitionem. Loquela 12 diēs mansit perquam
 impedita, mœstitiaque ad amentiam pene in-
 crevit, non sine memoriæ etiam labe, ut
 æger nil amplius tractare posset. Severa au-
 tem diætâ, & copiosâ catharses cephalæam
 mitigarunt, memoriâque repararunt. Sed
 ex multo TRæ succini usu denuo ter totius
 corporis convulsiones, & brachii lævi paraly-
 sis reverterunt, tristitia usque ad apathiam
 incrementum. Tum tandem rissorus consul-
 tus, imperato vegetabili victu cum aquæ po-
 tu præbuit omni mane feri lactis colati ̄xxx
 cum ⊖ Sedlicensis 3j. Væ Sum prima facta
 ad ̄x, altera post 8 dies ad ̄viij, & reli-
 quo trimestri 14. quoque die sanguinis ̄viij
 detractæ. Postridie cujusvis Væ Snis cathar-
 ticum datum. Omnia alia remedia interdicta,
 post 3 menses vertigo cum convulsionibus ex
 toto desit; cephalæa nec jam assidua, nec
 intolerabilis, somnus horarum aliquot, tri-
 stitia

stitia multo minor, memoria vigebat, viresque in dies succrescebant, excepto brachio paralytico, in quo robur lente renascebatur. Continuata diætā cum sero lactis, & iteratis 6. quaque hebdomade Væ Snc cum catharsi æger post 4 menses omnis morbi evasit expers, nisi quod cephalæa interdum recurrerit, & parum quid stuporis in brachio superfuerit. Pristinæ abhinc diætæ æger porro insistens recuperavit constantem sanitatem. Huic ergo cum singulares Væ Snes nil opis tulissent, sæpius certis ex intervallis iteratæ profuere.

§. CV.

7. *Hæmorrhagiæ*, hæmorrhoidum vicariæ, quas vel suppressæ hæmorrhoides, vel anomala earum molimina produciunt, ut: hæmoptoe, vomitus; mictusve cruentus &c. unica sæpe idoneo loco instituta missione sanguinis cohibentur, hæmorrhoidalisque insuper fluxus non raro revocatur. Unica sane Væ So in ZETTERMANNI (a) medico utrumque præstitit, I. STORCH (b) viri meminit, 40 annorum, sanguinei, & perquam plethorici, qui multas narium hæmorrhagias juvenis passus, postea durum abdominis tumorem

(ob

(a) Vide §. 108. b)

(b) Obs. Clinic. ann. 4. Feb. d. 4. §. 1. Nro. 12. p. 119.

(ob quem subinde multis hebdomadis domi se tenebat) nactus, exeunte anno 1725 in stymatosin incidit, sanguine puro sine urina ex pene profluente. Illa cohibita Februario A. 1726, coepit notabilem sanguinis copiam citra peculiarem dolorem exscreare. Cum autem simul interdum pruriret velut ex hæmorrhoidum nisu anus, auctor phlebotomiam in pede, tum catharticum, demum hirudines ad anum consuluit; sed sola Væ So pedis scretum sanguinis ita minuit, ut hirudinibus haud opus fuerit,

§. CVI.

8. *Fluxus immodicus hæmorrhoidum* utrum sanguinis missionem exposcat, haud perinde inter omnes Practicos convenit; sunt enim, qui illam scopo vel revellendi, vel plethoram minuendi (quamdiu vires, & alia indicia sinunt) necessariam esse velint; alii vero nihil utrique horum deferunt; alii denique media incedunt via. Non multum sane revulsoriæ, & derivatoriæ Væ Sni fidentum esse M. ALBERTI (a) monuit, quando „(inquiens) hæmorrhoides modo prodige „profusæ fuerunt, vires magis destruit, atque „enervat, & ita æquivoce subvenit, „dum artifex de indubia efficacia non satis „certus est; de eo vero majorem certitudinem „habet,

(a) L. c. §. 23. p. 209.

„habet, quod si post usum Væ Snis hæmo-
 „rrhoides non subsistunt, tunc ob maiorem
 „penuriam sanguinis periculosiores effectus
 „insequantur. Neque etiam maturius venam
 „secare convenit; quia artifex non certus est,
 „an hæmorrhoides in excessum delabantur,
 „& an non proficiat: quo interdum paulo
 „largius hæmorrhoides succedant. Quod si
 „itaque nulla necessitate urgente talis artifi-
 „cialis sanguinis subtractio instituatür eo qui-
 „dem tempore, quando hæmorrhoides fluunt,
 „tunc liberiori earundem successui non exigua
 „perturbatio inducitur . . . siquidem (a) fa-
 „cile contingit, ut post Væ Snis usum in
 „brachio, motus in superiores regiones re-
 „dundent, etsi hæmorrhoides subsistunt, vel
 „actualis vomitus cruentus, vel molimina eo
 „spectantia, aut motus hæmoptoici, vel pa-
 „thematæ cardialgica, asthmatica, hepatica,
 „splenetica, &c. insequantur.“ Nonnul-
 „lis isthæc exemplis alibi (b) dandis eva-
 „dent luculentiora. Quantum autem ad ple-
 „thoram: „in iis tantum, inquit LUDWIG (c),
 „sanguinis missiones fluxus hæmorrhoidales
 „immoderatos cohibent, in quibus magis ex
 „plethora sanguinea; quam ex dyscrasia san-
 „guinis

(a) Ibidem §. 25. p. 211. sq.

(b) Vide §. 54. Nro. 8. d).

(c) L. c. p. 413. sq.

„guinis oritur. Cum vero in hæmorrhoida-
 „riis magis ad dyscrasiam humorum; quam ad
 „abundantiam sanguinis respiciendum sit, fa-
 „cile patet, Væ Snem minus tutum in iis esse
 „auxilium.“ Nam si non tam e plethora; quam
 potius ex tenui, acrique sanguine immodicus
 accidat fluxus, Væ So etsi forte pro tempore
 illum cohibuerit (quod ipse etiam fluxus sibi
 relictus efficit, ut post determinatam sangui-
 nis copiam elapsam conquiescat), sanguinis
 tamen tenuitatem, & acrimoniam augendo
 etiam dispositionem ad fluxum immodicum
 augebit, sicque plus oberit; quam pro brevi
 tempore profuerat. Interea tamen haud tam
 rarus est ex plethora vera immodicus hæ-
 morrhoidum fluxus, ac quidem LUDWIG nobis
 persuadet; si quidem illam sæpenumero & ne-
 glectæ, solennes alias, sanguinis missiones,
 & catamenia, lochiave suppressa, & ipse quo-
 que interdum diutius resistans hæmorrhoida-
 lis fluxus habitualis, &c. progignant: hinc
 recte F. HOFFMANNUS (a) „non adeo info-
 „lens est (ait) ut in corpore plethorico, re-
 „stitante aliquamdiu sueto alias fluxu, a ve-
 „hementiori corporis, vel etiam animi com-
 „motione, a potu spirituosio liberalius assum-
 „to, balneo nimis calido, aut medicamento
 „intestinum sanguinis motum nimium inten-
 „dente

(a) Med. rat. Syst. T. 4. P. 2. S. 1. C. 4.
 curat. §. 1.

„dente non modo subito, & confertim fiat;
 „sed & solito diutius infistat sanguinis cum
 „pulsu magno, & vehementi per hæmorrhoi-
 „des profusio. Quod ubi accidit, primo
 „omnium divertendus, ac derivandus sangui-
 „nis impetus, eumque in finem sanguinis
 „missio in brachio, vel brachiorum in liquo-
 „rem aquoso-vinosum tepidum immissio ap-
 „prime ex usu est.“ &c. Pulchre his dictis
 congruit L. RIVERII (a) observatio de nimio
 hæmorrhoidum a deficientibus per aliquot
 jam annos catameniis fluxu identidem rever-
 tente, nullisque aliis præsiidiis; quam phle-
 botomia brachii avertendo. Nimirum Aprili
 Anni 1651 matrona 40 annorum deficienti-
 bus ab aliquot annis catameniis incidit in
 immodicas hæmorrhoides nullis remediis per
 8 menses cohibendas: unde cachexia hydro-
 pem minitans, summa debilitas & icterus
 enatus. Cum nulla jam ferret remedia, & ec-
 coprotica quoque fluxum proritarent, con-
 sultus demum Auctor potionem 4 continuis
 diebus usurpandam præscripsit.

R. Tamarindor. ʒβ.

Fol. plantag. M. j.

Myrobal. citr. ʒj. Coqv. ad ʒvj. In
 colatura infunde

Rhabarb. elect. ʒj.

Spicæ

(a) Obs. med. Cent. 4. Obs. 64.

Spicæ nardi ꝑ℞. Expressione facta dissolve

Syr. rosac. ℥j.

℥ rhei ꝑj. F. potio.

Cujus a prima dosi licet quinquies dejecerit; fluxus tamen sanguinis conquievit, & idem a reliquis evenit dosibus. Tum in 12 dies datus julepus e decocto rad. pentaph., & torment. fol. plantag., pimpin., & millefol. cum ꝑ℞ prunellæ, ac syrupo granator. paratus, interpositis 5. quoque die catharticiis. Toto hoc tempore hæmorrhoids non fluxit. Ne autem contumax fluxus diutinus, revertique solitus porro rediret, in multos abhinc dies datus ꝑ℞. a gr. vj. ad viij, & 5. quoque die potio dicta purgans. Per 5 septimanas ab horum usu fluxus non revertit; his autem lapsis denuo ægra sub quavis alvina dejectione purissimi sanguinis copiam egerebat. Postridie ergo denuo data potio purgans, a qua ter, vel quater dejecit sine ulla sanguinis egestionem. Altero a catharsi die imperatum balneum ex hordeo, plantag., polygono, summitat. rubi, & rosis rubris biduo usurpandum. Deinceps eadem remedia toto mense data. Vires ab his in dies crescere, vividus redibat faciei color, ac tandem pristina successit sanitas. Circa finem tamen ejusdem mensis calor in hypochondriis, & somni tempore inquietudines obortæ. Hæc a copia sanguinis renati & sursum regurgitantis (qui per anum prius, & multo ante

ante per uteri vasa effluere consuevit) enasci liquebat: instituta ergo phlebotomia brachii; quo facto dicta symptomata sublata sunt.

§. CVII.

B. *Selektus vasorum* in sanguinis missione, ubi indicatur, utiliter, ac citra noxam instituenda proximam sibi ab indicatione curam vindicat; quippe quo spreto haud raro in gravissimum discrimen, aut vitæ, aut sanitatis certe ægri conjiciantur. Ab experientia enim certum est, sanguinem ex hydrostatices legibus semper versus venæ vulnus (ubi minor est resistentia) concitatus ferri. Porro & illud experiundo didicimus, hæmorrhoidalem sanguinem, si per ani vasa erumpere nequeat, ab iis refluentem, vel ad vesicam urinariam, vel ad superiora viscera regurgitare non sine functionum hisce in partibus læsione. Eapropter hæmorrhoidalis sanguis eo promptius ad superiora verget; si brachii, vel alia ano altior fuerit pertusa; nisi forte vel nifus sanguinis hæmorrhoidalis deorsum major sit nifu versus venæ vulnus, vel idiosyncrasia corporis contrarium efficiat. In delectu ergo sanguinis mittendi quoad vasa generalis esto canon: *quoties hæmorrhoidales nifus vel abolendi sunt citra sanguinis ad superiora regurgitationem, vel ad fluxum* (quem forte vel nimia vasorum distentio, vel spasmi partium morantur) *perducendi, vel fluxus suppressus revocandus,*
missio

missio sanguinis ex ano, vel e vasis infra hunc sitis facienda est: contra ea, ubi præsens vel indubie instans hæmorrhoidum fluxus est cohibendus, sanguinem e vasis supra anum remotioribus demere oportet. Nonnullis tamen canon hic non tanti esse visus est, ut religiosam illius habendam esse censerent rationem, quos inter etiam LUDWIG (a) „mihi . . . rebus omnibus rite perpensis vi-
 „detur (ait) Væ So omnis depletoria, dum-
 „modo sufficientem sanguinis copiam subdu-
 „cat, optima esse; cum selectus venæ non
 „sine ratione suusus interdum in incidenda
 „vena fieri nequeat.“ Hac in sententia eo etiam confirmabatur magis, postquam Væ Snc
 „in hæmorrhoidibus non rite fluentibus quo-
 „cunque demum loco, vel qua copia illa in-
 „stituatur, fluxum brevi restitutum cognovit“
 (b). Sed pace cl. viri dicere licet, paucos admodum, & idiosyncrasie potius tribuendos esse id genus casus, quibus communis, & constans alioquin reclamationis experientia, quæ paulo ante datum canonem longe esse verissimum confirmat. Hinc

S. CVIII.

(a) L. c. p. 410.

(b) Ibidem p. 412.

§. CVIII.

1. *Brachii* e venis demendum sanguinem esse inprimis indicant sequentia:

a) *Fluxus nimius hæmorrhoidalis* a plethora totius vel partis obortus; hac enim ratione non modo sanguinis boni copia, seu plethora totius corporis minuitur; verum etiam nisus sanguinis in vasa ani (ut paulo ante vidimus) contrario-inducto motu regurgitatorio sursum infringitur, & eliditur, sicque topica intestini recti, vel & vesicæ urinariæ plethora imminuitur. Unde M. ALBERTI (a): „Væ
„So in brachio moribus hæmorrhoidalibus
„sublevandis, & ordinandis haud conducit:
„quare ad hæmorrhoides cœcas, & exceden-
„tes revellendas Væ Snem in brachio vulgo
„ordinant.“ Plura hanc in rem deinceps & testimonia, & exempla (b) occurrent. Cum autem, ut alibi (c) dictum fuit, haud semper-
tutum sit id genus in casibus nisum illum regurgitationis ad superiora simul, ac semel uno veluti momento inducere, cautela G. F. LAURENTII (d) hac in re data non videtur
asper-

(a) Diff. de hæmorrhoid. salubri, & insalubri promotione §. 9. p. 26.

(b) Vide seq. c) & confer. §. 54. N. 8. d).

(c) Vide §. 54. N. 8. d).

(d) In notis Hippocraticis, vet. semissor. 10.

aspernanda, ut videlicet phlebotomia id temporis non fiat magna in vena, amplo vulnere, & uberi copia, sed e vena exili, parcaque copia, & iteratis potius vicibus instituenda. Sic enim ille: „ad hæmorrhoidum „diuturnum, & nimium fluxum nihil tutius, „quam uti lenibus, temperatis evacuationibus, & revulsionibus moderatis; & iteratis „admodum iusto, & debito tempore per Væ „Sem institutis, non neglectis hepar alterantibus, & roborantibus: ut ego observavi „alia profuisse in me ipso, qui per 10 menses singulis diebus, & noctibus fui hæmorrhoidum nimio fluxu vexatus. Hæmorrhoides enim diuturnæ, & nimix Væ Snem per „revulsionem instituendam indicant, urgentque. Proinde aperienda vena 1.) minor, „quæ minore dispendio sanguinem spiritus, & vires exhaurit; 2.) remotior, ut in majore distantia revulsio fiat. Eligenda igitur „in manu dextra Salvatella, quæ urgente fluxu „reperenda, admoto digito per intervalla „sub fluore sanguinis. Lenes autem, & temperatæ evacuationes constabant ex syrupo de „rosis siccis ad ℥ij. pro dosi, sicut hepar con- „temperantia, & roborantia ex conserva radicum cichorii, speciebus diamargar. frig., „diatragac. frig., item diarrhodonis Abbatis „cum nitri ppt. modico, & aliis hæmorrhoidum fluxui dicatis, quorum usu... evasi.“

Interea, qui venarum delectui hic nihil tribuunt, possent non abs re in contrarium ad-

ferre I. C. GORTZII (a) observationem; ille enim „novit . . . Principem . . . qui . . . „hæmorrhoidibus stato tempore fluentibus cum „euphoria hætenus gaudet. Huic si in vere „(ut affuevit) brachii vena tundatur, mox post „Væ Snem hæmorrhoides erumpunt, & salutariter ad aliquot dies fluunt.“ Perinde etiam LUDWIG (b) „novit virum arthritide „affectum, qui affirmaret, se scarificatione „omni mense in novilunio instituta, & arthritidem arcere, & blandum semper hæmorrhoidum progressum sibi conciliare. Quamquam vero hanc ejus spem per aliquot annos „certo expletam cognovi; tamen paulo post „inordinatis insultibus arthriticis, & hæmorrhoidibus cum magno vitæ incommodo variantibus ita vexatus est, ut tandem ante „60 annum moreretur, quamvis summum se „nectutis fastigium ex hac re vellet attingere.“ Ex binis his casibus abunde liquere credi posset, nisi illum regurgitationis ad superiora per sanguinis missionem e vasis ano altioribus haudquaquam progigni; quandoquidem utroque hocce in casu hæmorrhoidum fluxus potius; quam regurgitatio acciderit, ac proinde in minuendo, cohibendove nimio hæmorrhoidum fluxu brachii Væ Sni præ quavis alia non plus esse deferendum; cum copiam tantum

(a) Aët. nat. cur. Vol. 2. Obs. 185.

(b) L. c. p. 411.

tum sanguinis minuat. Verum enim vero jam superius monui, paucos admodum esse hujusmodi casus, & indubie idiosyncrasie peculiari tribuendos; siquidem infinities plures sint, qui contrarium evincunt. Unus instar omnium esto, quem F. HOFFNANNUS (a) refert: vidua 49 annorum, sanguineo-cholerica, spongiosa, mobili animo, post sanissimum cœlibatum nupta, etiam quinquies mater, nullo gravi tentata morbo, ut & crebris curis, & mœrori obnoxia, 40 annos nata ex vehementi terrore subito menses amisit. Neglecta re horrenda cephalalgia, vertigo, & insultus apoplectici sunt oborti; sed ab larga vulneris in fronte supra lævam orbitam e gravi lapsu accepti, hæmorrhagia protinus omnia evanescere. Abhinc Væ Snæ fieri cœptæ, sed inordinatæ, & modo binæ uno anno, modo nulla per biennium. Lapso a mensium suppressione biennio hæmorrhœis fluere cœpit, idque plures in annos statis temporibus cum insigni levamine, donec ultima ætate ob neglectum sub fluxu regimen substitisset. Nati hinc spasmodici dorsi, & intestinorum dolores. Ab usu antispasmodicorum, nitroforum, præcipitantium, resolventium, pilular. balsam. HOFFM., ac STAHLII, & pediluviorum reddiit denuo hæmorrhoidalis fluxus, sat largus; sanguinis modo floridi; modo grumosi, modo
muco

(a) Consult. & resp. med. Cent. 2. Casu 24.

muco etiam albo, ac fetido remixti, sed ini ventris spasmi superstites, totumque sæpe latus lævum, & caput in consensum trahentes, apoplecticos interdum insultus simulabant. Accitus ergo in autumno alius medicus venam juxta pollicem manus tundi jubet. Quid fit? Malum in dies ingravescit, ægra fit clinica, sævissimi ingruunt ossis sacri dolores, alvus segnis, inquires, extremorum frigus, & intolerabilis ardor in ano. Priora ergo adhiberi cœpta remedia, & intumescentibus ab eorum usu hæmorrhoidibus cœcis admotæ, præmissis fotibus, hirudines multum sanguinis eduxere, at sine levamine; imo internæ hæmorrhoides ita simul intumescere, ut enemata alvum motura, spasmosve lenitura gravem causerint dolorem. Ob assiduos ergo intestinorum spasmos alvus non nisi data manna solvebatur. Externe insuper circa anum excrescentia dura, juglandem æquans enata est, cujus in apice sæpius albæ pustulæ abortæ sponte iterum abibant: tumor parte superiore mollior, fortius compressus, prodebat dolorificam duritiem. Cum discuti nec injectionibus, nec sacculis posset, emollientia duritie nihil imminuta dolores intulerunt atrociores. Porro quotidie a 5 vespertina ad mediam usque noctem febricula, horrorem æstu jam leniore; jam graviore excipiente, ægram invadebat cum pulsu celeri, duroque, lotio rubro, paucique sedimenti. Cetera sitis nulla, appetentia inconstans, somnus inordinatus; at sine sudoribus. Exitus morbi

morbi ignoratur. Potuit ergo phlebotomia venulæ exilis juxta pollicem manus revocatum hæmorrhoidum fluxum ocys cohibere, relictis tantum ad cæcas in posterum hæmorrhoides causandas nisibus, cur non nimium fluxum amplior brachii secta vena moderari possit, vel plane compescere? Copiam certe sanguinis phlebotomia non usque adeo videtur minuisse ob tantum vasorum hæmorrhoidalium tumorem consecutum; sed spasmodicos nisus aliquatenus ad superiora excitavit, licet eos, qui deorsum tendebant, non prorsus eliserit.

b) *Morbi capitis, & pectoris* ex aliquorum opinione phlebotomiam brachii poscunt, nempe ob celeriores vasorum infarctorum revulsionem, depletionemque. Verum ut id in capitis affectionibus hæmorrhoidalibus concedam; de iis tamen, quæ ad thoracem pertinent, haud perinde sentio. Nam licet utriusque loci hujus morbi debeantur hæmorrhoidali sanguini illuc regurgitanti, tamen in morbis capitis utpote brachio altius siti phlebotomia cubiti nisum illum regurgitandi sursum insigniter minuere, imo & elidere valebit, contrario ad venæ tusæ vulnus effecto nisu: quod in situ pectoris cum brachii situ collato haud obtinet. In utrisque quidem dictis morbis tutius semper e talo mittitur sanguis, ut in LUDWIGII (a) furioso vidimus,

(a) Vide §. 104.

dimus, & plura deinceps (a) afferemus; vehementer tamen affecto capite etiam cubiti phlebotomia non est inefficax, quod liquido colligere est ex observatione L. P. ZETTERMANNI (b): medicus 44 annorum, sanguineocholericus, cœlebs, paucis obnoxius morbis, nullisque hæmorrhagiis & capitis doloribus unquam vexatus, post scabiem in adolescentia litu artuum depulsam incidit in 3nam a paroxismo 7. sine ullis remediis; sed solo spontaneo sudore copioso judicatam. Juveniam, & medicinam ægris facienti ischias lateris dextri in suram usque excurrens accidit, quam unica Væ So in pede sustulit. Lapso hinc triennio post liberalius haustum toto anno vinum caterva malorum ingruit; primum enim circa regionem superiorem intestini recti sentire cœpit punctiones leviu- sculas, quas insequiebantur varia pathemata hypochondriaca, segnior alvus, hypochondria (lævum in primis) inflata, ac tensa, spasticæ ventris stricturæ, dyspnœa, imbecillitas insignis artuum, somnus profundior, & a prandio maxime molestans, atque per vices mentis alienatio: quam ob rem lectum petere est coactus. Medici anamneseos ignari mor-
bum

(a) Vide §. 110.

(b) Disp. sist. hæmorrhoides ex palato proflu-
entes 4to Erford. 1722. Præf. I. A.
FISCHER.

bum pro epidemico tunc grassante habentes
 cardiaca, & alexipharmaca dabant, frustra ea
 deprecante lucidis intervallis ægro, & Væ
 Snem deposcente. Post longam curationem
 convaluit; sed insequentibus annis verno præ-
 sertim tempore eadem recursabant sympto-
 mata cum fece alvina striis cruentis extrinse-
 cus notata; quæ tamen phlebotomia in pede,
 & mucus albus tragacanthum solutum refe-
 rens, ad aliquot cochlearia alvo egestus, de-
 nuo sustulit. Novissimo vere post brumam
 potissimum sedendo, multamque in noctem
 lucubrando exactam eadem rursus sympto-
 mata sunt oborta, dilataque Væ Sne mane
 quodam ægrum e lecto egressum vertigo (nun-
 quam hætenus tolerata)prehendit, cum ten-
 siva artuum, præsertim superiorum, gravitate,
 ac inter prandendum eodem die post obor-
 tum in palato acutum, scindentemque dolo-
 rem perceptum ocyus tumor subnigricans,
 transversum digitum ab uvula distans est ob-
 servatus. Vena erat atro sanguine distenta,
 inque momenta usque adeo accrescens, ut
 suffocationis metum injecerit; sed leni lin-
 guæ appensione rupta fluidi sanguinis ad duo
 cochlearia sensim eructavit, indeclinabili
 fluxum hunc excipiente somno. Phleboto-
 miam ergo hætenus dilatam non amplius tu-
 to differri ratus protinus a prandio pedilu-
 vium calidum adhibuit, summoque mane
 postridie e mediana lævi brachii demi san-
 guinem iussit; qui licet nil vitii præferret,
 bihorio tamen post Væ Snem æger in recto
 sensum

sensum relaxatarum stricurarum percipiens aliquoties mucum album instar gelatinæ aliquot cochlearium alvo excrevit, illico etiam cessantibus symptomatibus. Deinde per aliquot dies sequenti usus est ꝯe:

℞. Lap. 69. citrat.

Ⓢ succo ceras. tincti ꝯ ꝯß.

Cinnab. opt. ppt. gr. v. M. F. ꝯ.

Hunc dein variis mutavit modis, quandoque conchas ppt., vel ꝯ. diaph. substituendo, alias dosin mutando. Cumque a catharticiis abhorreret, enemata ex ∇ salia admisit, quorum a primo sexies, quater ab altero, & sic porro dejecerat, summa cum euphoria, cessantibusque mox hypochondriorum tensionibus. Ab his æger plane convaleuit. Perinde TISSOTI (a) æger a vertigine sua, & convulsionibus cum amnestia, solis in brachio (ut videtur) sæpius institutis phlebotomiis ex toto est liberatus.

c) *Abolitio morbi hæmorrhoidalis*, si iste nempe vel recens, vel periculosus admodum, vel sponte sua citra ulla mala cessans, neque ullatenus indicatus, &c. sit, ita ut ejus averruncatio proficua esse censeatur, factis prudenter circa solstitia, & æquinoctia, & quo-

(a) Vide §. 104.

quotiescunque insignes hæmorrhoidales nifus
 sese exterunt, phlebotomiis in cubito mor-
 bus hæmorrhoidalis pedetentim aboletur. Do-
 cuit id jam olim GALENUS (a) dicens: „fi
 „retentæ hæmorrhoides mittendi sanguinis
 „occasionem præstiterint, siquidem cohibere
 „eas voles, quæ in brachio sunt; sin provo-
 „care, quæ in cruribus consistunt, venas se-
 „care convenit.“ Perinde G. E. STAHLIUS (b)
 „si desuefacere (inquit) potius; quam juvare
 „hanc excretionem ex usu videatur, in parti-
 „bus superioribus Væ Sne, vel scarificatione
 „pro diversitate habitus, seu temperamenti“
 id fiat oportet. Atque huc reipsa est referen-
 dum, quod facere F. HOFFMANN. (c) in cœ-
 cis hæmorrhoidibus cum colica consueverat,
 nempe tam ad sævam illam colicam abolen-
 dam; quam ipsas etiam varices dissipandas
 „venam tunc ego (inquit) non in pede; sed
 „in brachio secari præcipio, ad meliorem
 „sanguinis a partibus inferioribus ad superi-
 „ores derivationem; exterius vero duo re-
 „media expertissimæ virtutis deprehendi,
 „quorum alterum est linimentum . . . alterum
 est

(a) De cur. rat. per sangu. miss. Cap. 6.

(b) Diss. de motu sang. hæmorrhoidali, &c.
 Cap. 10. p. 29.

(c) Med. rat. Syst. T. 4. P. 2. S. 2. C. 5. curat.
 §. 9. Opp. T. 2. p. 289.

est epithema^(a) &c. Quam parum autem aliis id genus in casibus ad colicas, & cardialgias hæmorrhoidales mitigandas cubiti phlebotomia profit; imo quam sæpe lædat potius, documento est 1. STORCHII (b) femina 30 annis major, phlegmatico-sanguinea. Hæc ex lauta diæta, & otio a 2, vel 3 annis admodum corpulenta incidit in plurium hebdomadam cardialgiam hæmorrhoidalem cum anxietate, quæ ubi 3 hebdomades jam vexasset; facta phlebotomia in cubito sævior evasit (nedum mitior), simulque ocysus ante terminum fluxus catameniorum ingruit cum dolorifica micturitione. Datæ ergo 2. Martii tres MRæ rhab. doses, & ℥ \ominus amari ʒij , antisph. ʒj . M. pro 6 dosibus, cardialgiam sustulere, superstite ad 8am usque micturitione: quo circa ℥ prior datus, imperatusque litus ex oleis scorp., & petr. Die 14. rediit colica cardialgica cum tenesmo: hinc præter MRam rhab. datæ pil. BECHER., & purg. aa ʒj ; sed cum ab altera MRæ dosi menses fluere cum levamine, iussa est nonnisi his finitis uti pilulis. Harum dosin 18va sumsit: postridie levamen attulere; sed post iram vespere ejusdem diei vehemens cardialgia revertit cum frigore crurum; sed a MRa rhab.,
&

(a) Vide §. 131. Nro 8.

(b) Quinque partit. præst. A. 1731. d. 4. p. 194. 1q.

& ꝑ antispasm. cum magn. alb. die 20. melius habuit, & relicta simul cerevisia biduo adhuc recte valebat. Cumque 23. novus rediret; levior tamen, insultus, hunc aliquot MRæ rhab. doses, & una pilularum denuo profligarunt, superstite tantum postridie aliqua adhuc œsophagi constrictione. Nocte diei 25. æstus cum siti adfuit: idcirco præscriptum

℞. ℞. ①. dulc. ʒiij.

Syr. fl. pap. rh. ʒβ. M.

S. ter de die gtt. 30, simulque interdum dosis ꝑ. antisp. cum magn. alb. capiatur. Unde altero die levamen. A meridie diei 27. denuo horror, & æstus, & vesperi fluxus hæmorrhoidalis sanguinis ad cochl. ij. successit, continuavitque etiam postridie, utut cum tenesmo, & tuberculis ani. Datus interne ꝑ antispasm., magn. alb., & arcan. dupl. Externe anus illitus ungu. camph. alb., & sacculi e flor. chamom. in lacte maceratis admoti. Die 29. sanguis puri mistus lubricæ consistentiæ prodibat; unde zema tantum levata est, ut lectum defereret, sed lenes adhuc dolores coxæ aderant: hinc insistebat usui MRæ ex liqu. anod. min. cum. syr. fl. pap. rh. Aprilis prima cum bene adhuc valeret, 6ta e pede sanguis bonæ notæ eductus, & dein data dosis pilular. ante dictarum, atque abhinc ad 4am Maji usque sana mansit; quo tempore cum post insuerum motum de-

nuo

quo fieret anxia, ab una pilularum dosi rursus levata est, & ex usu jusculi cum herbis nasturtii aquatici, beccabungæ, chelidon. min. recte valebat. Die 30. catameniorum tempore oborta tormina ad aliquot MRæ rhab. doles desiere.

§. CIX.

2. *Pedis* autem phlebotomiam, si nimium hæmorrhoidum fluxum excipias, omnis alia hæmorrhoidalis affectio melius fert, quam quæ in brachio instituitur. Præprimis vero illam exposcunt.

a) *Molimina* graviora hæmorrhoidalia, ut sunt: dolores capitis, dorsi, stomachi, intestinorum, artuum, præsertim coxæ, &c. Cum enim hæc ab infarctu vasorum dictis in partibus non sine spasmodis concurrentibus oriuntur, quæ hæmorrhoidalis sanguis erronee ibidem subsistens, vel etiam illuc regurgitans occasionem præbet, facile patet, infarctæ vasa sanguinis missione, quæ sæpe simul etiam spasmum ab infarctis vasis ortum solvere solet, esse deplenda. Cum vero plurimum inter sit, ne depletio hæc nîsum simul sanguini, vasisque inducat sursum regurgitandi, unde gravissimæ affectiones oriri solent, nîsusque hic a sanguine superioribus e venis apertis excitetur, non item a phlebotomia partium infra anum sitarum: satis intelligitur, phlebotomiæ hic non brachii; sed pedis locum esse.

esse, id quod & paulo ante allatus STORCHII (a) casus edocet, & plures etiam alii constantur.

b) *Cæcæ hæmorrhoides* indolentes, dolentes, inflammatae; in his enim phlebotomia pedis vasa infarcta deplendo citra regurgitationem celerrimam fert opem. Sic apud M. ALBERTI (b) „matrona annorum 35, 7 liberorum mater, admodum tenera: dum uterum fect, ordinarie bis Væ Snem in pede sibi institui ipsa postulat, quamprimum nempe dolores abdominis spastici, & hæmorrhoides cæcæ repullulant, jam satis experta; nullo alio subsidio tam præsentaneum sibi levamen obtingere. Factum est aliquando, ut cum vena minus late incideretur, ac nihil fere sanguinis stillaret; illa præ metu aliam sibi venam aperiri recusante, nihil quoque solatii, sed potius dolorum exasperatio sequeretur.“ Perinde I. STORCHII (c) auriga multis ab annis rheuma, subinde humescens, & aliquoties erysipelas, ac retrocessione morbos periculosos creans passus, incidit in vehementes intestini recti dolores,

&

(a) Vide §. præced. c)

(b) Diff. de Væ. Snis. in pede gravidar. usututo, & salubri (4to Hæla A. 1724. Resp. A. HOIELSING) Cap. 3. p. 30.

(c) Obs. clin. ann, 1. Jul. d. 4. Nro 1. p. 170.

& inflammationem cum multis hæmorrhoidum varicibus, colore striatum leporis tergum, ac humectatum æmulantibus. Imperata, quam neglexit, pedis phlebotomia, lituumque in locum admoto podici vino calido, ac datis MRæ ex TRa rhei ʒiij, TRæ ʒri ʒj, 4ta quaque hora gtt. 30. æger intra paucas horas levatus 3tio die domo egressus est. Huc etiam I. A. RAIMANNI apud A. E. BÜCHNERUM (a) observatio pertinet: vir 48 annorum, ex abusu vini gutta rosacea fœdus, & aliquoties hæmorrhoidum fluxum passus, incidit post prævios dorsi, lumborumque dolores, cum alvo tenesmode in laniantes utriusque pedis dolores, quos post varios fœtus octiduo admotos sic satis abegit; sed non multo post intumescentiam hæmorrhoidum in ano sensit, & quandoque etiam sub sicciori alvi egestionem aliquot sanguinis guttas excerni animadvertit. Fluxum hæmorrhoidum, sibi alias salubrem promovere cupiens, nescio, cujus medici suasu, dum sæpius vi editis alvinis nixibus id perficere satagit, loco fluxus nactus est hæmorrhoides cœcas tumentes, perquam dolorificas cum gravi pectoris opple-tione, noctu præsertim spiritum intercludente, siccaque tussi. Accitus demum Auctor invenit in lævo recti limbo tumorem iuglandi nuci æqua-

(a) Misc. phys. med. A. 1728. Octobr. d. 4^o
art. 6. p. 1398. sqq.

æqualem, e nigro fuscum, durum, & attractum nullatenus ob dolores ferentem, quapropter æger nec jacere, nec sedere valebat, inprimis vero ad tussim dolor sæviebat. Ocyus ergo larga in pede phlebotomia facta, fots e fl. samb., verbasci, herb. linar. &c. in lacte coctis ano admoti; interne vero ob alvum nycthemero non egestam datus haustus, olei amygd. dulc., cum pauxillo \S ii dulcis, cum enema vix applicari potuisset. Sub noctem \S is nitroso-cinnabarinus exhibitus. Continuantibus autem nihilo secius doloribus postridie datum infusum millefolii calide sæpius hauriendum, tumorigue præter priorem fotum etiam linimentum ex albo græco cum oleo verbasci, & fl. calendulæ, ac pauxillo camphoræ applicitum. Emollito post 3 dies. aliquatenus tumore, & sub egestionem alvi sanguinis aliquid præbente, ad promovendam ejus resolutionem idonei fots in vino cocti applicabantur, eo cum successu, ut intra paucos dies curatio fuerit absoluta. Pectoris symptomata mox a Væ Se evanuerunt quidem, sed expectoratio aliquamdiu adhuc pergebat: donec & hac sub usu resolventium prorsus cessante pristina demum rediisset sanitas. En Væ Sem in pede ad hæmorrhoidales pectoris morbos abolendos perquam proficuum! Quæ etsi ani inflammata tubercula non perinde leviora reddidit, saltem etiam non auxit; id quod tamen fieri oportere nonnulli perperam contendunt. Sane de utilitate phlebotomiæ digiti minimi pedis agens

M. A. SEVERINUS (a) „nós (inquit) sectæ
 „ejusdem venæ beneficium experti sumus in
 „doloribus hæmorrhoidum sopiendis, quibus
 „& implacidos dies, ac insomnes noctes
 „per multas duxerat legum doctor: . . .
 „ISALONUS. Surculum interioris saphenæ, qui
 „inter pollicem, proximumque digitum pedis
 „excurrit, aperiri feliciter in hisce malis te-
 status etiam ab experto est ARN. VILLA-
 „NOVA“ (b). Haud itaque video, cur F.
 HOFFMANNUS (c) in dolore intestini recti ex
 hæmorrhoidibus maluerit venam in brachio
 referari; siquidem in pede secta perinde juvet;
 ac sine regurgitationis insuper metu.

S. CX.

c) *Morbi a suppressis, anomalisve hæ-
 morrhoidibus nati, ac vel maxime superiorum
 partium. Cum enim hi a regurgitante alior-
 sum, vel descendere versus anum non valentē
 sanguine oriantur; nisus ille sanguinis ab
 his partibus ad venæ in pede vulnus est aver-
 tendus. Profuit omnino hæc phlebotomiā*

LUD-

(a) De efficaci medicina L. 1. P. 2. de phle-
 bot. C. 33. p. 60.

(b) Libr. de confid. oper. medic. Dist. 2. P. 1.
 C. 2.

(c) Vide §. præced. c).

LUDVIGII (a) viro ex suppressis hæmorrhoidibus furioso. Et „novimus, inquit F. HOFFMANNUS (b), ischiadicum dolorem ex hæmorrhoidibus suppressis aperta in pede vena protinus ex toto sublatum fuisse, neque minus recordamur in atrocibus totum abdomen, & male fluentes hæmorrhoides affligentibus doloribus Væ Snem in pede institutam, pariter & nitrosa, atque emollientes clysteres, omne curationis punctum tulisse.“ Cur igitur alias (c) in cubito venam secandam suasit?

§. CXI.

d) *Fluxus hæmorrhoidum;*

a) *Instans*, si indicatio sit eum promovendi; plerique enim illum phlebotomia pedis facilitari, accelerarique asserunt, solo id F. PLATÆRO (d) negante. Non ita sane crebro saltem id evenire vel solæ hæctenus allatæ variorum observationes evincunt; neque enim idem hic; quod in catameniis obtinere videtur. Eatenus tamen Væ So. in pede instantem

(a) Vide §. 104.

(b) L. c. T. 3. S. 1. C. 9. §. 19. Opp. T. 1. P. 344.

(c) Vide §. 103. c).

(d) Prax. med. T. 2. p. m. 570.

tem fluxum promovere est censenda, quod sanguinis ad anum nifum contrario nullo nifu inturbetur, &, si forte præ nimia vasorum sedalium turgescencia fluxus nequeat succedere, blanda illorum depletione facta, obstaculoque ita sublato, sanguini viam ad erumpendum quasi sternat. Exemplum hujusmodi suppeditat I. STORCHII (a) vir prope 60 annorum, melancholico-cholericus, pene per 20 jam annos molimina hæmorrhoidum expertus, sed quæ vice quadam contraria Væ. Se. inturbata ita evaserant anomala, ut nunquam hæctenus hæmorrhoides prodierint. Hic Martii 2., instante Væ sectionis vernalis tempore, cum coryza, tussisque molesta, eam non admitterent, medicina catarrho primum facta, atque in hujus declinatione, demum ipso in æquinoctio phlebotomia pedis instituta id est consecutus, ut mane diei 24 Martii non exiguus hæmorrhoidalis sanguis eruperit, qui ægrum reddidit alacriorem. Auctor ad fluxum aliquatenus adhuc promovendum, vel mucum saltem evehendum præscripsit:

R. M. P. BECHER ʒij.
— purg. ʒj. M.

S. bis per hebdomadem vesperi pilulas 10.
Effectus erat laudabilis.

(β)

(a) Obs. clin. ann. 6. Martii. d. 4. p. 500.

β) *Suppressus*, qui pedis phlebotomia vel revocatur, vel certe compensatur. Ad revocandum fluxum cohibitum hanc phlebotomiam commendatam fuisse a GALENO, aliisque jam ante (a) vidimus, & LUDWIGII (b) furioso suppressum hunc fluxum secta in talo vena denuo revocavit, furoremque auspicato sustulit.

§. CXII.

3. *Ani* denique ex vasis hæmorrhoidalibus ipsis non raro sanguinem educere oportet, idque duplici scopo; videlicet, vel ad fluxum hæmorrhoidum arte producendum, vel tantummodo ad infarctum sedalium vasorum, indeque orta symptomata tollenda. Fluxus porro arte excitati finis rursus duplex est; nimirum: ut nifus sanguinis hæmorrhoidalis: vel ad sedis vasa, at imperfecte, & cum functionum læsione tendentis promoveatur, cum symptomatum mitigatione; vel alias ad partes anomalo motu regurgitantis elidatur, aut etiam in nifum versus anum convertatur, & ita symptomata ex hac quoque anomalia orta profligentur. Binis vero modis ani vasa aperiri solent; nempe vel cultri acie; vel

(a) Vide §. 108. c) §. 110.

(b) Vide §. 104.

vel hirudinibus admotis : verum cum non eadem semper sit utriusque hujus methodi utilitas, ita ut alias hirudines incassum; alias culter periculose applicetur; liquet operæ esse pretium, ut utriusque hujusce præsidii legitimus, opportunusque usus tironibus ex affe explanetur.

§. CXIII.

a) *Hirudines* veteribus hosce in fines ignotæ, nostrorum temporum industria detectæ, tantæ sunt seu in fluxu hæmorrhoidum arte excitando, seu in malis illarum mitigandis utilitatis, ut specifici nomine haud indignas G. E. STAHLIUS (a) censuerit. Odione hujus, an prolixioris experientiæ defectu F. HOFFMANNUS (b) hirudines sibi habuit suspectas, & ambiguæ utilitatis? serius tamen errorem suum dedoctus maxime proficuas sæpe esse confessus est (c). Pene autem desipit I. D. SANTORINUS (d) scribens: „hinc constare puto ampullosum hoc esse remedii genus, ceteris ni deterius, non equidem majus;

(a) Diff. de sangnifugar. utilitate (4to Halæ 1699. Resp. 1. I. COLERO) Cap. 4. p. 15.

(b) L. c. S. 2. C. 9, Theor. 21. schol. opp. T. I. p. 462.

(c) Vide §. 115. Nro. 1.

(d) Opusc. med. §. 49. p. m. 188.

„ius; sed aut enormis præjudicii signum, sive
 „(ut diximus) desperatæ salutis, aut exhau-
 „stæ medicinæ prodromon. Nec mihi expe-
 „rimentorum myriades pro hujus saluberrimo
 „usu reponant; sit experimentis fides, at sit
 „cautum alioquin difficillimum experimentorum
 „judicium.“ Quid jam hoc homine facias,
 cui myriades observationum de utilitate hi-
 rudinum, ut eas admittat, non sufficiunt?
 haud utique sine ullo discrimine ubique sunt
 applicandæ; quandoquidem alias inutiles sint,
 alias etiam noxiæ. Proinde

§. CXIV.

a. *Contraindicant earum applicationem.*

1) *Inflammatio* varicum hæmorrhoida-
 lium præsens, vel jam facta suppûratio, recte
 notante id C. F. SCHULZIO (a), ista enim
 nondum præsens ab inflammatae partis vulnere
 facile consequitur.

2) *Varices grandes, vetustæ*; quia ple-
 rumque & illarum tunicæ crassiores sunt, quam
 ut ab hirudine ad cavum usque penetrari pos-
 sint, & sanguis diutius ibidem stagnans in
 grumosum abit crassamentum, ab hirudine non
 amplius evacuandus. Monet id ipsum M.

AL-

(a) L. c. p. 26.

ALBESTI (a) „præctici solertiores (inquiens)
 „ad hirudinum usus in hisce cœcis hæmorrhoi-
 „dibus confugiunt, neque quidem male, sed
 „cum hac discretione, quo mox in primis
 „initiis applicentur; alias si tumentes hæmo-
 „rrhoides cum inflammatorio motu stipatæ
 „sunt, & turgentes aliquamdiu substiterunt,
 „ut in cutanea vesiculari illa protuberantia
 „sanguis jam in coagulum prolapsus sit; tunc
 „hirudines partem non apprehendunt.“ Dis-
 „sertius etiam I. L. SCHMUKERUS (b) hiru-
 „dines tali in casu & inutiles, & interdum etiam
 „noxias esse ostendit: „ubi tubera hæmorrhoi-
 „dalia (ait ille) sunt grandiora; vesanum est
 „hirudines admoveere; quamvis viderim eas
 „imperari in varicibus pomum magnis. Chi-
 „rurgus illas in id genus adjunctis suadens
 „non videtur unquam apertam vidisse hujus-
 „modi varicem, nec ullam tenere ideam stru-
 „cturæ, indolisque illius; nam quo amplius
 „grandescit varix, tanto etiam tunicarum ip-
 „sius increfcit crassities, quam sæpe annulari
 „digito æqualem reperi, ut proinde tunc hi-
 „rudines tam crassas tunicas morfu penetrare,
 „coagulumque sanguinis educere nullatenus
 „valeant. Idcirco non inutiles modo sunt,
 „sed vidi etiam ejusmodi varices ab admotis
 hiru-

(a) Diss. de hæmorrhoidib. cœcis §. 24.

(b) Vermischte chirurg. Schriften I. Band. 2.
 Abschn. p. 108.

„hirudinibus, aliaque inepta medela cancro-
 „sas evasisse.“ Hinc tali in casu exitus co-
 „acto sanguini melius ferro paratur, ut paulo
 post (a) dicetur; quidquid contra sentiat c.
 F. SCHULZIUS (b).

3) *Internæ hæmorrhoides* perinde hiru-
 dinum usum vetare censentur. Cum enim hi-
 rudo externo tantum ani limbo admota non-
 nisi vasa externa hæmorrhoidalia apprehendat,
 si morbus ab sanguine internarum hæmorrhoi-
 dum oritur, creditur tunc hirudo non inuti-
 lis modo; sed etiam noxia esse posse, ob san-
 guinem non peccantem eductum. Ingens ra-
 tio dubitandi, quod ex parte affecta sangui-
 nem hauriant hirudines, hæc est inquit F.
 HOFFMANN (β): „quod ipsæ ex hæmorrhoi-
 „dibus externis, cum internæ lateant, su-
 „gant, quæ exiguum vel plane nullum com-
 „mercium cum vasis intestinalibus meseraicis,
 „& portæ ramis, in quibus tamen sedes pa-
 „thematicum spasmodicorum & hypochondria-
 „corum, habent; in fluxu vero hæmorrhoi-
 „dali hæmorrhoides internæ sanguinem stil-
 „lant, & ob id si convenienti modo, & tem-
 „pore fluunt, vitiis ex stagnatione in ramis
 venæ

(a) Vide §. 117. (β) L. c,

(b) L. c. §. 25.

„venæ portæ oriundis apprime opitulantur.“
 V. TRINCAVELLA (a) id ipsum videtur voluisse, dum monet, non esse admovendas ano hirudines, si hæmorrhoides non tumuerint, i. e. si nullæ adsint varices externæ, videturque id confirmare M. ALBERTI (b) observatio: „contigit mihi (narrat ille) habere „virum per longum tempus moliminibus hæ- „morrhoidalibus externis, spasmodicis, ar- „thriticis, ad pedes usque evagantibus, & „hos podagricis doloribus excruciantibus vexatum, in quo non obstante larga evacuatione per hirudines, & debito medicaminum „usu nullus constans sequebatur effectus, sed „motus spastici vix per 3, 4ve dies emanfere, „ex consuetudine iterum redeuntes.“ Ad externas quidem hæmorrhoides casum Auctor refert; sed quam parum id sæpe numero asserere liceat, nemo qui vasorum hæmorrhoidalium externorum cum internis nexum, variumque amborum decursum apprime novit, ignorat. Unde etiam consequitur, hirudines ad mala ab internis quoque hæmorrhoidibus profecta debellanda, vel certe mitiganda non raro prorsus utiles esse; id quod variis deinceps exemplis in medium datis patebit liquidius

(a) De rat. cur. partiç. H. C. affect. L. 9. C. 14.

(b) Diss. de flux. hæmorrhoid. provocat. (4to Halæ 1719. Resp. A. HERRMANN) thes. 21. p. 13.

dus. Certe S. BIANCARDI (a) Juvenis 25 annorum ab internis hæmorrhoidibus miserrimos dolores passus, admotis hirudinibus eos depulit, ita ut nunquam amplius redierint,

§. CXV.

β. *Indicant* vero illarum admotionem

1. *Molimina* hæmorrhoidum cum nisu sanguinis vel ordinato versus anum; at insufficienti ad fluxum producendum; vel anomalo in alias partes seu vicinas, seu remotiores, quacunque alia tentata medendi methodo non sopienda. Ordiamur moliminum horum exempla a capite, digressuri ab iis in alias partes. F. HOFFMANNUS (b), ubi in apoplexia sanguinea utilem esse supervenientem hæmorrhoidum fluxum cum COO, agnovisset, „maxime iis, qui eundem antea jam experti“ subdit: „nos ad obtinendum hoc præter frictiones in ano, & admissos foris maxime „proficuum censemus hirudinum applicationem.“ Et „Nobilem Patavinum ætatis „mediæ, melancholicum ab epilepsia liberavit

(a) Instit. chirurg. P. 3. C. 20. Opp. T. 2. p. 462.

(b) L. cit. T. 4. P. 2. S. 1. C. 7. curat. §. 8. Opp. T. 2, p. 244.

„vit B. SILVATICUS apertis quovis mense venis hæmorrhoidalibus“ teste I. RHODIO (a). Videtur sane in melancholico corpore simul alia medicus hic observasse phænomena, quæ arguerent, epilepsiam ab anomalis hæmorrhoidum moliminibus fuisse productam: qualis & ille fuerit, cujus M. ALBERTI (b) casum refert, qui „prægressis in juventute largis narium hæmorrhagiis, in provectiore ætate vero gravissimis hemicranicis doloribus initium sensit cataractæ, quæ nil obstante Væ Se in pede; externis discutientibus, internis & libus laxantibus, in dies majus sumebat incrementum; adhibito vero, & continuato hirudinum usu cum topicis discutientibus evanuit.“ Huc item pertinet, cujus meminit E. D. SALOMON (c), juvenis ad 17 annos natus, in apyretam, & continentem capitis inbecillitatem lapsus, ut sine duce incedere nequiret. Nullis licet præsentibus hæmorrhoidum cœcarum indiciis BERGIUS suavit hirudines ano admovendas; quod hujus adolescentis pater in juventute ab simili capitis inbecillitate hæmorrhoidum fluxu sit liberatus; applicatis ergo illis æger post-
ridie

(a) Obs. med. Cent. 1. Obs. 65.

(b) Diss. cit. thes. 17.

(c) Act. Suec. Vol. 22. Trimestr. 2. Nro. 5.
P. 127.

ridie prorsus sanus fuit. Porro (a) mulier 40 annorum nacta est vehementem læva in lumbari regione, ac spina dorsi dolorem, quem secutæ graves abdominis tensiones, & vix 4. diebus lapsis, dolor lævum etiam femur, genuque invadens sese per crus ad pollicem usque extendit, lacerans ac lancingans, præsertim ubi ægra assurgeret, at sine tumore. Nec erysipelas, nec podagra, nec hæmorrhoides cœcæ præcessere, sed mox a 2do puerperio insolita in intestino recto sensatio sine ullo tamen tumore, oborta est. Cetera mulier sæpe alvina laborabat obstructione. Cum inspectus anus ruborem circa sphincterem ostenderet, ocyus admota hirudo. Eductis sanguinis 3v. ægra noctu placide dormiit, ac postridie ab omnibus symptomatibus immunis est inventa, levi tantummodo superstite in pede, ac femore sensatione, quæ postea perinde evanuit. Plura similia etiam G. E. STAHLIUS (b) commemorat. Vir erat 40 annis major, melancholico - sanguineus, a 5 vel 6 annis cerevisiam vino sufficere coactus; curisque, & iræ sæpius obortæ deditus, atque inde ad anxiam melancholico-hypochondriaca pathemata pronus, demum & præludia ischiatico-nephritici mali nactus, cum a STAHLIO molimina esse hæmorrhoidum, utilesque ad illa hirudines audisset, reposuit, se autē 8, vel
am.

(a) Ibidem p. 138.

(b) Diss. cit. p. 16.

„Simplius annos semel, vel bis illis e medici
 consilio eo cum successu fuisse usum, ut inde
 sibi veluti renatus videretur. Perinde (a)
 „vir habitus sanguinei quinquagenarius a plu-
 „sculis annis circa orificium ani pruriginoso,
 „& quasi leviter serpiginoso malo (quod fe-
 „re Galli les hæmorrhoides blanches vulgo
 „vocare solent) vexatus, tandem oleo com-
 „posito hyperici, lilior. albor., & similibus
 „ab hac quidem molestia liberatus fuit; sed
 „incidit non ita multo post in febrem inter-
 „mittentem, a qua (ut est suspicio) per chi-
 „nam chinæ liberatus cum paulo post iter su-
 „scepisset . . . pluvia, & frigida tempestate,
 „in febrem cum paroxismo vehementissimo,
 „& paralytode relapsus, mox inde rheumati-
 „cas passiones in artubus persensit, quæ mox
 „magis, magisque in ischiadicas, & arthriti-
 „cas conversæ jam in 3um annum patientem
 „exagitant, repetitis nempe variis insultibus,
 „Apud hunc patientem cum etiam denique
 „hirudinum mentio fieret, ipse similiter recor-
 „datus est, quod præsidio hoc ante 18. cir-
 „citer annos similiter aliquot jam vicibus
 „usus fuerit, eoque ipso tum temporis non
 „exiguum levamen, & alacritatem corporis,
 „animique inde persenserit.“ Haud secius
 (b) vir alius 40 annis major, melancholico-
 cho-

(a) Ibidem.

(b) Ibidem p. 17.

cholericus, in juventute vinis Gallicis, Italicis, Austriacis, & Hungaricis usus, in tantam incidit ischiadem, ut stanti spina dorsi obrigesceret, quam ad confidendum cito flectere nequiens nec promte assurgere sine sævissimo dolore poterat: a quo demum crebriori malo Viennæ admotis hirudinibus cito, constanterque sanatus est. Id dum religioso cuidam narraret, reposuit iste, in toto suo Ordine commune, arcanumque esse hoc remedium, a quo monachi pancratice valerent. Denique (a) & viri 43. annorum meminit, arthriticos totius spinæ dorsi dolores, & asthmaticam circa scapulas pressionem, ac nonnunquam (a vehementi præsertim ira) anxietates præcordiorum, & pectoris cum sicca tussi patientis, qui propterea phthiseos initia esse ratus una, alterave vice Væ Snem, at inordinate, instituit, deincepsque iterum intermisit: donec Auctoris consilio hirudines admoræ insignem sanguinis copiam eduxere, & hæmorrhoides post aliquot inde hebdomades elicuere. Unde habitum resumit, & ab omnibus symptomatibus est liberatus, superstitibus tantum interdum in externis partibus aliquibus arthriticis vestigiis. Insignem etiam hujus comatis casum C. O. MOLLERUS (b) literis prodidit:

(a) Colleg. casual. magn. Casu 14. p. 188.

(b) Annal. Vratisl. Tent. 16. A. 1721. Novemb. d. 4. art. 12. p. 518. sqq.

Præco sacer. 33 annorum, cholérico-melancholicus a 18vo ætatis anno hucusque semper valetudinarius, sæpeque vehementes insultus hypochondriacos, a quibus raro penitus liber erat, expertus; nihilo tamen fecius totas hebdomadas fere sine induciis docendo cum acri animi intentione, & affectibus exigebat: unde etiam assiduo madebat sudore. Alias toto anno ita in raucedinem proclivis erat, ut eam vel ab horæ intensiori sermone contraheret. Ante aliquot annos medicorum suasu Væ Ses aliquoties celebravit; postea vero rectius valens eas prorsus omisit. Tandem cum a gravi febre rite percuratus brevi post immoderate & labori, & appetitui denuo nunc reverso, quo pluribus jam annis caruit, indulgeret, aliquando postprehenditur dolore cutaneo, & carnis toto corpore, qui, ubi æger concionando aliquoties magnopere incaluisse, remittens in sola sese brachia, & pedes contraxit, ut ut e brachiis iterum fere in totum abierit. Abhinc tantummodo quebatur de ardenti dolore pedum (potissimumque in carnibus, licet sæpius etiam dolor intrinsecus, ac præsertim in pollice, & circa articulos sentiretur) cum tanta omnium artuum lassitudine, ut si vel uno $\frac{1}{4}$ horæ pro concione diceret, fesso inde caput æstuar, ac sudaret. Auxit etiam lassitudinem hanc assidua agrypnia cum magna anxietate, ægrum nunquam in lecto ferente. Singulare simul erat, quod cum ante toto corpore solitus esset sudare, nunc solo capite, pectore, & dorso
uber-

uberrime sudantibus totus venter, & superni artus ficci essent. Dictus item dolor febrile quid præsefererat; quippe qui alternis diebus sævius affligebat, magno cum æstu, ceteris diebus factis tolerabilibus. Ubi summus erat dolor, ibi (& passim alibi etiam) efflorescebant maculæ rubicundæ, ac lividæ, sed brevi iterum evanidæ. Ante hunc morbum, præsertim ante febrim, multas habuit in manu rubras maculas magnis cum torminibus, sæpeque paucas pustulas, & gingivarum cruentationem. Principio hujus morbi exigua Væ So facta; dein aliquoties pro alvo referenda STAHLII pilulas, & pro sanguine depurando decoctum e sassafra, &c. hausit; at sine levamine. Consultus Auctor præmisso tridui usu infusi rhei, 4to vel 5to die, quo nempe remissio dolorum aderat, 4 hirudines ano ad moveri jussit. Abhinc per aliquot tempus præbuit omni mane infusum discutiens diaphnoico-diureticum, vesperi autem ꝑem ex conchis citr., arcano dupl., & nitro, sub diætâ molli, ac diluente, salubrique corporis motu. In posterum vero monitus, ut semper circa æquinoctia vel hirudines repetat, vel Væ Sem in pede substituat. Facta omnia co successu, ut intra 2 horas, postquam hirudines deciderant, dolor fere omnis evanuerit, & sub remediorum datorum usu cetera quoque symptomata sensim abierint. Ita & monachus 46. annorum, sanguineo-melancholicus ab hypochondriaco-cardialgico-nephriticis passionibus pertinacissimis in verum TRNKHA Hist. Hæmor, Vol. II, M hæti-

hecticum statum, omnibus jam conclamatum visum, prolapsus admotis ano hirudinibus intra breve tempus convaluit, & repetito circa singula æquinoctia eodem remedio athleticum recuperavit corporis habitum, donec post 11. annos (indubie ob neglectas sanguinis missiones) ex hydrope interiit. Neque minoris ponderis est observatio, quam R. D. SALOMON (a) suppeditat: mulieri 29 annorum lævo in pede oborta est rosa bullata cum valido tumore, tantoque dolore, ut noctu, diuque careret quiete, idque in 5 dies cum capitis gravitate. Apertæ vesicæ, sine levamine. Ex anamnesi patuit, ipsam cœcas quandoque hæmorrhoides habuisse; sæpe vero spinam dorsi dolere, & alvum assiduo esse obstructam; hinc nihil licet vitii in recto visceretur, tamen ocyus 4 hirudines ei admotæ sanguinem ad 3v. elicuere. Postridie post totam noctem pacatam dolor pedis plane absuit, tumore simul ita imminuto, ut cutis prius tensa nunc rugosa esset, ruborque etiam pallesceret. Gravitas quoque capitis abiit, & ægra sensim prorsus convaluit. Ejusdem (b) vir 42. annorum toto dorso dolores passus cum pectoris oppressione, & primum somno inquieto, ac sudoribus nocturnis; dein autem aliquo corporis tremore, ac demum

aurium

(a) L. c.

(b) Ibidem Vol. 26. Trimestr. I. Nro 12. p. 614

aurium fusurro, punctorioque temporum dolore: hirudines ano applicari iussit; unde symptomata partim desiere, partim lenita sunt, & reverso 4ta abhinc hebdomade dorsi dolore, ut ut mitiore, admotis iterum hîrudinibus sanguinis circiter 3vj. educæ optato cum successu. Denique & A. LEBENWALDTII (a) casum adducere visum est: „juvenis quidam temperamenti sanguinei, passus est herniam varicosam in interna scroti tunica dilatatis vasis spermaticis cum dolore & pondere, quoties deambulare. Aperitur vena brachii ob plenitudinem sanguinis; nec gutta effluit: pedibus comprimit locum affectum; mitigatur dolor, & largissimo rivulo saltat sanguis foras. . . Valde levatus fuit per venæ aureæ mediantibus sanguisugis apertionem.“ Ex hætenus ergo dictis satis, superque probata habetur hirudinum in moliminibus hæmorrhoidalibus sanandis utilitas.

2. *Varices parvæ recentes*, proinde molles, nondum callosæ, nec vehementer inflatæ nulla alia arte deplendæ, & abolendæ, vel sponte sua crepare (si criticæ sunt) non valentes. „In parvis adhuc, inquit I. L. SCHMUCKER (b), & pisum, vel nucem parvam

(a) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 6. Obs. 97.

(b) Vermischte chirurg. Schriften 1. Band. 2. Abschn. p. 107.

„viam æquantibus tuberculis hîruidines sunt
 „singularis prorsus utilitatis, a quæis illa ple-
 „rumque aperta a suo crasso sanguine vacu-
 „antur, & concidunt“ atque in fotu dein,
 vel enemate admota aqua frigida partes re-
 laxatæ contrahuntur, pristinumque ad offici-
 um redeunt (a). Nihilo minus tamen haud
 pauci fuere, qui minus tuto hæc insecta ano
 applicari existimaverint. F. HOFFMANNUS (b)
 propria sua experientia didicit hirudines sæpe
 inutiliter, aliquando vero cum evidenti noxa
 fuisse administratas: „vidit multoties in ve-
 „hementibus, & inveteratis hypochondri-
 „orum spasms hirudines sine effectu applica-
 „tas; vidit easdem levamen tantum ad tem-
 „pus attulisse, vidit quoque ab earum appo-
 „sitione ad hæmorrhoides cœcas, mali mo-
 „ris ulcera, & fistulas procreatas.“ Et multo
 jam ante istum T. BARTHOLINUS (c) ex hiru-
 dinibus admotis (ait) „multi ulcera nacti Ne-
 „apoli me præsentem, unde fistulæ, aliaque
 „mala ad nosocomium miseros detruserunt.
 „Phthificum novi ibidem misere exinde fi-
 „stula ani tortum. CHEBIBI medicus Ebræus
 „(d) testatur ex his vulneribus complures
 „fato

(a) Vide §. 119. Nro 4.

(b) L. c. T. 3. S. 2. C. 9. theor. 21. Schol.

(c) Histor. anat. Cent. 4. histor. 74.

(d) Libro de Væ Se.,

„fato cessisse inflammatione, dolore, abscessu.“
 Eadem & alii ingeminantes maluerunt varices
 ferro; quam hirudinibus unquam reserare.
 Sed pulchre ad hæc LUDWIG (a), qui ubi
 cultro alias, alias hirudinibus aptius venas
 hæmorrhoidales aperiri docuisset, demum sub-
 jungit: „post tales evacuationes, præsertim
 si ægri nimia humorum corruptione laborant,
 ulcera remanere satis notum est; hæc etiam,
 cum „in spurco loco sint, difficilius purgari,
 „& nonnunquam sinibus, & fistulis ad anum
 „oriundis occasionem præbere: sed hoc in
 „uno, & altero auxilio evenire vidi, nec
 „evitari posse credo, nisi medicus in dyscra-
 „sia corrigenda attentus, & chirurgus in ul-
 „ceribus purgandis diligens, & prudens sit.“
 Idque eo facilius evenit, si ut superius (b)
 vidimus, hirudines vetustis, grandibusque
 applicentur. Quod vero sæpe brevi tantum
 cum levamine, & sæpe nullo etiam successu
 fuerint admotæ, nemini mirum videbitur, cum
 non sint remedium infallibile; & certiorine
 levamine uspiam aliud remedium in hæmo-
 rrhoidalibus malis adhibetur? Ceterum nu-
 merosi omnino casus præsentissimam hirudi-
 num cœcis hæmorrhoidibus provide applica-
 tarum utilitatem commonstrant. G. BLANCAR-

DVS

(a) L. c. p. 402.

(b) Vide §. præced. Nro 2.)

DUS (aa) puerperæ varices hæmorrhoidales majori nuci moschatae æquales habenti admotis hirudinibus sanitatem reddidit. Et „quam „laudabilem, inquit V. RIEDLINUS (a), conferant opem venis hæmorrhoidalibus dolentibus, & sanguine plenis appositæ, . . . „me ipsum quoque experientia docuit. Cum „enim . . . rei tormentariæ præfectus a dictis „doloribus rebus humanis tantum non exemptus, omnia alia frustra in usum reduxisset, „tandem ab hoc vermiculo levamen sensit, & „quidem tam præsentaneum, ut vix eodem „delabente dolor omnino . . . cessaverit; „quin imo (quod adhuc magis mirandum est) „in hunc usque diem cesset.“ I. STORCH apud A. E. BÜCHNERUM (b) narrat cholericum juvenem 30. annorum a semestri ter expertum fuisse invasionem spasmi manuum, pedumque cum syncope, quæ Æe antisp. cum epilept. nigro brevi semper mitigabatur. Sed ubi dein venter cœpisset inflari, datæ pilulæ STAHLII cum levamine; verum oborta circa ani exitum angustatio docebat morbum esse nisus hæmorrhoidum. Incredulus juvenis diu abhinc,
at

(aa) Instit. chirurg. P. 3. C. 20. Opp. T. 2. p. 462.

(a) Lin. med. ann. 1. Decembr. 6. p. 422.

(b) Miscel. phys. med. A. 1727. Jannuar. d. 2. art. 2. §. 4. Nro. 3. p. 47.

at incassum, alius medici opera usus est; donec hæmorrhoidale tuberculum enatum fidem rei fecisset. Admotis ergo hirudinibus, tussaque aliquoties pedis vena immunis evasit a spasmo, & syncope, flatulentias tamen retinuit. E. D. SALOMONIS (a) consanguinea intolerabilem mejendi difficultatem cum dolore in imo spinæ dorsi, ac pressione abdominis, & sæpe vertigine, ac perturbatione capitis passa cum ab initio cathetere nonnisi 3j. lotii reddidisset, explorato intestino recto mox ad orificium 2. varices repertæ sunt: protinus ergo 4 hirudines admotæ intra horam omnem dolorem sustulere. Unde reversos deinceps dolores eodem semper præsidio fugabat. Multo autem hisce sunt luculentiora duo exempla, quæ apud A. HALLERUM (b) I. B. L. CHOMEL posteritati reliquit: vidimus (inquit iste) „mulierem annos 39 natam, „asthmatis paroxismo variantibus anni tem- „pestatibus suffocatam, hepatitide sæpius laborantem, nephritico quandoque dolore diarrheam, colica modo intestinali, hysterica modo fatigatam, hisque affectibus variis eo „magis obnoxiam, quod ob hæreditariam, „&

(a) L. c. Vol. 22. Trimestr. 2. Nro. 5. p. 137.

(b) Diff. med. præct. T. 4. Nro. 116 (ergo tumidis hæmorrhoidib. hirudines. Præf. I. F. C. MORAND) §. 5. p. 122. 199.

„& vagam arthritidem cum puerili scabie sup-
 „pressa conjunctam tota nervorum compages,
 „sævum in modum levissima de causa doleret,
 „& spasmodice torqueretur. Huic miseræ...
 „toties a pueritia repetita fuerat Væ So, ut
 „vasa omnia cubiti, radii, carpi, pedis, lan-
 „ceola foedata, & quasi concisa operationem
 „licet indicatam omnino rejicerent. Hanc
 „in assueto diversorum symptomatum paro-
 „xyismo visitans cum invenissem dolente ab-
 „domine, hepate tumido, diaphragmate quasi
 „sursum retracto (sæviebat acriter asthmatis
 „paroxysmus) exiguoque pulsu laborantem,
 „ecce natura, tantis etsi oppressa, & fatigata,
 „symptomatibus, per tumidas hæmorrhoides
 „sublevare se enixa est... Protinus admo-
 „vendas hirudines jussi. Vix sanguis fluere
 „incepit spissus, feculentus, atro-rubescens,
 „cum subito pulsum reviviscere, ventrem de-
 „primi, urinas cieri, diaphragma descendere,
 „aerem spirari, hepatis regionem elevari, se-
 „cretiones uno verbo redintegrari, & (quod
 „faustum magis; nec satis prædicandum) hæc
 „omnia symptomata non ad menses (ut olim
 „cum balneis, Væ Sbus, temperantibusque
 „medicamentis) sed ad annum, & amplius so-
 „lis admotis hirudinibus, solo fluxus hæmo-
 „rrhoidalis promoti beneficio conticuere, &
 „quæ per plures annos in sella brachiata,
 „noctes infelix erecta perdiderat, lecto nunc
 „sana decumbit. Adeo verum non quantitate
 „evacuati sanguinis; sed qualitate; sed ele-
 „ctione loci, per quem extrahitur sanguis,
 „natu-

„naturam ægrotantem juvari, atque sublevari.
 „Curavimus virginem annos 25 natam, qui-
 „busdam abhinc annis ob menstruæ purgati-
 „onis tardantem fluxum colicis doloribus ne-
 „phriticam, uterinamque colicam sæpe refe-
 „rentibus ita vexatam, ut pluries noctu e-
 „lecto pulsus auxilium, & opem laturus cur-
 „rerem. Lacerabant miseram distenti ventris
 „tormina, torquebant sævum in modum semi-
 „animem vomitus horrendi. Væ Ses innume-
 „ras, fomenta, olea, victum tenuissimum,
 „ceteraque hujus generis medicamina vix fa-
 „vente successu præscripseram. Balnea aquæ
 „dulcis ad menses quavis die per 4 horas
 „usurpanda censueram, ut tumens, & acriter
 „renitens universum abdominis spatium mol-
 „lire, & redigerem. Vix ægra tepidæ bal-
 „neum aquæ subierat, cum aquam proprio
 „calore ita recalefaceret, ut plures aquæ si-
 „tuli alternatim in balneo projecti illud vix
 „temperarent (quem visceribus æstum!). Emul-
 „siones, serum lactis, & id medicaminum
 „genus incassum abhibebantur. Incendebant
 „narcotica; non sedabant, adstringebant; non
 „aperiebant aquæ ♂les: humores rarefaciebant;
 „non pellebant sulphureæ, & thermales. Væ
 „Sem non semper admittebat debilior pulsus.
 „A spisso, & visceribus abdominalibus hæ-
 „rente sanguine universa symptomatum cohors
 „ut plurimum ducebat originem; at massam
 „hanc penetrare, vasorum mæandros perme-
 „are hoc opus, hic erat labor. Cæca mode
 „in-

„interius ; exterius modo tumebat hæmo-
 „rrhoidum congeries, strictamque pertinaciter
 „alvum reddebat strictiorem. Hirudines igi-
 „tur pluries admovendas eo confidentius præ-
 „scripseram, quod ab ipsismet abdominalibus
 „vasis sanguinem eliciendum esse fortiter persua-
 „sum haberem. At nescio quo suffusa pudore pu-
 „ella renuebat acriter, per annumque fere
 „integrum pugnaverat; sed atroci, multoties-
 „que recidivo victa tandem, & fere confecta
 „malo, nullamque aliam a nobis sententiam,
 „quam enixe postulabat, accipiens, hirudi-
 „nes admoventi permisit; quæ quidem ita pro-
 „spere successit operatio, ut deinde quavis
 „die quavis hora hirudines invocaret, has
 „amicas appellaret, precibusque admoven-
 „das efflagitaret, donec perfecte sanata fue-
 „rit, hirudinum plus quam 50 admotione,
 „3 mensium intervallo.“ Dictum superius (a)
 fuit, vetari ab nonnullis hirudinum ano ad-
 motionem tumentibus hæmorrhoidibus inter-
 nis ut inutilem, & noxiam, simul autem fuit
 monitum, contrarium sæpe nos experientia
 doceri, promissaque sunt hujus rei exempla.
 En unum! quod M. FALIX (b) præbet: mu-
 lier 23 annorum, sanguinea, at parce men-
 struans, viro vegeto, alacrique nupta, in
 quo-

(a) Vide §. 114. Nro. 3.

(b) L. c. Fasc. I. Obs. 21.

quovis coitu quiritabat. Abhinc aliquot septimanis cum virum facile tulisset, rursus deinceps tam dolorifici fiebant coitus, ut clamores invitæ exprimerent. Anno ita exacto vir rei impatiens, malitiamque subesse ratus, uxorem obstetrici lustrandam tradit, istaque nullam dolorum causam detegente, magis sua in suspitione confirmatus uxorem male tractare cœpit. Hæc cum a medico clam consulto data nescio ad quem uteri morbum medicina uteretur, virque fortuna in eam incidisset, mitius cœpit agere, atque ad morbum jam diutinum examinandum Auctorem accivit. Iste intellecto nunquam alias nisi in coitu sentiri dolores, menstrua parce procedere, mulierem vero cetera per omnia sanam esse, manu demum genitalia perquirat. Admonitus ab ægra imam vaginæ partem doloris esse sedem, in hac tactu explorata plura detexit tubercula. Rogata num & alvum egerens doleret, vel sanguinem excerneret? annuit, additque, largius ex ano profluente sanguine nullos in coitu se pati dolores. Indito proinde in anum quoque digito, & ceteris quoque præsentibus signis haud ægre patebat omnem dolorum causam esse hæmorrhoides. Facta Væ So, imperatum idoneum regimen cum semicupiis tepidis, iussaque est internam intestini recti tunicam unguento populeo inungere, atque cum nihil inde minuerentur tumores, hirudines etiam sunt admotæ. Hac demum methodo in 14 dies observata cœperunt & hæmorrhoides, & catamenia uberius fluere

fluere, tumoresque fensim evanescere. Inde mulier virum sine dolore admittens paulo post concepit, legitimoque tempore filium feliciter partu edidit. Ex omnibus itaque his casibus abunde elucescit, quanta cum utilitate hirudines hæmorrhoidalibus varicibus applicari soleant, & quam parum, raroque metuenda illa ani ulcera, ac fistulæ inde consequantur. Non tamen ita ubique hirudines esse necessarias contendimus, ut non persæpe earum in locum culter suffici posset eodem successu; imo plures sunt, qui promptius cul- tro ægrum; modo is illum non reformidet, levare asserant, nec nisi paucis in casibus cul- tro hirudines præferendas esse velint, cujus- modi est, quod solícite discernit LUDWIG (a), quodque non exigua dignum est lectoris attentione: persistunt enim (inquit ille), „sæ-
 „pius in iis, qui hæmorrhoidalibus insulti-
 „bus affecti sunt, tubercula callosa, quæ sine
 „dolore sunt, nec excretionem alvinam adeo
 „turbant, interdum tamen cum aliqua san-
 „guinis abundantia, vel dyscrasia has partes
 „urget, & irritat, dolorosa fiunt. Venæ,
 „quæ tum temporis a latere callosi tuberculi
 „surgunt, sponte non rumpuntur, quod ip-
 „sæ callosæ sint, et si vel maxime rumpuntur,
 „parum sanguinis reddunt, ex qua re levamen
 „exiguum, vel etiam nullum experiuntur.
 „Sæ-

(a) L. c. p. 400. 194.

„Sæpius in his nulla universalis indicatio ad
 „sanguinis missionem est, & ea, quæ solum
 „ob stases ad anum factas instituitur, effectu
 „sperato caret. Cum igitur præcipue de san-
 „guine in loco ipso affecto subducendo co-
 „gitandum sit, quo vasa turgentia deplean-
 „tur, et se contrahant; disquirendum omnino
 „est, num in doloribus obortis hirudines
 „applicandæ, aut incisio debeat institui?
 „Medicorum consilia hac in re discrepare in-
 „telligo; alii enim hirudines præferunt; alii
 „incisionem suadent; alii utrumque auxilium
 „promiscue admittunt. In hac re itaque quan-
 „tum fieri potest, definienda ad constitutio-
 „nem venarum semper attendendum esse ar-
 „bitror. Si nimirum callositas in cute non
 „solum; sed in venis ipsis animadvertitur;
 „hirudines apto loco applicatæ, & aliquo-
 „ties reiteratæ sensim evacuant; quamvis in
 „callosis partibus verum robur institui ne-
 „queat, nec applicatis externis remediis emol-
 „litio solidarum, & discussio fluidarum par-
 „tium attingatur: ægri tamen exinde aliquod
 „solatium capiunt, & nonnunquam applica-
 „tio hirudinum iterum necessaria redditur.
 „Quodsi vero venæ turgidæ molliores sunt,
 „altiusque in intestinum surgentes, & aptus
 „intumente quadam vena locus deprehenditur,
 „incisio majori cum emolumento instituitur;
 „quod venæ promptius evacuantur & nonni-
 „hil contrahuntur. Etsi enim perspexi foti-
 „bus calidis post hirudinum applicationem
 „ad anum admissis magnam subinde sanguinis
 „vini

„vim elici, & hunc interdum ita fluere, ut vix
 „cohiberi possit: tamen ea, quæ incisionem
 „venæ sequitur, evaçuatio promptior mihi visa
 „est, imprimis si vulnus satis amplum venæ
 „turgenti infligi potuerit.“ Verum hæc ex ad-
 junctis semper iuste sunt æstimanda.

3. *Suppressæ* denique cum functionum
 læsione. Admotæ enim hirudines vel nifum
 illum sanguinis ad sedis vasa, qui perperam
 quacunque de causa sufflaminatus fuit, resti-
 tuendo fluxum hæmorrhoidum revocant; vel
 saltem fluxum non amplius revocandum com-
 pensant, & quemvis alium anomalum san-
 guinis nifum versus alia vasa enervant, sym-
 ptomata inde enata profligant. Sic Ill. A.
 STÖRCK (a) de sua illa epidemica febre hæ-
 morrhoicali agens „sanguisugæ (inquit) circa
 „anum iis in casibus necessario debebant po-
 „ni, in quibus ab hæmorrhoidæ regurgitante
 „fiebant caligines, vertigines, sopores. Et
 „A. HAENIO (b) narravit . . . vir omni fide
 „dignus, solere se instante fluxus tempore
 „caligas sibi suas mappis dēnsis complere, ne
 „per eas perflueret sanguis. Semel autem
 „contigisse, ut sui temporis immemor, atque
 „itinere defatigatus amici, qui cum hospitio
 „exce-

(a) L. c. p. 153.

(b) Præleſt. in H. BOERHAAVII instit. pathol.
 ad §. 708. Tom. I. p. 103.

„excepisset, lectum pretiosissimum profluente
 „per somnum sanguine ita fœdasset, & con-
 „spurcasset, ut nulla ratione deinceps refici
 „potuerit. Se quondam in Gallia degentem
 „illo fluxu caruisse, incidisseque in quemdam
 „morbum fere apoplecticum; quam causam
 „cum ignorarent medici, frustra quæque ad-
 „hibuisse: donec amicus quondam ejus for-
 „tuito accedens hanc anamnesin medicis daret;
 „mox medicos tunc applicuisse hirudines, ar-
 „tisque cetera applicuisse auxilia, seque hac
 „ratione mortis exemptum periculo fuisse.“
 Similem etiam casum I. M. LANCISIUS (a)
 commemorat; nempe matronæ subpingui 60
 annorum, cum diu spasmodicis circa collum,
 pectusque doloribus, ac levi vertigine vexari
 solitæ hæmorrhoids interdum flueret cum le-
 vamine, hac subsistente post alvi tormina,
 & fluxum, ac dein contractiones artuum si-
 nistrorum, 30ma Novembris repente ingruit
 apoplexiâ. Admotis autem illico cucurbitu-
 lis, ustione, balneis, dextrosque ad artus,
 & cervicem vesicantibus, ac M. Sammon. ad
 nares, resipuit balbutiens, posteroque mane a
 syrupo persico belle purgata est. Gravi autem
 adhuc superstitie sopore cum hemiplegia læ-
 vilateris accitus Auctor, cum a restitante hæ-
 morrhoidum fluxu morbum judicasset enatum,
 jussit

(a) De subitan. mortib., L. 2. Obs. 2. p. 177
 192. sqq.

jussit mariscas aperiri eo cum successu, ut superveniente febris ægra, prius fere muta cum hebetudine sensuum, evaserit loquacissima. Cumque facile in soporem recideret, paralyticis etiam artubus admota vesicantia, relictis octo dies in fluxu plagis, intereaque cathartica, & crebra enemata data, & ob sitim urgentem largi potus concessi ex jure C. C., & aquis cephalicis. Transacta 3^{ma} die post novam catharsim in solo infusi eboris; ac falsæ usu relicta ægra appetente demum vere, recuperato pedum usu ad pristina munia rediit. Perinde ZACUTI (a) „femina gravida „novimestris, carnosa, & juvenis ex consueta hæmorrhoidali vacuatione diu suppressa in gravissimam incidit epilepsiam, quæ cessante melancholicum patiebatur delirium. „Hæc præter acria enemata, & partium inferiorum diversiones, & sectas in utroque „talo venas nonnisi hirudinibus sedi ter applicitis convaluit, & felicissime peperit.“ Eodem quoque præsidio virum a melancholia liberavit (b). Neque segnius ab hirudinibus auxilium obtinetur in pectoris morbis ex eadem causa enatis I. D. GOHLII (c) vir consistentis

(a) Medic. Princip. histor. L. I. Obs. 27. p. m. 249.

(b) Vide seq. §. 116. Nro. 1. d).

(c) Act. med. Berolin. dec. 2. Vol. 1. Sect. 2. p. 68.

stentis ætatis, tenerioris tamen habitus, a 9 annis, ex anomalis hæmorrhoidum moliminibus, sæpius obnoxius erat humorum ad pectus congestioni coryzam, tussimque, & asthmaticam oppressionem causanti; quæ symptomata provocatis per pediluvia hæmorrhoidibus cœcis dolentibus semper iterum solvebantur. Donec continuatis pediluviiis, institutisque æquinoctialibus phlebotomiis in pede ad fluxum hæmorrhoides perduxisset, periodicum quidem, rarum, at non statum, quippe qui semel per trimestre, dein per semestre, tandem toto triennio semel perinde apparuerit, potiori semper manente cœcarum apparitione. Cum A. 1721. nec unus, nec alter hæmorrhoidum status toto semestri accidisset, mense septembri homo nactus est ischiadem, ejus in summa ferocia phlebotomia æquinoctialis in pede facta malum exasperavit; & versus hibernum solstitium totum jam in pedem sæviebat dolor ardens, ac lancinans, cum stupore, & per intervalla ingravescens cum celeri pulsu, æstu interno, nocturnisque pavoribus, ac vigiliis. Consultus medicus cum præter venæ sectionem pedis, enemata, fatus calidos, demumque affecto in pede fonticulum, interne simul justo calidiora remedia ordinasset; ab horum usu nihil levaminis accessit; imo insuper vetus illa humorum ad pectus congestio magno cum ardore, & angustia rediit; sed sepositis his remediis iterum remisit. Sic tam usque septimanam

TRNKA Hist. Hæm. Vol. II. N dira

dira ischiade vexante rogatus Auctor consilium, intellexit ischiadicos dolores interdum esse leniores, stuporem pedis abiisse, cœcasque hæmorrhoides a triduo protuberare. Cum hirudines istis mox admovendæ nuspiam obtineri possent, data pro re nata alia, inter quæ externe emplastrum saponatum, BARB. dolores pulchre lenivit, & Æ Epsomeni mota alvus perinde cum levamine. Atque ab his æger pede sine dolore uti cœpit, superstitie solummodo aliqua post sessionem surgendi difficultate, & post stationem oborto rigore pedis cum sensu fervoris. Verum prout hæmorrhoides cœcæ, ac spasmi pedis cum dolore abibant, ita solennis illa humorum sursum congestio renascebatur cum cephalalgia, sternutatione, coryza, & Nuchæ spasmis, præterea tremula quædam motitatio toto in pede hætenus affecto, nucha, maxilla inferiore, ac temporibus sese exseruit. Nihilominus secius dolor in os sacrum contractus, & ani post alvi egestionem fervor ægrum fatigantes cum non inventis hirudinibus abigi non possent, sibi erant relinquendi, quoad æger ipse sibi hirudines applicare potius factus. Interea tamen hætenus bene valuit observato exacto regimine, & æquinoctiales celebrando prophylactice Væ Ses. Clariorem isto casum suppeditat 1. PLENCIZ (a):

„45

(a) Aët. & Obs. med. Cap. 4. p. 99.

„45 annorum sedentarius a $\frac{1}{2}$ anno multo
 „mœrore affectus, quique ante annos plu-
 „res continuo hæmorrhoides fluentes ha-
 „buit, ad ultimum quadriennium usque. Ab
 „anno jam dyspnœa afficitur, ac tussi vio-
 „lenta, sicca cum deleto appetitu, & dolore
 „hypochondrii, præsertim dextri, laborat.
 „Consuluit practicorum nostrorum unum ex
 „famosissimis, ab eoque recipit remedia pecto-
 „ralia, decocta, dein demulcentia, pilulas
 „dein balsamicas, ultimo ∇ as Selteranas
 „cum lacte potandas, sed meliorationis loco
 „pejorantur omnia eousque, ut noctu a tussi
 „impetuosissima omnis excuteretur somnus,
 „de die sub motu minimo anhelosissimus gres-
 „sum sistere cogeretur, emaciaretur summo-
 „pere, febricitaret intense, hocque in statu
 „apud me auxilium quæreret. Omnia præ-
 „dicta audiens inquirō in hypochondria, he-
 „patisque regionem, & duram, & dolentem
 „invenio, pulsum præcelerem, contractum,
 „ac durum, oculos flavescentes, linguam albam,
 „ac appetitum deletum. His inventis sangui-
 „sugas hæmorrhoidibus applicari jubeo, ac
 „decoctum ex rad. graminis, & taraxaci, &
 „ex tamarindis cum leni stimulo salino præ-
 „scribo. Cum vero post primas 6 hirudines
 „levamen persenserit, 4ta die denuo eas re-
 „peti curavi, sicque hominem post octiduum
 „per scalas meas libere ac vegete ascenden-
 „tem, adventumque suum risu profuso de-
 „nunciantem vidi, & audiui, indeque spes
 „affulget maxima miserrimum hunc, & pro-

„phthisico habitum hominem brevi perfecte restituendum fore.“ Pari quoque felicitate in morbis imi ventris dicta ex causa obortis hirudines usurpantur. C. O. MOLLERI (a) Centurio 45 annorum melancholico - cholericus a 4 annis assiduam pene patiebatur cardialgiam cum vehementi pectoris tensione & anxietate. Nihil per id tempus opitulantibus multis emeticis, catharticis, & carminantibus morbus crevit potius, noctu praesertim affligens & somnum ne unius quidem horae concedens. Bene appetebat aeger, dietam exactam tenebat, nisi quod semel, aut bis opem a liberalius hausto vino Tokayno sperans dolorem pectoris fecerit aliquamdiu multo graviolem. Corpus etiam quotidiana fere venatione exercebat. Alvus tertio quoque tantum die solvebatur, & ructus interdum erumpebant non levantes. Vi huius mali homo ad osseam usque maciem jam extenuatus fuit. Multo ante saepius Væ Sem instituens, eam ab aliquot jam neglexit annis. Ante biennium multum a coecis hæmorrhoidibus perpeffus ex illo tempore nil amplius earum sensit. Hæc anamnesis, totusque ægri aspectus arguebant cardialgiæ causam

(a) Annal. Vratisl. Tent. 18. Octobr. d. 4.
art. 11. §. 2, p. 412. sq.

sam esse retentas hæmorrhoides. Consultus Auctor, cum æquinoctium autumnii procul adhuc abesset, dilata sanguinis missione præbuit infusum leniter resolvens, & eccoproiticum cum ꝑbus digestivo nitrosis: externe vero V camphoratum. Usus his æger usque ad æquinoctium sine ullo levamine. Præmissio ergo Ꝑ cathartico, 4a Octobr. Væ So lævo in pede facta cum levamine, & noctu bihorii somno, quo jam æger diu caruit. Inde per 5. insequentes dies datum quovis mane vinum ex infusis herbis solventibus, incidentibus, ac laxantibus, vesperi autem ꝑ temperans, & vini ac cerevisiæ loco decoctum ex hordeo, polypod., liquirit., ac cinamomo potui concessum, externe ad præcordia admotum emplastrum saponatum, & subinde sacculi discutientes. Ab horum remediorum usu sic satis levaminis obtentum, cum somno etiam trihorii. Verum ubi 7 die a Væ Se admotæ ano hirudines satis elicuissent sanguinis, manifesta apparuit emendatio sequente nocturno 5 horarum somno. Nec postridie æger de ulla singulari pressione, aut dolore amplius questus est. In 8 tamen adhuc dies datæ pilulæ correctæ BECHERI. Abhinc insigniter homo carnes, viresque recepit, & hucusque ab inveterata illa cardialgia prorsus immunis mansit. Quid porro ad cruciatus arthriticos, rheumaticosque ab suppressa hæmorrhoides obortos profligandos valeant hirudines, documento est casus apud M. AL-

BERTI (a): juvenis 24 annorum: temperamenti sanguineo-melancholici, antea laborioso vitæ generi deditus, patre hæmorrhoidario natus, cum 3. „jam annis hæmorrhoides internas menstruas subiisset, præter has „æquinoctio autumnali dorſi, & cruris vexatur doloribus, qui in malum ischiadicum „deſiere; hoc ſequebantur puſtulæ prurientes „circa limbum ani, quæ adhibito unguento „ſaturnino camphorato diſparuere, redeunte „tamen priore malo, cum dorſi, & ſpaſticis „vagis arthriticis doloribus ſcapularum, colli „& artuum; hi accedentibus largis, ſpontaneis, matutinis ſudoribus arte promotis ſenſim evanuerunt. Adventante æquinoctio vernali adhibet Væ Sem præſervativam in pede; „nihilominus ſequuntur hæmorrhoides cœcæ „tumentes, quæ ſuffumigiis cedunt, ſecutis „in harum locum multo gravioribus arthriticis, vagis doloribus; a quibus nonniſi provocatis per hirudinum uſum hæmorrhoidibus „liberabatur, & continuata ſic verſus æquinoctia Væ Se, & hirudinibus ab incommodis illis liber vixit.“ Quantum denique ad varias periculofas hæmorrhagias (ut eſt hæmoptoë, vomitus, miſcuſve cruentus, &c.) a ſuppreſſis hæmorrhoidibus inductas cohibendas, & deinceps avertendas hirudines valent,

(a) Diſſ. de fluxus hæmorrhoid. provocatione, theſi 15. p. 9.

ant, complurimum perinde Practicorum edocemur experientia. Sic AMATUS (a): „per hæmorrhoides . . . vir . . . sanguinem copiosum emittere solebat; cui cum multa peracta essent remedia, & sanguis ex toto cohibitus, consequens fuit, ut sanguinis rejectatio veris statuto die illi superveniret. „Qui cum graviter morbum ferret, & phthisis adventum timeret, nos ad se accersiri fecit . . . cui nos . . . sanguinem extrahere ex interna brachii vena fecimus, & bene habuit. Ceterum singulis sequentibus annis antequam morbus ipsum invaderet, venis ani hæmorrhoidalibus dictis hirudines nostro consilio admoveere faciebat, ac sanguinem per eas, quoad hirudines deciderent, & sanguis ex se cohiberetur fluere . . . per mittebat. Qua . . . evacuatione homo absque sanguinis ex pectore rejectione sanus & incolumis perseverabat.“ Ejusdem (b) propola 45 annorum, olim syphiliticus, nunc diu jam menstruum hæmorrhoidum fluxum passus copiosum, cum iste ab aliquot diebus restrictus non flueret, cœpit sputare sanguinem copiosum subflavum, ac rubrum, at sine tussi, & febre. Admotis autem ano 4 hirudinibus, eductisque ̄vj. sanguinis, & præscripto cum diæta in aliquot dies decocto endiviæ,

(a) Curat. med. Cent. 2. cur. 13.

(b) Ibidem Cent. 5. cur. 3.

diviæ, fumaræ, ac lupulorum cum homonymis syrupis, & subjuncto cathartico, atque usurpato per plures abhinc dies condito ex flor. fumaræ, Saccharo, veluti fl. cichorii concinnato, stomacho jejuno, haustaque semper desuper pauxilla ∇ a cichoreæ, convaluit, reverso nempe fluxu hæmorrhoidum cum euphoria. Confirmavit hæc propria sua experientia, haud ita multo abhinc tempore I. L. SCHMUCKER (a): „sæpe (ait ille) ex suppressis vel hæmorrhoidibus, vel catameniiis periodicis nascitur hæmoptoë, in qua hirudines reperi perquam efficaces. Ut primum, vel minima pectoris oppressio sese exserebat, extemplo 8 vel 12 hirudinibus ano admotis, prævertebatur hæmoptoë, reversoque alterutro illo fluxu, ægri ab hæmoptoë prorsus liberabantur . . . In tota mea praxi tres tantum viros novi, quos post diu ante suppressas hæmorrhoides periodica id genus hæmoptoë, ut in feminis, invasit, fere 4a quaque hebdomade revertens, rejecto semper ad aliquot vascula theata sanguine. Unus eorum hypochondriacus vitæ semper jacturam sub hæmoptoë reversa metuens, 4a quavis hebdomade sanguinis 3vj e brachio demebat; sed sæpe admodum eo ipso die sanguinem sputabat. Diætam tenebat exactam, & aliquanto ant, quam me consulisset, „cœca-

(a) L. c. p. 405. sq.

„cœcarum hæmorrhoidum nifus, at citra flu-
 „xum, experiebatur. Exferentibus ergo sese
 „per pectoris oppressionem imminentis hæ-
 „moptoes indiciiis admovi ano 12 hirudines:
 „hæmorrhagia 5 horas duravit, sanguine ad
 „5xij elapfo. Id ipsum per 3 menses est ite-
 „ratum, atque ita a morbo penitus liber eva-
 „sit. Verumtamen quotannis deinceps suo
 „confilio omni vere, & autumnio sibi 10 ad
 „12 hirudines ad moveri fivit neglecta plane
 „Væ Se, & hucusque recte valet. Eadem
 „quoque ratione duos alios ab hæmoptoe
 „vindicavi.“ Similia etiam de mictu cruento
 memorat (a): „haud raro in hæmorrhoidibus
 „a distentis vesicæ vasis oritur hæmaturia mo-
 „lestissimis cum symptomatibus. Nonnullos
 „Væ So in brachio cum temperantibus illico
 „levavit; aliis vero morbus plures in dies
 „perstabat summis cum doloribus, nil opitu-
 „lante Væ Snc quater, & sæpius facta, datis
 „una temperantibus, & exactissima servata
 „diæta, imo quibusdam hæmorrhoides omni-
 „no ex vesica (satis jam ejus vasis p. n. dila-
 „tatis) fluxere, id quod in 3 ægris multis
 „cum doloribus, molestiisque vidi accidisse.
 „Omnes prius hæmorrhoidum fluxum habue-
 „runt; sed hocce ad vesicam conversio, nil
 „nisi levis ad cœcas hæmorrhoides nifus pri-
 „stino in loco superfuit. Primo illorum 4a
 „qua-

(a) Ibidem p. 112. seqq.

„quaque septimana, alteri quavis ga vel roma
 „tertio vero quolibet vere, & autumno ex-
 „acte hæmaturia redibat. Post incassum ten-
 „tatas Væ Snes, remediaque temperantia,
 „& alia tandem cuivis illorum instante fluxus
 „periodo hirudines ano apponi iussi, quo ter,
 „quater facto, hæmorrhoides rursus ex ano
 „fluxere, & hæmaturia desit. Omnes tres cum
 „militarent, atque ob id ipsum non semper
 „justam possent diætam observare, nulli tamen
 „amplius revertit hæmaturia. Ante aliquot
 „annos minister statuum maximos ab aliquot
 „diebus cruciatus ex hæmorrhoidibus vesicæ
 „perpeffus me accivit. Erat 50 annis major,
 „macer, atque intolerabiles perpetiebatur ante
 „dolores; quam guttas aliquot cruenti lotii
 „emitteret. Jam Væ So & omnia in & ex-
 „terna idonea frustra administrata fuere. Vix
 „ $\frac{1}{4}$ horæ consilio interfui, cum ægrum serosa
 „prosterneret apoplexia. Datīs emeticis post
 „aliquot horas ad se rediit; sed mictus dolo-
 „rificus mansit, ut ante. Admotæ autem qua-
 „perinæo, qua ano actutum 20 hirudines vix
 „fluxere, & jam fiebat æger tranquillior, lo-
 „tisque fluxus evanuit. Post $\frac{3}{4}$ horæ arcte
 „adhuc inhærentibus sanguisugis magnum
 „reddidit vitrum lotii cruenti cum grandibus
 „frustris coacti sanguinis non sine facilitate,
 „ac levamine, ac paulo post tantumdem cum
 „grumis, atque abhinc urina denuo rite, &
 „sine dolore procedebat. Die 4ta rediit
 „morbus; verum admotis iterum sanguisu-
 „gis abiit sine ulteriori recidiva. Trimestri
 „,aurem

„autem post obiit ex hydrope cerebri, nam-
 „que insignis aquæ vis inter meninges, at-
 „que in ventriculis est reperta.“

§. CXVI.

γ. *Cautelæ* tamen aliquæ in sanguifuga-
 rum applicatione haud sunt prætervidendæ,
 ne illæ sine his administratæ ægro aut molestiæ
 plus; quam utilitatis, aut noxam etiam affe-
 rant. Observanda autem hæc fere occurrunt.

1. *Præparatio ægri* exigit, ut vasa hæ-
 morrhoidalia, queis hirudines admovendæ
 sunt, reddantur conspicua; quod præsertim
 de vasis hæmorrhoidum internarum valet: ea-
 propter illa die ægro intemperate calido loco
 degenti, ac mollibus cibis pasto (a)

a. *Enema* emolliens bihorio ante appli-
 cationem injicitur; postmodo vero.

b. *Semicupium* vel infessus vaporis hy-
 drogæ æqualiter semper calidæ per $\frac{1}{2}$ ho-
 ram imperatur. Si autem ne sic quidem vasa
 dicta satis evadant conspicua.

c. *Nixus inspirationis* cohibita exspira-
 tione qualis præsertim ad alvi egestionem fit,
 facien-

(a) c. F. SCHULZ l. c. §. 28. sqq.

faciendus jubetur. Quodsi neque ita inflentur & in conspectum se dent vasa aperienda, tunc

d. *Cucurbitula* totum anum comprehensens est apponenda, quod ZACUTUS (a) eximio cum successu fecit sequenti in casu: viro immanes ex intervallis hæmorrhoidum dolores oborti cum semper cessarent excreto humore nigro, aliquando restitante hac evacuatione incidit in melancholiam. Tentata varia quæque ad vacationem illam vel revocandam vel supplendam sine fructu, atque ter etiam incassum admotæ ano sanguisugæ, propterea quod externas tantum sedis venas referarint. Superveniens ZACUTUS comperto errore cucurbitulam totum anum comprehendentem apponi jubet, forasque sic prolectis vasis hæmorrhoidalibus, quæ intra anum ante latebant, hirudines quartum admovent, copiosumque ex iis sanguinem elicit; quo facto æger sanatus pancratice dein vixit.

e. *Situs* denique ægri aptissimus est, decubitus quietus alterutrum in latus.

2) *Hi-*

(a) Medicor. Princip. histor. L. 1. Obs. 6. p. m. 22. & Prax. med. admir. L. 2. Obs. 74.

2) *Hirudines* porro ipsæ exigunt, ut observetur illarum delectus, numerus, modusque, cum applicandi, tum amovendi.

a. *Delectus* illarum censetur optimus, si illa sumatur hirudinum species, quam I. L. SCHMUCKER (a) ex MÜLLERO depictam sistit, vel etiam SCHULZIUS (b) ex GESNERO commendat, jubens eas e stagno captas, optimeque absterfas per 7 vel 8 dies in aqua fluviali servari, quod ita & puriores fiant, & morsus avidiores.

b. *Numerus* vero applicandarum pro loco & morbi magnitudine est varius. Ano adultorum 4. 6. 8. 10. 12. apponi possunt; sin pluribus opus fuerit, perinæo ceteræ admove-
 ri vel primis delapsis aliæ atque aliæ suffici possunt. Vicenas SCHMUCKER (c) Ministro statuum applicuit. AMATUS (d) quidem consilium præbet, qua ratione paucarum hirudinum ope multum sanguinis elici queat: „postquam
 „(ait) affixæ . . . hirudines . . . tumescerent
 „incipiunt, per medium eas forficibus præ-
 „scindi mandamus; nam tunc melius fugunt,
 „& ex ægroto super perforata sede sedente
 „sup-

(a) L. c. p. 116.

(b) L. c. §. 27.

(c) Vide §. præced. Nro. 3).

(d) L. c. Schol.

„supposita aqua calida sanguis in vasculum
 „aut scutellam cadens ea a nobis præscripta
 „quantitate servatur, ut postea de ejus co-
 „lore, & substantia judicium feramus.“ Sed
 rejicit id SCHULZIUS (a), quod experimen-
 tis captis constet, multas hirudinum vulne-
 ratarum decidere; ceteras autem factas debi-
 liores lentius fugere cum ægri impatientia,
 nihiloque ita plus sanguinis elici.

c. *Applicatio.* porro ita peragitur: hi-
 rudines cum aqua in pelvim effusæ, indeque
 exemptæ intra lintheum ita conduntur, ut ca-
 pite tantum eminentes destinato loco, probe
 ante spongia aqua, lacteve tepidis imbuta
 mundato, applicentur, et si mordere nolint,
 vel aceti guttula capiti aspersa excitentur,
 vel illito parti ipsi mordendæ sanguine allici-
 antur (b).

d. *Amotio* denique triplici ratione pro-
 curatur, nempe vel relinquendo sanguiifugam,
 donec sponte sua delabatur, vel si id ob moram
 aut minorem sanguinis educendi copiam ne-
 cessariam haud expedit, momentum salis illi-
 us ori applicando, vel vi avellendo: postre-
 mum tamen; cum subinde periculo non va-
 cet, vitandum est.

3. Hæ-

(a) L. c. §. 29.

(b) FROMMANN. l. c. P. 2. probl. 27. p. 375.

3. *Hæmorrhagia* superstes cohibendane an promovenda sit, e copia sanguinis ab hîrudinibus exsucti est æstimandum.

a. *Cohibetur* vel sponte sua sibi relicta, vel decubitu in lecto, ubi compressis venis vulneratis desinit, vel stipticis lenibus admotis v. g. linteo combusto cum splenio appposito, &c.

b. *Promovetur* autem duplici ratione, videlicet vel cucurbitula sicca toti ano imposita, si æger lectum relinquere nequit, vel si id potest, insidendo sellæ perforatæ (ne alio corporis situ venæ apertæ compriantur) super vase excipulo stillarum sanguinis, ita ut vapore ∇ æ calidæ subtus locatæ & sanguis a grumescencia circa vulnera prohibeatur, & vasa relaxata conserventur, ne sese contrahant. Quodsi tamen sanguis circa vulnera grumescens fluxum interrumpat, spongia calida & humida sæpius est abluendus. Cavendum tamen est, ne ubi hîrudines varicibus hæmorrhoidalibus præsertim majusculis, fuerunt adhibitæ, hæmorrhagia alterutra hac methodo promoveatur, monente id f. ab AQUAPENDENTE (a): periculum enim est, ne nimium inde profluvium sanguinis consequatur, cujusmodi exemplum

(a) De chirurg. operat. p. 112.

plum GISNERUS (a) excitat de juvene, quem post delaptas ab hæmorrhoidibus hirudines ministri inconsulto medico in folium vaporis imposuerant: quo factum ut contumaci hæmorrhagia pene fuerit exanimatus. Sic & DURETI (β) mulieri, quæ prætumidas venas 5 ani habebat, admotæ sunt cucurbitulæ, quarum vi 2 pintas profudit sanguinis: fere incidit in hydropem.

4. *Locus* denique, cui apponere hirudines oportet, rite est determinandus, prout nempe intentio est, sanguinem aut ex internis aut externis hæmorrhoidalibus vasis eliciendi. Ubi varix protuberat, huic ipsi hirudo admovetur; at ubi nullo, conspicuo venarum tumore præsentē hirudo est adhibenda, RIOLANUS (b), præcipit, ut ad interna vasa hæmorrhoidalia referenda hirudo versus coccygem ac magis introrsum ad intestinum applicetur; ad latera vero podicis ac versus perinæum & superficietenus, ubi externa oportet vasa hæmorrhoidalia deplere. Cautum tamen decet esse chirurgum ac providum, ne hirudo intimo ani limbo admota ipsum in anum sese penetret, velut ZACU-
TUS

(a) Ex 3. dialogor. medic. MUNDELI p. 509.

(β) Schol. in HOLLER. l. c. p. m. 579.

(b) Anthropogr. l. c. Cap. 17.

tus (a) quartanario cuidam accidisse narrat, unde injecto cœparum succo semimortua est excreta. Enema ex aqua probe salsa tunc etiam proficuum foret.

5. *Regimen* post cohibitam hæmorrhagiam exigit, ut æger levi cibo & quiete aliquamdiu utatur; sic enim vasa vulnerata brevi sanantur; motu vero, acribusque assumptis & dura fece alvina facile iterum recrudescunt.

§. CXVII.

b) *Acies ferri* demum hirudinibus præfertur, quotiescunque vel celerius deplere turgentia vasa ani oportet, vel hirudo ad vacuationem hujusmodi præstandam est impar. Quapropter incisionem vel scarificationem vel omnimodam etiam excissionem subinde exposcunt.

α. *Prolapsus ani* simul præsens atque ob tumorem hæmorrhoidalem partis elapsæ non reponendus, qui ut recte notat YOUNG (b), sese haud ante reponi finit; quam vasis elapsa in parte turgentibus vel hirudine
vel

(a) Medicor. Princip. histor. L. I. Obs. 7. p. m. 24.

(b) L. c.

vel cultro depletis, & per admota dein styptica minus ad volumen facile redigendis. Verum cum ani prolapsi celeri sit opus repositione, lente vero hirudo depleat: liquet, cultro (si nil obftet) tunc uti chirurgum oportere.

β. *Varix* grandis, vetus crassa (a), praesertim haemorrhoids dicta saccata (b), grumoso jam sanguine referta, aut recens quidem adhuc, sed atona, & strangulata, nec Væ Sæ, nec topicis ullis, nec internis perinde remediis dissipanda. Vasa enim ani tunc ad atoniam usque a sanguine distenta f se (utcumque vasis aliis per Væ Sæm vacuatis, & utcumque topicis, ad sui contractionem exstimulata) non amplius contrahere, sanguinemque mora & quiete grumosum factum nullatenus loco movere valenti idcirco necessaria est immediata horum vasorum non tam per hirudines hic inefficaces, quam ferri acie apertura, ut educto grumoso sanguine ipsa sese denuo contrahere valeant. Atque tunc „incisio cauta, pro tuberculi „mole major vel minor, puncto livido nigro (loco nempe ubi grumus latet,) facta „integrum, evidentem grumo præbet exitum“

(a) Vide §. 114. Nro. 2.

(b) Vide §. 6. B. Nro 2. a). E.

„tum“ inquit I. N. HUMBOURG (a). De recentibus adhuc varicibus I. A. BRAMBILLA (b) agens „hæmorrhoides (inquit) sunt tuberculoſa venarum inteſtini recti a ſanguine ſpiſſo, lentoque dilatatio. Quando hæ venæ a conſtrictione fibrarum circularium ſphincteris ani permanente ſtrangulantur, vicinis in partibus, quas continuo irritant, inſignem cauſant inflammationem cum tumore ac dolore, quæ vero facile abeunt, ſi turgentia vaſa incifione referentur, grumusque intus contentus cruor educatur. Quodſi vero inflammatio ſit vehemens, contumax, & ipſa etiam incifione facta non reſolvenda, tunc præter Væ Snem emollientibus quoque & anodynis topicis opus eſt; rarius tamen accidit, ut non ocyus poſt incifionem, & exemptum ſanguinem coactum dolor, ac tenſio ceſſent.“ Et alibi (c) „ſæpe numero (ait) ad ægros accerſebar, qui a conſtrictione ſphincteris ani & preſſione ipſius ſanguinis in vaſa cutanea varices hæmorrhoidales ovum æquant, lividas vel nigras, ſtrangulatas habebant cum doloribus ſpasmoticis abdominis, dy-

(a) Diff. Ergo hæmorrhoidi recenter tumida ſectio, non hirudo §. 12. p. 17.

(b) Von der Phlegmone I. Th. 3. Cap. p. m. 29,

(c) Ibid. 2. Th. 6. Cap. 2. Beobacht. p. m. 134.

„dysuriaque, vel ischuria, febre, & in-
 „flammatione. Totum illico tuberculum
 „discidi, atque exempto inde grumoso san-
 „guine dolores e vestigio; cetera vero sym-
 „ptomata pedetentim evanuerunt; incisura au-
 „tem mox, ad $\frac{2}{3}$ minuebatur, & intra pau-
 „cos dies persanabatur. Cavendum tamen,
 „ne vel minimum quid grumosi sanguinis
 „incisa in varice relinquatur; moratur enim
 „sanationem.“ Pulchre hæc aliorum obser-
 „vatis confirmantur. I. HOLLERUS (a): „cui-
 „dam nobili . . . cum in gravissimo renum
 „dolore emingeret pus, sanguinem, & cras-
 „sam pituitam, natura remedium ostenden-
 „te, quia tumebat hæmorrhoids, & aliis re-
 „mediis non cedebat dolor, eo statim tem-
 „pore jussi aperiri hæmorrhoidem; unde in-
 „credibili celeritate dolor conquievit.“
 Idem G. H. VELSCHIUS (b) „vidit in viro
 „nobili consistentis ætatis, cui tumebant in-
 „signiter, & dolorem intolerabilem excita-
 „bant. Huic extemplo scalpello apertæ sunt:
 „unde præsentaneum auxilium sensit multo
 „ichore cum paucis sanguine effuso. Chirur-
 „gus mundificans ex melle rosaceo appli-
 „cuit, deinde cerato diachalciteos cum oleo
 „hyperici liquato consolidavit.“ Perinde
 duo-

(a) De morbis intern. Schol. ad Cap. 55. p. m. 573.

(b) Obs. med. hecatost. 2. Obs. 98.

duobus in civibus cœcas hæmorrhoides graviter passis post præmissam Væ Suem in cubito ad immodicum ex ano fluxum præcavendum, incisus FROMMANNI (a) jussu varicibus ani, secutoque aliquo sanguinis effluxu dolores confestim remiserunt. Magis etiam alius ejusdem casus necessitatem hujus incisionis demonstrat: vir gravem hæmorrhoidum cœcarum dolorem pilulis aloeticis, specificis, narcoticisque sumtis, ac litu adhibito ex ungu. populeo infrigidante, opio, &c. aliquatenus sopiens, cum abhinc varicum crepaturam frictione lintei asperi succo cœparum cum oleo amygdalarum amar. sub cineribus assatarum imbuti procurare conaretur, dolores inde renati cum sat amplo carnosâ in parte rubore erysipelatode oborto. Accitus eapropter chirurgus varicum complurium tumidarum unam majorem, nuci moschatae æqualem, mollem, ac tactu vix dolentem lanceola aperit. Sanguis inde crassus fibrosusque, & parum perolidus non nisi facta manu compressione poterat elici (manifesto indicio, hunc talem nullis internis, externisque remediis discuti, resolvique potuisse). Hoc educto & dolor tumorque ceterarum varicum inde remisit, & copiosus abhinc e vulnere sanguis sanus sponte erupit, ut cum fluxui illius plane cohi-

(a) L. c. P. 2. Probl. 26. p. 3⁶4. 599.

hibendo admota spongia chelidoniae aqua & aceto imbuta non fuerit par, appposito crepitu lupi fuerit sistendus. Erysipelatoso illi rubori impositum molle linteum in calidos succos chelidonii, fol. quercus, & semper-vivi minoris cum sebi hircini, ac ceræ l. q. ad ignem mistos intinctum cum levamine. Magis etiam istis momentosus est casus, quem F. L. BANG (a) & I. D. METZGERUS (b) referunt, nimirum plebejus adultus stricti habitus, hæmorrhoidum pathemata jam expertus, in Argentinensi nosocomio æger decubuit ex morbo peripneumonici quid præseferente; aderat enim fixus dextri lateris dolor cum pulsu celeri, & aliquatenus duro, æstu, siti, tussi ac dyspnœa, a perfrigeratione, ut videbatur, obortus. Facta Væ Sne data in biduum antiphlogistica sine levamine. Morbus abhinc relicto pectore caput petens causavit delirium celeriter increscens, & efferatum, atque ad omnia quæque præsidia adeo rebelle, ut ne intermiserit quidem, sed multo potius sub ejus augmento excrementa sponte abirent, motusque convulsivi in facie sese exfererent; conclamata res jam omnibus visa, ægro podicis nomen assiduo in ore habente; quod cum
omnes

(a) Collect. med. Hafn. Vol. 1. Obs. 6. p. 46.

(b) Adversar. med. Part. 2. Specim. 2. Cap. 1. §. 2. p. 207. nota (n).

omnes agrestibus hominis moribus tribuerent, PEILL medici memoriam subiit, LEIDEN-
FROSTIUM præceptorem olim inculcasse: non aspernandas esse delirorum voces, ut-
cunque illæ viderentur incongruæ; quod ægri tolerent iterato verbis eam corporis partem, quæ morbi est sedes, indicare. Et ecce! cum forte fortuna PEILL præsentē tiro chirurgi enema injecturus ob insignem hæ-
morrhoidalem nodum fistulam ano indere nequiret, suspicari cœpit PEILL, num non morbus ab hæmorrhoidibus esset? Et vero aperta varice enema mox promte injectum & modico licet sanguine e vulnere elapso æger post pauca minuta mentem; sensimque etiam sanitatem recepit. Satis itaque speciminum necessitatem, utilitatemque ferro incidendarum hæmorrhoidum cœcarum recens e strangulatione dolentium, & nec sponte crepantium, nec ulla alia arte dissipandarum. Nihilo tamen secius sunt, qui cultro eas tangi prorsus vetant, quod lethales inde, aut certe vix cohibendæ sæpe hæmorrhagiæ & fistulæ ani non curabiles observatæ sint. Quantum ad fistulas, jam superius (a) ex LUDWIGIO vidimus, quid reponendum sit; nunc hæmorrhagias expendamus, DION-
DACA (b) Hispanus chirurgus celeberrimus scri-

(a) Vide §. 115. Nro. 2.

(b) De Apostematib. L. 3. C. 43.

scribit JOANNEM Austriacum CAROLI V. Imp. filium, Ducem strenuum hæmorrhoidibus laborantem admoto iis ex consilio plurium medicorum scalpello, largaque inde oborta hæmorrhagia, nullis cohibenda auxiliis, intra 4 horas e vita migrasse. Similem quoque casum ZACUTO (a) debemus de robusto quodam juvene ex hæmorrhoidibus suppressis in melancholiam lapsos ad omnia quaeque rebellem; inter quae cum hirudines etiam ter ano in cassum fuissent admotae, chirurgus crassum sanguinem promptius educturus lanceola venas ani aperit. At sectione vix facta oboritur hæmorrhagia nullis remediis, nec ipso etiam cauterio sistenda, donec viribus cum sanguine exhaustis miser juvenis extinctus est. Huc quoque referendus est I. A. HÜNNERWOLFFII (b) pellio biliosae temperiei, cui cum ante statis temporibus hæmorrhoids procederet, & si quando ex errore in victu intumesceret, fluxum impositis ficubus cum melle rosato contusis & sub juncta pannis asperis frictione provocare solitus esset, accedens aliquando ita tumentibus venis absque fluxu chirurgus eas phlebotomo incidit. Verum immodicus inde fluxus ortus cum assiduo dolore, prostratione virium,

(a) L. c. Obs. 40. p. m. 33c. & Prax. med. admir. L. 3. Obs. 59.

(b) Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 1. Obs. 119.

rium, ac vigiliis. Admotis vero stypticis vulnus inhibita haemorrhagia in sordidam abi-
bat ani fistulam, cui tandem horrenda super-
venit epilepsia quotidiana vix 3 horarum in-
ducias concedens, hominemque tandem ex-
tenuatum necans. Nunquid ergo satis tuta
varicum cultro incisio? Imo maxime! nihil
enim haec infortunia probant aliud, quam
quod incisio facta sit, vel ubi fieri non de-
buit, vel certe prava methodo. Nam in
DACAE casu vel non fuere varices strangu-
latae, vel plures incisiones (dum una suffe-
cisset) factae exitio fuere (a). Idem etiam
de reliquis valet, praesertim de ultimo, ubi
phlebotomo vulnus iusto altius fuisse debuit,
cum tantos post se dolores, & ulcus traxe-
rit. Alioquin enim id genus infortunia nulla-
tenus consequi experti sunt medici Vratis-
lavienses (b) scribentes: „ubi . . . discussio
„obtineri non poterat, aliquoties tumores
„hi aperiendi fuerunt . . . Et sane ex ista
„apertione ope lanceolae perpetrata nec hae-
„morrhagias nimias, nec fistulas consecutas
„meminimus, ac sane . . . ferro magis,
„quam hirudinibus . . . negotium perpe-
„traudum esse opinamur.“ Haud tamen in-
ficiandum est, puncturam tantum varicis (ut
in

(a) Medicinische Anecd. 2. Th. Nro. 14
p. 48.

(b) Histor. morbor. Vratisl. A. 1700. p. m. 172.

in crurum quoque varicibus dolentibus deplendis aliquando factitatur) praefendum interdum esse latiori ejusdem incisioni, praefertim ubi a majore vulnere metus imminet haemorrhagiae. Atque de hac fere M. A. SEVERINUS (a) sola loquitur „haemorrhoides (inquiens) compungi multi sanguinis affluxu distentas novum non est, sed saepe tum a pericis medicis, tum a vulgaribus usitatum.“ Quid autem cum haemorrhoidibus illis internis grandioribus, quas THEDEN saccatas (b) vocat, agendum? Ista nullam aliam requirunt sanationem, quam omnimodam excisionem, quae operatio THEDENTIO (c) teste multo minoris est negotii, quam incisio tuberculorum externorum. „Vidi, narrat idem (d), virum prorsus cacheticum cum assiduis incommodis febrilibus, anxietate pectoris, & anorexia. Peritissimi medici causam nequibant assequi. Dato cathartico antiphlogistico egressae haemorrhoides. Inspecto ano apparuit varix juglandem magna, quae ex intestino recto protrusa minus quam coecae, quarum aliquot majus pisum aequantes ad anum erant, „dolo-

(a) L. c. paracenth. Cap. 17. p. m. 74.

(b) Vide §. 6. B. Nro. 2. 2) E.

(c) L. c. p. 62.

(d) Ibidem p. 60.

„dolorifica, sed rubra tantum ac velut inflammata. Decreta excisione saccus forcipe attractus forcice abscinditur; quo vix ablato similis alius erupit pugnus magnus, perinde etiam excisus. Iniectum deinde ter quotidie decoctum vulnerarium ∇ a mea Arquebusada remixtum; interne datae MRæ temperantes. Nox longum, placidissimumque somnum attulit, qualem aeger per semestre ante nunquam habuit. Abhinc vero pedetentim ex integro convalescit.“ Alter (a) miles 50 annorum omnia eadem incommoda nullis remediis internis sopienda perpetiebatur, ex quo haemorrhoides ante sub quavis dejectione fluere solitae ab aliquo tempore substitissent. In ano inspecto nil repertum; sed a cathartico ex \ominus e mirabili vehementer alvum ciente emerferunt 3 facci, duo avellanam, juglandem nucem unus aequans. His forcice ablatis injecta ∇ a vegeto-mineralis cum magno dolorum lenimine, atque abhinc ex toto melius habuit. Haud secius (b) unus amicorum Auctoris e nimia sanguinis per haemorrhoides quotidie profusissime fluentes jactura amissis omnibus viribus perquam cachecticus lente febricitabat nihil ullis proficientibus remediis. Ano inspecto saccus prorsus callo-

(a) Ibidem p. 6r.

(b) Ibidem.

callosus $\frac{1}{2}$ pugni magnitudine inde cum variis parvis sacculis protuberabat, & a dato cathartico alter ejusdem molis perindeque callosus egressus est, qui ambo excisi sunt. Ita etiam 1. L. SCHMUCKER (a) accitus ad magnatē tria tubera hæmorrhoidalia, quorum unum pugno æquale fuit, habentem & a triduo jam alvo, somnoque carentem summisque excruciatum doloribus, eum mensæ impositum diductis ab alio natibus jussit fortes nixus velut ad desidendum edere, queis tubera magis tendebantur. Maximæ illarum primum incisæ tunicæ $\frac{1}{2}$ pollicem crassæ erant, cavumque tam capax, ut digitum indicem commode admiserit; unde elapso plurimo sanguine atro, spissoque eavum collapsum est. Quo factō tunicæ utrinque forcice ablata. Idem etiam cum reliquis duobus factum. Abhinc ocyus nova duo tubera ex ano erupere, quorum majus juglandem nucem æquabat: hæc quoque eadem methodo ablata. Omnis hæmorrhagia vix ℥viij erat. Externe igitur admota Splenia ∇ a frigida imbuta; interne datæ doses aliquot \ominus GLAUBERI. Operatio vesperi peracta, noctu placidum attulit somnum, alvusque sponte soluta est. Postero mane injectio ∇ æ frigidæ in anum imperata, & vulneribus admotum ope penicilli & linteo

car-

(a) L. c. p. 109, sq.

capto unguentum lithargyr. illa intra aliquot dies perſanavit. Modum hunc varices hæmorrhoidum internarum excindendi jam multo ante docuerat H. F. LEDRAN (a) conſultus pro viro, cui ultra ſemestre jam interna recti inteſtini tunica ex ano egreſſa formabat fimbriam circularem (ſarciminofam) 2 pollicum, ultra quam ſuſſum 6 tubercula hæmorrhoidalia, acinos paſſularum æquantia, ſedebant obdurata, margine ani admodum ſimul relaxato: ut idcirco æger elapſam partem ſine difficultate reponere poſſet, perinde facile iterum elapſuram, dolor quidem aberat; ſed ob quotidianum partis exeuntis incrementum æger multum inde moleſtiæ perſerebat. Reſpondit Auctor, poſt præmiſſam aliquot dierum diætam non nimis ſeveram & unum alterumve catharticum tubercula aliud ex alio eſſe excindenda proxime tunicam internam inteſtini, cui infidebant, ſat illæſa illa fimbria; hæmorrhagiam etſi levem cohibendam eſſe turunda a linteo carpto, magna, in aquam ſtypticam intincta, denuoque expreſſa, vulnere impoſita, & ſub ipſa elapſæ partis repositione ſimul in anum intruſa, filo tamen extra anum pendulo firmata, ut educi queat, nec ſeſe altius ad inteſtina recipiat. Orituram a ſtyptica aqua levillimam in vulneribus cruſtam, quæ appli-

(a) Chirurgiſche Gutachten p. 188. ſqq.

plicatis ope laxae ex linteo carpto turundae vulgaribus digestivis brevi secessura sit. Fore etiam, ut a suppuratione tumida interna tunica, ante operationem irritata, dejectionis tempore aliquid patiat. Si fimbria non illico post operationem tota reduci posset, reductum iri indubie 2do vel 3tio post deligationem die. Post octidui per digestiva suppurationem injectiones in anum vulnerarias m. & v. imperavit. Ut autem interna tunica relaxata sensim iterum pristinum situm, tonumque recuperet, opus esse quiete in lecto minimum in 3 hebdomadas; quod sub horizontali situ intestinum rectum se ipsum non premat, humoresque liberius fluant, quem situm etiam anus imus relaxatus exposceret. Porro quo certius tonum hunc tunica recipiat, m. & v. injectiones stypticas praescripsit, ut simul iis collecta sex molliatur, dum interea cibi liquidi tantum concessi collectionem illius praepediunt. Tandem subdit Auctor se hujus methodi efficaciam experientia didicisse. Consulebatur etiam (a) pro alio viro 40 annorum a longo tempore haemorrhoidibus abnoxio, quae nunquam alias, nisi sub dejectione duris a scybalis compressae, sanguinem fundebant, sub alvix nixibus foras semper protrusae, posteaque vix intra horam intro sese recipientes. Malum hoc in dies ingravescibat. Erant autem 5 varices cerasa aequantes, internae recti tunicae

(a) Ibidem p. 192. sq.

nicae sat ampla basi, firmiterque inhaerentes; his aliae 6 acinis passularum aequales erant intermistae: omnes autem simul sumtae magnitudine pomum mediocre exaequabant, cinctae plica ex interna tunica coronae in formam redacta. Aeger cetera sanus. Huic quoque reposuit Auctor, nullam hic aliam medelam profuturam praeter omnium varicum excisionem priore in casu cum adnexa curatione descriptam. Cum autem inter excindendum indubie aliquae varices futurae essent, e quibus ab arteria illuc eunte sanguis profiliat, ocysus splenium ∇ æ RABELLII intinctum, digitoque per $\frac{1}{2}$ horam appressum firmiter teneri iussit; ceteris vero tantummodo stillantibus turundam magnam e linteo carpto aquae lenius adstringenti intinctam, rursusque expressam imponi, & quoad ejus fieri posset, omnia iterum reponi iussit; licet saepe nonnisi pars posset reponi. Post mediam horam omnia iterum eximi posse, solamque turundam (ut in priori casu) adhiberi. Non obstante cautela hac perdi aliquid sanguinis, qui in rectum intestinum redit; casus enim sibi obtigisse, ubi aeger ad 3 vascula pro Væ Sæe adhiberi solita sanguinis amisit, postquam aborti borborygmi eum ad desidendum urtissent. Hoc in casu omnem deligationem secedere, omniaque simul auo exire, novaque proinde turunda ut ante indita oriri crustam, quae haemorrhagiam sistat. His factis ulteriorem curationem uti priori in casu fieri. Hisce jam universim expensis non usque adeo videtur necessaria

cautela, quam GOULARD (a) simili in operatione inculcat. Meminit ille theologi internas haemorrhoides passi, quae sub quavis dejectione foras protrusae plurimum ei molestiae cum in egressu tum in reditu in anum facescebant, donec urgente malo operationi se subjecit. Auctor voluminosissimam molem haemorrhoidum foras egressarum ac manu prehenfarum aliquanto plus quam dimidiam excidit, intactis reliquis, quod ab experientia certum esset, ablatis simul ac semel in toto ani ambitu varicibus cicatricem perarctam, curatuque difficilem stercorei iter velut strangulatu praecludere, id quod saepius ipse observasset: contra ea nihil ab relictis varicibus integris metuendum esse; ut quae sanguine sponte evacuato flaccescant, quo facilius evadit & deligatio & immissio turundae factae compluribus e laciniis lineis, fasciae decussatae super vulneratis partibus affixis. Finita operatione deligatus aeger bihorio inde post adeo ad desidendum urgebatur, ut apparatus fuerit demendus, & haemorrhagia supervenerit, periculosa futura, nisi Auctor adveniens eam compescuisset; sed abhinc rite deligatus aeger sensim convaleuit. Plurisne est cautela HIPPOCRATIS (b)

varices

(a) *Traité sur les Effets des Préparations de Plomb &c.* T. I. Chap. 10. p. 227. sqq.

(b) *L. de hæmorrhoidib.* Opp. FOES T. I. p. 892. sq.

varices id genus non radicatus usque exscindi, sed extrema tantum illarum praecidi iubentis? „Foras educta quam maxime sedes „(inquit ille) calida perfunditur, tum venarum sanguinem fundentium extrema praeciduntur. Hoc vero medicamentum antea praeparatum ad sectionem habere oportet: „urina in vas aeneum immissa, flos æris „ustus optime laevigatus inspergitur, tum „vas agitato maceratur, & in sole siccatur; „siccatum eraditur, teritur, & laevigatur; „ano admovetur; spongiaque superimposita „deligatur.“ Perfundit nempe anum aqua calida, ut dolorem leniat; praecisis varicibus pharmacum applicat valide siccans, & subadstringens, quod & vasa contrahit, & haemorrhagiam cohibet: Oleum denique ad leniendum valet dolorem, & inflammationem prohibendam. Spongia omnia in situ retinet. Atque haec de ferro haemorrhoidibus admovendo.

6. CXVIII.

c) *Vicaria ferri, hirudinum* in aegris utrumque horrentibus est varicum *friçtio* rebus asperis, vel *Compunctio* rebus aculeatis peracta; imo ambo haec in eo videntur convenire, quod minimum tantum hiatus puncti instar in varice efficiant citra insignis inde haemorrhagiae discrimen, ut ex HÜNERTRNA Hist. Hæm. Vol. II. P. VOL-

WOLFFII (a) casu æstimari potest. Compunctioni autem faciendæ optime deserviunt vel hystricis Americanæ aculei, vel hamulosum dysfaci pericarpium, de quo M. A. SEVERINUS (b) „Sic ubi scalprum (ait) asperius videtur (præsertim pueris, mulieribus, uno verbo molli huic toti generi); tum omisso ferro capietur hamulosum pericarpium dysfaci cardui illius, quem vulgo nominant „Cardo, Septembri mense collectum. . . ad illud globuli plumbi frustulum accommodabis, quo certius impelli possit; sic particulam ferres humore, quanto sit opus, exhausto. Tuto autem modicam hanc rem inferri testificatus experimento fuit Rev. sacerdos A. LOMBARDUS, qui non alio sane modo multis abhinc annis turgentium hæmorrhoidum dolorem sibi ipse lenire consuevit.“ Ad frictionem autem varicum, qua tunicæ illarum extenuari sensim usque ad crepaturam possint, vel maxime idoneæ sunt res planæ, & aspera superficie præditæ, cujusmodi præsertim est *charta bibula* rudior, quam A. STÖRCKIUS (c) consuluit, vel *panni asperi*, vel *folia ficus*, &c. Interea tamen ante similibus applicationem monente P. FO-

RESTO

(a) Vide §. præced. β)

(b) L. c.

(c) Medic. præst. Unterricht. 2. Th. p. 29.

RESTO (a) hæmorrhoidum varices erunt „prius „emolliendæ balneis, unctionibus, empla- „stris emollientibus, & ita molliores reddi- „tæ aperiendæ frictione aspera . . . foliis „ficum.“ &c. Sed & id cavendum, ne in varicibus inflammatis, aut nimium dolenti- bus frictio fiat; quippe quæ utrumque hoc symptoma exacerbet, ut id expertus est FROM- MANNI (b) æger.

CAPUT II.

E N E M A T A.

B A L A N I.

§. LXXIX.

II. **E**NEMATA amplissimi in hæmorrhoidali- bus malis usus alterum sibi a sanguinis missio- ne locum vindicant, eaque pro varietate indi- cationis varia indole prædita: hinc

I. *Emollientia* aquosa, mucilaginosa, oleosa adhibenda, ubi sicca intestina hume- ctanda vel spasmō constricta relaxanda, dolo-
res

(a) L. c. Schol. ad Obs. 6.

(b) Vide §. 117. β).

res leniendi, fex dura mollienda, & lubri-
canda. &c. Recte utique observat LUDWIG
(a), in cœcis hæmorrhoidibus non tam ad
plethoram quam siccitatem intestinorum, ac
fecum esse attendendum; siquidem cum ob
languentem vel vitiosam hæmatopoiesin, len-
tor in sanguine nascatur, vel pituitosus vel
sæpissime atrabiliaris ad secretiones ineptus,
minus ibidem secernatur humorum intestina hu-
mectantium ac lubricantium, fecemque mol-
lem servantium: quapropter & intestina &
scybalia sicciora facta venas premendo causa-
bunt hæmorrhoides. Unde (b) in „corri-
„genda siccitate intestini recti tanquam pri-
„marii symptomatis initium faciendum est.
„Quæ medendi ratio etsi palliativa est, viam
„tamen pandit ad reliquas indicationes rectius
„exsequendas. Efficitur vero humectatio cly-
„smatibus, iisque reiteratis; quoniam primæ
„injectiones ut plurimum magis lædunt; quam
„juvant. Sed si saburra intestinorum crasso-
„rum his quodam modo mora & emollita est,
„facile succedit alvi ductio per leniora Θna,
„& mannata, quæ antea purgantibus fortiori-
„bus & resinosis effici non poterat.“ Multum
huic methodo MORGAGNI (c) tribuit: „quod
„si . . . æquo durior (inquit ille) esse alvus
„per-

(a) L. c. p. 393.

(b) Ibidem p. 395.

(c) L. c. Nro. 11.

„pergat, neque usus crebrior adjuvet molli-
 „entium ciborum, nulli alii subsidium il-
 „lud postpones, ne hæmorrhoides ob nixus
 „oriantur, quo claros medicos uti video, ne
 „ortæ, sint adeo inter nitendum molestæ.
 „Injiciunt hi ante dejectionem unciam lenis
 „cujuspiam olei, inprimisque seminum lini:
 „quo nos quoque cum duriora recrementa
 „mollienda sunt, imumque intestinum lubri-
 „candum, sæpe uti, ac feliciter consuevimus
 „eodem fere pondere, aut certe non multo
 „majori, ne continuo refluat, imo ut diu-
 „tius retineatur; quamquam sic olivarum
 „quoque oleum interdum præscripsimus ab eo
 „usque tempore, quo narrabat RAMAZZI-
 „NUS, in puerpera matrona 7 jam dies nil
 „dejiciente, cum multa, ac varia nihil pro-
 „ficerent, rediisse in memoriam, quod le-
 „gisse dicebat (si recte memini) apud M. RU-
 „LANDUM, ut binas horas singulis uncias com-
 „munis olei injiciendas curaret, eaque ratio-
 „ne alvum solvisse.“ Quantum porro etiam
 enemata mollissima ad pacandos ab hæmo-
 rrhoidibus cœcis dolores valeant, documento
 est observatio D. GRÜGERI (a) de viro into-
 lerabilem intestini recti dolorem ex hæmo-
 rrhoidibus passo, nullis expugnandum reme-
 diis, donec tandem injecto enemate ex de-
 cocti malvæ $\frac{16j}{\text{ss}}$, & olei popul. Auguttan.
 $\frac{3v}{\text{ss}}$.

(a) Misc. nat. cur., dec. 3. ann. 2. Obs. 197.

§v. non levamen modo; sed demum etiam hæmorrhoidum ulcerosarum sanatio est obtenta. Plurimum quoque id genus enemata conferunt ad immodicum hæmorrhoidum fluxum ex acrimonia vel nimia irritabilitate ortum compescendum. DE LA METRIE (a) narrat hypochondriacum laborasse obstructione hepatis, crurum oedemate, tantoque hæmorrhoidum fluxu, ut quotidie fere ea copia sanguinem, qua Væ Sne demi solet, egesse-rit: unde admodum debilitabatur. Facta igitur Væ Sne insistebatur usui enematum ex lacte asinino, queis hæmorrhagia sensim cohibebatur. Tandem deventum ad potum aquarum mineralium s. JOANNIS (vicus est a s. MALO leucam distans), & demum ad equitationem diutinam. His præsiidiis ad pristinam rediit valetudinem.

2. *Anodyna* etiam quandoque acri dolori urgenti sunt opponenda, in queis præter emollientia jam dicta etiam lenissima nervos pacantia locum habent; cujusmodi vel maxime sunt olea illa infusa cum herbis antispasmodicis chamomilla, viola, &c. Sic apud R. DONAKUM (b) „viro cuidam cœcæ, ac inter-
„næ hæmorrhoides molestæ erant. Medicus
„enemata adhibuerat, quibus salem, & hie-
ram

(a) L. c. Obs. 36. p. 104,

(b) Obs. med. Cap. 50.

„ram picram admiscuerat: hinc dolor, & inflammatio adeo intensa, ut non minus; quam hæmorrhoidum labor, urinæ quoque molestum esset stillicidium, & cui prius remedium adhibendum, foret, in deliberationem caderet. Huic autem mox olei violacei uncia, in anum injecta benefecit, dolore primum hæmorrhoidum, deinde & vesicæ levato. Eodem vero postea aliquoties imposito omnis dolor cito conquievit.“

3. *Eccoproctica* vero cum emollientibus injecta, quod non feces modo educant, sed & vasa infarcta aliquatenus depleant, gravissimos sæpe dolores sedant, cujus rei exemplum præbet E. GOCKELIUS (a); puerpera 30 annis major, a laborioso partu nacta est hæmorrhoidalem varicem fabæ; vel avellanæ magnitudine, inflammata cum tanto dolore, ut præ illo anxia vix spirans in lecto sese huc illuc volutarit. Lochia varii erant coloris. Imperata ergo idonea diæta; sequens parti dolenti admotum remedium:

℞. Unqu. de linar. ʒj.
 — liquirit. ʒβ.
 Olei Mastichin.
 — ovor. ʒa ʒjβ. M.

Hocce

(a) Gallicin. med. præct. Cent. 1. Consil. 8.
 P. 32.

Hocce non satis levante adhibitum aliud :

℞. Unqu. infrigid. GALEN.
— de litharg. ℞ ℥ss.
Olei ovor. ℥j. M.

Ano, intra quem maximus erat dolor; indita turunda ex gossypio oleo ovor. calido intincta, desuperque unguentum anodynum super linteolis applicatum. Sed nec his ex toto juvantibus injectum demum enema :

℞. Lactis vaccini ℥vj.
Sacchari Thomæi
Mell. rosar. solut. ℞ ℥jss.
Vitell. ovor. No ij. M. F. clyσμα.

Hoc protinus dolorem, & inflammationem sustulit, & revertentem 3ta abhinc die dolorem rursus abegit. In prophylaxim, indicante præsertim lotio crasso, ac turbido, borborygmisque torminosis, deinceps datum eccoproticum :

℞. Fol. Senn. Alex. S. S. ℥ij.
Crem Qri
Rhei elect. ℞ ℥ss.
▽æ ceras. nigr. ℥iij. Post lenem ebull.
in colat. dissolve
Mannæ Calabr. granulat. ℥jss. F.
potio.

Sexies inde , facileque dejecit cum totius corporis alleviatione , morbusque omnis inde conquievit.

4. *Tonica* enemata ex roborantibus , & adstringentibus parata , ubi laxitas intestini recti varices vel fluxum causat, fovetque summi, sæpe sunt usus , & nimio in fluxu compescendo quantum possint , cum CORNARI (a) æger est expertus , tum etiam H. SMETII (b) calus testatur : „viro nobili quadragenario a multis „difficilibus , longisque morbis restituto nuper admodum copiosus ab alvo sanguis fluebat, ut intra secundum diem 6 ~~lb~~ ponderales adæquaret Revulsionem frictione, „atque ligatura brachiorum fieri jubeo una cum „rerum adstringentium per superiora sumtione. „Postridie ad ægrum accersitus circumstantiis examinatis hæmorrhoidem balani ex concreto melle suppositi usu in recto intestino „reclusam deprehendo. Sanguis enim sincerus , incontaminatus , grumosus , flavescens „(non nigricans , qualis ab ani venis prodire „solet) frequentissime excernebatur , ut „siqui die plures quam 30 puri sanguinis excretiones decederent ; quin etiam tandem syncope cum vomitu multo corripiebat. Deprehenso loco affecto medicamentum emplasticum

(a) Vide §. 95.^od).

(b) Miscell. med. L. 4. Epistol. 9. p. 222.

„cum cum adstrictione modica injici manda-
 „bam, lenissime tamen, ne intestinum rectum
 „præterveheretur. Quo facto suavissime to-
 „tam noctem quiescebat æger, nulla excre-
 „tione sollicitatus. Postridie reddebat infu-
 „sum cum fecibus compactis nulla sanguinis
 „nota apparente, surgebat, ambulabat, redi-
 „bat ad consueta munia.“ Perinde P. SPIND-
 LERI (a) figulus post enormem aliquot heb-
 domadum dolorem lumbarem, incidit in co-
 licam cum insigni, continuoque vomitu. His
 sumta aqua laxativa remittentibus successit
 fluxus ex alvo sanguinis floridissimi tantus,
 ut per 24 horas ultra **12** ad 14 egresserit,
 præcedente quamlibet dejectionem tolerabili
 colica, moxque iterum cessante. Juncta erat
 febris cum pulsu celeri & primis fluxus horis
 satis vehementi, dein vires omnino proster-
 nebantur. Facta initio Væ So, injectæ liga-
 turæ, victus imperatus refrigerans & adstrin-
 gens, data medicamenta in dysenteriiis, &
 hæmorrhagiis probatissima; etiam narcotica;
 sed omnia incassum: donec unica vice injectus
 clyster A. SALAE in dysenteria decantatus cum
 consolidæ majoris radice præparatus fluxum
 velut incantamento stitisset. Sine ullo alio
 remedio æger convaluit, nunquam deinceps
 simile quid passus. Haud minor est enematum
 tonicorum necessitas post saccatarum hæmo-
 rrhoi-

rhoidum excisionem ad venas constringendas, recidivasque præcavendas; atque hocce in casu nil efficacius est injectione aquæ frigidæ.

1. L. SCHMUCKER (a) post faccatas varices dicto modo depletas injici jussit „si illæ intra „anum latebant, jamque collapsæ sunt, quotidie m. & v. enema ∇ æ perfrigidæ; sic „etiam atonæ partes iterum contrahuntur, „ardor sub dejectione evanescit; circulatio „hisce in partibus denuo rite procedit, & „recidivæ ita præcaventur. Hunc in finem „serviet stannea Syrinx, circiter vasculi chocoladæ capax. Multi simili in statu meum „(ait) secuti consilium ex injecta in anum „quotidie semel aut bis hac aquæ quantitate „optime sese habent; imo complures adstri- „ctam assiduo alvum (symptoma hypochondriæ „acis vel maxime, ac hysterice familiare) ex- „perti etiam ab hac liberati alvum rite, & „sine molestia excernunt.“ Plurimum sane ab his enematibus illius magnas (b) est lucratus.

§. *Acria* denique etiam enemata interdum locum habent, inprimis ubi suppressus hæmorrhoidum fluxus est revocandus. Ita 1.

§.

(a) L. c. p. 108. fq.

(b) Vide §. 117. §).

S. ALBRECHTI (a) „vidua sexagenaria phlegmone utriusque femoris afficiebatur, ex qua asthmatica fiebat, utpote cui affectui, alias erat obnoxia; asthma autem post infectum tumorem oedematofum utriusque pedis mitigabatur, quo discusso dyspnoea rediit, hocque modo unus affectus alterum, aliquoties alternatim excepit tandiu, donec hæmorrhoides copiose quidem, ast dolorose fluentes erumperent; a quibus postea melius se habere cœpit, qualem eruptionem clysterum acriorum usus multum juvabat.“ Haud segnius F. HOFFMANNI (b) viduæ 50 annum egressæ ob lautam, otiosamque vitam obesæ, humorumque plenæ ante 8 annos cum catameniiis hæmorrhoides etiam fluxere. Inde cum semel tantum, ex quo menses prorsus desiere, venam secuisset, diu jam lassam, languidamque se sentiens tandem circa æquinoctium autumnale in grave incidit coma cum omnium sensuum abolitione nulla inde arte excitanda, donec post phlebotomiam in pede copiosus fontanæ frigidæ potus quavis hora ad aliquot uncias datus fuisset. Exhaustis sic intra biduum 5 vel 6 ejus mensuris post injectum enema stimulans ingens vis sanguinis crassi primum, dein tenuioris alvo exiit,

(a) *Commerc. Nor. T. 7. A. 1737. hebdom. 44. P. 347.*

(b) *L. c. T. 4. P. 2. S. I. C. 4. Obs. 6.*

it, ut intra 24 horas plus quam 5 mensuræ profluxerint. Ex eo illico ad se rediit ægra, sopor discussus, collectæ pedetentim vires, datisque analeptics leniter adstringentibus, injecto etiam clysmate ex pura aqua frigida, pauca tamen, belle convaluit.

§. CXX.

Cautelæ tamen in clysmatum administratione aliquæ interdum tenendæ sunt, nempe ubi tantummodo ratione intestini recti affecti injiciuntur, opera danda est, ut non isto prætervecto altius in tubum intestinale perveniant; sed intra rectum subsistant, & ut quam diutissime ibidem morentur. Quocirca

1. *Injectio lenissima* instituatur; ne fluidum concitatus immisum ultra intestinum rectum altius provehatur. Sollicite id observatum fuit in viro SMETII (a).

2. *Copia* liquidi esto parva, ne pondere suo alvum cieat. Uncia olei satis visa est MORGAGNIO (b), suffecitque DODONÆI (c) viro,

(a) Vide §. præced. Nro. 4.

(b) Ibidem Nro. 1.

(c) Ibidem Nro. 2.

viro, aquæ non plus injectit SCHMUCKER (a), quam quantum chocoladæ capit vasculum.

3. *Irritatio ani a fistula clysteris sollicitè cavenda est præsentè inflammatione, & acerrimo dolore cum tumore anum omnino præstruente; facile enim gangræna inde letalis consequitur. Sic apud ZACUTUM (b) „cuidam „ex cæcis hæmorrhoidibus laboranti, cum „præ illarum tumore anus esset clausus, & „multis diebus . . . non dejiceret, injecto a „quodam inscio clystere ita hæmorrhoidales „venæ sunt dilaceratæ, ut ob dolorem, & „affluxum humorum tota inflammata parte „sphacelata . . . biduo vitam cum morte „commutaverit.“ Perinde referente in PE-REISKII vita GASSENDO (c) hoc ipsum infortunium magno isti litteratorum mæcenati eadem ex causa accidit.*

§. CXXI.

BALANI enematum vicarii sunt: proinde ejusdem quoque indolis sint oportet, nimirum vel emollientes, vel anodynæ, vel eccoprotici, vel tonici, vel acres stimulantés, prout

(a) Ibidem Nro. 4.

(b) Prax. med. admirab. L. 3. Obs. 137.

(c) Lib. 4. p. 158.

prout hos, vel illos necessitas exegerit. Emollientes & anodynæ ex sebo vel butyro frigore durato optime parantur, præsertim vero *butyrum cacao* mire se hic commendat: hinc I. C. STUNZER (a) ad hæmorrhoidales dolores, & ardores compescendos non abs re commendat balanum ex butyro cacao m. & v. indendum. AMATI (b) Romana uteri prolapsum, & hæmorrhoidum dolorem passa, post frustra adhibita remedia selecta demum balano e sebo hircino cum opio indito dolorem fugavit, quin amplius reversus fuerit, præsertim subjuncto ad partem affectam fotu calido roborante. Si vero acribus pro fluxu suppresso revocando sit opus, varia scopo hoc adhiberi possunt: „quidam, inquit FROM-
 „MANNUS (c), alumine suppositorii loco so-
 „lum usurpato fluxum concitarunt; idem
 „præstat radix ireos recens, vel raphani,
 „vel betæ, vel brassicæ in formam supposi-
 „torii secta, molliore aut lana aut bombacis
 „foculo circumducta, atque intincta in felle,
 „vel si acrimonia metuatur, in oleo irino,
 „& subdita. Radix quoque cyclaminis re-
 „cens, item cœpæ vel allii bulbus detracto
 „cortice externo intrusus idem efficit. Ex
 „sapone

(a) L. c. p. 78.

(b) L. c. Cent. 2. curat. 91.

(c) L. c. P. 3. Probl. 31. Nro. 4. p. 403.

„sapone albo recenter parari etiam potest
 „glans, oleoque irino tincta ano immitti.
 „Vel

℞. Mellis q. s. coqu. & inter coquendum
 adde

Aloes opt. ℥ij.

Hellebori. nigr. pulv. ℥ss.

Succi mercurial. parum.

„F. l. a. suppositorium. Vel

℞. Amygdalar. amar. ℥ij.

Pulpæ colocynthid.

Folior. rutæ āā ℥j.

Croci ʒss. Cum

Medulla cervi, & exigua

Bdellii in vino dissoluti aut

Myrrhæ quantitate fiant glandes

„oblongæ, immittantur.“ Tenendum au-
 tem apprime, balanos & enemata haud ita
 per omnia inter se convenire, ut sine discri-
 mine unum alteri suffici possit; enimvero
 est, ubi balani melius in rem quadrent;
 alias vero enema.

CAPUT III.

T O P I C A.

§. CXXII.

III. **T**OPICA etiam remedia, quoniam manibus accessus affectam ad partem datur, utilissime sæpenumero forma fumi, vaporis, litus, fots, turundæ, cerati, &c. adhibentur, præprimis vero ad hæmorrhoides aut sine fluxu tumentes, aut fluentes etiam. Cum autem varius hæmorrhoidum in tumorem elevatarum status esse possit; ita ut tumor vel recens, criticus, symptomaticusve, & indolens aut dolorificus, præsertim ex inflammatione, sit, vel pus collegerit, vel in gangrænam degenerarit, &c. satis intelligitur, topica quoque pro vario id genus statu varia esse oportere. Ex innumerabili prope eorundem serie probatissima tantum & in suas quæque redacta classes hic referam, ne reliqua faragine vel paginas inutiliter impleam, vel memoriam tironum obruam. Ac primum quidam occurrunt,

§. CXXIII.

A. *Emollientia*, quæ exigit cæcarum immanis dolor, vel inflammatio, vel suppurationo occipiens, vel ubi fluxum obtinere satagimus;

gimus, ut ab iis laxata magis ani vasa plus recipiant sanguinis, & ab eo facilius crepent, &c. Indolentibus tamen ac præsertim inflammatis id de emollientibus notabis, addenda semper illis esse lenia vel anodyna, vel discutientia, & haud diu eorundem usui esse insistendum; ne secus aut laxitas vasorum ani morbum fovens adaugeatur, aut etiam inflammatio in suppurationem abeat, indeque ulcera ani fistulosa oriantur. Recte idcirco experti monent Practici, ut remittentibus dolore, tumore, rubore, febre, &c. ocyus discutientia in locum emollientium sufficiantur. Emollientia porro triplicis fere sunt generis, videlicet:

§. CXXIV.

1. *Aquosa* tepida, quæ hic forma fatus, aut vaporis applicantur. Sic I. WEISZII (a) „hæmorrhoidarius juvenis tinctior tussi sub-
„peripneumonica afficitur, quam una Væ So,
„nitrosum emulsum, ac dein MRa stibiata
„oxymellita facile sanarunt. Post $\frac{1}{2}$ annum
„tussis cum pectoris oppressione pejor redit,
„hæmorrhoides tument, arte benignæ na-
„turæ alvus simul fluit. Vapores emolli-
„entes, balnea pedum, infusum emolliens &
„purgans salinum . . . hæmorrhoides aperi-
„unt,

(a) L. c. p. 19. fq.

unt; fluunt hæ, & mala pectoris evanescent.“
 I. P. LOTICHII (a) juvenis eruditus immenso
 ex intervallis hæmorrhoidum dolori obnoxius
 levamen sæpe obtinuit a fumo, vel calore
 candentium prunarum ad anum admissio. Re-
 verso aliquando acerbo hoc dolore consultus
 Auctor, cum materia flueret, neque con-
 dytomata adessent, primo hoc linimentum
 suavit;

R. Olei rosar. ʒijß.

Mucilag. sem. cydon.

— — psyll. Aqua plantag. extr. aa ʒijß.

Lap. calamin. cum ▽a ros. triti.

Pingued. gallin. aa ʒß.

Vitell. ovor. No ij. Ponantur in Mor-
 tario plumbeo per 3. horas, sub sole. M. F.
 linimentum. Applicetur cum lana carpta vel
 penicillo calide instar suppositorii. Hoc vero
 nihil juvante, jussus est decocti e fol. ac flor.
 verbasci vaporem fervidum ano excipere,
 Quo per 2 vel 3 dies factitatio omnis dolor
 conquievit. Simillimus huic est. v. RIEDLINI
 (b) casus de viro 60 annis majore, rarissime
 ægrotante, itineribus dedito, nuperque hæ-
 morrhoidum nato fluxum cum tanto dolore,
 ut incedere non posset. Cum pingua adhi-
 bita cruciatus potius auxissent, hisque surro-
 gata

(a) Obs. med. L. 4. C. 10. Obs. 2, p. 430.

(a) Curar. medicar. millenar. Obs. 51.

gata mucilago sem. cydon. nil opis tulisset, demum vapores aquæ calidæ herbis idoneis alteratæ ano admissi dolorem profligarunt.

§. CXXV.

2. *Mucilagines cydoniorum*, psyllii, &c. ad quas & fots plantarum emollientium, althææ, saleb, &c. mucilaginis plurimum continentium sunt referendi, quæ gravissimi sæpe cruciatus pulcherrime mitigantur. V. RIEDLINUS (a) „præter interna . . . mucilaginem „ex semine psyllii vel cydoniorum cum aqua „vel conveniente, vel etiam simplici paratam „sæpius jam dolorem, si non penitus abegisse, „plurimum tamen leniisse expertus est, si nimirum vel cum linteo subtili applicata vel „per syphonem injecta fuit.“ Multi his mucilagibus alia simul coindicata, ut deinceps passim visuri sumus, jungere assolent. I. B. MORGAGNIUS (b) „ALBERTINUM vidit tum „mentium hæmorrhoidum cruciatus in Procere quodam lenire admotis cucurbitarum interaneis aut injecta aqua, in qua hæc fuerant decocta. A Procere autem altero . . . „accepit, ipsi quidem in harum doloribus ita „prodesse linteola subinde admota, quæ maderent tepida, in qua lini semina & concisæ

(a) Lin. med. ann. 1. April. 4ta. p. 96.

(b) L. c. Nro. 12.

„cisæ radices althææ decocta essent ad tertias, ut cruciatus non modo sedarent, verum etiam si statim, atque hi inciperent, admoventur, increcere hæmorrhoidum tumorem non sinerent, nec (quod consequitur) disrumpi, & sanguinis profluvium fieri.“ Perinde Vratislavienses medici (a) „folia (inquunt) verbasci in lacte cocta, & calide applicata sæpe sola nobis suffecerunt.“ Formulæ huc facientes sparsim in consequentibus (b) occurrent numerosæ.

§. CXXVI.

3. *Pinguia* denique, ut *Axungia*, seba, butyra, olea pressa, blanda, maximi hic sunt usus, idque vel sola, vel (quod usitatissimum) lenibus solventibus, discutientibusve remixta, atque in formam litus redacta.

a) *Axungia* hic laudari solitæ sunt

α, *Canina*. MORGAGNIUS (c) ex femina „remedium adhiberi audivit, quæ tumentibus „hæmorrhoidibus a longo jam tempore vexabatur, quas . . . cum ostendisset, ipse autem „tem

(a) Histor. morbor. Vratisl. A. 1702. p. m. 376.

(b) Vide §. 131.

(c) L. c.

„tem quærerem (ait), qua ratione tumentes
 „adeo reponere sine intolerabili molestia pos-
 „set? continuo respondit, se multa & varia
 „expertam nihil utilius invenisse pinguedine,
 „quæ circa renes sit canis rufi: ea igitur rite
 „præparata inungere se egressas inter dejici-
 „endum hæmorrhoides, eaque ratione aut
 „sine dolore, aut certe cum multo leviore
 „jam diu reponere, ex quo ab aliis, qui pe-
 „riculum ante fecerant, id secum pro arcano
 „fuerat communicatum.“ Sed nil specifici
 opinor axungia canis, etiam rufi, vel circa
 renes collectæ inesse; quandoquidem alio-
 rum etiam animalium axungia idem præ-
 stant, ut

β. *Caprilla*. P. FORESTUS (a) commen-
 dat sequens cataplasma:

R. Medullæ panis ℥ij. coque in
 Lactis ℥ij ad consumpt. $\frac{2}{3}$. Adde
 Axung. renalis caprillæ ʒij.
 ♂. verm. terrestr. ʒj. M. & ano
 calide applica.

γ. *Suilla* sed vel cum tabacco, vel cum
 colcothari vel cum ☿o vivo remixta. „Inter
 „præstantiora resolventia, & anodyna prima-
 „tum sane ducit *unguentum Neapolitanum*
 „in-

„inquit I. LIEBTAUD (a), quod omnium aliorum topicorum vices explere multiplex experientia edocti afferere minime dubitamus.“ Perinde de aliis inferius videbimus.

b) *Butyra* quoque raro simplicia sed plerumque aliorum corporum viribus acuta hic in usum vocari solent. Inter hæc

a. *Cacao Butyrum* princeps est remedium, & omni sæpe pretio majus, quod non ano solum sed perinæo quoque aut offi sacro illitum dolores actutum sopire solet, id quod in pluribus jam sum expertus.

β. *Unguentum terreum* ex butyro cum terra aliqua subacto paratum, quale est. I. DOLAEI (b): „ad dolorem (inquit ille) & ardorem compescendum, & fluxum immoderatum lente sistendum instar arcani medicis junioribus . . . commendo vile sed proficuum hoc remedium :

Rx. Alcohol lapid. scissil. q. v. Cum

Butyro non salito parat.

„& ano applicat.“ D. NEBEL (c) „lubet . . .
„pau-

(a) L. c. p. m. 393.

(b) Encyclop. med. L. 3. C. 10. §. 19. P. m. 291.

(c) Misc. nat. eur. dec. 3. ann. 3. Obs. 162.

„paucis hic meminisse (ait) illius euporisti,
 „quod quidam meorum amicorum non saltem
 „in se ipso; sed etiam in . . . Principe CA-
 „ROLO LUDOVICO Electore quondam Pala-
 „tino, ut & nuperrime in summo quodam
 „viro (prætereo jam alios) saluberrimum ex-
 „pertus est . . . Componitur *ex gypsi pol-
 „line cum butyro cancrino* subacto, quo ca-
 „lesacto, tumentes ani venæ leniter foven-
 „tur, dolore sic confestim cessante.“ Usus
 est hoc ipso remedio PAULLINI (a) etiam æger
 non sine optato successu. Analogum hisce
 est, quod narrat I. H. VELSCHIUS (b): „hæ-
 „morrhoidum dolor cum tumore, fluxuque
 „sanguinis, interdum & cum prolapsu ani,
 „perquam molestus a nobis in pluribus tam
 „viris quam feminis (maxime a partu) facili
 „hoc remedio curatus est, quod arcani loco
 „habebatur:“

℞. Cretæ nigræ Colonienfis

Lap. thermar. Grumbacens. ℞ā ʒij.

Tutiæ ppt. ʒj. In pollin. redacta cum

Oleo periclymeni M.

γ. Unguentum de loto, de quo I. G.
 PREBISIUS (c): „Consul . . . hæmorrhoidi-
 „bus

(a) Vide seq. c) γ.

(b) Obs. phys. med. hecatost. 2. Obs. 41.

(c) Act. nat. cur. Vol. 1. Obs. 153. p. 326.

„bus cœcis laborabat; chirurgus ejus furem
 „tem dolorem non poterat sedare: hinc jussi
 „lotum cum butyro frigare, postmodum ex-
 „primere, cum vitello ovorum miscere, &
 „exceptum linteo carpto dolenti loco appli-
 „care, quo modo dolor subito fuit ab-
 „latus.“

δ. *Unguentum de nummularia.* Hujus
 remedii virtutem anonymus quidam apud L.
 RIVERIUM (a) sequenti commendat historia:
 „quidam insulanus . . . vehementi hæmo-
 „rrhoidum dolore torquebatur, qui nullis ano-
 „dynis præscribi solitis cedebat, nimirum fo-
 „tibus ex malva, herba hæmorrhoidali, flori-
 „bus tapfi barbati, chamomæli, neque un-
 „guentis ex butyro, adipe recentis anseris,
 „gallinæ, oleo de semine lini, atque hujusce
 „farinæ aliis sexcentis: quapropter dejecta
 „appetentia, vigiliæ, vires prostratæ subse-
 „cutæ fuerant. Sed neque mucro fistulæ, per
 „quam clysteres injiciuntur, in anum intro-
 „mitti poterat, adeo venæ illæ hæmorrhoida-
 „les propingua loca tumefecerant! Quæ causa
 „fuit, cur alvus nullas feces spatio 8 dierum
 „excreverit, quamvis cassiam recentem æger
 „bis devorasset. Tandem vero a quodam
 „docto Germano . . . monitus, multis fo-
 „tibus remollientibus repetitis, unguentum
 „de

(a) Observ. Collectarum. Nro. 27.

„de succo nummulariæ cum butyro recenti
 „non rancido parari jussi, quo turunda illita,
 „& sensim intromissa dolorem compescui:
 „unde somnus optatus sensim surrepsit, ap-
 „petentia revocata fuit. Eidem ægro paulo
 „post intestinum rectum prociduum fuit, quod
 „hoc remedio curatum nunquam postea foras
 „exiit:

R. Olei mastich. q. s. in eo bulliant
 Scarabæi No viij.

„Deinde oleo ungatur intestinum supra asperso
 „se putaminum ovorum, ex quibus pulli
 „fuere exclusi. Idem Germanus mihi asse-
 „bat succum blattariæ itidem mire dolores
 „omnes hæmorrhoidum mitigare.“

c) *Olea* denique pressa blanda nunquam
 pura, sed semper aliarum rerum virtute im-
 buta adhibentur, atque ut plurimum tonica
 resolventia, vel discutientia iis incorporan-
 tur. Præprimis autem commendatur hic
 oleum.

a. *Ovorum.* „Ego, inquit FORRESTUS
 „(a), . . . in hæmorrhoidibus, in quibus
 „fere cruciat dolor, commode sæpe oleo
 „ovorum solo usus sum; aliquando vitellum
 „ovi

(a) L. c. Obs. 5.

„ovi commodè cum rosaceo aut violaceo oleo
 „subegi, atque iis tantum utebar. Ubi au-
 „tem insignis adesset ardor, albumen ovi
 „quandoque apte commiscui, modo etiam
 „micam panis albissimi ex supra dictis oleis
 „subactam emplastri modo cum maxima utili-
 „tate apposui, etiam subinde sedem inungen-
 „do oleo violaceo, mucilagine feminis psyl-
 „lii, pauca portione ceræ adiecta.“

β. *Scarabæorum*, vel hisce oleo inco-
 ctis vel cinere illorum cum oleo remixto.
 „Adscribam, inquit R. SOLENANDER (a),
 „medicamenta duo, oleum, & unguentum,
 „quibus ego usus sum antehac & utor felici-
 „ter . . . Conficitur oleum ex bruchis ster-
 „corariis autumnò hoc modo, quod oleum
 „scarabæorum . . . voco:

R. Olei lini ℥j.

Bruchos stercorear. vivos bene pastos.
 Nro. 56.

„Eos ordine comprimo, conteroque inter
 „duos politos lapides, atque contritos in-
 „jectosque in oleum coquo lentò ignæ in
 „vase terreo tecto ad 3tæ partis olei aut me-
 „dietatis consumptionem: inde colatum oleum
 „asservo, in eoque tutiæ opt. lævigatæ aut
 „pom-

(a) Sect. 4. Consil. 20.

„pompholigos aliquid dissolvo, quo inungo
 „hæmorrhoides, si in conspectum veniunt;
 „sin intus in ano latent; jubeo guttatim per
 „anserinam pennam instillari; dolores sedat,
 „& hæmorrhoides mirum in modum per sanat.“

G. FALLOPIUS (a) perinde magni hoc oleum
 fecit scribens: scarabæi, „qui in stercore bo-
 „vino in viis nascuntur, vera medicina sunt
 „hæmorrhoidum dolentium, hos incoque in
 „quocunque oleo, & optime, donec ex toto
 „fere urantur, & deinde hoc oleo inunge.“

Et I. AGRICOLA (b) „ad dolores (inquit) &
 „fissuras hæmorrhoidum nil melius est; quam
 „si scarabæi in oleo lini coquantur, donec in
 „oleum resolvantur, & statim dolor cessat.“
 Idem etiam facit cinis scarabæorum oleo ad-
 mistus. Apud C. T. BIERLINGIUM (c) „mer-
 „cator . . . accepto . . . : Æ purgante in-
 „consuetum dolorem in intestino recto, &
 „quasi intolerabilem ex hæmorrhoidibus cœ-
 „cis per 3 septimanas persensit, qui ipsum
 „valde excruciauit; licet varia assumserit re-
 „media, non omissis etiam opiatis, & topi-
 „cis tam interne, quam externe, nullum ta-
 „men exinde percepit levamen, donec oleum,
 „& cineres scarabæorum adhibebantur, quæ
 „statim

(a) De tumoribus. p. n. Cap. 40.

(b) Chirurg. parv. Tr. 2. p. m. 599.

(c) Adversar. curios. Cent. I. Obs. 21. schol.
 p. 49.

„statim dolorem sedabant. Hujus medica-
 „menti virtutes insignes in hoc affectu multo-
 „ties expertus sum.“

γ. *Millepedum*. Duorum illorum reme-
 diorum a SOLENANDRO commendatorum (a)
 alterum (post oleum scarabæorum) est unguen-
 tum hunc in modum conficiendum: „℞. Olei
 „violar. ℥ij, asellorum in subterraneis & hu-
 „midis locis degentium ℥j. (si mediocres sunt
 „100 aselli ut plurimum ℥j pendent); istos
 „tusos indo oleo atque in vase terreo levi-
 „ter coquo; tum addo ceræ albæ rec. ℥ss,
 „deinde colo, & exprimo in aquam frigidam,
 „atque subactum bene, refrigeratumque re-
 „condo in usus. Si latent (varices) linamen-
 „tum in formam glandis involutum isto obli-
 „tum suppono; atque splenium eodem indu-
 „ctum superaddo; si exterius prominent, un-
 „guentum in splenio superdare satis est. De-
 „siccatur hoc idem, discutiturque magis, si una
 „aut altera radix serpentariæ, vel ari decor-
 „ticati, & tusi oleo simul incoquatur. His
 „ego magno ægrorum commodo uti soleo.“
 „Commendat idem P. BORELLUS (b) „ad hæ-
 „morrhoides (inquiens) dolentes, & tumen-
 „tes, tam internas, quam externas expertus
 „sum sæpius sequens Oleum, frigide admo-
 „tum

(a) L. c. in præced. β.

(b) Hist. & obs. med. phys. Cent. I. Obs. 63.

„tum sæpe in die, valde contulisse: accipe
 „insecta, quæ in locis humidis, & cellis vi-
 „nariis sub lignis, & lapidibus reperiuntur,
 „(Gallice cloportes dicta), leucophœa, con-
 „vexæ figuræ, multa collige, utpote ad $\bar{\zeta}$ iv,
 „ut & radices porri, seu barbam ad $\bar{\zeta}$ ijß, olei
 „olivarum $\bar{\zeta}$ vj. Minutim incidantur insecta, &
 „radices, & cum oleo per horam bulliant,
 „cola, & utere. Si autem sint internæ, in-
 „tus infundatur oleum.“ Perinde c. F. PAUL-
 „LINI (a) „referente non nemo exquisitiss-
 „simos cœcarum hæmorrhoidum dolores de-
 „mulcebat secreto QUERCETANI, quod erant
 „millepedes in oleo nucum expresso in alem-
 „bicum positi, factaque legitima digestionem
 „oleum elicitur. Si spes eum fefellisset, ad
 „manum erat $\epsilon\nu\pi\omicron\sigma\iota\omicron\nu$ NEBELIANUM (b) ex
 „polline gypsi, cum butyro cocto cancrino.“

δ. *Cineratum* seu oleum cineribus remix-
 tum, namque referente P. FORESTO (c) „ma-
 „trona . . . prolifica . . . in puerperio dolo-
 „ribus hæmorrhoidum fere semper valde affi-
 „ci solebat, quæ cum multis frustra remediis
 „tentatis a dolore minime liberari posset, tan-
 „dem consultum fuit, ut suberem lignum . . .
 „com-

(a) De ther. coel. l. c. §. 7. p. 238.

(b) Vide præced. b) β.

(c) L. c. Obs. 5.

„combureret, & cinerem ejusdem cum vitello
 „ovi, & oleo rosaceo linimenti instar simul
 „cominisceret: quo remedio . . . dolores hæ-
 „morrhoidum miraculo quodam semper seda-
 „bat.“

ε. *Ferratum.* A. HAEN (a) ipse hæmo-
 rrhoidarius „juvenis olim (ait) ex his do-
 „loribus sæpe incepti animo linqui, fuit enim
 „mihi malum frequentissimum. Sebum can-
 „delarum fusum, & intrusum ano, sebum idem
 „parvo siphone injectum . . . ex optimis re-
 „mediis sunt; semper levamen inde habui . . .
 „sed quo infinitis in mea praxi profui, est
 „oleum chalibeatum opificum, qui chalibeis
 „instrumentis conficiendis victum quæritant.
 „Habent hi, annosi dum sunt, idem oleum,
 „quod ante 20. 30. 40. annos habuere, cui
 „de tempore in tempus aliquid novi olei ad-
 „dunt. In hoc millies extinctum ferrum aut
 „chalybs est, & dat remedium incomparabile
 „ad hæmorrhoides cæcas dolentes, & tumi-
 „das percurandas.“ Memini HAENIUM, no-
 bis dicere, dolorem ab hoc oleo ferrato ve-
 lut ab incantamento desisse. Videtur desum-
 ta res ab N. CHESNEAU (b) pharmacopæi cu-
 jusdam remedium familiare describente: R.
 Li-

(a) Prælest. cit. T. 5. ad §. 1236. p. 373. sq.

(b) Obs. med. append. in alphabeto remedior.
 p. m. 542.

Liquoris nigri defluentis ex brachiis æris campani muro affixis q. s. ducatur in mortario plumbeo longo tempore; statim dolorem sedat. His vero non male quandoque substitui potest miscela ex *axungia cum colcothari*; nam teste I. AGRICOLA (a) terra ☉li dulcis „addita unguentis intolerabilem hæmorrhoidum dolorem certo experimento tollit.

§. CXXVII.

B. *Anodyna* paregorica, narcotica; quæ plerumque cum emollientibus juncta adhibentur ad cruciatus promptius leniendos. Usitatissima hic sunt

1. *Opium*. (b).

2. *Hyosciamus*, cujus folia cataplasmatibus emollientibus vulgo adduntur, qualia commendat G. E. HAMBERGERUS (c) ex speciebus emollientibus, croco, & foliis hyosciami, cum lacte parata.

3. *Bel-*

(a) L. c. p. m. 520.

(b) Hujus usui, deinceps forsan adscribendo, vacuam paginam reliquit defunctus Auctor, in volumine manu propria scripto: neque quid hac super re notatum dare voluerit, inter alias Viri cl. chartas invenio.

(c) Diff. cit. §. 54.

3. *Belladonnæ* baccae in oleo olivarum infusæ, quo oleo adhibito C. OFFREDUS (a) refert pueros 3 & 4. annorum ex hæmorrhoidibus graviter laborantes, quorum seniori cum summo dolore specie fungi exstabant, a dolore fuisse liberatos.

4. *Solanum* nigrum. I. BINNINGERI (b) „matrona quædam annorum aliquot supra 60, „hæmorrhoidibus cœcis tumidis, & valde dolorificis laborans aliquot præscripta remedia „observaverat, sed successu levi: tandem solanum officinarum recens, & contusum ubi „admovisset, statim subsederunt sublato dolore.“

5. *Momordica*. „Probata hic & momordica, inquit M. ETTMÜLLERUS (c), cujus „fructus, sive poma spinosa, & rubicunda in „oleo communi vel lini, vel (quod melius „est) in oleo amygdalarum dulcium infusa „dant nobile oleum, in specie ad hæmorrhoides cœcas optimum. In muliere quadam, „quæ ex mensibus imminutis dolore hæmorrhoidum afficiebatur, feliciter hujus tentavi
ex-

(a) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 9. Obs. 178.

(b) Obs. & cur. med. Cent. 4. Obs. 58.

(c) Prax. special. L. 1. S. 9. C. 3. art. 4. Opp.
T. 2. P. 1. p. 149.

„experimentum.“ Haud secius M. I. WITTI-
CHIUS (a) testatur, se vidisse dolores hæmo-
rrhoidum ab hoc oleo cito sublatos.

6. *Scrophularia*. Hujus jam alibi (b)
mentio facta, & deinceps etiam in formulis
passim occurret.

7. *Linaria* denique, planta omnium hic
celebratissima quondam, hodie non perinde.
Arcanam eam sibi sua ætate habuit I. WOL-
FIUS amicus G. HORSTII (c), donec promisso
quotannis bove saginato illam Hassiæ Principi
non modo ostendit, sed ejus etiam ab esula
discrimen hocce docuit versiculo:

Esula lactescit; sine lacte linaria crescit.
Unguentum de linaria dictum ita conficitur:

℞. Herb. liniariæ cum florib. M. j ij cum
Axung. suill. q. s. contusos coque in
linimentum, expresso, & parum-
per refrigerato adde
Vitellum ovi. M.

Quod ôpe lanæ vel bombacis loco dolen-
ti admotum dolores ad miraculum sopit. At

W.

(a) Consil. med. 79. p. 634.

(b) Vide §. 81.

(c) Obs. med. P. I. L. 4. Obs. 42.

W. HÖFERUS (a) „mallem ego (ait), confectur e floribus tantum; sic magis esset anodynum: hoc ego hæmorrhoidibus dolentibus in momento quasi medebar . . . Comitatus . . . cum præ dolore & tumore earum, vix stare, nedum incedere vel sedere posset, præter plures alios.“ Et N. CHESNEAU (b) „quidam (inquit) medicus Massiliensis fratrem conjugis curans ab hæmorrhoidibus, non inveniens anodynum, audita vi prædicti unguenti in doloribus hæmorrhoidum demulcendis, rogavit unum ex consanguineis, ut tantillum a me peteret; cuius applicatione maxime levatus est, sicut & omnes, qui in posterum usi sunt. Hoc unguentum semper apud me servatur sine vitello ovi, de quo recenti ex ovo extracto tantum impono applicationis tempore, quantum unguenti quantitas requireret. Nunquam rerum usu simile inveni anodynum in externarum hæmorrhoidum dolore sedando; licet variis usus fuerim, quæ habentur descripta.“ Et vero in se ipso efficaciam illius V. RIEDLINUS (c) expertus est, & B. VERZASCHA (d) mercatori 40 annorum acerbissimum hæmorrhoi-

(a) Hercul. med. L. 3. C. 5. p. m. 195.

(b) Obs. med. L. 3. C. 12. Obs. 2. p. m. 346.

(c) Obs. med. Cent. 1. Obs. 61.

(d) Obs. med. 31.

rrhoidum dolorem passo, cum post brachii phlebotomiam, emulsumque datum, frustra litum quemdam anodynum applicuisset, unguento tandem linariæ omnem dolorem miraculi instar abegerat. Sæpius illud etiam I. STORCH (a) optato cum effectu adhibuit. Mirum proinde, cur G. E. STAHLIUS (b) hoc remedium elevet dicens: „nonnulli medici „commendant præsertim unguentum de linaria, ac linariam ipsam ut præstans remedium; „at mehercle neutrum voto satisfacit, nisi „forte in hæmorrhoidibus jam ulcerosis vel „ulcerationi proximis.“ In eandem fere sententiam loquitur discipulus ejus M. ALBERTI (c): „unguentum de linaria, quod vulgo ad „cæcas hæmorrhoides commendatur, non „ita facile adhiberi debet, quia affectum facilius exacerbat: potest vero hoc unguentum „temperari cum oleo lilior. albor., & ovorum, „atque cum tantillo camphoræ combinari, & moderate ad affecta loca adhiberi. Ceterum hoc „unguentum de linaria paulo majorem & securiorem utilitatem exhibet, quando hæmorrhoides cæcæ in ulcerosum statum degenerare videntur, aut jam actu humorem & ichorem profundere inchoant, ubi cum tantillo olei ovorum, & camphoræ remixtum efficacius „abstergit. Interea experientia attenta & prudens

(a) Quinquepart. præst. T. I. p. 200. 254.

(b) Colleg. casual. magn. Casu. 16. p. 195.

(c) Diss. de hæmorrhoidib. cæcis §. 26.

„dens testabitur, quod indiscretus linariæ usus
 „haud miracula talia exhibeat, quo HARTMAN-
 „NUS (a) HÖFFER (b) HORSTIUS (c) SACHSIUS
 „(d) provocant.“ Verum quousque pro linariæ
 efficacia numerosi successus loquentur, contra
 quos STAHLIANI nil nisi verba attulerint, li-
 nariæ tamdiu laus perstabit.

§. CXXVIII.

C. *Discussientia* porro ad tumentes tan-
 rum, vel etiam simul dolentes hæmorrhoides
 iisdem cum cautelis & iisdem sub indicatio-
 nibus adhibentur, prout illa in alio quovis
 tumorum genere usurpantur, idque forma va-
 poris, fumi, fots, litus, cerati, &c. Vul-
 go sacculi discutientibus plantis repleti ano
 admoventur, vel sicci, vel ex incoctione in
 cataplasmatibus formam redacti, quales com-
 mendat HAMBERGERUS (e) „ex floribus cha-
 „monillæ, herb. scordii. absinthii, & cam-
 „phor. præpar. Cum vero multi siccum calo-
 „rem propter dolorum exacerbationem per-
 „ferre nequeant, melius est cataplasmata . . .
 „admove.“ Ex amplissima vero discutien-
 tium profapia ceteris palmam, pro varietate
 adjunctorum præripiunt.

I. Ca-

(a) Prax. chymiat. p. m. 203.

(b) L. c.

(c) L. c.

(d) Gammatolog.

(e) Diff. cit. §. cit.

1. *Calor siccus* I. P. LOTICHII (a) „juvenis . . . narrabat . . . potissimum levamen sibi fuisse, sicubi fumum vel calorem e prunis candentibus illa parte, qua alvum exonerare solemus, excepisset“ in hæmorrhoidum cruciatibus vix ferendis. Multum etiam Servita RHODII (b) a lamina candente cominus varicibus admota opis tulit, quo artificio etiam HIPPOCRATEM usum dicetur (c).

2. *Fumi medicati*, præsertim virosi, vel aromatici, ac vel maxime

a) *Terebinthinæ*, quo fumo prolapsum ani sub dejectione contingentem, doloresque augmentem in se ipso M. GERBEZIUS (d) minuebat. Neque dubium est, id ipsum a mastiche, myrrha, &c. obtineri posse; sed mirabile est, quod narrat I. D. MAIOR (e), theologum quemdam hæmorrhoidum fluxui a levi zelo, vini haustulo, voce, vel motu corporis concitatore reverti solito obnoxium huncce solo myrrhæ naribus perceptæ odore cohibuisse.

b) *Un-*

(a) L. c. (vide §. 124).

(b) Vide §. 137. Nro. 1.

(c) Ibidem.

(d) L. c. (vide §. 24. c)

(e) Misc. nat. cur. dec. 1. an. 3. Obs. 248.

b) *Ungulae equinae*, quo proquæstorem a nimio hæmorrhoidum fluxu ad omnia re-
belli, ubi ex consilio rustici ano admissus est,
fuisse liberatum I. L. HANNEMANNUS (a) per-
hibet.

c) *Uteri raia piscis*. „Ab aliquot an-
„nis, ait M. ALBERTI (b), inter Belgas innotuit
„concrementum illud tunicaceum, quod de
„pisce raja provenit, & a quibusdam pro
„utero hujus piscis habetur (licet N. STENO
„(c) huic sententiæ repugnet); quamquam hic
„piscis jam ARISTOTELI, ALDROVANDO,
„RONDELETIO, GESNERO, & JONSTONIO
„cognitus fuerit, cujus concrementi usum con-
„tra dolentes, furentes & cœcas hæmorrhoides
„cum multo fructu & levamine experti fue-
„rant, ut propterea ab illis temporibus tan-
„quam specificum contra hæmorrhoides cœ-
„cas externe adhibendum laudatum proster...
„Applicatur vero tale concrementum in forma
„suffumigii, ita ut vapor dolentibus parti-
„bus admittatur, sed requirit etiam hoc spe-
„cificum dexterum artificem, si enim non mox
„in initiis adhibetur, tunc magis nocet; quam
„prodest; siquidem effectus illius reprimens
„deinde

(a) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 5. Obs. 130.

(b) Diff. cit. §. 25.

(c) Epist. ad RISON. de anatome Raja.

„deinde statim sanguinis magis obfirmat, &
 „affectum intractabiliorem reddit: cujusmodi
 „exempla (Auctori) constant de infelici, &
 „serius suscepta applicatione murium horum
 „marinorum.“ Primus hujus remedii laudes
 peculiari scripto edidit C. M. SPENERUS (a).
 Semel periculum ejus fecit Neosolii C. O.
 MOLLERUS (b): „hocce autumnno (refert ille)
 „occasionem nactus sum non ita dudum ab-
 „hinc innotescens concrementum marinum,
 „quod mures marinos vocant, in doloribus
 „hæmorrhoidum cæcarum experiundi, dum
 „in viro 40 annis majori, temperamenti phle-
 „gmatico - sanguinei, vehementer iisdem la-
 „borante, hos mures marinos, sub forma
 „suffumigii adhiberi sibi cum notabili effectu
 „discussorio, & mitigatorio.“ STAHLIUS (c)
 quoque curiositate ductus aliquoties vim hu-
 jus remedii tentavit, optato sæpius, at non
 semper, cum successu; nec ocyus etiam pro-
 fuit. In ipsis etiam ulcerosis hæmorrhoidi-
 bus efficax inde levamen observavit.

d)

(a) Epist. ad M. B. VALENTIN. de novo hæ-
 morrhoid. cæcar. remedio. murib. se. ma-
 rinis, &c. 4to Amstelod. 1700.

(b) Annal. Vratisl. Tent. 6. A. 1718. Novembr.
 d. 4. art. 5. §. 3. p. 1871.

(c) L. c.

d) *Testæ testudinis*. „Ad hæmorrhoidas „testudinis tetta suffita bene facit“ inquit GALENUS, aut quisquis ille auctor sit libelli de medicamentis facile parabilibus (a).

3. *Aceti vapor*, in quo igniti filices extincti sunt, in duris hæmorrhoidibus emolliendis RIVERII (b) monacho est adhibitus.

4. *Vinum*. „Nullum forte euporistum „præstantius excogitari potest vino tepido, „quo crebro foveri debet pars affecta“ teste I. LIEUTAUD (c).

5. *V* quoque egregiam hic opem præstat, non in cœcis modo; sed immodice etiam fluentibus isque vel simplex, vel aliis junctus.

a) *Rectificatus* simplex calide ano admotus immodicum hæmorrhoidum fluxum cohibet. G. HARRIS (d) meminit viduæ gracilis, ac biliosæ, cui, postquam noctu repente intra paucas horas plus quam 4 ~~lb~~ sanguinis per hæmorrhoides amisisset, prostratis viribus sacro viatico munitæ, tanquam ocyus morituræ,

(a) L. 3. Nro 153.

(b) Vide histor. 4.

(c) L. c. p. 393.

(d) De morbis aliquot graviorib. Obs. 10.

turæ, panni calido Ψ rectificato imbuti alius ex alio ad anum applicati hæmorrhagiam sine ullo alio remedio compescuerunt. Præfert autem Ψ calidum frigido, quod vapor ejus anoresorptus internam quoque hæmorrhagiam cohibere queat.

b) *Ficus* in Ψ macerata eoque desuper accenso post deflagrationem applicata. Refert v. RIEDLINUS (a) tenerrimam feminam, crassiori quandoque diætæ indulgentem, & ab aliquot annis hæmorrhoidum fluxui sine molestia obnoxiam, acuto tandem dolore mariscarum fuisse prehensam, quem nec varia interna, nec vicina scarificatio, nec hirudines, nec mucilagines, aliaque euporista per bimestre lenire poterant, donec ægra ipsa HOHBERGII georgica legens in remedium incidisset, scilicet 6 ficus per medium sectas, in Ψ injectas, hocque desuper accenso, & combusto calidas adhuc loco affecto applicuit, eo cum successu, ut dolor omnis brevi conquie-

c) *Album græcum* cum Ψ *Rhenano* in linimentum redactum; I. STORCHII euporiston, crebra ejus experientia probatum. *Feminæ* (b) tuberculis hæmorrhoidalibus diu
jam

(a) Lin. med. ann. 1. Decembr. 28. p. 459. fqq.

(q) Obs. clin. ann. 1. Maji d. 4. Nro. 12. p. 128.

afflictæ linimento hocce appposito illa feliciter discussit. Perinde (a) melancholicus 40 annorum tuberculum hæmorrhoidale cum intolerabili dolore nactus post incassum adhibitum unguentum de linaria eodem hoc euporisto levabatur. Eundem res etiam successum habuit, in alio viro malum idem passo, (b) tum grvida (c), binisque puerperis (d). Commendat etiam P. G. WERLHOF (e) hoc ipsum euporiston; quippe quod experientiæ respondeat; quidquid stercoreum olores contra dixerint.

6. *Saliva* quoque tuberculis hæmorrhoidum illita illa G. W. WEDDELI (f) experimento curat: „novimus (ait ille) extuberantium hæmorrhoidum tubercula salivæ jejuni ægri ipsius inunctione fuisse coercita (g).

7. *□a humana.* „Piætor, ait I. LAZONUS (h) „A. 1685, se frequenter laborasse hæ-

(a) Ibid. Decembr. d. 4. Nro. 5. p. 281.

(b) Ibid. Julii d. 4. Nro. 2. p. 171.

(c) Von Krankh. der Weiber. 3. Band. Cas. 16. p. 133.

(d) Ibid. 5. Band. Casu 83. p. 357. sqq.

(e) L. c. p. m. 132.

(f) Misc. nat. cur. dec. 2. ann. 1. Obs. 11.

(g) Ibid. dec. 2. ann. 6. Obs. 211.

(h) Animadv. med. 90. opp. T. 3. p. 570.

„hæmorrhoidum dolore mihi narravit, pro-
 „cidebant enim ipsæ ex ano, & inflammaban-
 „tur, ipsumque semper usum fuisse magno
 „cum levamine & juvamento □a propria ad
 „partem affectam apposita; quod ipsum olim
 „docuit . . . Capucinus.“

8. *Pomi pulpa, succus.* I. H. LANGE (a)
 in dolentissimis hæmorrhoidibus cœcis com-
 mendat „pulmentum ex malis acidulis, &
 vino rubro „(vulgo Pontack) coctum, quod
 „ope lintei repetitis vicibus ano impositum
 „citum præstat levamen.“ Videtur hoc re-
 medium desumptum esse ex N. CHESNEAU (b),
 qui refert Episcopum atroci hæmorrhoidum
 dolore vexatum, non invento anodyno tan-
 dem a chirurgo sequenti pomata (quam 10
 aureis nummis compensavit) egregie fuisse
 levatum:

℞. Butyri rec. in vino albo cocti
 Sebi ex semi candela ʒā
 Pomi rasi No j. coqu. omnia in
 ▽ ʒ rosar. q. f. & F. pomata. Coletur
 & exprimatur.

9. *Chelidonium minus* de quo superius
 jam actum est (c).

10.

(a) Miscellæ veritates, de rebus medicis. p. 7.

(b) L. c. L. 3. C. 11. Obs. 3. p. m. 346.

(c) Vide §. 86.

10. *Cœpa* sub cineribus assa. „Externe
 „discussionem adjuvat, inquit Vratislavienses
 „(a), ac dolores sopit cataplasma ex cœpis
 „sub cineribus assatis ac oleo ovorum re-
 „centi.“ Et vero M. GERBEZ (b), dum viro
 „hæmorrhoidum fluxui obnoxio venæ hæmo-
 „rrhoidales cum intolerabili dolore intumue-
 „rant, suaserat, ut cœpam conscissam cum
 „mica panis albi decoquerent ei ministrantes,
 „adjicerent ad finem aliquid croci; & vitellum
 „unius ovi, atque omnia invicem in cata-
 „plasma conquassarent, partique affectæ lino
 „carpto exceptum calide admoverent, fota
 „prius utcunque diu parte affecta, lacte herb.
 „malv., alth., melil., linar., fl. Verbasc.,
 „sem. lini, psyllii & althææ per decoctionem
 „alterato. Et convaluit intra biduum, fru-
 „stra antea diversis sibi a chirurgo suis tra-
 „ctatus.“

11. *Olea varia, ac præprimis*

a) *Mustelæ fluviatilis* DÜRENIO apud S.
 BLANCARDUM (c) æger quidam retulit, se in-
 ternas hæmorrhoides, quas sæpe patiebatur,
 non aliter compescere potuisse, quam instil-
 lato.

(a) Histor. morbor. Vratisl. l. c.

(b) Chronol. med. pract. ann. 1. §. 85. p. 77. sq.

(c) Collectan. med. phys. Cent. 4. Obs. 78.

lato in intestinum rectum oleo ex hepate mustelæ fluv. obtento.

b) *Jupineri* G. G. LEIBNIZ (a) „dolores
 „ . . . in ano ab hæmorrhoidibus . . . so-
 „pire licebit (ait) oleo juniperi per retortam
 „igne aperto lege artis propulso Qu prius
 „per infundibulum separato. Si hæmorrhoi-
 „des sint externæ, oleo eodem pennæ ope
 „tangantur singulis 4 horis, si internæ sint,
 „madefiant eodem, cujus quantum 4am par-
 „tem cochlearis impleat, adinstar enematis
 „injici satis erit: ita intra bihorium cessabit
 „dolor, & hæmorrhoides flaccescent, ut alio
 „remedio non sit opus. Hoc remedium com-
 „municavit D. GATELIER insignis artista, quo
 „COLBERTUS ob peritiam utebatur.“ Sed A.
 F. LOEFFLERI (a) ægris non ferendum cau-
 savit cruciatum.

c) *Buxi* ope linteoli repide admotum,
 de quo R. FONSECA (b): „oleum buxi . . . sicuti
 „dentium dolores quosvis ad miraculum us-
 „que sedat, ita & reliquos dolores, & præ-
 „sertim hunc hæmorrhoidalem sedare solet,
 „si

(a) Relat. de novo anti-dysenterico Americano
 in Misc. nat. cur. dec. 3. ann. 3. app.
 Nro 1. p. 19.

(a) Beyträge zur Wundarzn. 1. B. p. 380.

(b) Consult. med. T. 1. Conf. 27. p. m. 184.

„si illius gtt. j. supra hæmorrhoides appona-
 „tur, cum stilo gossypio involuto; item si
 „cum oleo seminum lini misceatur, ut ad 36
 „prædicti olei 3j olei buxini misceatur.“

d) *Aurantiorum*. AMATUS (a) „qui ab
 „hæmorrhoidum dolore (inquit) graviter cru-
 „ciabatur, post multa, & varia a medicis
 „tentata præsidia hoc remedio a nobis præ-
 „sentato usus fuit, & brevi ab illo infestissi-
 „mo dolore liber evasit. . . R. ☉ pomum,
 „& id cultro excava, in quo oleum rosaceum,
 „& pseudonardi, lavendulæ dictæ semina in-
 „funde, & ad cineres calidos admove, &
 „calidum applica, & sæpe innova; est enim
 „mirum.“ Huc etiam referri debet.

e) *Balsamus* ♀ *terebinthinatus*. R.
 FONSECA (b) „unum tamen (ait) præ ceteris
 „tanquam secretum propono, & experientia
 „comprobatum, quod appellant chymici bal-
 „samum ♀, in quo pessulæ intingantur, &
 „applicentur tepide loco affecto. Fit autem
 „balsamus ♀ ex floribus illius cum terebin-
 „thinæ ℞ . . . Quodsi . . . balsamum ♀
 „non reperiatur, misceantur flores ♀ cum
 „terebinthina multoties in ▽a rosacea lota,
 „& loco balsami ♀ imponatur.“ M. RUTAN-
 DUS

(a) L. c. Cent. 2. curat. 6.

(b) L. c.

dus (a) Jesuitam refert atroci hæmorrhoidum
 dolore cruciatum, qui post varia alia incas-
 sum tentata illitis sæpe, maxime post excre-
 tionem, tuberculis calide statim a dolore
 convaluit. „Nam valet (ait) hoc balsamum
 „certo in hoc vitio, nec unquam fallit, ut
 „experimenta innumera edocebunt.“ Memi-
 nit (b) & pistoris ad 50 annos nati cæcis
 hæmorrhoidibus vehementer dolentibus, &
 ani prolapsu divexati, cui in 8 dies m. & v.
 infesum imperavit ex \bigcirc crudi ſvj . in aqua
 pluvia chalibeata decoctis, ac 3to quovis die
 innovandum *ἐγυάνισμα*; ante infesum di-
 gito anum reponebat, & post balneum hæ-
 morrhoides balsamo \triangle inungebat. Sic intra
 8 dies pulso dolore, & ano haud amplius
 elapso, convaluit. Haud secius P. GRÜLIN-
 GIUS (c) Pastori cuidam sæpius per annum,
 præsertim circa autumnum dolores hæmo-
 rrhoidum cæcarum pati solito ætutum abegit
 illito calide iis hoc ipso balsamo, eodemque
 litu pharmacopœum quemdam ab acerbo id
 genus dolore e vestigio liberavit. Hujus quo-
 que loci est.

Ver-

(a) Curat. empyr. Cent. 1. cur. 87.

(b) Ibidem cur. 86.

(c) Observ. & cur. med. Cent. 6. Obs. 26. Cent.
7. Obs. 28.

Vernix pictorum, remedium notante MAYERNIO. apud I. ALLEN (a) singulare in curandis hæmorrhoidibus tam cœcis; quam apertis. Quodsi in apertis cuti nimis tenaciter adhæserit, oleum rosarum addendum est. Hujus usu sanatus fertur a muliere CAROLUS V. cum nulla ope curari posset. Paratur autem *Vernix* ex olei lini ꝛxiij, terebinth. venet. ꝛjv, sandarac. puriss. sive gummi juniperi ꝛiiij. Liquantur lento igne, &c.

12. *Mercurialia* etiam (præsertim cum acidis mineralibus parata) hic sæpe admodum sunt proficua. Sane R. D. FALCK (b) inter topica ad cœcas hæmorrhoides inflatas discutiendas, doloresque sopiendos nullum efficacius expertus est suo unguento mercuriali, quo non modo tumor minuebatur, sed etiam dolor fere in momento profligabatur; & cujus continuato usu in compluribus hæmorrhoides cœcæ annosæ prorsus evanescere. Paratur:

℞.

(a) Synops. univers. med. pract. C. 12. art. 1267.

(b) Von dem Quecksilber u. dessen Kräften bey verschiedenen Krankheiten. 3te. Abtheil. p. 124. sqq.

R. Rasur. stanni opt.

℥ ii vivi ꝯa ℥ij. F. amalgama, adde

℥ = rubr. subtil. pulveris. ℥ij.

Pomat. rosar. ℥j.

℞ still. menthæ piperit. gtt. xx. M.

& illitum linteo carpto tumori applica.

13. *Saturnina* denique, quod leniter adstringendo inflammationem discutiant, doloremque leniant, hic summi sunt usus, ut est extractum ℥ni, acetum lithargyrii, aqua vegeto-mineralis, unguentum nutritum, emplastrum diapompholygos, &c. Sic „vir „sexagenarius melancholico, & atrabiliario „temperamento præditus, dolore hæmorrhoidum molesto confictabatur cum tumore, & „inflammatione partis, qui multis remediis „non cessaret. L. RIVIERUS (a) præscripsit „fotum ex aqua rosarum, in cujus ℥vj Θ „℥ni ℥j dissolvebatur, qui fots pluries in „die iterabatur; postmodum vero cataplasma „admotum est, ex cœpa alba sub cineribus „cocta, & cum butyro subacta partibus æqualibus. Intra biduum inflammatio sedata est, „& tumor magna ex parte resolutus.“ GOU- „LARD (b) in hæmorrhoidibus externis juxta
ac

(a) Obs. med. Cent. 4. Obs. 58.

(b) Traité sur les Effets des Preparations de Plomb. Chap. 10. p. 229.

ac internis duo plumbata remedia utilissime adhibuit, nimirum lavamentum ex aqua vegeto-minerali, ac dein suum ceratum Saturninum. In externis, ubi præmissum enema fuerit egestum, imperat sæpius per diem tuberculorum lotionem aqua vegeto-minerali, ac dein cerati sui applicationem, dicitque sibi hanc methodum usque adeo feliciter cefsisse, ut si omnes casus prosperos colligeret, necessum foret, longissimam eorum contexere seriem. Auspicato etiam plumbata L. HEISTERUS (a) sæpius adhibuit, præsertim in Ecclesiaste, Magnate, ac milite.

§. CXXIX.

D. *Styptica* in immodico fluxu cohibendo, dum aut vasa stringendo crispandove, aut sanguinem circa vasis cum fundentis hiatus in grumum, thrombumque cogendo ulteriorem illius effluxum sistunt. Cujusmodi sunt.

1. *Calor* siccus intensior ignis vivi propius vasa admoti, quippe qui vasa crispet, sanguinemque cogat. Huc proinde etiam calidissimi fumi pertinent, ut in fumo ex ungula equi superius (b) vidimus.

2. *Plas-*

(a) Vide §. 84. b) & §. 49. Nro. 2.

(b) Vide §. præced. Nro 2. b)

2, *Plantæ variæ valida vi adstringente præditæ, vino rubro vel aqua ferrata, vel aceto decoctæ, & forma fatus, sacculi, turundæ, infessus, &c. adhibitæ. Ita curatio*
„comperta mihi ipsi, inquit M. RULANDUS
„(a) cum sæpenumero per multos dies imo
„etiam menses gravi hæmorrhoidum venarum
„fluore opprimor, adeo ut vires vacuatio-
„nis hujus copia dejiciat, & pro sanguine
„nigro, ac crasso ruber jam fluat. Sisto autem
„hunc fluxum adaptando crebro alternos
„sacculos calidos ex rubro panno, & contu-
„sis glandibus, vel quercinis foliis in forti
„aceto multum decoctis factos, quibus ocys
„fluor consistit.“ Sæpius etiam hoc ipso re-
medio P. GRÜLINGIUS eodem cum successu
utebatur. Sic (b) „polyographus . . . affi-
„ciebatur singulis annis quater vel pluries
„hæmorrhoidibus prætermodum fluentibus,
„quem curavi (inquit) sacculo pleno glandibus,
„& foliis quercuum cocto in forti aceto, &
„imposito ano: quo remedio sisto . . . om-
„nes hæmorrhoides præter modum fluentes“
 FROMMANNUS (c) autem civem quemdam eo
 fluxu correptum feliciter restituit sequenti re-
 medio:

R.

(a) L. c. Cent. 1. curat. 7.

(b) Obs. & curat. med. Cent. 7. Obs. 27.

(c) L. c. P. 2. Probl. 16. Nro. 3. p. 205.

R. Rad. tormentill.

— bistortæ āā ʒij.

Folior. quercus

— millefol.

— plantag. āā M. j. Coqu. in

▽a chalibeata &

Vini austeri æqualib. partib.

„Hoc decocto spongia imbuatur, & frigide
 „vel tepide applicetur.“ Utilis quoque hic
 est herba dicta *centinodia* seu *polygonum*
mas, de qua L. DURETUS (a) „memini (ait)
 „me medicinam fecisse monacho cuidam, qui
 „factus fuerat ὑποχλωρὸς ex profusione sangui-
 „nis, unde fere in hydropem inciderat;
 „erant illi (hæmorrhoides) inaspectabiles.
 „Jussi, insideret in pulvinar ex centinodia, quæ
 „mirifice valet, ex præscripto HIPPOCRATIS
 „dedi vinum subaustrum: quievit profluvium,
 „& sanatus est.“

3. *Colcothar* ☉li, quod MORGAGNIUS
 (b) in profluvio hæmorrhoidali ut admodum
 efficax proponit, namque „ubi . . . hoc ni-
 mis urget, VALSALVA . . . tria præ ceteris
 „laudabat, a quibus videlicet acciderat, ut
 „mirabiles effectus videret: primum theriaca
 recen-

(a) In HOLLER. de morb, intern. Ichol. ad C.
 55. p. m. 581.

(b) L. c. Nro. 12.

„recenti pondere 6 circiter drachmarum, ad-
 „mistis 4 aut 6 etiam in magno fluxu opii
 „granis, regionem umbilicalem linire; alte-
 „rum (Plum in Ξem redactum, quod chy-
 „mici appellant colcothar, parti, unde san-
 „guis profluit, adhibere, tertium curare, ut
 „æger imum intestinum extrorsum premat, si
 „forte (ut nonnunquam accidit) apertum va-
 „sis sanguiferi foramen in conspectum veniat:
 „tunc autem (Plum frustulum (sicut hæmatitem
 „pictores solent) in extrema quapiam fistula
 „aptatum ei foramini tantisper apprimere,
 „dum crustam inducat. Hoc autem, quo pro-
 „ponebat ordine, aliud post aliud adhiberi
 „volebat, ubi nimirum priora non respondis-
 „sent.“ Verum etiam sine infricta theriaca
 colcothar. J. HEURNIO (a) suffecerat: „cui-
 „dam (narrat iste) mediæ ætatis nimia præ-
 „cipitatione fundebantur hæmorrhoides. Cum
 „medici, & chymici cuncta tentassent, nec
 „suffecissent, iussi, ut una intacta reliquæ
 „tangerentur colcothare (ita appellant crassa-
 „mentum illud a Plum olei destillatione re-
 „lictum) illico constitit. Vivit“. In idem fere
 cadit

4. *Atramentum.* Quidam „Vir ... post
 „applicationem hirudinum cum fluxum san-
 „guinis patiebatur, qui nullis remediis cede-
 „bat,

(a) In HARPOCR. Sect. 6. aph. 12.

„bat, & jam virium succedebat exsolutio.
 „Cum D. PUERARIUS (a) rogatus . . . pilos
 „leporis concisos plurimo atramento imbutos
 „applicari, & intrudi iussit, quo remedio sta-
 „tim suppressa fuit illa sanguinis profusio.“

5. *V rectificatus* calide admotus ut
 superius (b) vidimus; quod & vasa crispando
 & sanguinem in exitu suo cogendo fluxum
 ulteriorem compescat.

§. CXXX.

E. *Reserantia* in fluxu indicato, sed dif-
 ficulter succedente, seu ob crassitiem tunicarum
 in vasis reserandis, seu ob nimium sanguinis
 in hæc vasa insufficientem. Quæ tunicas
 vasorum extenuant, hæc alibi (c) jam sunt
 memorata; quæ autem nimium sanguinis in hæc
 vasa adaugent, sunt ut plurimum acriora,
 cathartica præsertim remedia, ani vasis ad-
 mota, cujusmodi sunt.

1. *Colocynthis pulpa*, quæ si 1.
 HOLLERIO (d) teste „convenienti oleo im-
 „mer-

(a) In T. BURNETI thes. medic. pract. T. 2.
 L. 8, S. 5, subsect. 7. p. m. 45.

(b) Vide §. 128. Nro. 5.

(c) Vide §. 123. sqq.

(d) L. c. C. 55. p. m. 570.

„mergitur, ano alligatur, 5 horarum spatio
„aperit.“

2. *Cyclaminis succus*, qui GALENO (a) perhibente „hæmorrhoides referat, violenter-
„que ad secessum provocat in crocyde sine
„floccis appositus.“

3. *Cœpæ* quoque ad proritandum hæ-
morrhoidum fluxum faciunt GALENO (b) te-
ste: „cœpa . . . hæmorrhoides (ait ille)
„aperit tum apposita, tum aceto inuncta.“
STOCKERUS (c) commendat sequens cata-
plasma:

R. Allii spicas No jv.
Cœpas No ij. Incorporentur cum
Farina lupinorum &
Aceto fortissimo pauco. F. catapl.

Ponatur super hæmorrhoides, statim aperi-
untur.

4. *Bilis taurina*, qua occlusas aperiri
hæmorrhoides GALENUS (d) notat, quod eo
etiam certius obtinetur ab illa cum prius di-
ctis

(a) De simpl. medicam. facult. Lib. 7.

(b) Ibidem.

(c) Prax. med. Cap. 70.

(d) L. c. Lib. 10.

etis applicata. Sic „GALENO, inquit R. so-
 „LENANDER (a), cœpa cum aceto apposita; mi-
 „hi vero cœpa cum aliquo felle illita hæmo-
 „rrhoides aperit. Colocynthiden, & aloen cum
 „felle vel succo cœpæ idem facere certum est.“

§. CXXXI.

F. *Composita* denique ex hætenus enu-
 meratis, insuperque aliis simplicibus medica-
 mentis dicenda supersunt, quibus diversi Au-
 ctiores maxima encomia tribuerunt: hos in-
 ter est

I. N. BLEGNYI (b) linimentum :

R. Olei ovorum ℥j.

— lateritii

Balsam \triangle is aa ℥β. M.

Profuit in sequenti gravissimo casu: vi-
 dua post diuturnas ob elatum virum lacrimas
 corripitur acerrimo hæmorrhoidum dolore,
 nullis remediis leniendo, crescente potius
 inflammatione ac tumore ad pugni usque
 molem. Applicato autem, nescio quo, em-
 pyrico remedio, & dolor enormiter, & tu-
 mor $\frac{1}{2}$ fui major increvit cum tanto simul in-
 flam-

(a) L. c. p. 379.

(b) Zed. med. Gall, ann. 1. Febr. Obs. 5. p. 47.

flammationis augmento, ut intra noctem gangræna denarii spatium occuparit. Cumque vulgaria remedia hic partim non satis efficacia, partim etiam nociva futura providerentur, tentavit Auctor modo descriptum linimentum eo cum successu, ut inflammatio eadem adhuc die pene evanuerit, subsederitque tumor, & gangrænae progressus substituerit, atque intra paucos dies remittente morbi atrocità, spatioque hebdomadæ mortuo a vivo secedente, ægra non multo post convalesceret.

2. *Idem (a)* describit Cataplasma ad cœcas hæmorrhoides mirandi effectus:

R. Amyli ʒß. Coqu. ad consist. glutinis in
 ∇æ rosar ʒvj, tum adde
 Cerussæ ʒj.

Croci ʒß.

Alb. ovor. rec. No. iij. M. F. Cataplasma.
 post tres horas renovandum.

3. *Idem (b)* Unguentum mirabile vocat:

R. Olei rosacei omphacini ʒij
 Aceti stillat. ʒij cum soluta

⊖

(a) Ibid. Mart. Obs. 10. p. 68.

(b) Ibid. ann. 2. Julii Obs. 11. p. 151.

⊖ ℥ni ʒj. subactis in formam nutriti
adde

℥ii præcip. rubr. subtil. triti ʒjß. M.

4. CHABERTI (a) vir ab hæmorrhoidum
externarum pugnum magnarum atrocibus
doloribus altero die levabatur admotis bis
quotidie decocti chamoni. ac meliloti in ∇æ
℥ ℥ij, in quæ soluti erant ℥ ii subl. cor-
ros. ʒij, & applicatione lintei carpti eodem
liquore imbuti. Altero autem biduo plane
sublatæ sunt sequenti remedio ad prioris nor-
mam adhibito :

℞. ∇æ ℥ ℥ij, solve

℥ii subl. corros. ʒij, adde

℥. ʒjv. M.

5. M. ETTMULLERI (b) „femina ardorem,
„& dolorem insignem patiebatur hæmorrhoi-
„dum cœcarum, & cum reculasset hirudinum
„applicationem

℞. Mucilag. sem. cyd. cum

Sperm. ran. extract. ʒj,

℥ camphor. ʒij.

Sacch. ℥ni ʒj. M.

„Quo

(a) Observations de chirurg. prat. Obs. 28.
P. 72.

(b) Obs. med. 263. opp. T. 2. P. 2. F.

„Quo linteum probe illitum, & humectatum
 „applicetur crebrius . . . Alia femina patie-
 „batur dolorem, & tumorem hæmorrhoidum
 „cæcarum etiam extra partum, nec poterat
 „ferre pingua & unctiosa, quæ exasperabant
 „malum:

R. Lap. calamin. ʒj.
 Cerussæ ʒj.
 ℥ camphor. ʒjss.
 ▽a plantag. ʒj. M.

„Diluantur pro libitu cum spermate ranarum
 „veteri per se asservato, & applicetur linteis
 „multiplicatis. Egregie profuit.“

6. Idem (a) sequentia commendat:}

R. Balsam ♀ impr. c. oleo hyper. parati ʒjss.
 Olei momord. ʒj.
 — sem. pap. expr. ʒss.
 Sacchar. ʒni ʒj.
 Camphoræ gr. vij. M. F. linim.

„Camphoram (ait) non immerito addo, nam
 „mirabile est remedium ad hæmorrhoides do-
 „lentes, si ejus ʒss ad ʒj. subigatur in ▽æ
 „malvæ vel rosar. ʒj, & ita applicetur cum
 „linteis ad dolentes, & ardentes hæmorrhoi-
 „des, v. g.

R.

R. ▽æ fl. verbasco. vel. fœnic. ʒjß.

Camph. oleo amygd. solutæ ʒj. M. & cum

„lintheis duplicatis applicetur rimæ ani.“

7. L. HEISTERI (a) vir plethoricus 40 annorum, hæmorrhoidibus cœcis obnoxius, cum aliquando trīdum affligeretur obortis 5 tuberculis amplitudine thaleri serum olidum subcruentum exsudantibus, cum atroci dolore ardente, & vix incessum, sessionem, decubitumve concedente, ac vigiliis, Auctor imperata diæta tenui antiphlogistica præscripsit:

R. Lap. 69 citrat

□ri ⊕lati aa ʒiij.

Cinnab. nativ.

⊙. puri aa ʒj. M.

S. m. v., & meridie ʒij ex ▽æ primulæ veris; externe autem litum sequentem:

R. Olei amygd. dulc. ʒjß

Camph. gr. vj.

Sach. ʒni gr. iij. M.

Teratur probe in mortario plumbeo, & varices sæpius illinantur, foveanturque cataplasmate tepido crebro ex sequentibus:

R.

(a) Medic. chirurg. Wahrnehm. 1. B. No. 208.

℞. Herb. althææ Mij.

— malvæ

— hyosc.

Flor. Verbasci

— melilot.

— samb. ʒʒ. M. j. concis. coqu. in

Hydrogala ex æquis ∇æ, & lactis partibus. Ab his æger brevi convaluit, & secta dein ter, quaterve quotannis vena, sub permoderato vini (cujus appetens erat) usu sensim a morbo plane immunis evasit. Simili quoque medendi ratione curavit (a) mulierem 28 annorum ab tuberculo hæmorrhoidali juglandem magno, quod post ultimum puerperium obortum vehementes sæpe dolores, & ardorem causabat; secta enim in pede vena datus ☿ temperans, & externe litus superior cum sacculis ex fl. verbasci, linar., & chamom. in lacte coctis imperatus malum sustulit. Analogum casum jam alibi (b) quoque ex illo dedimus.

8. F. HOFFMANNUS (c) pro hæmorrhoidibus cæcis consultus „ego saltem (ait) in „tali casu egregiæ virtutis tam purificantis „atque consolidantis; quam etiam dolores „sopientis deprehendi sequens unguentum:

℞.

(a) Ibidem Nro. 268.

(b) Vide §. 84. c)

(c) Conf., & resp. med Cent. 2. Casu 24. Conf. Med. rat. syst. T. 4. P. 2. S. 2. C. 5. curat. §. 9.

℞. Olei ex vitellis ovi recentib. ℥j.
 — hyosciami ℥ij.
 Flor. ♀ ℥ii.
 Extr. croci ℥j.
 Camph. gr. vj. M. D.

9. I. LANZONUS (a) „hæmorrhoidalem
 „fluxum, atque dolorem in muliere quadam
 „quadragenaria fugavit hujus unguenti appli-
 „catione :

℞. Ungu. de linaria ℥j.
 Adipis ranar. ℥ß.
 Olei ovor. ℥jv.
 — citri ℥j. M.

„Intingatur lintecolum, & apponatur calidum
 „loco dolenti.“

10. Idem (b) unguentum meum (ait),
 „quo feliciter usus sum in praxi facienda,
 „sequens erit:

℞. Cœpæ sub cineribus coctæ ℥ij.
 Ungu. populeonis ℥j.
 Olei lini ℥ß.
 Vitellor. ovorum ℥ij.
 Θ ἡνι ὄσφati ℥j.

Extr.


(a) Citrolog P. 2. C. 3. Opp. T. 1. p. 339.

(b) Consult. med. 99. Opp. T. 2. p. 208.


Extr. opii ʒß.

Adipis ranar. ʒiiij. M. F. linimen.

„S. a. & bene misceatur in mortario plum-
„beo.“ Et (a) „faber lignarius . . . anno-
„rum 49 molesto hæmorrhoidum dolore af-
„fectus . . . brevi 2 dierum spatio sanatus
„est sola applicatione mei unguenti de cœpa.“

II. Idem (b) „religiosum novit, qui bal-
„samo  in hoc affectu utitur; feminam,
„quæ oleo ovorum; puellum, qui adipem ra-
„narum; & piscatorem, qui cœpam sub ci-
„neribus coctam adhibent. Judæum quem-
„dam vidit, qui a longo tempore ab eo ve-
„xatus post varia præsidia tandem sequenti
„unguento sanatus est:

R. Unguenti rosat. malvin ʒj.

 rii crudi ʒij.

 vivi ʒj.

Croci orient. gr. v. M. in mortario
plumb. f. a.“

12. F. LOSSIUS (c) curandam habuit mu-
lierem ætate florente, perquam obesam, gra-
vissimis cœcarum hæmorrhoidum doloribus
ob-

(a) Consult. med. 174. p. 352. sq.

(b) Misc. nat. cur. Cent. 5. Obs. 42.

(c) Obs. med. L. 3. Obs. 28.

obnoxiam, totas noctes insomnes causantibus, quæ post multa incassum tentata demum instar miraculi a dolore liberata est fotu thapsi barbati, & scrophulariæ in lacte coctorum, ac litu frequenti

℞. Carnis bubulæ macræ ad prunas in
Olla ustæ, ut ☿sari possit, ℥ij.
Vitell. ovi. No. j.
Unqu. de Linar. ℥jß.
— — althæa ℥ß.

Olei amygd. dulc. q. s. M. F. linim.
gossipii ope admovendum. Idem etiam in
aliis ex voto cessit.

13. M. G. PURMANNUS (a) ad hæmorrhoides dolentes isthoc usus est linimento:

℞. Ungu. de lithargyrio cum
Olei amygd. dulc. facti ℥iiijß.
Tutiæ ppt. ℥ß.
☿ herb. silicis seu linar. ℥iiij. M. F.
linimentum ope linteoli vel gossipii applicandum. Ubi unctuosa noles, pro unguento lithargyrii sume mucilaginem cydoniorum.

14. H. REUNERI (b) „homini maximo
dolore hæmorrhoidum laboranti optime contulit hoc linimentum

℞.

(a) Chirürg. curios. P. 2. C. 20. p. 473.

(b) Obs. med. 89.

℞. Pulpæ pomi sub cinerib. cocti ʒj.
 Pingued. gallin. ʒß.
 Ungu. popul. ʒß.
 Croci ʒß.
 Vitell. ovi. j. F. linimentum.

„A. GASSERUS feliciter utebatur pulpa pomi
 „cocti cum saccharo penidio.“

15. P. SORBAITII (a) cataplasma

℞. Porrorum cum toto M. jv.
 Micæ panis ʒßß. Coqu. in
 Lacte caprillo ad putrilag. contundendo
 in mortario, addo sub finem
 Croci Austriaci ʒß. v. q. s. ad intensam
 flavedinem. M. F. Cataplasma, quod mira-
 culi instar, uti sæpissime probavimus, dolores
 omnes tollit.

16. TILLINGIUS (b) literato cuiquam
 sævissimos hæmorrhoidum dolores linimento
 hocce protinus submovit :

℞. Empl diach. simpl. oleo chamom. molliti
 Ungu. populconis ʒʒ ʒß.
 Olei amygd. dulc.
 — lilior. albor.

Olci

(a) Medic. præct. Tr. 1. C. 68. p. 421.

(b) Lib. de laudano opiato. p. 472.

Olei lumbricor.

— verbasci aa ʒj.

Lapid. prunellæ ʒß.

Laudani opiat gr. viij. M. F. linimen.

17. G. H. VELSCH (a) „rarissimus (ait)
„affectus est fluxus hæmorrhoidum non san-
„guineus; sed ichorodes, & quasi suppura-
„tus: bis omnino hunc observavimus, semel
„quidem in viro religioso, qui sponte ru-
„ptis haud parvam copiam purulentæ excre-
„verat; linimento ex ʒe lap. Grumbacensis,
„tutiae pptæ, boli Armen. cum ung. de
„minio, & de cerussa curatus est.“

18. *Vratislavienses* (b) „in doloribus
„atrœcibus mitigandis spem (ajunt) nostram
„non fefellit linimentum ex mucilagine sem.
„psyllii, ac cydon. cum ▽a Verbasci extracta,
„oleo hyosciami, & vitello ovi . . . Inter-
„dum sumus etiam usi sequenti Unguento:

R. Unqu. ad hæmorrhoides.

— rosati aa ʒiij.

— albi camphor. ʒij.

Sacch. ʒri in oleo lil. alb. solut. ʒss.

Olei hyosciami ʒß.

— verbasci

— momordicæ. aa ʒij. M. D.

19.

(a) Obs. med. Hecatoſte 2. Obs. 98.

(b) Histor. morbor. Vratisl. A. 1702. p. m. 376.

19. C. L. WALTHERUS (a) multum fidebat miscelæ ex balsamō Δ terebinthinato cum balsamo Hni camphorato. Nobilis vir equitationi, saltui, pugilatui deditus, & obstructioni alvi obnoxius, ex nimis nixibus in hæmorrhoides cœcas incidit, quas pro ani prolapsu habens frustra repositionem tentavit, imo multa pressione durities accessit, ac tumor tria in tubercula divisus est. Accitus Auctor applicuit sæpe calida linteola oleo de 7. florib. MYNSICHTI imbuta, simulque vaporem ex herbis emollientibus vino incoctis; alvum enemate reseravit: interne salem volat. oleos. præbuit, & alvum apertam servavit catharticis pilulis, & quietem imperavit. Mollito his tumore miscelam balsaniorum dictorum ad finem usque adhibuit. His intra 3 hebdomades plane convaleuit. Atque hac methodo cœcas hæmorrhoides cito, auspiciatōque semper ab se fuisse percuratas ait.

20. *Unquentum album camphoratum* in leniendis hæmorrhoidum cœcarum doloribus, ac tuberculis discutiendis 1. STORCH (b) sæpenumero efficacissimum est expertus.

216

(a) Thesaur. Observ. medico-chirurg. Obs. 43. p. 139. sqq.

(b) Prax. casual. med. T. 1. A. 1731. Novembr. d. 4. p. 291. von Krankh. der Weiber 2. B. Cas. 37. p. 176. Cas. 116. p. 431. idem 2. B. Cas. 7. p. 85.

21. *Unguentum de nicotiana* (a), quo SEBIZIUS teste C. ROESLERO (b), Præfectum quemdam fluxu diuturno, nullatenusque compescendo vexatum curavit, ut non amplius redierit; sed sequente 4na, & scorbuto confectus æger interiit. Plura huc facientia apud Veteres quoque videri possunt (c).

S. CXXXII.

G. *Vulneraria* demum in suppuratis, ulcerosisque factis hæmorrhoidibus locum habent; sed quoniam hæc ad generalem abscessum, & fistulæ ani doctrinam pertinent, non est hic visum prolixius de iis agere, ne libelli moles in immensum excrescat. Mere-
tur hic legi methodus M. ALBERTI (d), tum balsamus mundificans PURMANNI (e); nec prætereundum, quod O. BORICHIUS ad T.
BAR-

(a) TRILLER. disp. pharm. univ. T. 2. p. 826.

(b) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 3. Obs. 331. P. 543.

(c) Vid. GALEN. de compos. pharm. secund. loc. L. 9. C. 7. de compos. medic. per genera L. 7. C. 2. 13. 14. de dynamidiis, & libr. secretor.

(d) Diff. de hæmorrhoid. cæcis. §. 26. p. 46. sq.

(e) L. c. p. 477.

EARTHOLINUM (a) præscripsit: „in desperata (inquit ille) hæmorrhoidum exulceratione nihil „præsentius auro fulminante (postquam „cum floribus Δ iterum, iterumque exarsit „prius), si cum oleo amygdalarum dulcium „illinatur.“

C A P U T IV.

BALNEA, INSESSUS LOTIONES.

§. CXXXIII.

IV. **B**ALINEA vel totius corporis vel dimidii umbilicotenus (quæ *semicupia* dicimus), vel narium ac femorum (quæ *inseffus* audiunt), vel artuum quoque solorum, eaque calida alias, alias frigida, in hæmorrhoidalibus variis malis, non raro summi sunt usus, & quidem

a) *Calida* ad præsentem morbum profligandum, nimirum tensionem, doloremque varicum imminuendum, tubercula mollia, atque sanguinem in iis spissescentem diluendum, ac spasmos sopiendos, imo ipsum quoque

(a) Epist. med. Cent. 4. Epist. 92. Nro 15. p. 523.

que fluxum vel suppressum revocandum, imminutemve facilitandum; immodicum refrigerandum, quantum valeant, numerosis edocemur casibus. ZACUTUS (a) pro sedando hæmorrhoidum dolore præsidium nullum (ait) semicupio facto ex lacte „tepidum præstantius est, in quo si æger per horam aut $\frac{1}{2}$ horam se-deat; extempore sanus evadet. Utere lacte „vaccino, ovino, equino; quod si ~~th~~ olei „papaveris & $\frac{1}{2}$ violacei in balneum projicias, „excellenter præsidium administrabis.“ Sed sufficit etiam solum decoctum emolliens; imo ipsa aqua pura tepida. Luculentum hanc in rem casum narrat V. RIEDLINUS (b): mulieri perobesæ, 30 annis majori, solennibus obesitatis incommodis afflictatæ, ab ultimo ante septennium fere foetus mortui partu hæmorrhoides aliquoties intumuerant cum dolore, & citra ullum fluxum, malumque semper sine ullis remediis sponte iterum, brevique desit; donec aliquando morbus accidisset cum acerbior, tum diuturnior. Accitus Auctor præbuit laudatissima quæque interna; ipsumque opium; sine ullo levamine; externa topica nulla ferebat mulier, nam ab unguentis malum exasperabatur, & ab aliis dolor crescens clamores exprimebat. Ingravescen-

(a) Prax. histor. L. 11. C. 2. Nro. 3. Obs. 1. p. m. 90.

(b) Lin. med. ann. 4: Aug. 5. p. 640.

cente morbo urinæ quoque retentio oborta
 novos causabat dolores. Donec in balneum,
 cujus usum hætenus pervicax detrectaverat,
 ingressæ dolores, quamdiu in illo morabatur,
 conticescere cœperunt. Ex balneo egressæ
 dolor quidem recrudit, at mitior nec nisi
 brevis, quo abeunte rediit somnus, & post
 hunc, dolore non amplius reverso, præser-
 tim ad iteratum balnei usum pristina sanitas.
 POMMERI (a) quoque mulier quadragenaria, a
 pubertate cum spasmis hysteris hæreditate
 acceptis conflictata sævissimos hæmorrhoidum
 cœcarum dolores, qui ultimis puerperii die-
 bus convulsiones causarunt, patiebatur ad
 omnia anodyna externa contumaces, nec hi-
 rudinibus etiam vel hilum imminutos. Lo-
 chia procedebant: quam ob rem forsan bal-
 nei tepidi usus diu renuebatur; donec ultima
 demum necessitas illius adhibitionem extor-
 sit. Et en! primo, mox balneo dolores egre-
 gie leniti, atque a 5to prorsus conquieverunt.
 Multum perinde calidis infessibus emollienti-
 bus tribuit, effecitque DE LA MOTTE. Memi-
 nit primum (b) feminæ, quæ primis tribus ge-
 stationibus ischuriam sæpius patiebatur a vehe-
 mentibus hæmorrhoidum doloribus cum insigni
 om-

(a) Abhandl. von den hyster, u. hypochondr.
 Nervenkrankh. p. 404. sq.

(b) Traité compl. des Accouchem. L. I. C. 28.
 Qbs. 424. P. 114.

omnium vicinarum partium inflammatione, ut nec alvum insuper sine maximo labore egerere posset: quapropter urina sæpissime cathetere fuit educenda; id quod majorem; quam hæmorrhoides, causabat dolorem. Injecta complura enemata mollia; bis ex brachio sanguis, ad bina semper consueta vascula, detractus. Porro infusus quotidie m. & v. per horam in decoctum emolliens ex herbis malvæ, bis-malvæ, verbasci, violariæ, chamomillæ, duabus lactis pintis remixtum ita imperati, ut natibus tantum fere umbilicotenues mergeretur; a cujus bidui, vel tridui usu convaleuit quidem, sed eadem gestatione bis terve adhuc passa est recidivam, at iisdem infusibus denuo semper profligatam, ita ut proxima abhinc gestatione nihil horum pertulerit. Alteri (a) puerperæ in 10 dies a partu optime habenti repente dein numerosæ, grandesque hæmorrhoidales varices omnem ani ambitum occuparunt cum tantis cruciatibus, ut diu noctuque quiete caruerit. Cum vero morbus ab alvo, quam inde a partu nunquam adhuc reddidit; nec ei enema sæpius tentatum injici a custode ob hæmorrhoidum tumorem posset, obstructa ortum haberet, Auctor enema primum injecit, e decocto verbasci, malvæ, flor. chamom., sem. lini, & furfur, cum melle communi ac mercuriali; quo reddito in-

(a) Ibidem L. 5. C. 12. Obs. 424, p. 813.

inseffus paulo ante descriptos imperavit, queis
 ter iteratis ægra convaluit. Quantum vero
 hi inseffus ad revocandum etiam fluxum sup-
 pressum valeant, M. SCHURIGII (a) observatio
 documento est: „viro juveni 30 aliquot anno-
 rum, „satis robusto, lumme tamen hypochon-
 „driaco, per longum temporis spatium men-
 „struatim fluxerant hæmorrhoides, & quidem
 „satis largiter. Harum ille pertæsus suasu
 „chirurgi cujusdam adstringentibus ab illo or-
 „dinatis utitur: quo facto talis hæmorrhoi-
 „dum fluxus ex voto quidem cessat, subse-
 „quente tamen post aliquot mentes menstrua
 „& quidem largissima narium hæmorrhagia,
 „quam ipse pariter ob supervenientem debi-
 „litate ægre ferens per interna, & externa
 „refrigerantia & styptica, & id genus alia,
 „sanguinis e naribus effluxum ejusdem chirurgi
 „cura impedire tentat, eoque successu, ut
 „cruor . . . nunc per penem, & quidem ite-
 „rum singulis mensibus; cum urina, ad quam
 „crebrius mittendam stimulabatur, egredere-
 „tur: unde æger hypochondriace anxius
 „meum consilium efflagitabat. Quare . . .
 „suavior ipsi eram, ut circa instantis orgasmi
 „menstrui tempus, quod ex lassitudine totius
 „corporis & aliis symptomatibus præscire,
 „atque prædicere poterat, per lenes frictio-
 „nes, circa spinam dorsi a parte superiori
 „ver-

(a) Parthenol. S. 2. C. 4. §. 5. p. 324.

„versus inferiorem, præsertim circa os sacrum,
 „partesque vicinas, item per fomentatio-
 „nes, & infessus sanguini exitum quærenti
 „viam panderet. Quod . . . ita successit,
 „ut absque medicamentis, quæ jam abhorre-
 „bat, & absque Væ Sc, quam in talo suade-
 „bam, ipse vero absque animi deliquio ferre
 „non poterat, hæmorrhoides iterum appare-
 „rent, quas ad hunc usque diem ultra 20 ali-
 „quot annos optima cum sanitate menstrua-
 „tim experitur.“ Ad immodicum denique
 hæmorrhoidum fluxum cohibendum „brachio-
 „rum in liquorem aquoso-vinosum tepidum
 „immissio apprime ex usu est“ F. HOFFMANNO
 (a) teste; nec abs re, quandoquidem in hæ-
 moptoë simplex hoc præsidium sæpe ad mira-
 culum prodest.

b) *Frigida* vero pene majoris sunt uti-
 litatis; siquidem non modo præsentis malo
 sæpe medeantur, sed etiam reversionem illius
 arceant. Enimvero ubi nimia vasorum seda-
 lium laxitas vel varicibus dolorificis, vel pro-
 fluvio immodico, vel ani quoque prolapsui
 ansam præbet, aquæ frigidæ lotiones vel in-
 fessus nativum reparando tonum & præsen-
 tia hæc mala tollunt, & ulteriori usu reditum
 eorum præpediunt. Hinc G. E. HAMBERGE-
 RUS

(a) Med. rat. syst. T. 4. P. 2. S. 1. C. 4. curat.
 §. 1.

BUS (a) „ad præcavendas (ait) . . . coecas
 „hæmorrhoides nihil præstantius est quotidiana
 „lotione ani cum aqua frigida“ POMME (b)
 meminit civis 36 annorum, atrabiliarii, qui
 a longo tempore nimium hæmorrhoidum flu-
 xum variis oppugnabat remediis. Suspicio
 erat, malum esse syphiliticæ originis: inili-
 tata ergo provide anticeptica curatione fluxus
 remisit. Aliquando autem ira vehementi per-
 cito rediit idem tantopere, ut per integrum
 mensem quotidie fere $\frac{1}{2}$ j. sanguinis effluxe-
 rit. Fluxum hunc excepit inflatio faciei, ac
 pedum cum colicis. Nulla adstringentia data,
 sed plastica (ob sanguinem a Ψ o attenuatum)
 sub diætâ analeptica humectante, externe
 vero crebra enemata refrigerantia, & balnea
 frigida imperata hæmorrhagiam compescuere;
 inflatio autem equitatione demum plane di-
 sparuit, ægerque omnino convaluit. DÜREN
 apud S. BLANCARDUM (c) refert virum quem-
 dam a nimio hæmorrhoidum profluvio nullis
 cedente remediis medici tandem stratagemate
 fuisse vindicatum. Duorum subornatorum
 famulorum uno herum irritante alter a tergo
 nihil opinantis corpus urceo aquæ frigidæ
 repente perfudit: unde terro hero & vasis
 aquæ frigore contractis hæmorrhagia substi-
 tit.

(a) Diff. cit. §. 52. ad calcem.

(b) L. c. p. 219.

(c) L. c. Obs. 79.

tit. 8. WHYTT (a) in fluxu nimio balneum aquæ marinæ commendat, quo una ægrarum illius, nondum quinquagenaria tanto hæmorrhoidum profluvio obnoxia, ut raro alvum egerit, quin multum simul sanguinis amiserit, plus quam alia quavis re profecit; namque inde non fluxus, tantum imminutus est, sed appetentia quoque emendabatur, & ægra vires colligens vividiores etiam colorem est adeptæ.

C A P U T V.

CUCURBITAE SICCAE.

§. CXXXIV.

V. CUCURBITAE *siccæ* quemadmodum in alia quavis hæmorrhagia vel nimia compescenda vel suppressa cum læsione functionum revocanda magnæ sæpe sunt utilitatis, dum visum contrarium visui morbofo sanguinis inducunt; sicque illum a læsa parte aliorum alliciunt; ita etiam in hæmorrhoidum fluxu
vel

(a) Beobacht. über die Natur, Ursachen, und Heil. der Nerven. Hypochondr. u. hyster. Zufälle. 7. Cap. 1. m. 528.

vel nimio cohibendo vel suppresso versus anum derivando non contemnendam sæpe operam præstant. Dum fluxus hic suppressus caput, pectus, abdomenve laceffit, cucurbitarum siccarum applicationem ad femora consulit. M. ALBERTI (a); in immodico autem hæmorrhoidum profluvio vel hæmaturia hæmorrhoidali non sine successu ad mammas affiguntur. Quemadmodum cucurbitæ siccae, inquit. I. JEITTELES (b) „ad mammas „muliebres applicatæ ad hæmorrhagias uteri „sistendas, vel saltem moderandas potentissimæ admodum deprehensæ sunt; ita non „raro eas ad eadem loca in viris appositas in „sistendo vel saltem moderando fluxu hæmorrhoidali, cruentoque mictu ab hæmorrhoidibus ita dictis vesicæ originem trahente „proficuas apprime deprehendi.“

CAPUT

(a) Diff. de hæmorrhoidum consen. cum capite, & pectore §. 25. Tract. cit. P. 2 p. 109.

(b) Observata quædam med. §. 17. p. 15. sq.

CAPUT VI.

REPOSITIO ANI PROCIDUL

§. CXXXV.

VI. **R**EPOSITIO *ani prolapsi* cum varicibus sub nixibus vel alvinis, vel quibusvis aliis evenientis, ut alibi (a) vidimus, sæpe tam est necessaria, ut hac neglecta nec dolor nec fluxus, adhibitis quibuscunque aliis præsiidiis conquiescant: unde L. DURETUS (b) „sæpe „multos animadverti (ait), qui ab hæmo- „hoidibus immisericorditer cruciabantur; qui „nec fotu, nullo tapso, nullo cataplasmate, nul- „lo denique anodinatorum mitescebat dolor, „priusquam pars restitueretur suo loco, & ut ac- „cidit in prolapsu ani, nam vel suspensio ipsa „facit dolorem . . . Sed inter omnia primum „studeamus; ut partem suo pristino loco re- „stituamus; nam hæc partis restitutio dolorem „sedat, ut in M. HOSPITALIO Galliæ cancel- „lario hæmorrhoidibus diuturnis vexato sæpe „experti sumus.“ (c) Aliquando etiam acci- „dit,

(a) Vide §. 53. II. Nro. 6.

(b) L. c. p. m. 577.

(c) Ibidem p. m. 581.

dit, ut prostantibus tuberculis internis oboriatur fluxus hepatico similis, qui nullis cedit remediis, sola vero repositione desinit, cuius rei exemplum R. F. OVELCÜN (a) suppe-
ditat de sene 62 annum agente, melancholico-
sanguineo, qui post cœcas hæmorrhoides to-
piciis retropulsas varia illarum molimina gra-
vissima 11 annis perpeffus, ubi ab idoneis
remediis denuo hæmorrhoides primum cœ-
cæ, dein fluentes etiam venissent, multis dein-
ceps annis commodius habuit. Verum ante
ultimum sexennium obortus alvi fluxus lo-
tūræ carniū jam aquosiori, jam plus cruentæ
similis, indusum, braccasque foedans, ad re-
media increscens potius, ex intermittente jam
fere continuus factus vires sensim pessumda-
bat, quem ahi tuberculis hæmorrhoidalibus
carnem crudam referentibus obsiti accidens
aliquando, nec repositus, prolapsus causavit:
donec demum facta ab ipso ægro repositio
linteo molli fluxum illico compescuit; qui
vero toties iterum revertebatur, quoties æger
prolapsum sub alvi egestionē rectum obli-
viscebatur reponere; facta autem repositione
rursus desinebat. Hoc ipso etiam fluxu ex
eadem causa frater illius laborans eadem pe-
rinde arte ab eodem liberabatur. Sopito hoc
fluxu vires ambo ammissas, sub diætā bonā
recuperarunt. Subinde tamen repositionem
vel

vel ficitas elapsi ani, vel varicum moles moratur: idcirco primo in casu pars elapsa humectanda, ut MORGAGNI (*a*) femina factitabat, in altero autem varices prius vacuandæ, vel discutientibus vel hirudinibus vel scarificatione (*b*).

CAPUT VII.

L I G A T U R A.

§. CXXXVI.

VII. **LIGATURA** etiam olim ad cœcas hæmorrhoides fuit commendata. HIPPOCRATES eo quidem libro, quem de hæmorrhoidibus (*c*) inscripsit, nullam illius injecit mentionem; at de ratione victus in morbis acutis (*d*) agens disertis eam verbis consulit: hunc CÆLSUS (*e*) exscripsit; istos alii, quos inter R. FONSECA (*f*) „curantur autem (inquit) hæmorrhoides
usti

(*a*) Vide §. 126. *a*) „

(*b*) YOUNG l. c.

(*c*) FOESSI opp. T. I. p. 891. sqq.

(*d*) Ibidem p. 406.

(*e*) L. 7. C. 30. Nro 3.

(*f*) L. c. T. I. Conf. 27. p. m. 181. sq.

„ustione, sectione aut ligatura, ut docet
 „HIPPOCRATES, sed 4to acutorum probat li-
 „gaturam, quam etiam FALLOPIUS approbat
 „magis, quam cetera.“ Verum enimvero
 cum in spuriiis hæmorrhoidibus, sive alius
 indolis excrescentiis ani locum illæ ligaturæ
 aliquando habere possint, in veris profecto
 tuberculis hæmorrhoidalibus sunt periculosæ.
 Ligatura enim teste I. L. SCHMUCKERO (a)
 tunc „non modo vehementissimos dolores,
 „coarctationes intestini recti, inflammationes,
 „ac spasmos letales causaret, verum etiam,
 „cum vinculum quotidie magis contrahi de-
 „beret, æger ex his supervenientibus malis
 „prius certe periret (præsertim si ligatura plu-
 „ribus in tuberculis simul ac semel institueret-
 „tur) quam ista delabi quirent.“ Vera hæc
 esse jam olim L. DURETUS (b) expertus est.
 „Memini (refert ille) vidisse me abhinc 16
 „annis in Episcopo, qui mariscam habebat,
 „quæ colore & consistentiâ cutim naturaliter
 „constitutam referebat. Quidam peritissimi
 „Chirurgi suaserunt, ut constringeretur accu-
 „rate, ut excideret; negabam esse faciendum
 „... ac dicebam multas calamitates posse
 „accidere. Lino constricta est; ut morere-
 „tur; & excideret. Ecce doloris nata est
 „acerbitas, ac in convulsionem incidit. Illud
 est

(a) L. c. p. 110. fq.

(b) L. c. p. m. 577. fq.

„est manu chirurgica curare, sed non sanare.“
 Haud secius M. PURMANNUS (a) narrat pecti-
 num confectori cœcas hæmorrhoides a chi-
 rurgo arcte filo fuisse ligatas, ut exciderent;
 verum infandos inde dolores & convulsiones
 accidisse. Auctor accersitus plurimum habuit
 laboris in servando demtis vinculis homine.
 Ex his itaque abunde liquet, quantopere hic
 ligaturæ sint vitandæ. Hinc dum S. BLAN-
 CARDUS (b) „verbi divini pastorem, qui diu
 „erat hæmorrhoidibus vexatus, sola ligatura
 „curavit, & postea ab hoc malo liberatus
 „aliquot annos sanus vixit“ non tam veras illas
 opinor fuisse varices hæmorrhoidales; quam
 carnosas potius quasdam circa anum excre-
 scentias, quæ spuris hæmorrhoides vocari
 solent.

CAPUT VIII.

U S T I O.

§. CXXXVII.

VIII. **U**STIO hæmorrhoidum immodice au-
 gentium, si hæ nulla alia arte sisti possint, ve-
 lut extremum fluxus compescendi auxilium
 ten-

(a) L. c. p. 473.

(b) Instit. chirurg. P. 3. C. 20. Opp. T. 2. p.
 m. 462.

tentata est, nec poenitendo eventu. Duplici autem methodo administratur, nempe:

I. *Corrugans*, dum ignitum ferrum vasis hæmorrhoidalibus patulis cominus quidem at citra contactum admovetur, ut illa æstu ignis corrugentur tantum, & varices, earumque hiatus aboleantur, sicque sanguinis ex iis cursus consistat. Atque hæc tantum methodus familiaris fuit HIPPOCRATI (a) scribenti: „ferrament. 7. 8ve parari jubeo, quæ „magnitudine palmum, & crassum specillum „crassitudine æquent, extrema parte recurva, „& in summo ad oboli parvi formam lata. „Post exhibitum pridie medicamentum purgans eodem, quo ad ustionem aggredieris, „die homo supinus reclinatur, pulvinoque „lumbis supposito sedes digitis quam maxime „foras educitur, tum candentibus admotis „ferramentis uruntur, quoad resiccentur, ita „ut ne *contingas* . . . Inter urendum autem „a quibusdam caput & manus detineantur, „ne moveatur, sed clamet, qui inuritur; „hoc enim pacto anus magis prominet“ &c. Ac paulo post (b) „ustio (ait) adhibenda ea „cautione, ut ne ferro attingatur, sed præpe „admotis ferramentis exsiccetur.“ Haud sum quidem nescius, variare hac in descriptione

vete

(a) Libr. de hæmorrhoidib. p. m. 891.

(b) Ibidem p. m. 893.

veteres codices Græcos quoad non nullas
 voculas, ut ex A. FÖRSIO (a) colligere est,
 ad quas etiam FROMMANNUS (b) aliique adhæ-
 lere; sed si omnem contextum, ipsamque ad-
 nexam ulteriorem in COO curationem atten-
 te expendas, intelliges, ferro tactum partis
 vetari. Confirmat id ipsum & alia ejus uren-
 darum hæmorrhoidum, quæ paulo altius in-
 tra intestinum rectum delitescent, descripta
 methodus (c), ad quam exsequendam „cau-
 „terium (inquit) parare oportet, in modum
 „parvæ arundinis vallatorię (phragmiten vo-
 „cant), & in ipsum ferramentum probe con-
 „gruens accommodare; deinde immissa in sedem
 „fistula candens ferramentum in eam demit-
 „tere, crebroque eximere, quo magis calo-
 „rem toleret, neque ulcus ex calore contra-
 „hat, & venulæ exsiccatae consanescant.“
 Methodus tamen utraque hodie exolevit, tum
 ob ignaviam ac mollitiem ægrorum hodierni
 ævi; tum ob medendi methodum hodie effica-
 ciores, per mitiora, ut raro AESCULAPIUS
 nunc VULCANI ope indigeat. Interea tamen
 I. R. FORTI (d) hoc remedii genere se in
 plurimis ægris felicissimo cum successu usum
 fuisse

(a) Ibid. p. m. 892.

(b) L. c. P. 2. Probl. 9. p. 252. 19.

(c) L. c. p. m. 894.

(d) Conf. & resp. med. Cent. 2. Obs. 99.

fuisse refert; neque forte efficacius, celeriusque præsidium reperitur ad reponendum ani prolapsum, ubi multæ, & grandiores varices hæmorrhoidales ejus reductionem remorantur: enimvero „lamina candente mox admota co-
 „minus hæmorrhoides contrahuntur, inquit
 „I. RHODIUS (a), ac veluti corrugantur, quæ
 „in suum reposita locum, ne denuo procidant,
 „annulo ferreo dextre cohibentur, quem sum-
 „mi ingenii viro PAULO (SARPI) servitæ vene-
 „to plures magno commodo acceptum refe-
 „runt. Annulum vero aluta utrinque conti-
 „net, quæ perinæum, & clunes versus fa-
 „sciis 4 ejus capitibus adsutis lineo cingulo
 „innexis firmatur.“ Atque hæc de prima hæ-
 „morrhoides adurendi methodo, cujus ferra-
 „menta ab HIPPOCRATE adhibita in iconibus
 „videre est, apud I. SCULTETUM novissime ab
 „I. C. SPROEGELIO editum (b). Altera

b) *Escharotica* est, dum candente ferro tactæ hæmorrhoides ita aduruntur, ut crustam in superficie nanciscantur. Hac usum unquam fuisse eorum non constat; ab aliis tamen adhibitam fuisse satis constat, de qua L. HEISTERUS (c) „antiquiores quidem nonnulli me-
 dici

(a) Obs. med. Cent. 2. Obs. 94.

(b) Armam. chirurg. (8. Amstel. 1741) Tab. 13_r & 44.

(c) Instit. Chirurg. P. 2. S. 5. C. 166. §. 2. p. 1048.

„dici (inquit), ubi medicamenta adstringen-
 „tia parum proficiebant, quæ mox, licet male,
 „adhibebant, ferro candente admoto vena-
 „rum ora sanguinem fundentia graviter aduf-
 „serunt . . . Recentiores autem vel ipsa ex-
 „perientia magistra didicerunt, veterem hanc
 „curandi rationem . . . quæ igne instituitur,
 „non nimis tantum crudelem esse; sed &
 „plerumque prorsus perniciosam.“ Interea
 tamen, si vetustate incrassatæ sint varices,
 vivo eas igne tangi, & magna pro parte ab-
 sumi nil vetat, imo sæpe necessum est; cum
 alioquin sese nullatenus jam contrahere que-
 ant. „Dantur quippe casus, inquit A. HAEN
 „(a), ubi hæmorrhoides copiosæ tument circa
 „anum, tumentque enormiter, ac spongiosæ
 „factæ, & veluti carnosæ ultra in anum re-
 „duci nequeunt: hinc dolores ad alvum into-
 „lerabiles; alvus vix ultra movenda, proflu-
 „vium sanguinis perpetuum, ut hydrops in-
 „de nascatur, aut continuæ fere oriantur de-
 „bilitates ac syncopes. Talem casum vidi in
 „virgine quadam; inito consilio, & eradi-
 „catione conclusa vidi dexterrimum vetera-
 „num chirurgum DRINGBERG cauterio acti-
 „ali magnitudinem auferentem plus quam pomi
 „aurantiorum, & parvum relinquentem tuber-
 „culum, quod bene sanguinem fundebat: hinc
 „semper ea via aperta servabatur.“ Neque
 fini-

(a) Prælect. cit. T. 5. ad §. 1235. P. 372.

similis ustio infelicitèr cecidit **I. SCULTETO**
 (a) „in nobili veneto **EXCONTARENORUM** stirpe
 „nato, juvene 26 annorum, temperamenti
 „sanguinei, tempore veris laborante primum
 „(antehac enim nunquam) hæmorrhoidibus
 „externis nimium fluentibus; ad quem voca-
 „tus venam brachii dextri internam incidi,
 „dorsoque cucurbitulas sine scarificatione sic-
 „cas applicari jussi, conservam rosarum anti-
 „quam cum croco ♂ (non neglectis ligaturis
 „partium superiorum) per os ut sumeret, ex-
 „hibui, & medicamenta valida adstringendi
 „facultate prædita, ovique albumine subacta
 „& gossipio unto excepta parti affectæ appo-
 „sui: nihilominus tamen fluxus semper ve-
 „hemens duravit, ægerque rubicundus alias
 „in colorem pallidissimum fuit mutatus, ita
 „ut de vita sua periclitaretur . . . Unde do-
 „mum festinans necessariis me instruxi instru-
 „mentis, punctalibus nimirum (b), quæ re-
 „trocedens famulo . . . ut ea ignita redde-
 „ret, tradidi, quibus optime ignitis omnium
 „venarum hæmorrhoidalium, quæ fluxerunt,
 „ostiola singillatim tetigi, crustamque induxi,
 „a superioribus incipiendo, ne sanguis ex
 „intactis defluens ferramenta ignita extin-
 „gueret . . . sanguine chirurgia suppresso,
 „& optima victus instaurantis regula obser-
 vata

(a) L. c. Tab. 44. p. 136. fq.

(b) Ibidem Tab. 22. fig. 5. 6.

„vata nobilis ille pristinae sanitati restitutus
 „fuit; cui consului, ut singulo trimestri cucur-
 „bitulas 4 scapulis, & dorso affixas, & scari-
 „ficatas adhiberet, ne natura in futurum san-
 „guinis abundantiam per venas ani expellere
 „assuesceret. His rite observatis ab hæmo-
 „rrhoidum fluxu liber per decennium integer-
 „rima sanitate vixit. Quodsi natura prædicti
 „nobilis hæmorrhoides antehac sæpius ape-
 „ruisset, & quasi assueta ad hanc solam par-
 „tem superflua transmittere solita fuisset,
 „unicam hæmorrhoidum ferro intactam reli-
 „quisssem.“ &c. Alium uestionis ejusdem ca-
 „sum I. B. LAMZWEERDE (a) suppeditat: „ru-
 „sticus . . . annorum 70 post intolerabiles hæ-
 „morrhoidum dolores, & quævis frustra ten-
 „tata remedia persuasione magistri mei opera-
 „tionem chirurgicam admittit, quæ . . . feli-
 „citer per scalpra obtusa, & ignita ferratim
 „perficitur, apposito vulnere actuali cauterio,
 „ne nimia hæmorrhagia subsequeretur; quod
 „ulcus aliorum instar brevi curabatur.“ Huc
 & S. BLANCARDI (b) casus pertinet, nobilem
 Polonum 48 annorum, sanguineo cholericum
 & gravi arthritide sæpius obnoxium, circa
 Novembrem A. 1689 tenesmus invasit, in
 dies ingravescens, ut demum omni momento
 ad

(a) Ibid. append. 1. Obs. 94. p. m. 651.

(b) Instit. chirurg. P. 3. C. 20. Opp. T. 2. p.
 462. sqq.

ad desidendum coegerit, licet vel nihil, vel pauxillum mucii egereretur. Frustra plurimis enematibus injectis Aprili 1690 alios consuluit æger. Indito in anum digito altius latentia tubercula hæmorrhoidalia detecta sunt. Idcirco bis quotidie injectis enematibus, admotisque ano cataplasmatibus malum foras attrahentibus id effectum, ut multi nodi duri ex uno latere circum anum enascerentur, atque ita fex egerenda, insignes intra, extraque anum causaret dolores. Horum nodorum aliqui exulcerati multum puris præbuere, ceteris nil mutatis. Post plurima rursus, diuque adhibita nec quidquam remedia æger aliquando multum sanguinis coacti egeffit, & abhinc ingens humorum acrium vis ano involuntarie exire cœpit, ut nycthemeri spatio 8 vel 10 mantilibus opus fuerit, alvo nihilominus segni, difficilique manente, ut syrupo cathartico fuerit promovenda. Tandem nodi anum obsidentes duri in unum majorem, ac duriores confluentes totum pene anum obduxere. Nec cerata, & cataplasmata numerosa, nec longus decocti e radice chinæ, & falsæparillæ potus vel hilum profuit. Arthritis vero, ex quo morbus præsens occepit, parum vexavit. Aeger cetera sanus, & mediocriter appetens cum A. 1691. commendatum ptyalismum reformidaret, Auctorem consuluit. Suasit hic, ut sub usu internorum alvum semper liberam præstantium bis quotidie sumeret Sem ex æthiope min. & Lap. 69:

externe consuluit nodorum hæmorrhoidalium cauterio absumptionem, ut ad internos facilius evadat accessus. Ablata crusta, & sanata plaga, ut indatur balanus e melle, & ☉lo alb. Sic æger ante 3um mensem convaleuit. Memoria etiam dignum est unctionis exemplum ab A. MASSARIA (a) literis proditum. A. 1569. F. C. V. dolore primum, dein immoderato correptus est hæmorrhoidum fluxu omnia eludente remedia, ita ut demum Patavini medici unctionem solam superesse judicarent: Accitus ergo Neapoli FABRICIUS chirurgus hujus operationis gnarus ægrum primum vinciri iussit, ne ullo sese modo movere; sicque operationem interturbare posset: deinde singula hæmorrhoidum capita ab intestino leviter excoiavit separavitque; tum apta ad id acu forti obducto filo fere ad extremum tota perforavit, & stricte obvinxit, consuitque. Demum forfice venarum particulam abstulit, residuamque ex sutura partem ignito ferro combussit. Ab hac ligatura sectione, & unctione dolor, ac febris emicuit; sed idoneis adhibitis remediis, æger a febre, dolore ac hæmorrhoidum fluxu intra paucos dies liberatus est, pristinaque redditus sanitati. Sed nimis sibi fidens cum Væ Sem, cathartica, probamque diætam neglexisset, e pestilenti febre proximo anno interiit. „Quæ cum fuerit

(a) Praef. meth. L. 2.

„fuerit felix Neapolitani Chirurgi curatio,
 „non minus ea felix fuit nostra, inquit M. A.
 „SEVERINUS (a), quam in R. P. BENIGNO
 „ . . . peregrinus, cui cœnobitæ . . . vari-
 „cula perdolens, ac sane gravis cum nullis
 „unquam aut internis, aut externis accommo-
 „datissimis præfidiis levata fuisset, igne per me
 „ . . . adhibito subinde discussa est semel,
 „vivitque jam homo integer ab illo, qui per-
 „petuo sub mortis sinu vivere videbatur.“
 Atque ex his liquet, haud ita sæpe esse per-
 niciosam hanc ustionem, atque L. HEISTER-
 RO visa est. Vivi autem ignis in locum cau-
 stica quoque remedia interdum Veteres ad-
 hibuerunt, ut ex CÆLSEO (b) intelligere est
 scribente: „si ista (styptica) parum juvant,
 „solent imposita medicamenta adurentia ea
 „capitula absumere. . . Adustis capitulis fit
 „cicatrix, quæ sanguinem fundi prohibet.“

§. CXXXVIII.

Cautela tamen in hæmorrhoidum ustione
 alterutra tenenda est, ut vel unum capitulum
 hæmorrhoidale, si plura urenda sint, intactum
 relinquatur, vel si unicum est, illud non
 funditus; sed ad minimam usque sui molem
 igne

(a) L. c. Pyrotechn. L. 2. P. 1. C. 97. p.
 m. 265.

(b) L. 6. C. 18, Nro. 9.

igne reducatur, ut aliqua nempe via sanguini deinceps egressuro relinquatur; ne alioquin omni intercepto simul ac semel exitu ille aliorsum regurgitans alios excitet morbos (a); vel, ut omnibus capitulis venarum igne exustis fluxus hæmorrhoidalis impofterum arte suppleatur. Multa nihilominus hac de re inter medicos existit controversia, cui HIPPOCRATES occasionem videtur præbuisse; nam cum alias (b) dicat: „urere vero illa oportet, ut earum venarum, quæ sanguinem fundunt, nulla iniusta relinquatur, sed omnes adurantur.“ Alibi (c) nihilo secius „diuturnum sanguinis profluvium per ora venarum (inquirit); quæ in ano sunt, (hæmorrhoidas dicunt), curanti nisi una fervetur, periculum est, ne aqua inter cutem, aut tabes succedat.“ Quæ posterior sententia eo etiam verior, & COO dignior visa est; quo magis experientiæ respondet (d), quam prior. Utræque tamen suos nacta est patronos, ita ut, qui priorem etiam tuentur, toti sint in posteriore varie interpretanda, & quidem

I) ABO

(a) Vide §. 55.

(b) De hæmorrhoid. p. m. 891.

(c) Sect. 6. aphor. 12.

(d) Vide §. 55.

1) AETIUS (a) contendit HIPPOCRATEM scripsisse „hæmorrhoidas sananti inveteratas, *si non adservetur*, periculum est hydropem, aut tabem succedere, non enim velut quidam opinantur, dixit, *si non una fuerit servata* hæmorrhoids ad sanguinis excretionem; sed dixit; *si non adservetur*; hoc est, si non convenienti diæta utatur. Quod autem sic velit HIPPOCRATES, ipsa aphorismi distinctio ostendit; ait enim hic vir: hæmorrhoidas inveteratas sananti; est autem sanatio perfecta liberatio, & legitima curatio. Quare juxta HIPPOCRATEM non oportet aliquam hæmorrhoidem relinquere, sed omnes excindere, & post perfectam ipsarum curationem per convenientem . . . diætam ad naturalem statum corpus curatum reducere, incidereque cubiti venam tempore opportuno, quo videlicet coacervatus in corpore sanguis evacuetur.“ Hæc ille. Verum ab omnibus rejecta est COI hæc interpretatio, quippe quæ contra fidem omnium codicum M. SS sit, ut recte observat E. FERDINANDI (a): quandoquidem in singulis vocula *una* reperitur.

2. Alii vero plerique volunt COI aphorismum ad habituales tantum hæmorrhoides, quas

(a) Serm. 14. C. 5.

(b) Histor. med. 16. p. 42.

quas ipse per *diuturnum* . . . *profluvium* intellexerit, pertinere, non item ad recentes. Sic homini SCULTETI (a) morbum recentem passo ad unam omnes adustæ fuere cum euphoria, & sanitatis constantia; virgini contra HAENII (b) unicum tantum tuber habenti vetustum ustio eatenus solummodo est adhibita, quæ tuberculo plurimum imminuto, non prorsus extirpato fluxum moderaretur, non ex integro cohiberet. Imo VALLESIIUS (c) etiam habitualement fluxum cesset ustione posse in totum supprimi; at non sine prudenti, ac provida methodo, nempe „(inquit ille) impossibile non esse, ut multi „putant, ex HIPPOCRATIS opinione fieri, „ut ex multis hæmorrhoidibus, illisque inveteratis homo sanus integre aliquando „evadat; non enim præcipit HIPPOCRATES „illam unam, quæ servatur, perpetuo servare; sed hic quoque (ut in aliis omnibus) „sensim consuetudinem permutare. Quoniam igitur ex multo tempore consueta erat „illa vacuatio, supprimendæ sunt (his quoque præmissa totius corporis cura) una servata, continendusque deinde homo in bono „victu, ut intemperies corrigatur. Quod „cum

(a) Vide §. præced.

(b) Ibidem.

(c) Controvers. L. 3. C. 6.

„cum factum fuerit, licebit etiam reliquam
 „obstruere, eritque ultima hæc curatio sa-
 „natio unius hæmorrhoidis, ut HIPPOCRA-
 „TIS sententiæ nihil sit adversum, & homo
 „integræ sanitati restituatur.“ Verum con-
 silium hoc theoriam magis; quam praxim
 sapere videtur; periculosa plenum opus aleæ!
 Correcta enim intemperie fluxus hæmo-
 rrhoidalis sponte cessat; sin minus, illa non
 videtur satis correctæ: quorsum autem tunc
 hæmorrhoidis superstitis curatio sit evasura,
 nemo divinabit.

3. Alii denique nihil interesse existi-
 mant, habitualis, an recens sit immoderatus
 ille fluxus, ac tuto semper omnia venarum
 capita aduri posse censent; modo aboliti ita
 fluxus in locum vicariæ instituantur sangui-
 nis missiones, & recta vivendi ratione accumu-
 latio sanguinis in vasis præcaveatur. CELSUS (a)
 his præluxisse videtur scribens: „quoties is (flu-
 „xus) suppressus est, ne quid periculi afferat,
 „multa exercitatione dirigenda materia est,
 „prætereaque & viris, & feminis; quibus
 „menstrua non proveniunt, interdum ex
 „brachio sanguis mittendus est.“ Ad hæc
 ipsa verba videtur etiam GALENUS (b) re-
 spexisse, dum cum interpretatur dicentem,
 ex intempestiva fluxus hæmorrhoidalis per-
 cura-

(a) L. 6. C. 18. Nro. 9.

(b) In MÆP. epidem. 6. comment. 3. text. 38.

curatione in varios graves delabi morbos (a); namque intempestive seu „importune „eorum mariscis medentur (inquit), qui neque venam per circuitus scindunt, neque „alvum ducentibus utuntur, neque per exercitationes evacuant, neque unam ex iis „saltem relinquunt, sed omnes una tollunt. Quasi diceret, alterutrum in mariscarum sublatione esse faciendum, nimirum aut unam esse intactam relinquendam, pro moderato fluxu retinendo, aut certe sublatum penitus nulla marisca relicta fluxum esse periodicis sanguinis missionibus, & catharsibus, corporisque exercitio compensandum. Unde etiam I. HOLLERIUS (b) „ubi (inquit) hæc remedia adhibita fuerint, & per intervalla, „nulla (hæmorrhoids intacta) relinquenda videtur, præsertim cum ea purgatio non sit „naturalis, & optima victus ratione declinari queat. In recentibus quoque metu „gravioris mali una servari potest. Multis „percurantur, sed experientia docet, nisi „purgentur, & sanguis detrahatur, nescio qua melancholia & obscœnis somniis „vexari. An autem una relinquenda sit, „quæ statis periodis effluat; an obligandus „æger phlebotomiæ per intervalla, & medicamentis, id fere arbitrio ægri relinquendum; nisi quis a plebothomia, purgatione, „exer-

(a) Vide §. 55.

(b) L. c. in scholio p. m. 574.

„exercitiis deterius habeat, aut hæc leniter
 „ferens gravius ferat hæmorrhoidem. Re-
 „linquere autem unam apud HIPPOCRATEM
 „nihil aliud est; quam non secare, non ure-
 „re, non consuere, siccare, putrefacere:
 „nam liber est de hæmorrhoidibus, ubi o-
 „mnes urit, secat, curat, consuit, putrefacit,
 „siccat. Quod igitur AETIUS nullam servan-
 „dam scripsit, PAULUS contra non solum in
 „diuturnis; sed ubi stillicidii modo effluit
 „sanguis, ceteris occlusis unam relinquen-
 „dam præcipit. Servari duobus modis inter-
 „pretari poteris, vel neglecta artificiosa cu-
 „ratione, vel adhibita; si negligatur, una
 „servanda est; si adhibeatur, nulla.“ Inge-
 „niosa hæc sane sunt, sed antequam his fidem
 „adhibeam, unum id rogatos velim, qui,
 „seu una hæmorrhœis intacta sinatur pro ulte-
 „riori fluxu, seu omnibus occlusis iste vacu-
 „ationibus arte institutis compensetur, perinde
 „habent, num ita vacationum arte facien-
 „darum tempora dimetiri norint, ut ubi
 „primum sanguinis copia abundarit, eas
 „actutum instituendas esse intelligant, & in-
 „stituere semper possint? Verum nemo
 „id, opinor, dabit: nam nec tempora
 „hujus accumulationis humorum ex æquo
 „semper sibi constant, cum hæc a variis, iis-
 „que vagis plerumque causis pendeat, ut id
 „variis temporibus accidens fluxus docet; nec
 „semper vacuare, dum oporteret, seu ob di-
 „agnosin sæpe prætervisam, seu ob ægri ad-
 „iuncta id morantia est integrum. Quod si
 „vero

vero hæc ita sint, ego utique haud existimo perinde esse, seu una hæmorrhoids pro fluxu relicta fuerit, seu occlusis omnibus ille deinceps vacuationibus arte factis suppleatur; cum enim priori in casu nihil periculi sit a fluxu superstitite pertimescendum; in posteriore mehercle res non ab omni discrimine abest: nam si multo ante accumulatur in corpore humor, quam solenne vacuationis tempus advenerit; per occlusas ani venas exitum haud nactus aliorsum regurgitabit, celeriusque noxam inferre potest, quam succurri queat; præsertim cum non semper manifesta adsint accumulati humoris indicia, & si quæ forte etiam aduerint, sæpe omnibus aliis causis, quam illi, attribui soleant. Suadet quidem HOLLERIUS, ut ad sequelas attendatur, nimirum utra ex re æger deterius se habeat, ex relictane hæmorrhoides, vel vacuationibus vicariis? si enim istas gravius ferat (i. e. si hæ minus levent, quam hæmorrhoids), hæmorrhoidum fluxum præfert, & contra. Sed si ex occlusis omnibus ani venis institutis licet vacuationibus vicariis: aliquanto post ingruat letalis apoplexia, quid HOLLERII consilium a juvantibus, nocentibusque petitum est profuturum?

4. A. MASSARIAS (a) denique plus sibi hic omnibus aliis videre vius est, dum
con-

(a) L. c.

contendit HIPPOCRATIS aphorismum unam
 hæmorrhoidem apertam servari jubentem ad
 fluxum tantum sanguinis nigri, spissique, i.
 e. melancholici seu atrabiliarii, non item ru-
 tili, purique, pertinere; cum enim ab isto
 in corpore retento (nisi sola copia peccet,
 quæ tamen arte minui, ac demi potest) ni-
 hil mali oriri possit, ab solo atrabiliario san-
 guine retento vel hepar obstrui, hydropem-
 que inde nasci, vel pulmones infarci,
 hincque hæmoptoen, & ex isto tabem conse-
 qui posse. Hinc „interpretes (inquit ille)
 „multum laborant, ut sententiam HIPPO-
 „CRATIS, & GALENI adversus AETIUM tue-
 „antur, sed forte nemo hæctenus satis eorum
 „mentem intellexit, & explicavit: namque
 „omnes generaliter, nullaque adhibita di-
 „stinctione ajunt, fluentibus hæmorrhoidi-
 „bus unam perpetuo esse relinquendam;
 „quod censco a doctrina HIPPOCRATIS &
 „GALENI, adde & ab omni ratione esse ali-
 „enum. Etenim . . . nisi hæmorrhoides
 „melancholicum perfundant, sed probum,
 „jam nullam præceptum HIPPOCRATIS ha-
 „bet locum, neque oportet unam hæmo-
 „rrhoidem apertam relinquere“ &c. Nihilo
 tamen minus distinctio hæc sanguinis atra-
 biliarii a puro in præsentī controversia Pro-
 fessoris magis ingenium; quam Practici ex-
 perientiam veritatemque redolet; nam usus
 rerum docuit occlusis penitus hæmorrhoidi-
 bus, cujus cujus indolis fuerit sanguis abhinc
 retentus, pessimos quosque morbos fuisse

consecutos: ut proinde, ab experientia certum, assertumque maneat, sententiam COI de una haemorrhoidae aperta finenda ad habitualement fluxum cujuslibet indolis pertinere.

CAPUT IX.

APERTURA SUPPURATARUM VARICUM.

§. CXXXIX.

IX. **A**PERTURA *suppuratorum* haemorrhoidalium tuberculorum opus esse matura, nisi sponte abscessus, matureque rumpatur, non est, cur multis notissima in re moneam. Monendos id tamen tirones F. HOFFMANNUS (a) voluit; ne videlicet pus intus diutius relictum ulcera sinuosa, fistulosaque (hic praesertim ob telam cellulosa pinguem uberrimam rectum intestinum undique ambientem facile nascentia) generentur, quod inprimis de internis haemorrhoidibus suppuratis valet. Namque „facilis curatio est, inquit

(a) Ad P. POTERII Obs. med. Cent. 2. Cap. 64.
nota (1).

„quit LUDWIG (a), si abscessus in ani mar-
 „gine surgit; difficilior, si profundius ad in-
 „testinum rectum formatur. Quemadmo-
 „dum enim in his locis disquisitio, & appli-
 „catio auxilii minus recte succedit; sic etiam
 „incisio, & puris evacuatio aegrius efficitur.
 „His saepe in locis abscessus nondum matu-
 „rus aperiendus est, cum non solum dolor
 „urgeat; sed diutius latens pus acre, & ro-
 „dens fiat, & ulceribus generandis occasio-
 „nem praebeat. Facile enim ob contextum
 „cellulosum tenacem & quasi callosum in his
 „partibus haerentem abscessus in ulcera mu-
 „tantur, saepius impura & callosa; quae,
 „nisi singulari chirurgi cura et apta corre-
 „ctione humorum auxilium feratur; tardius
 „justo densa cicatrice clauduntur, atque haec
 „li nimis digestivis emolliatur, laxa fit, se-
 „pticis vero irritata rigida & nimis callosa.“
 Monente porro M. ALBERTI (b) „etiam cau-
 „tela adhibenda erit, ne incisio, si qua ne-
 „cessaria erit, quando abscessus non sponte
 „rumpitur, vel nimis profunda, vel nimis
 „superficialis existat; quin convenit apertu-
 „ram sufficientem inducere.“ Ulterior au-
 tem ratio medendi e communi abscessuum
 doctrina petenda est.

CAPUT

(a) L. c. p. 404. sq.

(b) Diss. de haemorrhoid. caecis §. 26.

CAPUT X.

ULCERA ARTE FACTA.

S. CXL.

X. **U**LCERA *arte facta* ad recidivas præcavendas interdum multum possunt, alias vero mitiores illas reddunt, si ex toto illæ averti sese haud sinunt. Usitatissimi hanc in rem sunt pedum fonticuli. G. H. VELSCHII. (a) mulier perquam procera, multis partibus editis, & dencientibus per ætatem catameniis ab anno 50 deinceps crebros experiebatur hemorrhoidum dolores, eosque ut plurimum tam acutos, ut opio opus habuerit, nempe:

℞. Conf. flor. pap. rhæad. ʒj.
 Philon. MES. ʒß.
 Laud. opiat gr. iij.
 Sach. q. s. F. boli. iij.

Linimentum hoc ei familiare fuit:

℞. Ceruss. Ven. ʒß.
 Ol. rosac.
 Pingued. caninæ aa ʒß.
 — cati silv. ʒij.
 Camphoræ ʒß. M.

Sed.

(a) Obs. med. hecatost. 2. Obs. 20.

Sed malo sæpius per annum reverso & graviora minante post crurum ad malleolos scarificationem fonticuli in tibia excitati, qui materiam plerumque magis cruentam; quam ichoroden suppeditabant. Rariores hinc jam hæmorrhoides factæ, nunquam tamen ex toto emansere, donec cum iis anus facta anno ætatis 69^o. obiit. Felicius etiam ZACUTO (a) res cecidit; æger quidam ex importuno hæmorrhoidum cæcarum, tumentiumque dolore debilis, decolor, & emaciatus, cum a fomentis, lavacris, anodynis, & admotis hiru-
dinibus non nisi ad tempus relevatus, ab internis quoque remediis haud in melius proficeret, morbusque identidem reverteretur, tandem excitatus in crure fonticulus effecit, ne porro rediret dolor. In doloribus autem, quos molimina hæmorrhoidalia in spina dorsi, coxis, aliisve in partibus creant, sopiendis quandoque sola vesicantia suris admota officium præstant. J. STORCHII (b) Chole-
ricus 48 annorum ex restitantes in longius tempus hæmorrhoidibus incidit in sævissimos dorsi, & utriusque coxæ dolores, quos cum fornicarum geminavit; usu autem Jis polychresti Auctoris, & admoto uni suræ vesicante dolor paulo post abiit, licet hæmo-
rrhoi-

(a) Prax. med. admir. L. 2. Obs. 73. p. 246.

(b) Obs. clin. ann. 4. Jul. d. 4. §. 3. No. 8.
b) p. 380.

hemorrhoides non continuo reverterint. Neque inutile fuit hoc remedium sequenti in casu (a): vir sanguineo phlegmaticus 48 annorum ante biennium hæmorrhoides primum nactus Martioprehenditur repente vehementi spinæ dorsi dolore, ac tenesmo. Datæ ꝑ polychr. auctoris ʒij. pro senis dosibus, & ob æquinoctium appetens imperata in pede Væ. So, qua neglecta cum exigua morbi fieret emendatio, alvusque esset obstructa, dabatur M. P. BECCHER. & purg. aa ʒj, ut S. quovis vespere gr. X, monito simul ægro, ut Væ So, non differatur. Hæc vero in brachio; non in talo facta, & ob dolores injectum enema, ex decocto avenæ decort. cum butyro. Ab isto cum nulla egeretur alvus, doloresque increscerent, injectum enema e sero lactis cum \ominus e, imperatumque dextram ad suram vesicans, ac datum interne:

R. Ræ, ꝑri ʒß.

Essent. croci ʒj. M.

S. mane & a meridie gtt. 30 Porro

R. ꝑri \oplus lati TACHEN.

ꝑ magnes. alb. aa ʒj. M.

Divid. in doses ij. sumat j. post pilularum dosim vesperi. Neglecto licet vesicante dolores
post

(a) Ibid. ann. 5. Mart. d. 4. p. 87.

post alvum ab enemate facti mitiores. Urgebatur ergo vesicantis admotio, & remedium continuatio. Ab his multum remisere dolores, nec nisi ex intervallis dorsum impetiere; ad litum vero ex olei scorp. & flor. 7. MYNSICHTI aa ʒiij. æger intra biduum prorsus convaleuit.

CAPUT XI.

AMULETA, TRANSPLANTATIONES.

§. CLXI.

XI. **A**MULETA denique, ac *Transplantationes* memorandæ supersunt, quæis mortales a foeditate, molestiis, cruciatibus, periculisque hæmorrhoidalis morbi vindicare sese studuerunt. Nihil utique ab his, ubi palmaria solidorum, fluidorumque vitia hunc morbum fovent, prudenter sperari posse in confesso est; ubi vero solæ systematis nervosi turbæ hæmorrhoidale malum producunt, ibi interdum hæ vel amuletorum effluviis ægro corpori applicatis, vel excitatis occasione transplantationis dictæ animi motibus (puta Gaudio, spe, hilaritate, tranquillitate), mutatoque sic systematis nervosi statu in alium, componi, cumque iis circulationis æquabilitas restitui, atque sic hæmorrhoidalis status aboleri potest.

§. CXLII.

Amuleta celebriora sunt.

(a) *Chelidonium minus*, quod interno, externoque usu quam sit efficax, alibi (a) jam vidimus: verum amuleti loco apud se gestatum ut nullius unquam ab se visae virtutis STAHLIUS (b) rejicit.

b) *Cyclaminis radix nigra* a viris, alba a feminis e collo inter scapulas pendula abigere hæmorrhoides pro certo affirmatur. Duos ipse casus narrando accepi, quos inter comitem novi, qui a fluxus nimii reversionibus hoc uno remedio immunem sese redere potuit.

c) *Hellebori nigri e foliis cingulum* ad immodicum hæmorrhoidum fluxum sistendum a pluribus commendatur, de quo J. HARTMANNUS (c) „a proprietate quadam „(inquit) valet cingulum ex foliis hellebori „nigri conquassatis recentibus nudo corpori „circumdatum Folia parumper con- „quassantur scilicet ut tantum fibræ duriuscu- „læ

(a) Vide §. 86. 128. No. 9.

(b) Colleg. casual. magn. Casu. 16. p. 195.

(c) Pract. chymiatr. p. m. 50

„læ emolliantur , postea ad fasciam filo cum
 „acu assuuntur in longum , ut fiat quasi cin-
 „gulum. Hoc feliciter usus sum“. Nimio in
 fluxu cohibendo. F. PLATERUS. (a) folia sic-
 cata renovari semper jubet : „quod reme-
 „dii genus feliciter expertam fuisse mihi ,
 „inquit J. LANZONUS (b) , falsa est honesta
 „quædam matrona Ferrarientis“.

d) *Polygonum* seu centinodium sub alis
 gestatum. G. W. WEDELIUS (c) meminit mu-
 lieris 64 annorum , colore faciei ad viridem
 inclinante (hæmorrhoidariis proprio) , cui
 hæmorrhoides & quamdiu menstrua habuit ,
 & etiam ubi hæc per ætatem dudum jam
 desiere , fluebant cum dorsi , lævique hy-
 pochondrii dolore. Sanguis ut plurimum erat
 ater , ac sæpe cum saltu velut e siphunculo
 erumpebat immodicus non sine virium jactu-
 ra , quem immoderatum fluxum , cum an-
 tea quibusvis aliis remediis non facile cede-
 re fuisset solitus , tandem solo *polygono*
 sub axillis posito sistere consuevit.

e) *Scrophulariæ radix* super nudo cor-
 pore gestata idem posse perhibetur ; sed
 „in

(a) Prax. T. 3. p. 646.

(b) Consult. med. 97. Opp. T. 2. p. 204.

(c) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 3. Obs. 22.

„in scrophularia . . . efficiaciam hanc depre-
 „hendere minime potuit D. HELWIGH (a) ,
 „cum ante aliquot annos Episcopus War-
 „miensis in Prussia ab ea in dolore maximo
 „sibi opem polliceretur“. Contra ea J. LAN-
 ZONUS (b) „radicem scrophulariæ pro amu-
 „leto appositam dorso non semel juvile ob-
 „servavit.“

f) *Telephii* (quod aliis *crassula* , vel
fabaria audit) radix , aut folia e collo inter
 scapulas pendula fluxum & dolores abigere
 dicuntur. Verum STAHLIUS (c) „vidit radi-
 „ces fabariæ , & scrophulariæ , qua integras
 „qua contusas , coctas & assas appendi , &
 „applicari , nullo prorsus effectu , ægris do-
 „lorem nihilominus perferentibus“. Sit ita ;
 alii contrarium testantur. Præcipuus telephii
 encomiastes est G. W. WEDELIUS (d) : „hoc
 „amuletum (ait ille) firmo stat talo , & sine
 „ulla superstitione , temporisque , vel loci
 „observatione medicum juxta , ægrumque ex-
 „hilarat. Quoties a partu difficili mariscæ in-
 „felices vexant , & torquent puerperas ?
 „Quam urgent sæpe dolore etiam fluentes
 hæ-

(a) Histor. morbor. Vratisl. l. c. p. m. 173.

(b) l. c. Consult. 99. 208.

(c) l. c.

(d) Misc. nat. cur. dec. I. ann. 2. Obs. 195.

„hæmorrhoides? Quot dantur hypochondriaci,
 „ci, quibus eo derivatur mali sentina? omnes
 „mnes in hoc inveniunt auxilium. Linariæ pinguedine
 „non raro exasperati dolores (neque enim pingua
 „semper patiuntur tubercula hæc); crocus metallorum,
 „magist. hni, diaph. album Græcum, cum aliis remixta
 „pigre se ut plurimum gerunt: soli tot seculis ignotato
 „huic amuleto manum dat molestissimum malum,
 „neque enim ullus Auctor vel gry quidem de illo meminit.
 „Et ne lectorem curioso hoc medicamento excludam
 „diutius, fabariam, seu telephium illud esse publice
 „jam propono. Sin observationes desiderentur, ut fides
 „fiat laudibus, ex plurimis hæc sunt loco pignoris. Serenissima
 „persona, matronæ plurimæ illud expertæ, post exantlatum
 „partum novos dolores ab his tuberculis passæ. Vir
 „primarius cum hypochondriacis plurimis conflictaretur
 „symptomatibus, fluentibus hæmorrhoidibus tubercula
 „experiebatur summe dolorifica, reliquis omnibus,
 „ipsaque linaria incassum tentata, unica nocte ab appenso
 „amuleto nil de illis sensit reliquum. Vir Reverendus
 „iisdem divexatus ad stuporem levamen percepit. Taceo
 „plures, qui sedere nequiverunt, nec stare, frustra macerati
 „a variis unguentis, linimentis & aliis externis. Appenditur
 „vero radix telepii recens (vel aliquot saltem nodi, prout
 „nodi ipsi plures vel pauciores in ano protuberant) cum filo
 „in dorso inter scapulas. Simul

„mul cum marcescente radice tabescit & evanes-
 „cescit omne tuberculum“. Id ipsum etiam
 M. ETIMÜLLERUS, (a) „probavit aliquando in
 „studioso hæmorrhoidibus cæcis admodum
 „afflicto, qui hoc usus amuleto egregie con-
 „valuit“. J. C. GORTZ (b) refert Comitem
 de METTERNICH Regis Borussiae legatum,
 dum pro gravi morbo concilium peteret, in
 exactissima data anamnesi inter cetera etiam
 hæcce inseruisse verba: „multis abhinc an-
 „nis cæcas hæmorrhoides sum expertus;
 „at quæ appensa collo per spinam dorsi faba-
 „ria semper iterum evanuerunt“. Idem in
 se quoque experimentum cœpit M. GERBEZ
 (c); verum cum interna simul efficacissima
 usurparit, ambiguum est, fabariæ, an ce-
 teris successus inde bonus sit tribuendus. Tan-
 dem T. BARTOLINUS (d) dum amuletum hoc
 „in cristis tentare voluit: non successit“.

g) *Gemmæ* quoque hic pertentatae sunt;
 imprimis vero *smaragdus* umbilico admotus
 nimio in fluxu laudatur; sed „fluxum hæmo-
 „rrhoi-

(a) l. c. p. 151.

(b) Annal. Vratisl. Tent. 14. A. 1720. No-
 vemb. d. 4. art. 13. p. 562. & Act. nat.
 cur. Vol. 2. Obs. 195. No. 18.

(c) Vide §. 84. c.)

(d) Act. Hafn. Vol. 1. Obs. 51.

„rrhoidum non compescere smaragdum um-
 „bilico impositum quater in variis deprehen-
 „dit“ 1. LANZONUS (a). Eadem forte fors
 est *lapidum hieracitis*, & *Indici* a quibus
 hunc fluxum sisti scripsit GALENUS (b); si-
 quidem vix memoria illorum hic superfit.
 Huc adde annulum e lapide sanguineo novae
 Hispaniae a N. Monarde descriptum.

§. CXLIII.

2. *Transplantatio* autem quemadmo-
 dum amuleti multo est vanior; ita etiam
 rarius legitur commendata, nec nisi duas
 novi plantas, quarum ope medendi haec
 methodus pertentata est, quarum una

a) *Chondrilla* est, de qua PANAROLUS
 (c) „magister meus (inquit) P. CASTELLUS
 „ajebat se expertum fuisse; hæmorrhoides, si
 „tangantur tuberosa radice chondrillæ, sicca-
 „ri, si chondrilla siccet; corrumpi vero;
 „si corrumpatur; quapropter sub camino
 „exsiccanda ponitur post hujusmodi tactum
 „chon-

(a) Misc. nat. eur. dec. 3. ann. 1. Obs. 26.

(b) De simpl. medic. facult. L. 9.

(c) Arcanor. Fascic. I. in opusc. ad calcem
 medicinal. observ. p. m. 415.

„chondrilla tuberosa.“ Quod ipsum etiam se ex eodem magistro coram audivisse testatur T. BARTHOLINUS (a). Altera harum plantarum est.

b) *Hæmorrhoidalis* herba Italica non ignota. „Ea tactæ hæmorrhoides dolentes, melius habent, inquit ROLFINK (b), si per diem circa femur gestetur, & mox in fumante camino suspendatur; ut herba; ita & hæmorrhoides corrugantur, omnisque evanescit dolor.“

SECTIO

(a) In epist. præmissa ad H. GRUEB analysi nov. de transplant. morb. p. 17.

(b) Epit. L. 3. C. 21.

S E C T I O III.

D I A E T A.

CAPUT I.

A L I M E N T A.

§. CXLIV.

I. **A**LIMENTA *medicamentosa* (id est: medicamentorum, quæ in dato quovis hujus morbi casu ex indicationibus præbenda sunt, indoli quam maxime affinia) esse oportet: idcirco talibus nutriendi sunt ægri, quæ varia morbi causa, variusque cum morbi tum alvi status exposcit. Atque hæc generalis est regula, ad quosvis morbi hæmorrhoidalis differentes, ac sæpe sibi e diametro oppositos casus facile aptanda. Sic, ubi cœcarum hæmorrhoidum comes fuerit inflammatio, victu opus erit antiphlogistico; sin absque inflammatione tumuerint, utendum est diluentibus,

sol-

solventibus, humectantibus, ubi immodicus illarum acciderit fluxus, ad hujus causam (quæ varia prorsus esse potest) minuendam, auferendamque victus idoneus est imperandus, ita ut si nimia eum solidorum laxitas fovet; tonicis stypticisque cibis, ac præsertim potibus opus sit, sin tenuitas acris humorum in causa sit, plastica edulia, ac potulenta tunc multum profunt, atque huc forte referendus est ostreorum proficius esus (a) sequenti in casu observatus: „mulier sanguineo-atrabili-
 „osa 40 annorum, calculo vesicæ diu afflicta,
 „incidit in nimium hæmorrhoidum, & men-
 „struorum fluxum; his accessit icterus, habi-
 „tus cachecticus, tumor pedum œdematosus.
 „Quæcunque adhibebantur temperatissima, po-
 „tenter hæmorrhagiam moverunt: unde de-
 „liquia, icterus, & tumor augebantur, nec
 „quidem ex vegetabili temperatissimas herbas,
 „aut earum infusa aut juscula, quin nec pau-
 „cas impune vel simplicissimi Mūs ①. dulcis
 „guttas sumsit, quo non ægrius valuisset. In
 „statu hoc ancipiti ostreas crudas bis de die
 „No. 5 recentes comederet, ordinavi, & in-
 „tra 15 dies icterus, tumorque discessit, hæ-
 „morrhagiæ temperatæ processerunt, & con-
 „valuit, vitamque jam 10 annis incolumem
 ducit,

(a) Des Magens Vertheidigung der edlen Au-
 stern (8vo Prag. 1731. von I. I. M. M. P. P.
 Cap. 3. p. 62.

„ducit, excepto calculo vesicæ, quem quidem adhuc; sed tamen commode fert, quotannis congruo tempore ostreorum reassumens curam.“ Universim autem alvinæ excretionis in omni hoc morbo præcipua est ratio habenda, ut illa sit semper libera facilisque, ac mollis, præsertim ubi insignis intestinorum siccitas eam raram, duram difficilemque reddit, quam eccoproticis enematibusque ad officium, reduci debere superius (a) dictum est. „Ne vero crebrioribus clysmatibus, inquit LUDWIG (b), & purgantibus opus sit, ea diætæ ratio ineunda est, quæ præter blandam nutritionem etiam liberiores alvi excretiones efficiat, & juvet.“ Quænam autem illa sint alimenta, quorum ope id obtineri possit, non judicavi singillatim esse recensenda, ne promptuarium alimentare condere cogar. Porro autem „illud regimen circa alvinam depositionem tenendum est, inquit M. ALBERTI (c), ne hæmorrhoidarii ob negligentiam, aut socordiam aut impatientiam eandem diutius retineant; sed sedulo & sine longa mora naturæ ductum, & stimulum sequantur, & provide attendant,

(a) Vide §. 61. §119. No. 1. 3.

(b) L. c. p. 396.

(c) Diss. de hæmorrhoidariorum regimine & diætâ §. 15. Tract. de hæmorrhoid. P. 2. p. 149.

„dant, ne contra consuetudinem alvum reprimant; & retineant: alias eadem successive perturbatur, exsiccatur, indurescit, segnis redditur, quin denique actu adstringitur.“ Sicque, quod probo victu lucraturus erat æger, negligentiae suæ culpa reddit irritum. In omni autem hæmorrhoidali ægritudine vitare in cibis, potuque oportet cruda, sicca, dyspepta, flatulenta, acria, & idiosyncrasiae adversa, tum sanguinem rarefacientia, ejusque motum placidum perturbantia, vel alvum acriter, multumve cientia, & ante omnia ingluviem, præsertim debilibus, ac plethoricis (his ob incrementem inde sanguinis copiam; illis ob indigestiones, flatus, colicas, &c. inde provenientes) nocivam. Plura huc facientia prolixiori doctrina data videre licet apud ALBERTIUM (a), FROMMANNUM (b), aliosque.

CAPUT II.

A E R.

§. CXLV.

II. **A**_{ER}. Hæmorrhoidariis utilissimus est blande calidus, quippe qui & solida sua in
nativa

(a) Ibidem §. 14. 21. sqq. p. 143. 155. sqq.

(b) L. c. P. 2. Probl. 23. p. 349. Probl. 43. p. 455.

nativa flexilitate, & fluida in sua æquabili fluxilitate, a quibus circulationis libertas, & æquabilitas, necnon omnes cum secretionibus; tum excretionibus pendent, conservet. Obest vero & nimis calidus ob rarefactionem sanguinis, quæ facile nimium hæmorrhoidum fluxum inducit, vel motus hæmorrhoidales efficit anomalos; & nimis frigidus, maxime artubus inferioribus imminente aut præsentente fluxu admissus, ut qui vasa contrahendo, humoresque cogendo salubrem fluxum prohibere imminemtem; præsentemque suppressere soleat. Præprimis autem sollicite vitandæ sunt subitæ, & insignes caloris, frigorisque alternæ vicissitudines æquabilem humorum motum, & secretionum, excretionumque negotium perturbantes (a). Ex his jam intelligitur, cur certo quodam sub cœlo plures; quam alibi hæmorrhoidarios reperire sit, & cur soli mutatio hæmorrhoidalem quoque statum interdum, ut superius (b) dictum est, mutare soleat. Intelligitur porro, amictu hæmorrhoidariis eo esse opus, qui calorem blandum, & æquabilem corporis foveat: hinc vestes hyemales mature sub hyemem induendæ seroque sub æstatem deponendæ, simulque „maxime necesse est, inquit ALBERTI

(a) ALBERTI. l. c. §. 5. sqq. p. 137. sq.

(b) Vide §. 30.

BERTI (a); quo hæmorrhoidarii „inprimis pedes, & femora, siue inferiores partes bene obtegant, in constanti mediocri calore conservent, & a sensibili tanto magis frequenti refrigerio arceant; etenim analogum exemplum occurrit in feminis menstruis fluxibus subjectis, quæ eo citius mensibus nunc fluentibus, non minus vero etiam extra mensium fluxum, turbas, incommoda, & impedimenta circa mensium negotium patiuntur, quando incuriosius & negligentius pedes tegunt, sed usitatus, & sæpius inferiora loca refrigerant.“

CAPUT III.

MOTUS. QUIES.

§. CXLVI.

III. **M**OTUS corporis moderatus quam salubris sit, ac necessarius omni homini sano, multisque etiã valetudinariis, ex ejus effectibus, & noxis otiosæ vitæ satis est colligere: motu circulus humorum viget, viget appetentia, digestio, & alvina egestio; otio longo languet circulatio, appetentia, digestioque;
flatu-

(a) L. c. §. 5. p. 138.

flatulentia nascuntur, & alvus otiosis plerumque sicca, dura, segnis redditur, nec nisi operosioribus nixibus egerenda, quæ omnia quantum hic ob sint, in causarum doctrina (a) data vidimus. Hinc muscularis motus iis vel maxime est necessarius, qui hæmorrhoides ex otio, vitæque sedentaria vel contraxere, vel suppressere diu ante fluere solitas, quo fine homines ex otio hæmorrhoidarios factos LUDWIG (b) nullatenus esse curabiles censet; nam „nisi . . . post aliquot ab una, „& altera Væ Sine acquisitum levamen vitæ „ratio ita mutetur, ut a sedentaria in exercitatum transeat, continuatæ sanguinis mifiones magis noxiæ quam utiles sunt; cum „ad tenuitatem sanguinis, & reliquorum humorum ducant, ex quibus idonea nutritio, „& vera confirmatio virium effici nequit.“ Magnopere quoque iis motu corporis opus est, qui ab hæmorrhoidum fluxu seu sponte seu arte liberati in posterum ab eodem immunes esse volunt, ut sic per motum etiam corporis aliqua humorum pars dissipetur, ac plethoræ hæmorrhoidas resuscitaturæ genesis præpediatur. Unde CÆLSUS (c) post omnes ad unam exustas hæmorrhoides haud aliter sanitati

(a) Vide §. 21. 23. b)

(b) L. c. p. 418.

(c) Vide §. 138. Nro. 3.

nitati prospectum iri arbitratur; quam statis vacationibus arte institutis, multaque simul corporis exercitatione.

§. CXLVII.

IV. QUIES porro quemadmodum exercitiis interpolanda est ad vires reficiendas; ita in longum otium non est proferenda; nisi eam diuturnus hæmorrhoidum fluxus immodicus, ad quemlibet motum corporis revertens necessariam esse præmonstret, quo in casu monente F. HOFFMANNO (a) vel maxime „dissuadendæ . . . venationes, omnes impeniores corporis commotiones, per equitationem maxime & vecturam, in locis præsertim lapidosis & inæqualibus, & placidum, potius motus genus supernam magis quam inferiorem corporis regionem afficiens sub cœlo amœno sereno concedendum.“

CAPUT

(a) Med. rat. syst. T. 4, P. 2. S. 1. C. 4, cautel. §. 8.

CAPUT IV.

PATHEMATATA ANIMI.

§. CXLVIII.

V. **P**ATHEMATATA *animi* in nulla non hæmorrhoidali affectione prudenter sunt gubernanda, ita ut nihil animo sedato, ac tranquillo sit salubrius, sub quo placida circulatio viget, omnesque secretiones & excretiones rite peraguntur; nihil vero ira, ac terrore, mœstitiaque diuturna deterius, a queis hæmorrhoidalis status induci, fluxus moderatus in immodicum abire, vel suppressi, &c. solet. Instante vero aut procedente fluxu hi affectus præprimis obesse consuevere. Unde monente STAHLIO (a) „ab ira cavere sibi debent, „quotquot his passionibus obnoxii sunt; alias „non modo gravius; sed et frequentius, & „in dies pertinacius decubituri, ut fere semper fit, quo magis affectus tales, a fortiore „motus impetu; quam materiæ quantitate, „& proportionem fuscitantur.“ Notatu hicce dignum præbet exemplum I. C. STUNZERI (b) vir cui statis temporibus hæmorrhoides
tu-

(a) Diss. de hæmorrhoid. internarum motu Cap. 6. p. 28.

(b) L. c. p. 75.

tumescebant. Hic dum aliquando tempore intumescentiæ vehementi exarsit ira; tumor evanuit, ac periculosa successit hæmoptoe. Contra ea F. HOFFMANNI (a) virgini ira nimium concitavit hæmorrhoidum fluxum. Erat illa 19 annorum, Væ Snem nunquam passa; sed præter nimia subinde catamenia hæmorrhoidalem quoque fluxum per aliquot dies, at sine dolore ac molestia, experiebatur. At cum graviter excanduisset ingentem puri, ac sinceri sanguinis vim alvo reddidit cum summa virium jactura. Subsistente deinceps, imo frigido a potu penitus cohibita, ac restitante hac hæmorrhagia enormes abortæ præcordiorum anxietates, & constrictiones, quasi cor ipsum convelleretur, cum extremorum frigore, rubore faciei, venarum in capite inflatione, arteriarumque validis, ac citatis pulsibus cum quadam duritie. Verum ab exhibitio Œ ex Œ io diaph., lapid. 69., cinnabari & nitro, cum infuso summitat. millefolii, atque MRa simplici cum croco melius habuit.

HISTO-

(a) L. c. Obs. 3.

HISTORIA I.

I. L. DIETRICH (a)

Sistens singularem casum hæmorrhoidum cæcarum in cristas degenerantium dolorificas, ab CL. WEISIO curatarum.

Eccelesiastes 54 annorum, phlegmatico-sanguineus, sanis natus parentibus, junior quottannis fere 5 vel 6 modicas hæmorrhagias narium expertus, illibata fruebatur sanitate; donec ætatis 24. anno a fatigiis ecclesiasticis nactus est hæmorrhoidum fluxum, modicum primum ac sine ulla molestia; procedente vero ætate fluxus crevit & copia, & frequentia: demum paulatim se junxere symptomata molesta illum præcedentia & comitantia, nempe lumbago, & puncturæ intestini recti. Anno ætatis 30 obortæ hæmorrhoides cæcæ cum tenesmo, ut fere quotidie & vix non sub quavis

(a) DiT. de hæmorrhoidib. cristatis. 4to Altorf. 1764. p. 6. sqq.

quavis alvi egestione aliquid vel sanguinis vel feri effluerit, dolore sæpe anum per 8 minuta abhinc obtinente. Anno ætatis 40. appetente cœpit ideo Væ Snem admittere, ac primo quidem triennio quotannis semel, dein bis, idque e brachio dextro, abhinc vero bis quotannis e pede lævo; at exiguo levamine, morbo in vicennium tam acriter vexante, ut ultimo anno ob dolores nec stare diu, nec ambulare, nec sedere, imo nec quiete jacere licuerit; qui sub alvi egestione erant acutissimi. Namque extumentibus, prominulisque ani rugis multæ enatæ sunt plicæ gallinarum cristis inframaxillaribus similes, aliæ molles, ac velut ex inflammatione rubræ; aliæ tenues, subduræ, subpallidæ, infra arcuatæ, quædam pollicem longæ, basi ejusdem longitudinis adnatæ, radiatim sitæ, ultra 12, non instar varicum turgidæ, ac lividæ, sed e teneris vasculis rubris & serosis contextæ, glabraque testæ cuticula, at sine rhagadibus. Ad harum cruciatus post alvum egestam leniendos calidus lectus fuit petendus, ubi lintea calida serum acre succedens absorbentia cum aliquo levamine admovebat. Cristas has nec parcus hæmorrhoidum fluxus sponte interdum obortus, nec hirudines admotæ minuerunt. Somnus inquietus lassavit corpus, cetera æger bene habebat, appetitui tamen indulgere non ausus ob metum dolorificæ alvi. Varia tentata sine ullo successu, imo dum 6. hebdomades decocta, & ℥ia, & cathartica usurpasset, a quæbis bis terve quotidie

tidie dejiciebat; feri copiosi, & acris pro-
fluxu anus offensus magis intumuit cum te-
nesmo acerbiori & urente facto: unde alvus
aut planè intercepta, aut summe dolorifica
facta. Tot ergo remediorum juxta ac dolo-
rum pertælus æger WÆISII opem demum im-
plorat, qui paucis plurimum præstitit. In-
terne præbuit infusum;

℞. Rad. sarsaparill.

— scorzon.

— gramin. āā ʒβ.

— caryophyllat.

— liquirit āā ʒij.

— scrophulariæ ʒj.

Herb. hepat. nob.

— cherefol.

— matrisylv. āā M. j.

— heder. terr.

— scolopendr.

— cochlear. āā M. β.

Fl. papav. rh.

— rosar. āā. p. j.

Rasur. lign. sassaf.

Siliqu. dulc. āā ʒβ.

Sem. foenic. ʒβ. M.

℞. spec. pro infuso. m. & v. forbendo. Porro

℞. ☐ri solub.

☐ri ☉lati

☉ ☉ati āā ʒβ.

Lap. 69 pp.

Spec.

Spec. diāmarg. fr. āā ʒij.

Magn. alb.

♄. diaph. āā ʒj.

Ol. lign. sassafr. gtt. jv. M.

S. a meridie & sub noctem ad ij. cusp. cultri ex aqua. Tandem mane additum elix. viscer. amar. temperat. cum $\frac{1}{4}$ elix. antiscorbut. mixtum ad gtt. 40 cum ∇ a sumendum. Externe cum ani dolor, & strictura enema vetarent, primum sacculi emollientes ex rad. alth., fabariæ, herb. malv., verbasci, heder. terr., fl. samb., papav. rh., & Ⓞ tab. in lacte cocti & expressi per unum diem ano tepide admoti; dein suffecti resolventes, ac tonici, nempe

R. Rad. scrophular.

— chelidon. min.

— asphodeli.

— cynogloss.

— allii

— ari āā ʒij.

Herb. vinc. pervinç.

— scrophular.

— mercurial.

— cochlear.

— agrimon.

— vincetox. āā M. β.

Flor. spicæ nard.

— verbasci.

— calend. āā. p. j.

Θammon. ʒj.

Camphor. gr. ij. M.

F. inde 3. sacculi, quorum unus in ∇^a simplici, alter in vino, tertius in ∇^a \nmid distinctis horis leviter coctus, & expressus, tepide calens cristis imponatur. Hæc topica tenesmum, doloresque minuendo, aliquoties recenter parata, & interdum applicata effecerunt, ut cristæ pendulæ plurimæ, inprimis rubræ ac molles, corrugatæ, subsidentesque evanuerint, duræ autem, & subcallosæ indolentes, minoresque evaserint, sicque intra 14 dies tenesmo, ac dolore sublato alvus facile processerit. Inde per 3 annos æger, illibatam nactus sanitatem, ad omnes corporis motus evasit idoneus. In prohylaxim tamen quotannis circa æquinoctia phlebotomiam instituit, cathartica lenia sumsit, & diætam tenuit convenientem.

HISTORIA II.

F. H O F F M A N N I. (a)

Suppeditans exemplum podagræ hæmorrhoidalis, cum fluxu alternantis, & curatæ.

Vir 33 annorum, sanguineus, spongiosus, vino; venerique deditus olim narium hæmorrhæ-

(a) Consult. & resp. med. Cent. 2. & 3. Cas. 169.

rrhagiis obnoxius, & ante 10 annos hæmoptoen passus, abhinc quotannis semel, bisve Væ Snem instituit, donec hac vacuatione neglecta in podagram incidisset. Juniori in ætate clyma scorbuti ferax incolens scabiem contraxit scorbuticam ad varia remedia, ipsumque & ii in erum, & externum usum contumacem: donec nescio quo electuario sumto vesperi sudor primo, dein a $\frac{1}{2}$ nocte alvus mota, scabiem non multo post sustulit. Paulo autem post gonagra venit, cui abeunti successit hæmoptoe, siccam post relinquens tussim, humanæ dein axungiae usu sopitam. Verum circiter 4 ante annos post magna fatigia acuti circa genua dolores oborti, tactu acerbissimi redditi, & lapsis inde 4 septimanis, post iram vera ingruit podagra totius pedis cum dextri genu contractura. Abhinc decoctum e lignis, radicibusque resolventibus bibenti redibant quidem insultus ex intervallis, at dolor nonnisi genu, malleo um, ac pollicem pedis torfit. Ante 3 annos per biennium acidulas Egranas bibit cum euphoria, & ab his interdum fluxit hæmorrhoids cum insigni podagrae levamine, qui fluxus utut parcior, ubi nuper in trimestre absuisset; podagra reversa gravior, utrumque pedem ac genua afflixit, & reverso fluxu iterum cœnquievit. Hinc ab eo tempore podagra correptus pilulas IMMANUELIS No imbergenes sumere suevit, ut fluxum hæmorrhoidis procuraret, quo apparente podagra protinus abibat. Novissimo tempore fluxus singulis

TRNK. Hist. Hæm. Vol. II. Z 14

14 diebus redibat sine ulla molestia, praecedentibus plerumque torminibus, ac faciei inflatione; hoc autem cessante continuo praecordiorum anxietas, & flatulentia incessit; alvus plerumque libera, si adstringebatur, malum exasperabat. Ex quo podagra occepit, neglectae V. S. revocabantur, quas largius factas fere semper haemorrhoidum fluxus excipiebat. Insultus podagrici verni graviores erant autumnalibus: isti carebant aestu p. n., in illis vero summus aderat ardor cum intercurrente rigore, ac sequente sudore; novissimeque cum cutis in pedibus, manibusque secessione, ac nodis digitorum solvebantur. Aeger tabescebat sub anorexia, somnisque turbulentis, ac terroris plenis. Consultus id temporis Auctor cum videret a plethora vel haemorrhagias vel infarctus accidisse, tum a vino, venere, ptyalismo, iraque insignem in systemate nervoso conscitam debilitatem cum proclivitate ad spasmos, unde stomachi imbecillitas, & digestionis laesio consecuta, ab chyli, & sanguinis dytcrasia & acrimonia dolorum causa; consuluit circa singula aequinoctia phlebotomiam in pede ad ℥viij , ut insufficiens fluxus arte compensetur; vini, cerevisiaeque vetitae in locum commendavit decoctum

℞. Rad. scorzon.

— chinae aa ℥ss .

Cort. lign. sassafras

— cinnamom. aa ℥j . coq. in Vae
Mensuris iij. per $\frac{1}{2}$ h.

Sub

Sub epulis tamen concessus parvus usus vini Hungarici, vel Burgundiaci pro stomachi robore. Porro mane in lecto cum blando regimine suavit bibenda 6 vascula infusi ex herbae melissae, salviae, betonicae, veronicae, aa Mj & cort. citri recent. ʒiij. Brevi ante prandium elix: visceral. balsam. gtt 60. cum superiori decocto, ac vino imperatae, alternis autem vespers ʒ sui bezoard. ʒj. Porro quavis hebdomade summendae erant pilulae balsam: Auctoris Nro. xvj ad alvum solvendam, & intestina roboranda, circa aequinoctia autem & periodos imminetis fluxus haemorrhoidalis dosis haec alternis diebus 5 vicibus imperabatur ad fluxum promovendum. Cibi parciores, maxime in coena, concessi, & potius assi; quam elixi, vetitis nimis pinguibus, acidis, salitis, uti & nimio potu cassée, & nicotianae usu; graves animi motus vitandi erant, motus autem corporis creber, at moderatus suadebatur. Curatione hac in bimestre producta aeger prorsus convaleuit.

HISTORIA III.

J. S I D R E N. (a)

*In qua gravissima molimina hæmorrhoidalia,
ac prope exitialia superveniens fluxus
sustulit.*

Vir 31 annorum, cholericus, hypochondriaca matre natus, quamdiu in aromataria officina serviit, æris licet injuriis obnoxius, semper tamen sanus vixit; at 22^o. ætatis anno minus mobilem iniens vitam post 3 annos coepit colicam sæpius perpeti cum segni, & mucosa alvo. Id temporis molestus sæpe erat pressivus capitis dolor cum sensu ponderis in encephalo apoplexiæ metum incutiente. Idcirco 4^o. quoque mense Væ So in pede facta, & eccoprotica usurpata, quorum sub usu regio infraorbitalis livida, totaque facies flava evasit, manifesto indicio male affecti hepatis. Vertente anno 1765, ætatis 30^{mo}., prioribus symptomatis se junxit ventriculi imbecillitas, & ardor, anorexia, lassitudo, anxietas, & oppressio pectoris; accessit & febris m. & v. recursans, ac ne ~~h~~ quidem corticis abigenda. Insequenti ergo ætate ▽va
Pyr-

(a) Act. med. Sve ðcor. T. I. p. 367.

Pyrmontana hausta quotidie multum purgabat cum levamine ; sed ineunte autumno omnia pristina mala rediere apparentibus simul cœcis hæmorrhoidibus , queis hirudines cum levamine admotæ , ac brevi post oborta diarrhœa mucosa cum dorsi dolore. At febris aliquamdiu sopita non multo post ad vesperam redibat : unde noctes insomnes & matutinus languor. Urina fuit lateritia ; sed absunta ℥ss . corticis per doses ʒss . aliquoties quotidie captas color quidem lorii emendatus , rariusque sedimentum apparuit ; febris tamen nil mutata Decembri 1766 accitus medicus reperit vesperi febricitantem cum voce debili , ac tremula. Vetat ulteriorem corticis usum : imperat idoneam diætam , & quotidianam unctionem trahis , & ad alvum tenendam liberam consulit rheum , m. & v. masticandum glutiendumque ; monet insuper , ne ante consuetum tempus lectum peteret. Ab his & somnus redire cœpit , & vespertina febris tam levis facta , ut illam æger extra lectum ferre posset ; cibos utut nondum appeteret , tamen non amplius aversabatur. Cum sic relevatus iter aliquot milliarium insciente medico ingressus esset ; ad locum destinatum vix appellens prima mox nocte per 6 horas horruit cum colica & anxietate ; calore tamen lecti , fotuum , enematum , potuumque malum remisit , ut post aliquot dies æger domum reverti posset. Reditus per altas nives causavit dorsi dolorem , ac tensionem in pectore , & faciei icterus jam vix conspicuus denuo profunde flavus evasit , sterco-

ra veto alba, ac mucosa. Datum igitur quovis mane saturatum decoctum taraxaci cum melle; per reliquum autem diei MRa cum extract. tarax., Θ e medio, & syr. 5. rad. aperientium cochleatim. Alvo restitanti provisum elect. lenitiv. disp. Lond. cum cremore \square ri, ac paucio rheo. Ab his icterus minuebatur, & urina plus lateritii sedimenti ponebat. Appetente plenilunio cum hæmorrhoidales motus non obscuri ingruerent, datæ pilulæ balsam. STAHLIANIS analogæ, quarum a tridui usu oborti dorsi & colici dolores ubi molli fotu ac MRa ex ∇ a puleg., ol. amygd., liqu. anod. min. & syr. cich. cum rheo leniti sunt, cœpit æger ano sanguinem circiter ad $\bar{5}$ j egerere, sub qua excretionem aliquot dies durante quotidie trahis vehebatur, lotiumque reddebat fuscum cum sedimento e fusco lateritio; cessante autem sanguinis excretionem urina evasit citrina, & crassa. Finito hæmorrhoidum fluxu symptomata sensim omnia conquievere, & æger ad pristinam rediit sanitatem, usurpavit tamen multos adhuc in menses decoctum taraxaci: nihilo tamen secius hæmorrhoidum fluxus omni redit plenilunio; imo interdum etiam imminente subita cœli mutatione. Non comparente ad statum tempus interdum fluxu hirudines multum levaminis ferunt. Væ Ses denique vere & autumnio celebratæ sunt utilissimæ ad leniendam cephalalgiam, ac tinnitum identidem ægrum infestantes.

HISTORIA IV.

L. R I V E R I I (a).

Sistens hæmorrhoides cæcas furentes ad remedia optima contumaces, demum tamen curatas.

Cænobitæ acerbissime dolentes insigni cum tumore inflammatorio hæmorrhoides adepto post enema injectum secatur vena brachii lævi, tumorigue admotus anodynus fatus cum cataplasmate de mica panis; quod tamen ob exquisitissimum loci dolorem non tulit. Postridie secta dextri brachii vena, dati julepi emollientes, & levissimi cathartici, ut alvus maneret liquida:

R. Summit. malvæ

Fol. lactucæ.

— bugloss. āā M. j.

Passular. mundatar.

Liquirit. rasæ āā ʒʒ.

Flor. buglossi

— borag.

— violar. āā p. j. Coq. in

∇æ s. q. ad ʒviiij. In colat. infunde
Cassia

(a) Obs. med. Cent. 3. Obs. 7.

Cassiae rec. extractæ ℥j. Colaturæ
clarificatæ adde
Syr. violar ℥j. S. bis de die.

Ano admotum sequens unguentum :

℞. Olei. rosar. & viol. aa ℥j.
Ungu. popul. ℥β. F. linim.

Tumori autem dolorifico perstanti admotæ
duæ hirudines , quæ ℥jv sanguinis elicuere.
Remisit dein aliquatenus inflammatio. Dein-
ceps ergo sequens adhibitum suffumigium :

℞. Sempervivi majoris Mj.
Vini albi ℥ij. Bulliant.

Fumus hujus decocti per sellam perforatam
anō excipitur , dein sequens unguentum ap-
plicetur :

℞. Ungu. rosar. ℥j.
℥ii crudi ℥ij. M. F. Ungu.

Sed nihil his profectum. Quare eorum in
locum suffitus aceti , in quo filices igniti ex-
stinguebantur , adhibitus , & post hunc litus

℞. Ol. amygdal. amar. ℥ij.
Styracis liqu.
Bdellii aa ℥ij. M. F. linim.

Ab his tumor, dolorque in dies multum imminuebatur, præsertim juncto his bidui potu decocti millefolii cum paucò vino. Ad laxandam autem alvum continuo adstrictam ac vasa infarcta deplenda datæ pilulæ:

℞. M. P. de bdellio ʒij.
 Sennæ mundatæ
 Rhei electi
 Agaric. rec. trochiscati ʒā ʒj.
 Syr. ros. solut. q. s. F. M. P.

S. quovis mune inde ʒj, donec tota massa fuerit absumta. Atque his demum remediis convaluit.

HISTORIA V.

M. GERBEZII (a).

Narrantis, quæ remedia ipse in suo plus quam vicennali morbo, nimio scilicet fluxu cum dolore, & ani prolapsu efficacissima sit expertus (b).

Prænotatum . . . velim, me hæmorrhoidum fluxui jam a plus quam 20 annis fuisse sæpius
 per

(a) Misc. nat. cur. Cent. 8. Obs. 4.

(b) Confer. §. 84. c).

per annum obnoxium, & quidem primis aliquot annis absque notabili molestia; postea vero subinde cum aliquali intumescencia, & dolore, præsertim post violentiorem in itineribus motum, corporis incalescentiam, meracioris vini haustum, & casu subinde intercurrentes biliosas diarrhœas. Utcunque vero me sive fluxus copia, sive dolorum vehementia cruciarint; eis semper tempestivum, & opportunum remedium adinveniendi sortem habui, excepta sola elapsa æstate, dum post triduanam ceraforum esu (uti reor) excitatam diarrhœam me tantus hæmorrhoidum cœcarum dolor inceserat, ut ei sufferendo impar factus fuero, dum tamen aliis vicibus, quoties in similem diarrhœam me incidere contingeret, eæ semper sponte sua aperiri, & fluere solitæ sunt, dolore, si quis supervenerat, paulo post sponte sua, vel remediis consopito. Hac vero vice quidquid adhibui, adhibui frustra; quin imo pingua, & oleosa quæcunque, inter quæ erat etiam famosum illud unguentum de linaria, item quæcunque, actu calida, notavi mihi notabiliter dolorem exacerbasse, excepta sola coepa assa, & sacculis paregoricis ex herba, & floribus linariæ, verbasci, & hyosciami cum farina sem. lini foenugr., & psyllii in lacte decoctis & tepide applicatis, quæ successive tamen utcunque conducere videbantur. Purgare non ausus fuero; eo quod ad quaslibet vel solis clysteribus emollientibus cum unguento clysmati-

smatico, & populeo paratis promotas subinde sedes dolores maxime exacerbari experirer. Hinc ad applicandas hæmorrhoidibus sanguifugas recurrendum esse rebar; tamquam ad remedium alias etiam, præsertim in suppressis hæmorrhoidibus, singulare. Etiamsi vero 4 earum externis nonnihil tumentibus venis fuissent applicitæ, duæ internis; tamen vix una sanguinis uncia fuit prolicita (nescio quare), dum ex eis alias sponte apertis subinde plures libræ effluere solebant. Hisce tamen rem eo redegeram, ut nonnisi ante, post, & sub alvi exonerationibus solitos dolores perciperem. Hinc cogitandum mihi supererat, qualiter nam quoque alvum mihi redderem indolentem? Cumque conjicerem ad id necessarium fore, ut foeces alvinæ redderentur molles, sique sponte non secederent, saltem alternis; vel ternis diebus eæ leni aliquo laxativo subducerentur; determinaveram prunis aliquid foliennæ incoquere, & de eis una cum eorum jure, quoties necesse esse videretur, aliquot semper ante pastum deglutire. Secundo quod præterea adverterem in excretionibus semper intestinum rectum mihi insolentius protrudi solere, & inde dolores tanto magis exacerbari, sollicitus eram, qualiter & his opportunum repagulum opponerem? Et fortunate mihi inciderat usus terebinthinæ, cujus suffitus ano exceptus in tenebris & ani procidentis solet esse proficiuus, nec non ꝑ ostreorum calcinatorum, qui bombace exceptus, inque ani procidentis applicitus solet esse pereffica-

cax.

cax. Quibus postquam aliquoties fuisset usus, deprehendi, quod revera & dejectiones inde redditæ fuerint molliores & liberiores, & protrusio ani minor, ac minus dolorifica. Quod tamen adhuc in externis hæmorrhoidibus superesset tumor quidam dolorificus, huic quoque remedium erat reperiendum, & occurrebat unquentum . . . camphoratum album . . . propterea illud in linteolo molli extensum, quoties sedere dabatur, & vesperidum lectum ingrederer, aliquoties tumentibus & dolentibus venis sedalibus admoveram cum tanto effectu, ut intra paucos dies universus tumor, & dolor penitus evanuerit, adeo ut in tam acri tamque pertinaci hæmorrhoidalium venarum malo nulli ex usurpatis remedio tantam efficaciam adscribere valuerim; quam prunis laxativis, suffitui terebinthinæ ano excepto, Fri ostreorum calcinatorum cum gossipio excepto & admoto, & unguento illi, album camphoratum dicto, sed cum adjectione lithargyrii prius in aceto cocti præparato. Quamvis mihi paulo post sancte retulerit certus Presbyter, se a suis dolentibus tumentibus hæmorrhoidibus sola cerussa alba pulv. in aceto per noctem macerata, & mane abjecto aceto cum s. q. olei oliv. in lini-menti formam commista dicto modo aliquoties admota optatissime resanasse. Ne vero ex taliter semel suppressis, & forte a sexagenaria mea ætate nunquam amplius fluxuris hæmorrhoidibus mihi ea, quæ 6. aphor. 12 præ-

prædicat HIPPOCRATES, obveniant, obviandum fore rebar fonticulo tibiæ pedis internæ inurendo, idonea diæta, & gestatione in dorso radicis telephii, & scrophulariæ . . . quin & in potu per modum theæ saltem vere & autumnò, vel etiam sanguisugarum applicatione.

HISTORIA VI.

D. TURNERI (a).

In qua hæmorrhoidum cæcarum summe dolentium, quas gravissimus comitabatur tenesmus, curatio exhibetur.

Mulieri teneræ, imbecillæque compagis post difficile puerperium pro catameniis hæmorrhoides menstrue fluebant, quandoque intumescerent magno cum dolore. Ano hinc sensim laxiore factæ enatæ sunt complures mariscæ sub quovis fluxu tumentes, alvumque difficilem reddentes. Factæ Væ Ses in brachio primum, dein talo; data emulsa, & complures boli ex cassia cum flore Δ ; anitumori admotum cataplasma anodynum, aliæque:

(a) Abhand. von den Krankh. der Haut, 2. Th. 7. Cap. p. 533. sqq.

que: verum tumor, dolorque assiduus potius crevere, & anus mucosa excernebat. Accitus tunc Auctor detexit multa insignia tubercula ex inflammatione tumida, multum saniosi, cruentique feri dimittentia; ob assiduum tenesimum ægræ desidenti anus semper evertabatur cum tanta doloris exacerbatione, ut illa plures in horas lamentaretur. Primum ergo sopiendi tenesmi causa præscripsit.

℞. Confer. FRACAST. f. m. ʒß.

Lact. ♀ ʒj.

℥ rhei parum tosti ʒß.

Extract. thebaic. gr. β.

Syr. de mecon. q. f. F. bolus.

S. talem quotidie m. & v. superbibendo ju-
lepum:

℞. ∇æ lact. alex.

— ceras. nigr. āā ʒiij.

— cinnamom. ten.

— pæon. c. āā ʒj.

Margar. ppt. ʒj.

Sacch. p̄arum. M. F. julapium.

Si hæc non juvarent, sumenda erat MRa
semper ad manus habenda:

℞. ∇æ fl. paralyf. ʒjß.

— pæon. C. ʒj.

Syr. de mecon. ʒvj. M.

Potui communi datum decoctum album, cu-
jus in ℥iij soluta erat gummi Arab ʒj. Ex-
terne imperatum fomentum, & cataplasma:

℞.

℞. Fol. linariæ

— verbasco. ʒʒ M. j.

Fl. chamom.

— samb. ʒʒ M. β.

— ros. rubr. p. j. Coq. in

Lact. vaccin. q. s. ad ℥ij. Coletur.

Pars media hujus cum farina fab. redigebatur in pulvem pro cataplasmate, pars altera fotui asservata; utrumque adhibitum, nempe pannus laneus mollis (fronella dictus) decocto intinctus m. & v. admovebatur, quam calide ferri poterat, & quavis $\frac{1}{2}$ hora renovabatur, ac dein calidum cataplasma appositum, admistis semper eidem balsamo Δ simpl. ʒij. cujus ab altera applicatione ægræ mire levata est, tensio remisit, ac tumor subsedit eatenus, ut injectiones jam in anum fieri possent; quare ejusdem decocti aliquid injiciebatur cum tantillo ejusdem balsami, & uno vitello ovi, quod ægra quavis nocte retinuit. Ab his & anodyno interno evasit nox multo quam dudum ante quietior; namque ægra ob dolores toleratos, indeque natos sudores symptomaticos evaserat admodum debilis. Hæc in plures dies continuabantur, & fascia Tautaformi firmabantur, quoad imminuto humorum affluxu hæmorrhoids magis adhuc subsedit; deinceps dictum decoctum parabatur cum ∇ a chalibeata, & vino rubro, adaucta insuper copia rosarum rubrarum pro restaurando sphincteris tono. Ubi ab his tenesmus desit, omissa conserva

FRACAST.

CAST. cum rheo dabatur bis per diem lac
 ♀ cum absorbente aliquo, & emulsum ex
 amygd. dulc. & sem. papav. alb. cum ∇^a
 hordei paratum. In summis doloribus cum
 ischuria fuisset enata, præscribatur

℞. ♂ prunell.

Sacch. alb.

Lap. 69. āā gr. xv. M. F. ♂.

S. alternis horis ex cochl. j. sequentis MRæ:

℞. ∇^a hordei ℥j.

Gumm. Arab. 3vj. vel. 3j.

Syr. dialth. 3j. M. D.

Et superbibat cochl. v. vj. ex eadem, quam-
 diu ischuria duraverit; sed his brevi sublata
 fuit. Sublato demum morbo pro carnum
 resumptione, & recidiva præcavenda commen-
 davit Auctor sequentis remedii; quod ipse
 similibus in casibus vix non specificum exper-
 tus est, usum:

℞. Aethiop. min. f. i. ppt. ʒj.

Sacch. alb. crySTALL. ʒss. M. F. ♂.

S. quovis mane, & 5ta a meridie per inte-
 grum mensem in cochl. j. lactis asinini, su-
 perbibendo ejusdem ℥ss. Verum quamvis
 mulier inde vires, carnesque receperit,
 hæmorrhoidum tamen fluxus menstruus ei
 mansit.

WENCESLAI TRNKA

DE KRZOWITZ

S. R. I. EQUITIS MEDIC. DOCT. IN REG. UNIVERS.

PESTIN. PRAX. MED. PROF. P. O.

HISTORIA

HÆMORRHOIDUM

OMNIS ÆVI OBSERVATA

MEDICA CONTINENS.

VOLUMEN III.

OPERIS POSTHUMI

EDITIONEM PROCURAVIT

FRANCISCUS SCHRAUD

IN EADEM UNIVERS. INSTIT. MED. PROF. P. E.


VINDOBONÆ,

APUD CHRISTIAN. FRIDERIC. WAPPLER.

MDCCXCV.

HISTORIA
HÆMORRHOIDUM
ALBARUM.





PRÆFATIO.

Duobus historiæ rubrarum ani hæmorrhoidum voluminibus hucusque editis tertium addimus, albarum, & vesicæ hæmorrhoidum historiam complectens, in eo diversi a prima nostra destinatione, quod, quæ opuscula una cum ceteris quibusdam seorsim prioribus dare instituimus; ea nunc affinitate obiectorum inductinectere istis maluimus, ut omnem de re hæmorrhoidali tractatum nostri auctoris uno opere comprehensum lectores haberent. Quominus tertius hic tomus vastitate prioribus

bus responderet partim minori obiectorum huc pertinentium ubertati adscribendum est, partim vero, quod multa, quæ huc etiam pertinerent, prioribus tomis præcepta sunt. Ab auctore certe nostro utrumque opusculum usque ad preli labores consummatum datum est, uti manuscriptum docet: itaque non aut curandum mihi erat, ut ipse manca supplerem, aut verendum, ne minus elaboratum opus offerrem lectoribus. Quorum si toto opere edito gratiam inivi, omnem me qualiscunque laboris fructum tulisse existimabo.

Scribebam Pestini Nonis
Augusti MDCCXCV.

HISTORIÆ HÆMORRHOIDUM VESICÆ.

P A R S I.

	pag.
CAP. I. §. 1. Definitio - - - -	95
CAP. II. §. 2. Genera - - - -	97
1. Cœcæ - - - -	—
2. Fluentes - - - -	—
a. Sanguineæ - - - -	—
b. Mucosæ - - - -	98
CAP. III. Proëgumenæ causæ - - - -	100
§. 3. 1. Sexus - - - -	—
— 4. 2. Aetas - - - -	101
— 5. 3. Temperies - - - -	102
— 6. 4. Laxitas vasorum vesicæ -	103
— 7. 5. Gentilitia dispositio -	—
CAP. IV. Procatarecticæ causæ - - - -	104
§. 8. 1. Ingesta - - - -	—
— 9. 2. Venus nimia - - - -	—
— 10. 3. Hæmorrhoides ani anom. -	105
CAP. V. §. 11. Symptomata - - - -	109
§. 12. I. Fluxus phenomena -	110
1. Humor excretus -	—

a. Sanguis	-	-	-	—
b. Mucus, ejusque	-	-	-	—
α . Odor	-	-	-	111
β . Color	-	-	-	—
γ . Consistentia	-	-	-	—
δ . Ductilitas	-	-	-	112
2. Copia	-	-	-	113
a. Sanguis	-	-	-	—
b. Mucus	-	-	-	—
3. Tempora	-	-	-	114
a. Cruenti miſtus	-	-	-	—
b. Mucofi	-	-	-	115
4. Modus	-	-	-	116
— 13. II. Dolor	-	-	-	117
— 14. III. Miſturitio	-	-	-	122
CAP. VI. Diagnofis	-	-	-	123
— 15. I. Abſoluta	-	-	-	—
— 16. II. Relativa ab	-	-	-	124
A. Hæmorrhagiis aliis	-	-	-	124
1. Hæmaturia renal.	-	-	-	—
2. Stymatofi	-	-	-	125
B. Sedimentis albis	-	-	-	125
1. Mu-				

	pag.
1. Muco - - -	—
a. Spasmodico - -	—
b. Calculoso - -	126
c. Gonorrhoeico - -	—
2. Pure - - -	127
3. Chylo - - -	—
4. Creta arthritica - -	128
CAP. VII. Prognosis - - -	129
§. 17. I. Curabilitas - - -	—
— 18. II. Effectus - - -	134
A. Boni - - -	—
B. Mali - - -	136
1. Ischuria - - -	—
2. Cystidis - - -	140
3. Ulcus vesicæ - - -	142
4. Hæctica - - -	145
— 19. III. Suppressio periculosa - -	148
— 20. IV. Solutio morbi - - -	155
— 21. V. Recidiva facilis - - -	156

P A R S II.

CAP. I. §. 22. Summa curationis - -	157
CAP. II. Chirurgia - - -	159
§. 23.	

					pag.
§. 23.	1.	Sanguinis missio	-	-	159
— 24.	2.	Enemata	-	-	167
— 25.	3.	Topica	-	-	—
— 26.	4.	Catheter	-	-	169
CAP. III.		Pharmaca	-	-	170
§. 27.	1.	Cathartica	-	-	—
— 28.	2.	Solventia	-	-	172
— 29.	3.	Antispasmodica	-	-	173
— 30.	4.	Tonica	-	-	174
	a.	Mars	-	-	175
	b.	Millefolium	-	-	—
	c.	Cortex Peruv.	-	-	—
	d)	Uva ursi	-	-	176
CAP. IV.		Diata	-	-	176
§. 31.	1.	Alimenta	-	-	—
— 32.	2.	Affectus	-	-	—
— 33.	3.	Aer	-	-	177
— 34.	4.	Motus	-	-	—
— 35.	5.	Venus	-	-	178

HISTORIA
HÆMORRHOIDUM
VESICÆ.

SERIES OPERIS

HISTORIÆ HÆMORRHOIDUM ALBARUM

P A R S I.

	pag.
CAP. I. §. 1. Definitio - - -	1
CAP. II. §. 2. Genera ab - - -	2
I. Organo - - -	3
1. Ani - - -	—
2. Veficæ - - -	—
3. Uteri - - -	—
4. Penis - - -	4
II. Nifu - - -	—
A. Cœcæ - - -	5
1. Varices - - -	—
2. Serpigo ani - - -	—
B. Fluentes ^a - - -	7
1. Humor - - -	—

	pag.
§. 15. 1. Symptomatum abolitio	39
— 16. 2. Ulcus recti - -	42
— 17. 3. Tabes - -	55
— 18. 4. Hydrops, Tympanites	65
— 19. III. Suppressio fluxus mala	68
— 20. IV. Solutio morbi - -	72

P A R S II.

CAP. I. §. 21. Indicationes - - -	74
CAP. II. §. 22. Pharmaca - - -	76
1. Attenuantia - - -	—
— 23. 2. Cathartica - - -	78
— 24. 3. Aloe - - -	80
— 25. 4. Diuretica, diaphoretica	81
— 26. 5. Antispasmodica - -	82
— 27. 6. Tonica - -	83
CAP. III. Chirurgia - - -	85
§. 28. 1. Sanguinis missio - -	—
— 29. 2. Enemata - -	86
— 30. 3. Frictiones - -	87
— 31. 4. Topica - -	—
— 32. 5. Apertura varicum -	92

	pag.
a) Mucus - -	7
b) Serum - -	11
2. Copia . - -	13
3. Tempora - -	15
CAP. III. §. 3. Proëgumenæ causæ - -	17
1. Aetas - - -	—
2. Sexus - - -	18
3. Temperies - -	19
CAP. IV. §. 4. Procatarctica causæ - -	20
1. Ingesta - - -	—
2. Vis externa - -	21
3. Venus - - -	—
4. Hæmorrhoides rubræ - -	22
CAP. V. §. 5. Proxima Causa - - -	26
CAP. VI. §. 6. Symptomata - - -	29
CAP. VII. §. 7. Diagnofis relativa á - -	30
— 8. I. Scabie Venerea ani - -	31
— 9. II. Ulcere recti - - -	—
— 10. III. Diarrhœa - - -	32
— 11. IV. Dyfenteria mucofa - -	33
— 12. V. Cœliaca - - -	36
CAP. VIII. §. 13. Prognofis - - -	37
I. Curabilitas - - -	—
— 14. II. Effectus - - -	39

	pag.
CAP. IV. Diæta - - - - -	93
§. 33. 1. Alimenta - - - - -	—
— 34. 2. Affectus animi - - - - -	—
— 35. 3. Motus corporis - - - - -	94



HISTORIÆ
HÆMORRHOIDUM
ALBARUM.

PARS I.
PATHOLOGICA.

CAPUT I.
DEFINITIO.

§. I.

HÆMORRHOIDES *albæ* sunt muci, serive ex hæmorrhoidalibus vasis egestio. Morbus hic nil nisi anomalia est hæmorrhoidum rubrarum; de qua tamen nil uspiam apud Veteres exstat, neque inde per 15 à CHRISTO nato secula quispiam ejus commemorit; primus (opinor) I. FERNELIUS (a) fuit, qui
sexto

(a) Pathol. L. 6. C. 10.

sexto decimo seculo ad hanc hæmorrhoidalem vacuationem animum advertit, aliosque deinceps etiam, præprimis D. SENNERTUM, eo convertit. Verum, ut tunc tempora ferebant, medici non ultra phænomenon progressi nescio quid rari in illo magis admirari maluerunt, quam ut ad legenda naturæ vestigia adjicerent animum: quo factum, ut ad annum usque 1698, quo primum tempore G. E. STAHLII dissertationes de hæmorrhoidibus edi cœptæ, genuina hujusce morbi cum pathologia, tum therapia fuerit ignorata. Tum vero STAHLIUS, indolem hæmorrhoidalis morbi diu ante scrutatus, albas quoque hæmorrhoides editis tum scriptis eo cum successu illustravit, ut pauca postmodo adjicienda restarent, præprimis discipulo ejus M. ALBERTI manum ad ulterius hoc opus appellente.

CAPUT II.

G E N E R A.

§. II.

GENERA *hæmorrhoidum albarum* alia organum ipsum, in quo illæ sedem nactæ sunt, alia nîsus varius humorum in vasa hæmorrhoidalia suppeditant; idcirco.

I. *Organo*, ut sede spectato sunt:

1. *Ani* hæmorrhoides albæ, quarum sedes est in vasis hæmorrhoidalibus intestini recti vel externis vel internis. De his præcipuus mihi sermo erit. Sunt &

2. *Vesicæ* hæmorrhoides mucosæ, de quibus seorsim (a) doctrina dabitur. Porro

3. *Uteri* quoque hæmorrhoides albæ dari certa observatione constat, quæ leucorrhœa hæmorrhoidalis nuncupantur, curatioque hujusmodi leucorrhœæ hæmorrhoidibus propria est facienda. Meminit RAVLIN (b) hujus affectionis, & Auctor observationum clinicarum ad ductum medicationum in nosocomio Varsaviensi (c) meminit innuptæ feminæ in nosocomium illatæ cum leucorrhœa, & pertinacibus alvi obstructionibus. Leucorrhœam non esse veneream examen docuit; ut ut materia profluens fuerit corrosiva. Imperatum enema ad referendam alvum ægra recusabat, quod sub alvi egestionem atroces semper dolores perpeti cogeretur. Præmissis igitur

(a) Vide histor. hæmorrh. Vesicæ §. 12. Nro. 1. b)

(b) Traité des Fleurs blanches T. 1. S. 2. Ch. 3. p. 119.

(c) Fascic. 1. p. 39.

igitur emollientibus balneis iussa est postea vaporī aquæ fervidæ insidere; sed nullis inde varicibus hæmorrhoidum prolektis dolores potius intestini recti etiam extra alvi egestiones increvere. Intimius ergo rectum exploratum, & intra illud altius hæmorrhoidales nodi reperti. Curatione itaque ad hosce abolendos instituta non modo ani dolores; verum leucorrhœa quoque sponte desit, manifesto indicio illam fuisse hæmorrhoidalem. Et postmodo (a) „referre (ait idem auctor) „debeo, me iterum in uxore leucorrhæam „hæmorrhoidalem illi, quam in 1mo fasciculo „narravi, omnino similem reperiisse, & eadem „indicatione illam abstulisse, quæ jam per „triennium omnes alias indicationes fefellerat.“

4. *Penis* denique mucosas hæmorrhoides gonorrhœam benignam notham mentientes vidit R. I. FORTIS (b), nec aliorum referenda est MAYERNII (c) observatio.

II. *Nisu* autem vario edito sunt

A.

(a) Fascic. 2. p. 68.

(b) Vide Tom. I. §. 51. B. d. n. 3.

(c) Prax. med. P. I. p. 363.

A. *Coecae*, fere semper externæ i. e. systematis iliacarum, æque spectata tuberculorum magnitudine rursus duplices:

1. *Varices* vulgaris molis pro sanguine rubro mucum, vel serum, vel materiam spermati ranarum analogam continentes, quales erant in CONERDINGII (a) arthritico, & viris GREISELII, (b) ac SORBAITII (c).

2. *Variculæ serpiginosæ* STAHLII, olim attrices dictæ, de quibus P. FORESTUS (d): „attrices nominant quasdam tuberositates „parvas circa anum, quæ aliquando recessunt, & per tempus revertuntur.“ Multo autem luculentius eas descripsit STAHLIUS (e) dicens pullulare hic „minima, & quasi „serpiginosa tubercula, interdum ad 2 digitos „latos ambitum ani cingentia, mox vero iterum introrsum ad limbum ejus coeuntia, „summe pruriginosa, interdum aliquamdiu „plane delitescunt, mox denuo prodeuntia, tenuibus tamen eminentiis, & quasi
sola

(a) Vide sequ. B. Nro. 1. b).

(b) Vide §. 32.

(c) Ibidem.

(d) L. c. L. 23. schol. ad obs. 9.

(e) Diff. de motu sangu. hæmorrhoidal., & hæmorrhoidib. extern. Cap. 4. p. 12.

„sola scabritie pruriginosa . . . quæ pluribus
 „annis vel sæpissime repullulant, vel nunquam
 „ad plenariam desiccationem pertingunt. Dum
 „(ægri) hæc habent, aut plane nihil incom-
 „modi sentiunt, aut rara sane, & levia pa-
 „thematata spasmodico - ischiatica, aut lumba-
 „ria persentiscunt (a) . . . Jam licet per
 „ejusmodi superficialia ulcuscula neque san-
 „guis evacuetur, neque alius humoris ulla
 „effatu digna quantitas (siquidem revera, si
 „quantitas materiæ, quæ hic exsudat a scal-
 „ptione, pensitetur, vix tota septimana tan-
 „tum inde confieret, quantum Ξj , aut mi-
 „nus æquaret); nihilo minus ipsa sola levif-
 „sima excretio, quatenus talis, præstat hic
 „vicem alicujus satisfactionis“ (b). M. AL-
 BERTI (c) hanc eandem serpiginem ita de-
 scribit: „quod diversis subjectis hæmorrhoi-
 „dariis certis temporibus, & quidem per in-
 „tervalla vel in ipso ani exitu, vel in limbo
 „ejusdem efflorescant pustulæ miliares (in-
 „star serpiginis), quæ valde pruriunt, do-
 „lent, ardent, & in ambitu cum molestiis
 „tensoriis, strictoriis, subtiliter fremebundis
 „stipantur, concurrente alvi molestiori suc-
 „cessu, quin agentibus nonnunquam actuali-
 bus

(a) Ibidem p. 11.

(b) Ibidem.

(c) Diff. de hæmorrhoidib. albis, §. 11. Traët.
 de hæmorrhoidib. P. 1. p. 261.

„bus tenesmis; & hæ pustulæ vel fortuito
 „sub consueta obambulatione abradantur, &
 „affricentur, vel voluntario ad demulcendum,
 „& mitigandum eximium illum pruritum scal-
 „puntur, & fricantur, ut ita denique apertæ
 „hæ pustulæ exiguam quantitatem . . . ma-
 „teriæ tenuioris, limpidæ, subtiliter mucii-
 „laginosæ, leviter flavescientis effundant. Hæc
 „manatio interdum per aliquot dies continuat,
 „aliquando per longius tempus insistit, com-
 „muniter vero iterum exsiccatur, & concre-
 „scit; sed post aliquam moram iterum redit“. Atque his variculis serpigiosis quædam illius
 (a) femina laboravit.

B. *Fluentes* vero semper internæ i. e. ad venam portæ referendæ, quæ sanguinis loco mucum, serumve eructant ipso interdum sanguine alteratum. Atque in hocce hæmorrhoidali fluxu tria potissimum occurrunt animadvertenda, nimirum humoris excreti indoles, copia, & excernendi tempora.

I. *Humor*, qui alvo egeri solet, potissimum est

a) *Mucus* variæ consistentiæ, & coloris albicantis, si purus sit; at non raro sanguinem etiam sibi admistum habet, qui si in-
 time

(a) Vide §. 4. Nro. 4.

time illi mixtus est, mucum rubellum efficit; sin minus, tunc sanguis forma grumorum, striarumve &c. mucu inhæret. Atque ab hoc mucu, hæmorrhoides albæ vulgo mucosæ etiam audiunt. Hinc M. ALBERTIO (a) notante egeritur „materia plurimum mucilaginosa, „pallida, lubrica, albumen ovi, aut sperma „ranarum, vel saturatam spissiusculam solutio- „nem tragacanthæ referens, loca hæmorrhoi- „dalia eliquans, & mucilagine sua humectans“ . . . interdum „leviter rubella, aliquando „cum tenuibus filamentis, aut striis sangui- „neis remixta, magis tamen albuginea, & „haud sincere cruenta, cujus excretionem . . . „motus strictorii & tenesmodei urgent, qua „per intervalla obtenta aliquamdiu dolores „illi interni acquiescunt“ (b). Materiæ id genus per anum excretionem jam I. FERNE- LIUS (c) ex hæmorrhoidum vasis provenire agnovit, monuitque, ne cum pure confun- datur. Etenim „purulenta excretio (inquit „ille) si exigua, & cum dolore prodit, ab „ulcere, aut intestinorum, aut podicis est; „ . . . si copiosior est, atque doloris ex- „pers, ex abscessu quodam mesenterii in „proxima intestina fertur; si vero parcius, „pari-

(b) Diff. cit. §. 4. p. 254.

(b) Ibidem §. 10. p. 260.

(c) L. c. p. m. 170. sq.

„pariterque indolens, ea quidem vere puru-
 „lenta non est, nec ab ulcere manat (id quod
 „multos puris specie fefellit), sed mucosa
 „quædam sordes est subalbida, & veluti li-
 „mus, fexque sanguinis melancholici, quam
 „podicis exspuunt venæ, atque multo inter-
 „dum tempore eructant, post diuturnos fere
 „morbos melancholicos, duramque & labo-
 „riosam equitationem“ Sic I. RHODII (a)
 „cœnobitæ . . . ætatis provectæ pruritu sicco,
 „atque difficili diu vexato sanguis e venis hæ-
 „morrhoidalibus adeo pituitosus fuit evoca-
 „tus, ut præter tantillum feri nullum sangui-
 „nem referret . . . Lotium eidem per ali-
 „quot dies privative crudum conspiciebatur.“
 Et (b) „nobilis Venetus ætate jam præcipi-
 „tata pituitam fecibus permixtam deiecit, quæ
 „merum pus referebat.“ Perinde G. I. GREI-
 SELII (c), ERNESTII (d), ac SORBAITII
 (e) ægri materiam alvo excreverunt spermati-
 ranarum analogam, idque ipsum etiam „in
 „duobus notavit D. HELWICH (f), exivisse
 „materiam instar spermatis ranarum.“ Ru-
 bellus

(a) Obs. med. Cent. 3. Obs. 72.

(b) Ibidem Obs. 73.

(c) Vide §. 32.

(d) Vide §. 18.

(e) Vide §. 32.

(f) Histor. morbor. Vratisl. A. 1700. p. m. 170.

bellus autem erat imucus, quem vir MÜLLERI (a) quandoque excernebat, indubie ab admisto sanguine; manifeste autem subcruentum reddebat ISENFLAMMI (b) senex, imo cruentum STORCHII puella (c), amicus (d), & vir quidam (e) 52. annorum, cholericomelancholicus, macilentus, qui mense septembri ab insueto hactenus in horto labore cum crebra proni corporis incurvatione vehementem continuo dorsi dolorem nactus est, postridie magis in os sacrum & coxas delapsus, unde ischias illi jam sæpius infesta est enata. Data igitur pro litu olei scorp. $\text{ʒ}\beta$, interne vero $\text{ʒ}\text{es}$:

℞. ʒ specific. cephal. $\text{ʒ}\text{j}$.

— polychr. auctoris $\text{ʒ}\text{j}$. M. F. ʒ .

S. a meridie, ac vesperi $\frac{1}{4}$ ejus. Postridie imperatus usus MRæ ex ℞ is rhei, ac ♀ ri c. oleo anisi. Die 40 morbi exiguus superfuit dolor. Ob temperiem hæmorrhoidibus faventem de his interrogatus reposuit, mucum se excrevisse sæpius, nunquam sanguinem, & die 5to curiosius inspecta stercora exhibere

(a) Vide §. 17.

(b) Vide §. 16.

(c) Vide §. 14.

(d) Vide §. 4. Nro. 2.

(e) Obs. clin. ann. 2. Septembr, cl. 4. p. 419.

ere simul mucum lubricum & cruentum, qui doloris attulit levamen. Cum sanguine etiam primum, dein absque hoc egerebat mucum æger, cujus meminit FORTIS (a). Sæpe vero striæ tantum sanguineæ hunc mucum interstinguunt, velut in ALBERTII (b) viro, HOFFMANNI (c) senæ, RICHTERI (d) ægro, feminisque STAHLII (e) ac STORCHII (f). In nonnullis denique integri sanguinis grumi mucu obvoluti reperiuntur, quemadmodum in SEG-NITZII (g) viro & SILVATICI (h) homine, malo plerumque omine. Ut ut vero sæpissime in albis hæmorrhoidibus mucus an-
egeri soleat; aliquando tamen etiam

b) *Serum* profluere est observatum, id-
que summæ non rarò acrimoniæ: unde hæ-
morrhoides albas non semper mucosas; ve-
rum & serosas quandoque esse in confesso est:
„& mihi, inquit FRID. HOFFMANNUS (i),
„nota

(a) Vide §. 4. Nro. 4.

(b) Vide §. 19.

(c) Vide §. 16.

(d) Vide §. 4. Nro. 3.

(e) Vide sequ. Nro. 3.

(f) Vide §. 24.

(g) Vide §. 16.

(h) Vide §. 11.

(i) Med. rat. Syst. T. 3. S. 1. C. 9. §. 17.

„nota complura sunt exempla, quosdam tubercula in ano gestasse, quæ ob exquisitum dolorem totum corpus in consensum pertraxerunt; sponte autem rupta aliquot cochlearia feri acris corrosivi fuderunt, quo evacuato pathemata conquieverunt.“ Perinde T. CONERDINGIUS narrante P. C. STOCKHAUSEN (a) literis ad MEIBOMIUM datis retulit, se in arthritico graviter decumbente vehementes hæmorrhoidum dolores cum tumore obortos notasse; intra paucas autem horas apertura sponte facta limpidissimum serum ad plures libras effluxisse tam acre, & corrosivum, ut partes madefactas corroserit, & excoriarit. S. ALISCHER (b) curandum habuit literatum virum hæmorrhoidum fluxui obnoxium; quo minus, ac alias procedente hæmorrhoides cœcæ multo cum tumore, ac dolore sunt obortæ, & cum effluxu ichoris quasi glutinosi, ac gelatinosi summe acris: donec idonea medela sanguinis fluxus est revocatus. Hoc tamen abhinc superfuit incommodum, quod post singulas dejectiones hæmorrhoides satis diu extra anum prostiterint; & etiamnum, ubi sanguinis fluxus remittebat, magnam ichoris serosi, at longe fluidioris, quam ante, copiam eructarint; eo quod
sphin-

(a) Disp. cit. §. 15.

(b) Annal. Vratisl. Tent. 15. A. 1721. Mart. cl. 4. art. 11. p. 317.

sphincter ani penitus sese constringere nequiverit. Ad serosasne an mucosas referendum est hæmorrhoides, quod G. H. VELSCH (a) narrat? „Rarissimus (ait) affectus est fluxus hæmorrhoidum non sanguineus, sed ichorodes, & quasi suppuratus. Bis omnino hunc observavimus, semel quidem in viro Religioso, qui sponte ruptis haud parvam copiam purulentiae excreverat; linimento ex ☩e lap. Grumbacensis, tutiae ppt., boli Armen. cum ungu. de minio, & cerussa curatus est. Secundum vero in viro nobili.“ (b)

2. *Copia* porro, qua mucus, vel serum reddi solent, non semper est eadem; observante tamen M. ALBERTIO (c) ut plurimum muci tam exigua est „ut qualibet depositione copia $\frac{1}{2}$ mediocris cochlearis, & vix semper tanta excernatur; quæ evacuatio per vices & intercapedines repetit; sed eo ipso a vulgari alvi fluxu maxime discrepat, dum nulla alia fluida, aut feculenta materia vel ante, vel post exoneratur.“ Vix certe $\frac{1}{2}$ cochlear materiae pus referentis egerebat RICHTERI (d) æger;

(a) Obs. phys. med. Hecatoest. 2. Obs. 98.

(b) Vide §. 117. β. Tom. II.

(c) Diff. cit. §. 9. p. 259.

(d) Vide §. 4. Nro. 2.

æger; neque integro cochleari plus mucī SIL-
VATICI (a) vir excernebat; senex ISENFLAM-
MII (b) mucī vitrei subcruenti ꝑꝑ alvo red-
debat, & STORCHII (c) amicus materiæ sper-
ma ranarū referentis cruore misti volam ano
explofit. Hinc & FERNELIUS (d) ex pau-
citate mucī, ac excretionē sine dolore con-
clufit, humorem hunc non pro purē ulceris,
fed pro hæmorrhoidali eſſe habendum. In-
terea tamen id pro criterio non eſſe ſtatu-
endum docent alia obſervata, ubi inſignis ſæpe
copia hæmorrhoidalis id genus mucī excer-
nebatur: multum ſane illius egeſſerunt viri
GOHLII (e) ac STUNZERI (f), feminaque
STAHLII (g) ingensque ejus vis erat, quam ali-
quando SEGNITZII (h) vir dejecit; humor ille
ſperma ranarū referens a SORBAIT (i) viſus
fere 2 menſuras dedit, imo ꝑꝑ 10 ejusdem
GREISELII (k) æger exoneravit. Perinde ſe res
habet in ſero excreto, cujus aliquot tantum

CO-

(a) Vide §. 11.

(b) Vide §. 16.

(c) Vide §. 4. Nro. 2.

(d) L. c.

(e) Vide §. 4. Nro. 1.

(f) Vide ſequ. Nro. 3.

(g) Vide ſequ. Nro. 3.

(h) Vide §. 16.

(i) Vide §. 32.

(k) Ibidem.

cochlearia reddi HOFFMANNUS (a) vidit,
CONERDINGIUS (b) plures libras.

3. *Tempora* denique, in quæ excretion-
es hæ incidunt, recenti adhuc in morbo
eadem sunt fere, ac in hæmorrhoidibus ru-
bris, nimirum vel menstrua, vel æquinoctialia,
& solstitialia, vel certe nulli typo adstricta,
vel ex brevioribus intervallis constantia. Sic
STUNZERI (c) viro hæmorrhoides mucosæ
10. quoque die fluxere, cum solennibus hæ-
morrhoidali morbo symptomatis, vehemen-
tibusque circa umbilicum torminibus; at eva-
cuata uberi lenti muci copia levamen perinde;
atque a fluxu sanguineo aliis accidit, seque-
batur. Verum ubi morbus hic invaluit, ha-
bitualisve effectus est, quotidie propemodum,
idque crebris insultibus affligit adeo, ut de-
mum non modo sub fecum egestionem, sed
etiam ob assiduum plerumque tenesmum citra
ulla stercora mucago illa ad sui excretionem
urgeat, imo involuntarie etiam quandoque
secedat. STAHLII (d) femina sanguineo-me-
lancholica, ex arthritica familia, solitudi-
nes, & plus quam annuam quartanam, ac va-
rias

(a) Vide Nro. præced. b)

(b) Ibidem.

(c) L. c. p. 49.

(d) Diff. cit. l. c. p. II.

rias tertianarum recidivas perpeſſa, inſuper ultra annum peſſimum omni menſe capitis eryſipelas cum ferociſſima cephalalgia; catameniis autem pauciſſimis, laborabat. Catameniis Væ Se revocatis, poſt aliquot arthriticos inſultus accedentibus pluribus, gravibuſque terroribus, & anxietatibus tandem atroces ſplenicos dolores aliquoties perpeſſa, ac præterea diarrhœam cum intenſiſſimis tenesmis experta excrevit mucoſa cum copioſis ſtriis cruenta, multa, ſæpeque diei ſpatio. Perinde Eccleſiaſtici apud R. I. FORTIS (a) mucus primum ſub alvinis tantum nixibus, dein ſine ullo etiam conatu egrediebatur; MÜLLERI (b) Rector per 4 annos quotidie mucum ſæpius, & jam cum fecibus, jam ſine iis excernebat, & SEGNITZII (c) vir urgente noctu præſertim tenesmo intra $\frac{1}{4}$ horæ quater, ſexiesve deſidens raro ſtercora, ſed mucum plerumque reddebat; RICHTERI (d) autem æger vel vicies per diem deſidens nil niſi materiam albicantem excernebat. SCHAARSCHMIDTII (e) porro Eccleſiaſtici quotidie mucum alvo redenti podex inter ſedendum etiam madebat.

Atque

(a) Vide §. 4. Nro. 4.

(b) Vide §. 17.

(c) Vide §. 16.

(d) Vide §. 4. Nro. 3.

(e) Vide §. 13.

Atque ex his abunde liquet, hæmorrhoides albas habituales multo esse deteriores rubris, plurimumque afflictionis accersere ægrotis.

C A P U T III.

PROEGUMENAE CAUSAE.

§. III.

PROEGUMENAE causæ hæmorrhoidum albarum tametsi eadem sint, quæ rubrarum; tamen hæ ipsæ nonnisi sub singulari quadam conditione, de qua hic agendum est, cum peculiari perinde procatacticarum concurrentium applicatione, ad albas ducunt; quas inter

1. *Aetas* adultior plerumque est. Cum enim rubræ hæmorrhoides in omnem fere, ut vidimus (a), ætatem cadant; albæ, quantum ex historiis, quas coram habeo, eruo, nunquam ante 30um ætatis annum adveniunt, rarissime quoque ante 40um; ex iis enim, quorum ætatem rite adnotatam reperi, sola STORCHII (b) puella 30 annos nata erat, dum
cruen-

(a) Vide Tom. I. §. 10.

(b) Vide §. 14.

cruentum alvo mucum egerere cœpit, qui rubrarum potius hæmorrhoidum secuturarum prænuncius esse videbatur; quod ipsum etiam de ALBERTI (a) viro 30. annis majore tenendum est; quippe qui remediis adhibitis postea rubrum fluxum sit adeptus. Soli duo ægri, quorum unus KRÆBSII (b) est 34 annorum; alter 36um ingressus apud R. I. FORTIS (c), hæmorrhoides mucosæ vere tales, diuturnioresque sunt perpeffi. Reliqui omnes, quorum mihi de ætate constat, morbum hunc a 40mo ætatis anno, & post hunc exorsi sunt: ut proinde certum sit, ægritudini huic non nisi adultiorem, & ingravescentem ætatem esse obnoxiam.

2. *Sexus* autem præprimis virilis ad hocce malum proclivis est; ex toto enim ægrorum isthoc morbo affectorum syllabo, quem contexui, & prope 40 mortales continet, 4 haud amplius feminae sunt albas expertæ hæmorrhoidas; quarum etiam, si puellam STORCHII (d) demas, cui morbus non ultra semel accidisse videtur, & leucorrhœicam illam, cujus

(a) Vide §. 19.

(b) Vide §. 31. Nro. 2.

(c) Vide §. 4. Nro. 4.

(d) Vide §. 14.

cujus ante (a) meminimus, ad rubras perinde ani, at cœcas hæmorrhoides referas, duæ tantum erunt reliquæ: STAHLII (b) nempe una; altera STORCHII (c), quæ hæmorrhoidibus albis laborasse dici mereantur.

3. *Temperies* e melancholico - vel sanguineo - phlegmatica teste G. H. BEHRIO (d), cum quo & S. SELIGMANN (e) sentit, aptissima huic morbo suscipiendo videtur; forte ob mucosam humorum diathesin vasorum laxitati, inertięque in id genus temperamentis perfrequentem: nihilo tamen secius temperies cholERICA, cholERICO - melancholica, sanguinea, &c.; haud plus immunitatis, ut observata docent, attulerunt.

CAPUT

(a) Vide §. 2. I. Nro. 3.

(b) Ibidem II. B. Nro. 3.

(c) Vide §. 24.

(d) Medic. consultat. Consil. 1. p. 7.

(e) Diss. de hæmorrhoidib. albis. Sect. 2. §. 8. p. 10.

CAPUT IV.

PROCATARCTICAE CAUSAE.

§. IV.

PROCATARCTICAE *causæ*, a quæis hæmorrhoides albæ in corporibus ad eas dispositis frequentius excitantur, sunt in primis

I. *Ingesta* quædam nonnullis in corporibus, hoc morbo jam affectis, illum gravius commovere sunt observata, vel sopitum resuscitare, ut a cerevisiæ potu MÜLLERI (a) Rectori eveniebat. Et I. D. GOHLIUS (b) „hæmorrhoidibus albis laborans . . . me (ait) „consuluit. Circumstantiæ fuerunt sequentes: commisso excessu in assumtis potulentis sequitur nauseosa cardialgia, inappetentia, & excernitur per alvum cum tenesmo „ . . magna quantitas albicantis muci nulla „sanguinis micula notati. Vinum mangoni- „satum ægre fert, cephalalgia, & spasmodico „sinistri hypochondrii dolore hinc statim prehenditur, nunquam adhuc sanguinem mit- „tens:

(a) Vide §. 17.

(b) Aët. med. Berolin. dec. I. vol. 4. fest. I. Nro. 40. p. 54.

„tens: ad Væ Sem in pedibus præservative
 „instituendam persuasus a me ceteroquin fa-
 „nus dimissus est.“

2. *Vis externa* circa podicem illata. 1.
 STORCHII (a) amicus pede utroque fallente
 in nates lapsus est, ut præ dolore contusi
 ossis coccygis vix surgeret, qui etsi incessum
 brevi concessit; in osse tamen sacro, & co-
 xis ne post 3 quidem hebdomadas plane de-
 sit. Tandem mane quodam oborto desidendi
 stimulo cum per assidua negotia ad exoneran-
 dam alvum secedere nequiret, atque interea
 ex terra nescio quid sublaturus primum sese
 flecteret, anus præter voluntatem explosit
 mucum, quantum vola caperet, lubricum, &
 consistentia spermati ranarum similem, pau-
 xillo sanguine remixtum, stercorei foetoris
 prorsus expertem: quo facto dolor omnis
 pristinus desit. Post trimestre rursus id genus
 excretio accidit; abhinc vero non amplius,
 manifesto indicio ulteriorem ad hæmorrhoides
 dispositionem neutiquam adfuisse.

3. *Venus immodica*, humorum orga-
 smum ad organa in pelvi sita concitans. Apud
 S. SELIGMANNUM (b) quidam RICHTERI æger
 onania assidua exhaustus vel vicies per diem
 subito

(a) Obs. clin. ann. 2. Septembr. cl. 4. p. 419. fq.

(b) L. c. §. 2. Nro, 2. p. 7.

subito desidere coactus nil nisi materiam albicantem puri similem, interdum sanguinis striis mistam, & vix $\frac{1}{2}$ cochlear excedentem egerebat. Ob summam autem alvi obstructionem rheo sæpius usus feculentam inde alvum reddebat sine mucositate, & cum levamine. Cum vero ab aliis morbis pro fluxu cœliaco haberetur, RICHTERUS facta hæmorrhoidum albarum curatione pristinam ægro restituit sanitatem.

4. *Hæmorrhoides rubræ* instantes vel prægressæ, vel nimix. Quantum ad instantes „fluxum hæmorrhoidalem“ inquit NENTERUS (a), „probabiliter expectare licet, quando in ætate virili post prægressa varia pathemata splenetico - hypochondriaca varii „spastici circa regionem ossis sacri, & lumbos dolores inprimis cum tenesmode conatu egerendi sese exserunt, intercurrente „sensu rei alicujus duræ (v. g. nuclei) intus „in intestino recto hærentis, imo cum actualibus ani protuberantiis dolorificis, quas hæmorrhoides cæcas vocant, aut cum excretionem muci viscidum instar gummi tragacanthæ „soluti.“ Et sane G. H. BEHRII (b) Principi cholericum accidit in recto intestino dolor ardens, ac mordax cum varicoso tumore, tene-

(a) Fundam. medicinæ T. I. P. 2. 45. sq.

(b) L. c. Consil. I. p. 2. 7.

genesmo, & excretionē muci primum, dein sanguinis, sicque albæ hæmorrhoides rubris præivere. ALBERTII (a) quoque viro molimina fluxus hæmorrhoidalis rubri mucosum fluxum cum striis sanguineis, & alvi profluvio causerunt. Multo vero sæpius rubrum hæmorrhoidum fluxum quacunq̃ue de causa interceptum albus consequi est observatus. Refert M. ALBERTI (b) quemdam aulæ præfectum ab acidularum Egranarum potu legitimum hucusque hæmorrhoidum fluxum experiri deinceps cœpisse insufficientem, atque abhinc hæmorrhoidalibus dejectionibus albis multa cum molestia fuisse vexatum. Idipsum etiam experti sunt ALISCHERI (c) literatus, ac senes HOFFMANNI (d) & ISENFLAMMII (e). Ab hac eadem causa serpiginosæ quandoque hæmorrhoides oriuntur; nam ALBERTII (f) femina vegeta, activa, & plethorica, hæmorrhoidalem fluxum experta, postea quolibet fere mense præter anomala ac magis dolorifica catamenia serpiginēs ani, & manationes hæ-

(a) Vide §. 19.

(b) Diff. de hæmorrhoidum prudenti therapia per acidulas & thermas. §. 5. p. 15.

(c) Vide §. 2. II. B. Nro. 1. b).

(d) Vide §. 16.

(e) Ibidem.

(f) Diff. de hæmorrhoidib. albis §. 11. p. 261.

hæmorrhoidales cum torminibus, ac semi-
 ischiadicis tensionibus nata est; quod malum
 sensim adeo increbuit, ut ex præconcepta,
 sed irrita scorbuti, & acrimoniæ curatione
 quasi assiduum evaserit: donec perspecta vera
 morbi indole curatio idonea morbum sensim
 ex toto profligavit. Hujus quoque loci est
 casus, quem narrat R. I. FORTIS (a): Eccle-
 siasticus 38 annum agens eufarcus, usque ad
 14 annum vertigines, 18vo malignam febrim
 passus, 20 anno dolores hæmorrhoidum na-
 ctus est cum aliquali fluxu alternis, imo quan-
 doque singulis mensibus revertente, & ad 33
 usque ætatis annum sibi relicto, ne regimine
 quidem observato, ægro equitationibus, lon-
 gisque itineribus interea dedito, & intensis
 animi applicationibus indulgente. Tum vero,
 quod immodicus evaserit fluxus, corpore
 purgato haustæ aquæ spadaneæ; at sine fructu,
 forte ob equitationes continuatas. Mox Aquis-
 granenses aquas hausit, postquam paucos dies
 in chronicam incidit febrem, a qua usu cor-
 ticis Peruv. est liberatus. Interea tumor exi-
 guus, durus in lumbis emerfit, non abolen-
 dus, sed jam crescens, jam denuo decre-
 scens. A 35 demum ætatis anno cœpit cum
 hæmorrhoidali sanguine mucosam egerere ma-
 teriam, quandoque sine sanguine etiam pro-
 de-

(a) Conf. & resp. med. T. 2. Cent. 3. Cas. 10.
 P. 325.

deuntem, quæ primum sub alvi tantum nixibus, postmodo vero sine ullo etiam conatu reddebatur. Cumque hæc omnia ad 37 annum sine sensibili coloris in toto depravatione durassent, ac 37 anno sanguis ex tusa bis vena serofus admodum fuisset obtentus, data \mathcal{R} a coralliorum. Nullum ab his levamen. Anno itaque 38 denuo facta corporis purgatio, pota ∇ a Tettutiana, data martialia, bisque tusa vena, quod corporis color jam cœperit vitiari; sed ab his lædi se magis æger sensit, idque tanto etiam magis, ubi non multo post serum lactis, deinde aquas Villenses, & balneum aquæ dulcis usurpasset; namque sanguis nunc ano profluens licet primis guttulis ruber, & consistens appareret, mox tamen prorsus serofus sequebatur, imo sola cruenta tinctura cernebatur. Languor invaluit cum difficili progressu præsertim per acclivia. Subinde vertigo, crebro autem trepidationes aderant. Interdum diarrhœa serofa, cruda. Jamque pedum ꝑcepit oedema, & æger de pondere stomachi querebatur. Tactui occurrebant obstructi mesenterii signa. Constabat nihilominus adhuc appetentia, somnusque, & subinde copiosum lotium redditum levamen afferebat. In hocce casu mucosas hæmorrhoides rubris a nimia vasorum laxitate, quam immodicus sanguinis induxit fluxus, supervenisse veri est longe simillimum.

CAPUT V.

PROXIMA CAUSA.

§. V.

PROXIMA *causa* hæmorrhoidum albarum hætenus non ita liquido demonstrata est, nulla ut laboret ambiguitate; hinc non una etiam circa illam pathologorum opinio: tres enim fere sunt sententiæ, in quas illi diversi abeunt. Alii enim hunc fluxum ad anastomofin arteriarum hæmorrhoidalium referunt, quæ mucoso sero tantum, non item sanguini etiam uberiori saltem, transmittendo sufficiat. Momenta hujus opinionis præcipua sunt: quod muco striæ sanguinis sæpenumero insint, haud fecius ac in sputis peripneumonicorum; quæ a finibus arteriarum pulmonalium exprimuntur; tum quod mucosus hic fluxus rubrum præcedere, ac sequi soleat, quemadmodum leucorrhœa menses rubros ex arteriis oriundos præcedit, sequiturque: tum denique, quod succedens sanguinis profluvium mucoso huic fluxui finem imponere observetur. Verum tria hæc ut ut vera (a), præterquam quod in venis perinde ita evenire valeant, insuper
&

(a) Vide §. 2. II. B. Nro. 1. a) S. 4. Nro. 4. §. 20.

& illud adversus arteriarum anastomoses pugnat, quod autopsia docuerit, materiam mucosam, serosamque ex venarum hæmorrhoidalium varicibus sponte, arteve ruptis profluxisse (a), quemadmodum sanguis ruber alias inde profluere consuevit. Alii vero fluxum hunc malunt ad mucifera intestini recti vasa, tamquam propria muci organa, rejicere, quæ in sententia DELIUM (b) fuisse (nisi quis alius schediasmatis excitati Auctor sit) constat, scribentem: „sunt etiam hæmorrhoides albæ dictæ. Hæ consistunt in magis; minusve dolorifica, ac tenesmode egestione muci lubrici, ac aliquatenus lenti, qui jam albidus, jam striis cruentis interstinctus est: quod posterius quo uberius præsto est; eo magis excretio dicta ad originem hæmorrhoidalium vasorum & cum his nexorum est referenda; quod si vero mucus magis albus est, indicium est, scaturiginem illius esse potius lacunas, plicasque internæ tunicæ recti, quippe qui mucus isthic alioquin uberior esse debeat ad superficiem intestini ab irritatione sordium intus contentarum defendendam, assiduoque humectandam. Quo itaque sanguinis impetus in vasa hæmorrhoidalia major est; eo plus hujus muci
„præ-

(a) Vide §. 2. II. B. Nro. 1. b) & §. 32.

(b) Fränk. Samml. 7. Band. 42. Stück Nro. 1. p. 502.

„præsertim in corporibus phlegmaticis, & ad
 „mucositatem pronis poterit secerni, excer-
 „nique, atque ita hæmorrhoides albas pro-
 „ducere.“ Verum tametsi mucifera vasa ad
 fluxum hæmorrhoidum albarum quidpiam
 conferre possint; omnis tamen illarum ratio
 sufficiens iis in vasis quærenda haud videtur;
 nam nec feri, quod muci loco interdum pro-
 dit (a), profluvium ex iis repeti potest, nec
 utriusque copia sæpe enormis (b); præser-
 tim cum (ut jam dictum) autopsia ipsa con-
 stet, mucum alias, alias serum ex varicibus
 venosis sponte, arteve ruptis profluxisse. Hinc
 denique alii hæmorrhoides albas una cum ru-
 bris ad venas referre maluerunt, earum nempe
 rhexin a sanguinis in mucum anteversi disten-
 tione. Sanguinem enim rubrum in humorem
 lentum, ac viscidum & albicantem degenerare
 posse docet nos chlorosis. Dum ergo
 ob difficultatem succedentis fluxus hæmo-
 rrhoidalis rubri sanguinem contingit stagnare
 in vasis; facile vel in ipsis adhuc finibus ar-
 teriarum, vel ipsis jam venis hæmorrhoidali-
 bus in humorem albidum, lentumque abire
 poterit, qui e ruptis deinceps varicibus cum
 alvo egeritur. Facile hinc etiam ratio striarum,
 grumorumque sanguinis in muco repe-
 riundorum reddi poterit. Degenerare hic san-
 gui-

(a) Vide §. 2. II. B. Nro. 1. b).

(b) Ibidem Nro. 2.

guinem in mucum jam vero simile D. SEN-
NERTO (a) visum est, quem & S. SELIGMANN
(b) secutus, cui causa hujus morbi „proxima
„ . . . consistit in sanguine spisso, stasi, &
„mora in vasis hæmorrhoidalibus in mucum
„everlo, & vasorum lymphaticorum ani tono
„amisso, ut hæc minus reniteant feri; quam
„vasa sanguinea sanguinis exitui.“

CAPUT VI.

SYMPTOMATA.

§. VI.

SYMPTOMATA *hæmorrhoidum albarum* sunt
prorsus eadem, quæ *rubrarum*: nisi quod ob
assiduitatem, & quod a tempore ipso incre-
menta capiant, sint molestiora, & sæpe etiam
graviora. Cum enim fluxus hic sit tantum
rubrarum hæmorrhoidum aliquatenus vicarius,
perfectaque vasorum infarctorum exoneratio
fere nunquam contingat, congestioque humo-
rum continuo iterum fiat; ob stases nunquam
non præsentem etiam assidua aderunt ad excre-
tio-

(a) L. c.

(b) L. c. §. 7. p. 9.

tiones molimina, illorum prorsus similia, quæ in rubris obtinent. Horum autem symptomatum unum præprimis est, quod hic plurimas parit molestias, & ægros pene ad desperationem adigit, frequens videlicet, acerque *tenesmus*, mucosis hæmorrhoidibus quodammodo proprius, qui quantus hic sæpe sit, ex omnibus aliis vel maxime documento servient duo senes; HOFEMANNI (a) unus; alter ISENFLAMMI; (b) tum RICHTERI (c) æger, SEGNIZII (d) vir, ac STAHLII (e) femina. Hocce enim sublato reliqua symptomata ægri non usque adeo graviter ferrent.

CAPUT VII.

DIAGNOSIS.

§. VII.

DIAGNOSIS isthic *relativa* vel maxime est necessaria, cujus ope hæmorrhoides albæ ab aliis

(a) Vide §. 16.

(b) Ibidem.

(c) Vide §. 4. Nro. 3.

(d) Vide §. 16.

(e) Vide §. 2. II. B. Nro. 3.

aliis affinis morbis, præsertim scabie ani venerea, ulcere ani, diarrhœa, dysenteria, coeliaca passione rite discerni queant; ne forte alia, quam quæ in hæmorrhoidibus est solennis, adhibita medendi methodo æger non modo non sanetur; verum lædatur etiam magis.

§. VIII.

I. *Scabies ani venerea*, & serpiginosæ variculæ ani (a) eatenus ab se dissident, discernunturque, quod & causas prægressas habeant disparatas, & serpigo dicta conjuncta sit cum reliquo symptomatum hæmorrhoidaliū comitatu, qui in syphilitica scabie adest. Quod si vero æger venereus simul sit, phænomena saltem hujus labis non symbolifant cum serpigne dicta, quam præterea Ψii usus non eradicat.

§. IX.

II. *Ulcus recti*, aut ulterioris tubi intestinalis ab hæmorrhoidibus albis in pluribus discrepat; namque

I. Cau-

(a) Vide §, 2. II. A. Nro. 2.

1. Causa ulceris manifesta, ut est inflammatio (præsertim furentium hæmorrhoidum) &c., præcedat, necesse est.

2. Materia excreta omnes puris vel pro-
bi vel pravi dotes præsefert, si ab ulcere
provenit; omnia vero contraria sunt in nostro
morbo.

3. Symptomata ulcerum ab hæmorrhoi-
dalibus & numero, & loco, & indole diffe-
runt: idcirco, prout hæc, vel illa adfue-
rint; morbum etiam suæ profapiæ adesse ar-
guent.

§. X.

III. *Diarrhæa* perinde a nostro morbo in
pluribus diffidet; enim vero illius

1. Causa prægressa est singularis, ac ma-
nifesta; tum etiam

2. Materia egeritur uberior, fluidiorque,
serosa, aut biliosa, aut alius indolis.

3. Tenesmus, aliaque hæmorrhoidalia
symptomata, quæ muci hæmorrhoidalis ege-
stionem præcedere solent, in diarrhæa absunt,
& si forte tenesmus adsit; nec tantus, nec
tam diuturnus esse consuevit.

4. Le-

4. Levamen ab egestionibus nullum consequitur, in diarrhœa, quod tamen in hæmorrhoidali malo est manifestum. Interea tamen accidit, ut ambo hi morbi compliceantur quandoque, ut in KREBSII (a) viro: sed levamen prægressorum symptomatum ad censum hæmorrhoidalium pertinentium ad singulas fere dejectiones observabile, & mucus hæmorrhoidalis in excretis præsens omnem ambiguitatem haud difficulter solvunt.

§. XI.

IV. *Dysenteria mucosa*, in qua mucus cruore striatus cum tenesmo egeritur, hæmorrhoidibus albis maxime est affinis: hinc nil mirum, has cum illa non raro fuisse confusas; id quod celeberrimo sua ætate prædico Italo B. SILVATHO (b) accidit, qui sequentem casum de diarrhœa, *dysenteria*, & *tenesmo* inscripsit: „vir generosus ætatis annorum 46, „sanguineus, boni habitus, floridoque vultu; „ventriculo satis firmo, hepate fervido, pro „miscua usus vivendi ratione, ac peregrinationibus fatigatus hæmorrhoidum fluorem „dies aliquot passus est, a quo gravior nihil „accidit. Tribus abhinc mensibus diarrhœa „sa-

(a) Vide §. 31. Nro. 2.

(b) Consil. & resp. med. Cent. 2. Cas. 93.

„satis profusa dies aliquot sine dolore corri-
 „pitur, a quo tempore postea ante 7 hebdo-
 „madas observavit sanguinis quidpiam sine
 „dolore in dejectione naturali: cujus causa
 „infusum rhabbari, & clysteres ex lacte fu-
 „erunt præscripta, nihil tamen remittente
 „malo. Verum paulo post sanguini immixta
 „effluxit materia alba glutinosa cum nigro in-
 „terdum adusto, & coagulato sanguine a fe-
 „cibus sejuncta, sine dolore insigni, pauca
 „semper copia: quin imo quandoque a prima
 „desidendi cupiditate guttatim, quandoque
 „ad $\frac{1}{2}$ cochlearis vel ad summum unius men-
 „suram. Alvus interim suppressa dum inje-
 „ctionibus plurimum sollicitatur; dolor nullus
 „percipitur, sed fervor solum quidam in ex-
 „cretis æqualibus plerumque. Interdiu tamen
 „materia hæc sæpius ejicitur sola sine molestia,
 „adeo ut consueta munia obire valeat, to-
 „leretque etiam nunc vectari curru, & equi-
 „tare. Sub mediam vero noctem, quando-
 „que prius, dolor dorsi, seu potius ossis
 „sacri profundus, qui tactu neutiquam exa-
 „cerbatur, nec rubore, aut tumore se pro-
 „dit; licet patiens corpus exerceat. Vige-
 „simo primo Martii, præmisso rhabbaro,
 „e mediana missus fuit sanguis, a quo in su-
 „ris dolor nullus, qui nunc ante triduum
 „noctu invaluit. Clyster quoque anodynus,
 „& sanguinem sistens sine dolore injectus me-
 „diæ horæ spatio si contineatur; dolor soli-
 „tus tota nocte in auroram usque affligit, at-
 „que

„que vices, & sæpius etiam nullo clystere
 „admisso sine aliorum excrementorum, aut
 „serosæ illuviei permixtione materia cruenta,
 „tenaxque alvo excreta, quæ 2. 3. 4ve co-
 „chlearia non excedit; ceteris excrementis
 „interim omnibus suppressis. Fluxus quan-
 „doque unum, alterumve diem remittit, sed
 „mox recurrit. Venter initio quidem visus
 „est intumescere, nunc recte se habet.“ Ec-
 quis autem non videt, nihil hic dysenterici;
 omnia contra esse hæmorrhoidalia? Sed ætate
 illa, qua hæc edebantur (A. 1656), nil ad-
 modum de hæmorrhoidibus albis præter le-
 vissimas conjecturas tenebatur. Hodie vero
 dysenteria mucosa, seu alba sat promte, fa-
 cileque ab invicem dignoscuntur, ut in AL-
 BERTII (a) casu factum est; etenim dysente-
 ria, ut recte notat SELIGMANN (b),

1. Acutus est morbus (chronicæ hæmo-
 rrhoides albæ), &

2. Epidemicus plerumque, ac

3. Symptomata propria habens, præpri-
 nis febrim acutam; dum in albis hæmorrhoi-
 dibus & alia prorsus symptomata adsunt, &
 febris aut nulla, aut certe chronica lenta.

4. Le-

(a) Vide §. 19.

(b) Diss. cit, Sect. 2. §. 2. Nro. 1.

4. Levamen a dejectionibus nullum in dyfenteria; evidens vero in hæmorrhoidibus albis.

§. XII.

V. *Cæliaca* denique passio, non ut eam quidem R. A. VOGEL (a) perperam descripsit; sed quæ hodie vulgo intelligitur, cum hæmorrhoidibus albis perinde ab ignaro confundi posset; a perito tamen haud ægre discernitur; siquidem

1. Chylum, non mucum evchit, majori etiam copia, statisque a pastu horis.

2. Maciem citam cæliaca; lentam hæmorrhoides albæ causant.

3. Symptomata sibi propria habet, absentibus hæmorrhoidum albarum, præsertim tenesmo illo crebro.

4. Causas quoque ambo hi morbi diversas habent, &c. Quantum autem ad VOGELII cæliacum fluxum attinet, multa sunt, quæ persuadent, eum nil aliud esse; quam
 ipsas

(a) Diff. in qua fluxus cæliaci genuina notio, atque ratio exposita 4to. Göttingæ 1768.

ipsas albas hæmorrhoides male a veteribus cum cœliaca chylosa (quam ob chylopoiesin ignoratam non satis discreverant) confusas.

CAPUT VIII. PROGNOSIS.

§. XIII.

I. **C**URABILITAS morbi hujus ab ejusdem habitu, & causa pendet; si enim hæmorrhoides albæ rubrarum sunt præludia; his apparentibus illæ desinunt, ut in **BEHRII** (a) Principe; sin vero albæ a rubris repressis, vel erumpere non valentibus ortæ persistent, habitualesque evadant, dejectionibus factis asfiduis, manentibusque symptomatis, imo & ingravescentibus, tunc æque; ac leucorrhœa habitualis difficilem admittunt curationem, sed inducta sensim cachexia mortem, ut dicitur, afferunt. Quam ardua sit sæpe hujus mali curatio; documento serviet casus **SCHAARSCHMIDTII** (b) consulti pro Ecclesiaste

(a) Vide §. 4. Nro. 4.

(b) Medic. und chirurg. Nachrichten. 6. Theil
Nro. 27. p. 248. sq.

fiasse 42 annorum, qui ab anno 25. identidem hæmorrhoides cœcas perpeffus est multo cum pressivo hypochondrii lævi dolore. A 4 annis morbus admodum crevit spasmodicis cum symptomatibus non ferendis; nunc autem quovis mane vehementes spasmodicæ tensiones per totam spinam dorsii usque ad occiput vexabant cum gravi circa os sacrum pressione, & a non brevi jam tempore quotidie per alvum prodibat humor albus plasticus, sedentique etiam podex madescebat. Præcedebant semper egestionem vehementissimi spasmi abdominales, anxietates, tremorque totius corporis, maxime manuum, proclivi tunc simul ægro ad iram, terrorem, ac metum; quæ tamen ille solícite vitabat, reprimebatque. Non obstante vero dicta excretionem hæmorrhoides cœcæ a 14 diebus etiam aderant, non tam dolentes; quam valde prurientes, quæ tamen sponte iterum evanuerunt. Aeger quidem semestri quovis Væ-Sem instituit, identidemque ʒss STAHLII tam nitrosos, quam absorbentes capiebat; uti & pilulas ejusdem, tum HOFFMANNI elixir viscerale, ac liqu. anodynum, & a 4 hebdomadis infusum quoque ex veronica, betonica, melissa, & cortice ligni sassafras hauriebat; verum omnia sine levamine. Aeger cetera non obesus, magnis præditus venis, ad sudores pronus, bene appetens, dormiensque diætæ fuit observantissimus; alvus ei libera semper fuit, imo sæpe leviter fluxa, ita ut mane ter,

qua-

quaterve dejecerit. Si unquam hic vir con-
sanatus est; id profecto non exiguo tempore,
levibusque remediis obtinuerit.

§. XIV.

II. EFFECTUS porro ab hoc morbo ori-
undi boni sunt alias; alias pravi, prout nempe
ille aut ex toto aut aliquatenus tantum fluxum
rubrarum hæmorrhoidum compensat: si enim
istum ille non ex toto compensat, nil aliud
est; quam insufficiens, ac pene inanis naturæ
conatus ad infarctus p. n. vasorum hæmo-
rrhoidalium tollendos: queis perstantibus
symptomata illum præcedentia non modo non
abolentur, nisi pro exiguo tantum tempore,
paulo autem post eadem vehementia rever-
sura, sed etiam graviora sensim oboriuntur,
quæ ad mortem ducunt: sin vero fluxu hoc
albo ruber omnino compensatur, ac p. n. in-
farctus vasorum prorsus pro tempore saltem
longiori tollitur, symptomata tum præceden-
tia cessant; tum alia præpediuntur. Effectus
itaque ab hoc fluxu præcipui sunt.

§. XV.

I. *Symptomatum abolitio.* Insignem
hujus comatis casum refert I. STORCH (a):
puella

(a) Obs. clin. ann. 6. Maji cl. 2. p. 569. sq.

puella 30 annorum sanguineo-melancholica tempore mensium spasmis epileptico per paroxysmos vexabatur, quos stimulantia ex castoreo, Qu Θammon., &c. exacerbabant: horum itaque in locum datus ꝑis absorbens inducias 4 horarum dedit, ac postridie paroxysmus deferbuit. Die 4to prior medicina sumta insultum revocavit, post quem data MRa:

R. R̄æ rhei electi ʒjss.

Liqu. V̄æ. fol. ꝑri ʒss. M.

D. ad binas doses absumentum; unde alacris ægra nil nisi phlogoses adhuc, alvumque obstructam sensit. Iteratæ ergo MRæ dimidium mane, residuum a meridie porrectum, simulque ꝑis antispasmodicus ante meridiem, & vesperi exhibitus, & globul. sacchar. mosch. pro suppositoriis adhibitis vesperi alvus referata. Interea die 5to referebat ægra se sub, ac post hesternam alvum noctam esse tuberculum hæmorrhoidale cum tenesmo, neque abhinc quidquam amplius epileptici rediisse, hujus autem loco borborygmos, & aliquas anxietates ingruisse. Sub MRæ autem, ac ꝑum usu die 6to incepit dolor in dextro crure, pedeque: capropter MRa semel, semelque ꝑis datus. Die 7mo excrevit alvo inter dolores, & ardores mucum cruentum: unde dolor evanuit. Continuatus ꝑis. Die 9no ægra symptomatum expers, tantum dum lectum reliquit, leves horrores, ac post hos fugacem æstum passa est.

R.

R. M. P. BECHER. ℥j.

— purgant. ℥ss. M. F. pil.

S. 4to quovis die gr. x. vesperi.

R. TRæ. flor. papav. rhœad.

Liqu. anod. min. aa ʒij. M.

S. quotidie m., & v. gtt. 30. Die 12mo undique bene habenti consultum, ut post 8 dies Væ So in pede fiat; quo facto constanter sana mansit. Perinde (a) quadragenarius quidam a multis jam annis indicia scorbuti, ac molimina hæmorrhoidum passus, ubi recurrentibus solidis imi dorsi doloribus sumta pilularum Auctoris dosi mucum cruentum egere-ret; ad eum promovendum data M. P. BECHERI ℥ij. purg. ℥j eo cum successu, ut cum dudum ante pro phthifico haberetur ob maciem, ab anno carnes utcunque resumferit, & abhinc pauca tantum, leviaque symptomata toleraverit. Eodem cum levamine feri spontanea excretio in HOFFMANNI (b) ægris accidit. Plura huc facientia paulo inferius (c) etiam visuri sumus.

§. XVI.

(a) Ibid. ann. 7. Septembr. cl. 4. p. 229.

(b) Vide §. 2. II. B. Nro. 1. b).

(c) Vide §. 31. 32.

§. XVI.

2. *Ulcus intestini recti*, quod mucus, diu in vasis maxime distentis stagnans, mora, & calore loci corruptus, acerque factus vicina lente erodendo inducit. Hinc DELIUS (a) de albis hæmorrhoidibus agens „status „hic (ait) non est optimus; quandoquidem „per crebras muci in plicis intestini conge- „stiones facile stases & ulcerationes, imo & „fistulæ, nec non species scabiosæ crustæ in- „ternam recti superficiem obtegentis, qualis „sæpe externe molesto cum pruritu accidit, „enasci possunt.“ Et vero experientia verum id esse jam dudum, ac sæpe edocuit. Sic I. F. ISENFLAMMII (b) vir 60 annis major, „gracilis ac valde stricti corporis, facie e vi- rore flavescente, parte hæmorrhoidario geni- tus, exacta in laboribus, itineribusque sub vario victu citra graviores morbos juventute ubi adultam attigit ætatem, partis opibus vi- tam quietam, ac sedentariam amplexus variis jam malis affligi cœpit, at levioribus primum, & cum induciis, idque per plures annos, priusquam medici sibi auxilio opus esse judi- casset. Ingravescente demum ægritudine Au- ctorem media æstate 1769 consuluit, referens a multis retro annis hæmorrhoides sibi mode- rate fluxisse, ordinateque & cum euphoria; a
tri-

(a) L. c.

(b) Nov. act. nat. cur. Tom. 5. Obs. 48.

triennio vero, ubi parcius, rariusque fluere cœpissent, ac minori cum levamine, sanitatem cœpisse labefactari in dies magis. Abdomen sæpius, maxime in hypochondriis, in miram tensionem, ac duritiem inflabatur, sed brevi evanescentem, editis nempe ore, anoque flatibus cum levamine. Appetitus jam sat bonus aderat, jam nullus; sitis abfuit. Alvo interdum uno, eodemque die jam stercora, jam lubrica, & aquosa, jam cibos semicoctos egerebat. Sub mictu quandoque, at raro, in collo vesicæ obicem quemdam sentiebat, ut majori nisu ad mejendum opus fuerit: urina alias copiosa, parcissima alias fluxit, semper pallida, ac sublaetea cum sedimento velut chyloso. In inferiori coli flexura sensus ponderis aderat. Molestissima vero illi fuit alvi quædam incontinentia, qua sine præviis tormentibus flatum exclusuro illico simul invito erumpebat vel pituita vitrea subcruenta, vel ut plurimum materia aquosa tenuis, 3ß non excedens, idque ultra quinquagies diu, noctuque. Pulsus naturalis, at parvus, debilisque repertus; libera spiratio; integræ functiones animales; labia, ac palpebræ interna sui parte pallidissimæ. Ad obstructions ergo referandas, mucum abstergendum, primas vias roborandas dari cœpta lenia abstergentia, aperientia, amaricantia, roborantia, carminantia, rheum, ♂, cortex, externis quoque haud neglectis, eo successu, ut sub diutino horum usu fluentibus, parce licet, quovis fere mense hæmorrhoidibus æger summo-

pere

pere alleviatus æstatem A. 1770 sat commodè exegerit, & a. potis tunc Spadanis aquis usque adeo in melius profecit, ut receptis viribus, appetentia, emendato multum faciei colore, œdemate pedum plurimum imminuto, ac hypochondriorum inflationibus fere penitus silentibus, prorsus se convaluisse crediderit, sola illa alvi molesta quasi incontinentia post omnia remedia assumpta superstite cum intercurrente subinde leviori dysuria, epithemate tamen pubi admoto magnopere levanda. Pergebatur itaque in usu remediorum. Ast media æstate alvum redditurus immanem sanguinis copiam in matulam excernens corruit semianimis, lectuloque illatus pallidissimus, frigidus, præ debilitate vix fari valens, cum pulsu celeri, minimo, vermiculari, stillante adhuc ex ano sanguine. Lectus velut a puerpera non solum cruore imbutus, verum & grumis sanguinis fœdatus viscebatur, ita ut copia sanguinis amissi ad ℥jv. vel v. medicas æstimata sit. Priorum loco nunc interea sola cardiaca, analeptica, ac roborantia imperata, quorum usu paulo post hæmorrhagia sopita, ægerque recreatus per paucas horas lectum deferere potuit. Abhinc pristina illa alvi molestia multo jam rarius affligebat, lotiumque promptius excernebatur, at cum aliquo sub mictu sibilo, & flatu subinde etiam extra mictum per urethram erumpente. Paucis post diebus urina sæpius per diem emissa sat copiosa, cruenta observabatur, sub-

subsidente sensim fere $\frac{1}{2}$ parte sanguinis. Sequentibus deinceps diebus urina prodibat foetidissima, turbidissimaque, post brevem quietem $\frac{1}{2}$ sui partem sedimenti deponens vere stercorei; ex quo tempore alvina illa incontinentia desit, alvusque satis hactenus ingestis respondere solita nunc parcius multo succedebat. Satis jam liquebat, dudum ante latuisse ulcus in confiniis recti, ac vesicæ, quod sensim erosio utriusque tunicis eorum contentis ultro, citroque transitum concedebat, ac primum quidem lotio ex vesica in rectum (quod aquosa illa frequens ac molesta excretio docebat), quamdiu hiatus fuit minimus; hoc autem amplius patefacto etiam stercorei, flatibusque ex recto in vesicam. Remediis quibusvis incassum adhibitis æger post paucas hebdomadas vivere desit. Ejusdem quoque eventus casum refert I. G. SEGNITZ apud A. B. BÜCHNERUM (a): vir 40 annis major, juvenis æque, ac vir jam multa fatigia perpeffus, ut præ industria laborum sæpe multos per dies vel nil, vel parum liquidi hauserit, 24ta Febr. 1728 querebatur medico, se inde cum jam in annum varia pati incommoda, præsertim crebras, ac subinde in 8, & plures dies durantes, tamque vehementes alvi obstructiones, ut inde aliquoties pene iliacam passionem incurrerit; in præsentī vero molestam esse omnium artuum

(a) Miscell. phys. med. A. 1729. April. cl. 4. art. 7. p. 266. fqq.

tuum debilitatem, cephalalgiam, stomachum
 male affectum, dolores dorsi, & abdominis
 sat indurati fere intolerabiles, alternantia pe-
 dum œdemata, & quandoque ischuriam, ma-
 xime vero se ab assiduo defatigari tenesmo,
 noctu præsertim lacescente, adeo ut cum intra
 $\frac{1}{4}$ horæ quater ad sexies invadat, omnem
 quietem, viresque tollat; vi cuius tamen
 raro stercus; sed plerumque mucum vel fus-
 cum, vel sæpius album, subinde sanguine
 striatum egereret. Symptomata alia ultra se-
 mestre; tenesmus vero diutius etiam, cum
 induciis tamen, adesse. Ad alvum referan-
 dam aperientia, plurimumque aloeticas pilu-
 las, ad leniendos autem dolores anodyna se
 usurpasse, levatumque his ab ulteriori absti-
 nuisse medicatione. Nulla manifesta fistulæ
 ani indicia exploratione detecta esse; verum
 potius a continuante dies aliquot muci ex-
 cretione deinceps ejusdem remissionem, & in-
 signe symptomatum, dolorumque sequi leni-
 men. Aliquando etiam tubercula aliquot hæ-
 morrhoidalia circa anum emeruisse cum ardore;
 at brevi iterum post evanuisse. A data pri-
 mum essentia aperiente, ac depurante, &
 TRa antispasmodica post aliquot dies dolor
 caput, artusque reliquit, ac tumor femorum
 decrevit, appetitus increvit; usu vero infusi
 ex herb. meliss., veron., beton., summit. mil-
 lefol., scord., marub. albi etiam colica lenie-
 batur, tenesmusque factus tolerabilior. Sub
 ulteriori emendatione varia molimina hæmo-
 rrhoidum oborta indicabant tonum primarum
 viarum, ac viscerum esse restaurandum, al-
 vum

vum apertam tenendam, sanguinem fluidiorem pro hæmorrhoidum excretionem reddendum. Martii 21 vespere datus pil. bals. BECHER. ʒß, ac postero mane salis amari Sedlic ʒjv: unde 9. dejectiones, ita levantes, ut æger interdum sat diu extra lectum esse quiret. Nocte diei 25æ abdomen magnopere intumuit, cum majoribus solito doloribus; & licet inde a cathartico alvus manserit aperta; post aliquot tamen horas tanta alvina excretio secuta est, ut intra horam plus cantharo aquoso exierit lymphæ glutinis instar viscosæ cum integris mucis frustis. Aeger quidem inde languebat; sed somnus aliquot horarum vires refecit. Venter durus, & expansus subsedit, æger optime habuit. Die 31. ob alvum biduo clausam dati denuo salis Sedlic. ʒjv. illa die aliquoties alvum leniter solverunt; postridie autem alvo solito sæpius urgente egerebantur massæ juglandem vel æquantes, vel superantes etiam, multo exterius fusco, alboque obductæ muco, quo separato reliquum erat grumosus, prorsusque corruptus sanguis. Hæc autem excretio sine ullo medicamentorum usu, præter dictum infusum, & pil. polychrestar. HOFFM. gr. 5. vespere data, durabat dies aliquot, plenaque vascula similium massarum colligebantur citra sensibilem virium imminutionem, imo cum insigni gravium dolorum remissione. Ubi autem haud multum jam sanguinis hujus grumosi reddebatur; sincerus sanguis per 2 vel 3 dies egredi cœpit; unde non tantum dolor plurimus desit, sed tenesmus quo.

quoque pene omnis cessavit, ut æger & ob-
 ambulare in conclavi, & plus quoque cibi
 sumere potuerit. Verum peccando in diætâ
 denuo stomachum læsit, ac 15. Aprilis femur,
 quod fere jam prorsus detumuit, rursus infla-
 tum est; internis tamen resolventibus, & bal-
 samicis denuo restitutum. Finiente Aprili
 pertinax alvi obstructio accidit, & sub incre-
 mento colicæ a flatibus vehemens sonus, ac
 si plena. dolia lapidum exonerarentur, ede-
 batur, jam ante conclavis januam exaudien-
 dus, quo finito alius velut aquæ plenis ex
 vasis cum strepitu effusæ, & instar variorum
 animalium audiebatur, insecutis molestis ru-
 ctibus, & quandoque etiam olidis vomitibus.
 At salia aperientia data alvum intra 16 horas
 referarunt. Lapsis 4 hebdomadis, ex quo
 primum sincerus prodiit sanguis, multum ite-
 rum sanguinis grumosi, mucoque obducti in
 massis ad 8 dies egerebatur citra remedia pel-
 lentia, & post 5 hebdomades die 7a Maji suc-
 cessit alvinæ dejectionis tempore cum levamine
 doloris, ac tenesmi sanguis purus, ac flo-
 ridus, at non nisi per $1\frac{1}{2}$ diem, nec abhinc
 unquam fluxus hæmorrhoidum induci potuit
 ordinatus: dolores quidem dorsi, & abdo-
 minis abhinc fuere leniores; verum tenesmus
 aliquanto post reversus omnem arcuit quie-
 tem, nec externis, nec internis cum con-
 stantia domandus. Unde labantibus in dies
 viribus status cachecticus crevit. Præter su-
 pra dictum mucum albo ovi similem, & sæpe
 sanguine striatum nunc etiam copiosus ichor
 fu-

fuscus, & acer excernebatur, ut copia hujus saburræ excesserit assumpta, incremente simul pedum tumore. Aliquoties obstructio alvi cum ante dictis symptomatibus occipiens mature iterum solvebatur; semel tamen vomitus accidit, quo marcidæ rapæ ab ægro ante 14, & amplius dies comestæ prorsus indigestæ fuerre excussæ, uti alias etiam observatum est, indigestiles cibos multas per hebdomadas in ægro mansisse, alios vero multo serius assumptos longe citius, ut ut perinde plurimam non digestos, alvo exiisse. Cum vero ob nauseam toto mense remedia simul respuisset; vires adeo collapsæ sunt, ut mox ubi lectum reliquit, lipothymiam incurreret. Querebatur porro admodum de oculorum caligine, nullas ut sæpe literas discerneret. Julii 11. angina spasmodica cum globo hysterico dicto oborta non modo omnem deglutitionem; sed sæpe etiam loquelam interceptit, quam notabilis copia cerasorum acidorum comestorum causavit, & quam usus antacidorum, & antispasmodicorum post biduum lenivit, simulque dein aliquot cerasa integra multo mucro obvoluta alvo reddita. Hactenus pedibus tantum tumentibus artus superiores prorsus extenuati erant; sed 14. Julii spatio noctis brachium lævum tumore ad oculum fere crescente sub atrocibus doloribus correptum, & ad usus plane ineptum factum: verum fofus, & sacculi ex herbis leniter solventibus, ac doses aliquot Jii diaph. datæ cum dolores brevi lenivere; tum etiam tumorem minue-

TRNKA Hist. Ham. Vol. III. D runt,

runt. Sanationis autem spes omnis evanuit accedente præsertim 18 Julii constanti alvi incontinentia non emendanda nec restituendo tono sphincteris amisso, effluente, invito ægro, ichore fusco, aquoso, tam acri, ut omnia subjecta lintea corroserit. Augusti initio ischuria bidui accidit citra ullam anxietatem, abdominisque tumorem, observatumque est sæpius per diem lotium purum sine stercore ex ano effluere: unde ulcus vesicæ in rectum hians adesse liquebat. Toto hoc mense æger usque ad 18am languabat admodum, at mentis plane compos, nec doloribus magnopere obnoxius, nisi quod per aliquot dies vehemens œsophagi spasmus denuo adfuerit, quo licet sublato stomachus tamen fere nihil suscipiebat. Die 18. gravissima colica ingruit, sub qua fatiscentibus sensibus æger inopinate exspiravit. Huic non multum ab similem historiam dat F. HOFFMANNUS (a): vir 60 annorum, olim succulentus, cholericus, antehac hæmorrhoidum fluxui obnoxius, sanguinem sæpius cum stercore egerebat cum insigni dolorum dorsi, & abdominis levamine, imo & podagræ crebrioris, ac per 8 hebdomades quandoque infestantis mitigatione, ut vix per unam, alteramve hebdomadam affligerit; nunc vero ex biennali tenesmo assiduo tabescebat. Ante aliquot enim tempus alvum semper

(a) Consult. . & resp. med. Cent. 2, Casu 23.

per fluidiorem fortiori nisu positurus post sonitum in dorso perceptum largam sanguinis vim cum fecibus excrevit, & abhinc tenesmus evasit frequentior, inanis sæpe, nec spissius stercus nisi a durioribus, aut frixis cibis eliciens, sed plerumque mucus duntaxat albo ovi similis, interdum sanguine tinctus, primum prodibat, sequente dein fece duriore, & ovillæ simili. Lienteria nunquam observata. Quandoque solus sanguis coactus crassitie pennarum anserinarum insignem in longitudinem protensus absque scybalis prodibat: nonnunquam purulentum etiam egerebat, quod præsertim sub enematum injectione canulæ adhærebat. Tenesmus sæpe tam vehemens fuit, ut fex prius; quam æger cloacam attigerit, exiret. Extra desidendi tempora porro regio podicis assiduo plorabat humorem instar loturæ carniū, a quo indusia, ubi siccabantur, ita eliquata erant, ut facillime dilacerarentur. Ante aliquot hebdomades in confiniis ani lividum tuberculum apparuit, sensimque sponte iterum evanuit. Aeger cetera bene appetens, ac digerens vini loco cerevisiam cum euphoria bibebat. Primus ergo medicus bis in hebdomade præbebat ꝑ̄m ex rhei ꝑj, saphyri ppt. ʒss, ol. anisi gtt. j, iisdemque diebus m., & v. imperavit enemata ex rad. alth., fabar., herba, & flor. verbasci, hyperici, melle ros., & oleo hyperici. Data porro essentia stomachico-rheumatica cum liquore ꝑ̄li; anima rhei ꝑ̄iata, ꝑ̄is cachecticus WÄDEL., vel elect., ex ꝑ̄o

cascar. , pimpin. alb. , ꝯio ♂li LUDOV. ,
 electuario bacc. lauri, ▽a cinnam. cydoniata,
 ac tantillo theriacæ ANDROM. paratum vespe-
 ri sumendum; & denique tragea stomachica
 post epulas. Inde tenesmus mitior. Cum vero
 solennis Væ So in pede bis quotannis facta
 nunc a biennio neglecta fuerit, sanguis e
 brachio lævo ad 3jv demtus ater, spissus, im-
 petuose profiliens, ubi refrixit, corii instar
 tenacissimus evasit: nihilo tamen minus deje-
 ctiones non plus cruentæ abhinc factæ, re-
 crudescente potius podagra, quam brevi post
 sponte abeuntem vehementes lateris lævi pun-
 cturæ exceperunt cum dispnoea fere ad suffo-
 cationem; quæ tamen crebris pectoris frictio-
 nibus calido linteo factis brevi remittentia
 uberi alvi profluvio solvebantur cum eupho-
 ria, somno facto quietiore, tenesmoque im-
 minuto. Assidui tamen borborygmi sine fla-
 tuum elisione, urinaque citrina, in superficie
 spumosa, in medio nubeculosa, sine sedimen-
 to, priorum usum suaserere; nisi quod pro ꝯe
 stomachico data essentia pimpin. alb. cum es-
 sentia ambrae, & guttis aliquot bals. ꝯris ani-
 sati remixta guttatim sine vehiculo sumenda,
 & pro potu theato summitates millefolii præ-
 scriptæ. Tandem consultus Auctor respon-
 dit, adesse ulcus recti, & imi coli, quod
 neglecta idonea medela callosum etiam eva-
 ferat, nec spem superesse sanationis. Terreri
 se exemplo Judæi omnia eadem cum ischiade
 insuper passi in 8 annos, qui demum atrophiam,
 anorexia, colicisque supervenientibus tandem
 hectica

hectica consumtus perierit. Idcirco palliativa duntaxat remedia præscripsit ; a quæis etsi æger emendari primum videretur ; tamen brevi post recrudescente malo post 5 menses hecticus extenuato superiori corpore , pedibus autem oedematosis factis , vivere desit. Neque alium exitum nactus fuisse videtur B. GÖCKELII (a) vir consularis 63 annorum , raræ texturæ , & a teneris ad sudorem pronus , alvi-que obstructioni usque adeo obnoxius , ut magno semper nisu , & ano protuberante illi fuerit exoneranda : unde tandem tubercula in ano enata avellanas magna. Post hæc ante 13 vel 14 annos ab hyemali frigore , computationibus , arduisque negotiis hæmorrhoides magno cum dolore , & ardore erumpentibus multis circa anum pustulis fluere cœperunt , & fluxum quidem deinceps quoque continuarunt , at inordinate , neque statis temporibus , neque eadem copia , & alias sanguinem , alias materiam albam lentam , viscidamque eructantes cum hoc incommodo , ut interdum ab assidua hujus materiæ egestionē corpus , vestesque maderent. Noctu omnia cessarunt , vesiculæ disparuere , somnusque blandus obrepfit. Ante annum abhinc ex gravissimo inter ardua , & omnem quietem prohibentia negotia terrore , metuque fluxus hæ-

mo-

(a) Gallicin. med. pract. Cent. 1. Consil. 83, P. 253.

morrhoidum plane substitit, secutaque contumacissima alvi obstructio cum tam diro tenesmo, ut jam noctu quoque 10. 15. 18. vicibus desiderere cogeretur æger, raroque præter paucas urinæ stillantis guttas stercora fabam, vel avellanam æquantia extruderet. Sub hoc conatu pustulæ prius dictæ partim turgidæ, duræque; partim flaccidæ, & inanes magno cum ardore prominebant. Cumque mane omnia essent leviora, a prandio, ac cœna dolores statò tempore, ac velut ad horam ingravescebant; excrementa non amplius debito modo egerebantur, magnis circa umbilicum, lumbos, & os sacrum doloribus obtinentibus. Variis, multisque adversus hæc præsiidiis incassum adhibitis tandem per 4 hebdomadas usus est acidulis Jebenhufanis, quarum horis antemeridianis ℥iij hauriebat; a meridie vero balneo ∇ æ communis infidebat: unde factum, ut hæmorrhoides rursus aliquatenus fluerent; sed nil nisi per intervalla materiam rubram, incarnatam, albam, corruptam instar succi cydoniorum, interdum colorem citrei mali referentem, mox vero cineream, lentam, ac viscidam in forma gelatinæ cum ineffabili conatu, tenesmo, dolore, & ardore, atque insigni ani, hæmorrhoidumque protuberantia excernebant, quæ omnia ob locum a pustulis arctatum excludi non poterant, ideoque etiam flatus plurimi interclusi, ac varices venarum intus percipiebantur. Cumque prius æger uno præ altero die lecto relictò negotia privata, ac publica pro-
 cu-

curare potuerit; nunc jam ob assiduum tene-
smum, tumultus flatuum, dolorem, ardo-
remque vix ferendum, atrophiam, debilita-
temque id non amplius fuit integrum. Even-
tus tandem quis fuerit, haud constat. Feli-
cior his fuit, cujus I. G. ZINN (a) meminit,
vir ad 50 annos natus, qui præter asthma
spasmodicum albas etiam hæmorrhoides passus
egessit aliquando ano membranam mollem,
crassam, spongiosam, excavatam, magnitu-
dine fere $\frac{1}{2}$ manus, foetidissimam. Abhinc
plures in dies copiosum pus evehebatur. Dum
multo inde post tempore adversus asthma pauca
grana squillæ sumsisset; ocyus dolorem in
recto sensit. Nunc optime valet.

§. XVII.

3. *Tabes*, quam vel ulcerosus intestini
recti status post se trahit, ut paulo ante (b)
allata docent exempla, vel anomalia ipsa mu-
cosa hæmorrhoidalis inducit. Hujus posteri-
oris exemplum præbet W. T. RAVIUS (c),
quod etsi ob numerosas, & sesquipedales for-
mulas nauseam lectori sit moturum; omitten-
dum tamen non judicavi. Clericus 51 anno-
rum,

(a) Commentar. Götting. T. 2. p. 364. Obs. 4.

(b) Vide §. 16.

(c) Act. nat. cur. Vol. 9. Obs. 3.

rum, sanguineo - cholericus, a multis annis hypochondriacus, & hæmorrhoides passus anomalas jam decolores, jam albas cum alvo obstructa, flatibus, & cardialgia, a qua aliquatenus liberatus incunte Anno 1747. de-nuo eandem nactus est cum ardore stomachi, phlogosibus, anorexia, siti, lumborum dolore, ac pertinaci alvi obstructione. Primus medicus tunc febrem epidemicam esse ratus, temperantia, bezoardica fixa, & essentiam alexipharmacam præbuit; verum ab hac stomachi ardor usque adeo increvit, ut ille nil cibi ferret; potus quoque mox stomachum, pectusque gravabat, & ructus causabat: unde sudore colliquativo enato corpus tabescebat, ægerque consumptis per vigilias pertinaces viribus, pulsu debili, celerrimoque effecto, perpetuo clinicus mansit, per 3 continuas hebdomadas alvo nec feces, nec flatus exonerans, lotio quoque flammeo parcissime excreto. Stomacho primum ita prospectum:

℞. ∇a chamom ʒij.

— millefol.

— menth. aa ʒjss.

— perlar ʒß.

Cort. Peruv.

⊙ purif.

Rhei oz. aa ʒß.

C. C. sine igne ppt.

Matr. perlar

Cinnab. nat.

Gumm. Arab.

Gum.

Gumm. tragac. aa ʒj.

Mucil. sem. cyd. cum ▽a rub. id: parat.

Succi citri rec.

Syr. pap. rhœad aa ʒß. M.

S. omni bihorio cochl. j. Ad leniendum stomachi ardorem somnumque conciliandum:

℞. M. P. balsam. ʒß.

Extract. cort. cascar. ʒß.

—— chamom. gr. xij.

Ther. cœlest. gr. viij.

Bals. Peruv. q. s. F. pil. gr. ij. Nro. 30.

Inauratæ. S. quavis nocte Nro. 10. Potui datum decoctum hordei mundati cum passulis minoribus in fero lactis caprillo, addito colaturæ $\frac{1}{2}$ pomo citri in taleolos secto, & sacchari tantillo. In cibum data jura tantum carniū, & hordeacea cum uno, alterove cochleari gelatinæ C. C. cum succo citri & cons. alkerm. paratæ intus soluto. Cum autem vel a repidis alimentis stomachi ardor, & pondus, & anxietates sequerentur, frigide omnia sumta optime tulit, & cum viriū refectiōe. Alvum solvit enema ex jure carnis cum semine anisi, & carvi decoctæ & oleo olivarum, vitell. ov, ac sale, quo multæ siccæ, ac nigricantes sordes cum flatibus educæ. Dolorem lumborum hirudines ano admotæ sustulere. Postmodo alvum quotidie aperuit sequens electuarium:

℞. Extract. pulp. passul. minor.
 Conserv. flor. tunic. āā ʒss.
 ☿ stom. BIRKM. sine saccharo ʒjv.
 ☿ Cort. Peruv. Selectiss. ʒiij.
 — rhei. or. ʒij.
 Spec. diacret. MYNS.
 Gummi tragac.
 — — Arab.
 Nitri purif.
 Lap. 69. ppt. āā ʒss.
 Corall. r. ppt. ʒj.
 Flav. cort, ☉. ʒss.
 Bals. Peruv. ʒj.
 Syr. ros. solut ʒjv. M.

S. quater de die ad 2 cusp. cultri. Urgentibus tamen acriter stomachi ardore, æstu interno, phlogosisbus crebris, lotiiq̃ue paucitate, data emulsio:

℞. Sem. 4 frig. maj. āā ʒij.
 — cannab.
 — papav.
 — violar. āā ʒj.
 ▽æ rub. idæi.
 — chamom.
 — millefol.
 — menthæ āā ʒjss. F. l. a Emulsio colaturæ adde
 Nitri purif. ʒij.
 Gummi tragac.
 — — Arab. āā ʒj.

▽æ

▽æ perlar.

Syr. dialth: FERNEL. ʒʒ ʒvj. M.

S. sæpius cochleatim. Unde mala dicta minuebantur. Cum autem observatum esset, jura alvo reddi plane indigesta cum torminibus; ad tonum primarum viarum reparandum datum elixir.

R. Extr. calam. arom. ʒj.

— cascar. aquosi. ʒij.

— gent. rubr.

— millefol. ʒʒ ʒß.

Nitri purif. ʒj. Solv. in

▽æ menthæ ʒjß. M.

S. bis per diem gtt. 60. Sublata sic lenteria æger cœpit refici. Priori autem electuario, quod paulo valentius alvum ciceret, suffectum aliud:

R. Conserv. menthæ ʒß.

⚄ cort. Peruv.

— — cascarill.

— rhei or. ʒʒ ʒij.

— rad. zedoar.

Ⓞri purif. ʒʒ ʒiv.

Gummi tragac.

— Arab.

Lap. 69. ppr. ʒʒ ʒij.

Flav. cort. Ⓞ. ʒß.

Bals. Peruv. ʒß.

Syr. flor. tunic. ʒjv. M. S. ut prius.

Verum

Verum alvus per aliquot dies ægrius successit, retentisque flatibus phlogoses, & puncturæ dextri hypochondrii natæ; ut quamvis redeunte appetitu æger jam ova forbilia, aliaque cupepta ferret; vires tamen vix crescerent. Interpositus ergo electuario ☿ visceralis:

℞. ☿ stomach. BIRKM. sine sacch.

— cort. Peruv aa 3j.

— rhei or. 3iij.

— cornachini 3ß.

⊙ purif. ʒjv.

CrySTALL. ☐ri ʒij.

Lap. 69. ppt.

Matr. perlar. ppt. aa 3ß.

Macis ʒj.

Sem. anisi 3i.

Flav. cort. ⊙ 3ij.

Ol. de cedro gtt. vj. M. F. ☿.

Ab eo alvus rite soluta, flatus, & phlogoses abiere, stomacho bene fuit, ut pauxillum vini Neccarini nec ardorem, nec æstum crearet, ægerque viribus & carnibus resumtis intra 4 hebdomades plane convaluerit, semestrique toto sanus fuerit. Postea gravi ira, mærore, & ingluvie acetariorum denuo indigestio, stomachi pondus, siccitas oris, flatus, tormina, cum alvi segnitie revocata. Idcirco præscriptum

℞. ☯ antispasm. ʒj.
 — rhei or. ʒj.
 Magnes. alb. ʒβ.
 ☯ cort. Peruv. ʒβ. M.

S. a meridie, & vesperi ex ▽a cinnam. sine vino. Sed absque levamine: nam post quævis assumpta phlogosēs cum intercurrentibus horroribus, pondus, & ardor stomachi, pulsus celeres, sitis, & anorexia aderant: cumque & pertinaciter alvus esset clausa, datum

℞. Passular. minor. exacin.
 Fol. S. S. S. āā ʒβ.
 Fl. chamom. vulg. p. j.
 Cort. cascarill.
 Crem. ☯ri āā ʒi.
 Sem. anis. ʒβ. Coqu. in
 ▽æ f. q. ad reman. ʒjv. Solve
 Mannæ Calabr. ʒvj.
 ☉ purif. ʒβ. Adde
 ▽æ cinnam. f. v. ʒij.
 Syr. ros. solut. ʒβ. M. D.

Sexies inde blande, affatimque purgato data MRa:

℞. ▽æ menthæ ʒij.
 — chamom.
 — millefol. āā ʒjβ.
 — cinnam. f. v. ʒβ.
 ☯ antispasm. ʒjv.
 — cort. cascar.

☿ conch. ppt.

— rhei. or. āā ʒij.

⊖ absinth. ʒʒ.

Liqu. anod. min. HOFFM.

Essent. carmin. WEDEL āā ʒj.

Succ. citr. rec. ʒijj.

Syr. cort ☉ ʒʒ. M.

Sub pastu simul sumsit elixir balsam. gtt. 60. in haustu apozematis diætetici ex hord., pas-
sul. min., succo citri, & rub. id. Sic flatus
facile prodibant; sed alvus semper sicca, &
plerumque biduo clausa ejectis cum tenesmo,
lumborumque dolore scybalis mansit. Moli-
mina ergo hæmorrhoidum esse ratus Auctor
enema domesticum imperat, quo provocatæ
hæmorrhoides torminosæ, decolores, spu-
mosæ: queis cum aliquot dies indulisset,
apposuit apozema:

℞. Rad. polypod. querni.

— farsap.

— Chinæ

— cichor. āā ʒʒ.

Rasur. lign. sassafr.

— — Guajac. āā ʒj.

Anisi stell.

⊖ ☐ri āā ʒij. M. D. ʒʒ. decoquenda

in ℥ijv ∇æ, addendo colaturæ ob ardorem
stomachi, ac febriculam lentam sequentem
julepum;

℞.

℞. Mucil. tragac. c. ▽a simpl. factæ 3ß.
 Syr. acetosit. citri
 Rub. idæi
 Papav. rh.
 Berberum
 Cinnam. āā 3j.
 Ⓞ. purif. 3ij. M.

Sic omnia symptomata sensim abiere, super-
 stite tantum stomacho debili, alvoque segni;
 quæ tamen etiam sustulit electuarium:

℞. Pulp. tamarind. extr. 3ß.
 Conserv. cochlear. 3vj.
 Ⓢ. fol. S. S. S.
 — rad. jalapp. āā 3jß.
 — lign. Sassafr.
 Flaved. cort. Ⓞ āā 3j.
 Caryophyll. arom. 3j.
 Ⓜ Ⓞ. dulc. 3j.
 Syr. rub. idæi q. f. M.

Ita æger sanatus facta deinceps consueta Væ
 Se autumnali in pede jam per 7 menses mu-
 nia sua vegetus obibat. Non ita felices fuere
 alii. N. W. MÜLLER (a) narrat Portensem
 quemdam Rectorem ex hæmorrhoidibus albis
 habitualibus tandem contabuisse. Nec melio-
 rem

(a) Annal. Vratisl. Tent. 25. A. 1723. Septembr.
 cl, 4. art. 9. p. 320. sqq.

rem videtur exitum habuisse ejusdem vir 50 annorum, olim sub diætâ magis vinosa plethoricus, nunquam hæmorrhoidum fluxum passus, sed qui ante 20 annos semel duntaxat rubelli quid tempore vehementis diarrhœæ sub nephritica colica excrevit, cui cum multi sabuli, & albi muci excretionem, ac dysuria obnoxius erat fere omni 4a vel 6a hebdomade cum vehementi vomitu. Sub hac mense Octobri 1719 iterum vehementissima post enema corripitur gravi ani dolore cum dolorifica muci albi excretionem. Horum continua abhinc duratio suspicionem movit latentis ani fistulæ; sed ano rite inspecto nil detegi potuit, nec præter mucum pus unquam prodire observatum. Mucosæ autem hæmorrhoides per 4 deinde annos constanter fluxere, sæpe cum excrementis, sæpe etiam sine his, ita ut sæpe circa mediam noctem earum excretio acciderit, præsertim a cerevisia uberius vesperi pota; secus vero ordinate quovis mane, ubi æger surrexit, vel una cum feces, vel isthac paulo post consecuta fluxere, tum versus horam decimam iterum sine fecibus, at cum gravi meteorismo; sæpissime vero a prandio post cerevisiæ potum: dein ab hora secunda vel 3tia stercora omni fere hora, usque dum lectum peteret, egerebat. Quandoque, & vel maxime si curru vehabatur, mucum rubellum excernebat; ante 8to hebdomadas semel sincerus etiam sanguis profluxit. Tempore colicæ cum vomitu, quod æger nec cibos, nec cerevisiam, per 2 vel 3 dies

dies assumerit, hæmorrhoides albæ parcius fluxere. Ex quo autem æger fere 4ta quaque hebdomade purgans sumsit, a sesquianno colica non rediit, at ani dolor ad finem ossis sacri mansit assiduus, turgente materia mucosa gravior; eadem egesta levior. Unde corpus extenuabatur, vires cum roseo olim colore, atque appetentia abibant; & licet ab usu thermarum Teplicensium post copiosum sabulum, ac mucum excretum & vires, & carnes aliquatenus redierint; deinceps utrumque denuo minuebatur, stomacho sensim ita imbecillo effecto, ut ne levissimos quidem cibos præ nausea tulerit. Frustrâ variis usurpatis morbus ad 15. Septembr. 1723. magis irradicatus nonnisi exitium pollicebatur.

§. XVIII.

4. *Hydrops, Tympanites.* Utrumque in eodem ægro vidit I. G. ERNESTI (a) 42 annos nato, cholérico, sanguineo, in iram ad convulsiones usque, quas inde aliquoties natûs est, prono, & anomaliis hæmorrhoidum, quæ partim dolores femoris, pedumque; partim hæmorrhoides cœcas causabant, obnoxio, qui post superatam Augusto mense volaticam bullatam, & hæmorrhoidalia quædam

(a) Annal. Vratisl. Tent. 21. A. 1722. August. cl. 2. art 3. §. 3. p. 146.

dam incommoda, neglectamque circa æqui-
 noctium autumnale pedis phlebotomiam (a)
 ex vehementi rursus ira novos motus hæmo-
 rrhoidales cum pertinaci alvi obstructione sibi
 accivit, nec tribus enematis emollientibus,
 nec rheo cum nitro sumto cum aliqua con-
 stantia referanda. Hæmorrhoides cœcæ avel-
 lanas magnæ intensissime ardebant, queis cum
 sine prævia Væ Se oleum ovorum esset ad-
 motum, evanuerunt sequente ocyus hæmoptoe
 (quod & olim ab eodem remedio accidit),
 hacque usu temperantium antispasmodicorum,
 nitroforum, pediluviiis, & infuso ex herb.
 urticæ min., & millefol. sopita rursus in in-
 terno ani margine repullularunt summo cum
 tenesmo, dysuria, parca subinde muci, sper-
 mati ranarum similis, excretionem, colicisque,
 & cardialgicis ad assumpta doloribus. Ad hosce
 sopiendos dum proprio consilio sacculos avenæ
 abdomini admoveat, atque MRA carminante
 ex calidis conflata utitur, intra 8 dies abdo-
 men tympani instar alte inflabatur cum conti-
 nenti alvi obstructione, nisi quod sub vix
 ferendo tenesmo, doloribusque imi ventris
 mucus tantum exprimeretur. Accitus Auctor
 cum enemata mere oleosa mox iterum refluxere
 sine mitigatione tenesmi, ac fecibus videret,
 remittente tenesmo vulgaria injici jussit cum
 solu-

(a) Ibid. Tent. 22. Octobr. cl. 2. art. 3. §. 3.
 P. 385.

soluta in iis 3ß M. P. bals., quæis stercora
 dura ovillis similia educta. Ad mitigandum
 tenesmum post sacculos incassum ano admo-
 tos spongiola oleo verbasci intincta, anoque
 intrusa illum lenivit, mucique excretionem
 facilitavit, & abdomen quoque subsidere hæ-
 morrhoidesque egredi cœpere, quarum una
 avellanam æquavit. Admotis illico hirudi-
 nibus, & educto fere ad ℥ss sanguine venter
 magis sudsidebat; sed exiguo cuncta fructu.
 Nam prorsus licet egressis hæmorrhoidibus
 alvus tamen sæpius enemate movenda fuit,
 nec nisi diu post varices ani, frustra applicatis
 vel discutientibus, vel fluxum provocantibus,
 evanvere, & venter jam minui, jam rursus
 inflari cernebatur. Stomachus tantopere in-
 flatus fuit, ut æger nec bolum carnis citra
 summam anxietatem, ac pressionem ejusdem
 assumere quiret; qualia etiam plerumque in-
 digesta alvo reddebantur; ægerque solis car-
 nium juribus nutriendus erat. Nec remedia
 etiam alia profuere, quam ʒis ex rad. ari,
 lap. 6ʒ, ☐o ☉, ☉ puro, ☉ diaph; & cin-
 nab.; quippe quem lenis quandoque sudor
 sequeretur. Neque hæmorrhoidales motus
 compesci poterant usu essent. millefolii, gent.
 rubræ, chacarillæ, ac TRa ʒii ☐sati inter
 se mixtis, cui interdum subjuncta TRa ♂.
 LUDOV. cum arcano ☐ri combinata, perinde
 necquicquam. Neque etiam arcano ☐ri cum
 TRa ʒii ☐sata vel lotium, vel alvus pro-
 mota; sed semper ante dicto enemate opus
 erat, quo & urina, & copiosus alvi mucus

proliciebatur. Neque solennia ad ischuriam cataplasmata hic in facilitando lotio fuerunt efficacia. Pedis phlebotomiam nunc oedema pedum interea natum, & crescens prohibuit. Pridie obitus noctu magnum frigus ægrum corripuit, cui diluculo non minor successit æstus, & faciem, pedesque, præsertim lævum tumor inflammatorius invasit; postridie mors supervenit. In cadavere venter fuit aqua plenus, flatibus intestina, & stomachus; vena portæ sanguine turgebat: hepar magnum erat, durumque. Circa recti finem vesiculæ numerosæ viscebantur, magnitudine stratagematum majorum, sero, ac sanguine refertæ.

§. XIX.

III. SUPPRESSIO *fluxus* hujus eadem post se mala trahit, quæ ab intercepto fluxu rubro oriri superius (a) dictum est. Idem etiam valet de improvide sublatis serpiginosis illis variculis, quæ ad cœcas hæmorrhoides albas referuntur (b). De his ita STAHLIUS (c): „Si . . . postquam diutius jam sederunt, aut „frequentius repullularunt, & utrovis modo „sæpius, & plus perfricatæ manarunt, & ali- „quid

(a) Vide Tom. I. §. 55.

(b) Vide §. 2. II. A. Nro. 2.

(c) Diss. cit. l. c. p. 11.

„quid effuderunt, si tunc consolidentur,
 „exemplis ipsis vidimus personas tales mox
 „in gravissimas, & quasi perpetuas molestias
 „ischiatricas, arthriticas, gonagricas, poda-
 „gricas devolutas fuisse.“ Insigne hujus rei
 exemplum alibi (a) profert: vir 40 fere an-
 norum e sanguineo ad melancholicum vergens
 adeo vehementem sensit circa anum pruritum,
 ut a scalptu non prius desierit; quam cruen-
 tum prolicuisset humorem. Brevi inde post
 succrevere tubercula verrucosa perpetuo icho-
 rem acrem, nunc plus, nunc minus, exsu-
 dantia, habitualique demum ardore, ac pru-
 ritu permolesta. Si curru, vel equo vectus
 incaluit, aut calido tempore usque ad sudo-
 rem ambulavit, aut subinde alvum fluxam,
 acrem deposuit; verrucæ illæ velut prunæ
 candentes urebant. Litu autem ex oleo hy-
 perici, thure, ac mastiche adhibito ulcera
 hæc brevi omnino sanata sunt; sed paulo post
 acerbissimi sequebantur dolores artuum, co-
 xarum, ac tandem pedis, oborta ab animi
 motibus febre acuta nullatenus leniendi; imo
 a sumto versus diem criticum cathartico, dum
 æger ter, vel quater diu, laborioseque desi-
 deret, eodem vespere dextrum pedem tumor
 invasit, hodiedum prorsus non abigendus;
 verum

(a) Colleg. casual. magn. Cas. 16. p. 191.
 201. sq.

verum post aliquam subinde subsidientiam gravius iterum tumescere solitus cum rubore & ardore; quæ quandoque $\frac{1}{2}$ anno durabant. Nemine autem de hæmorrhoidibus suspicante STAHLIUS consultus rescivit percontando, jam etiam alias id genus ulcuscula adfuisse, quæ uxor sanarit non sine læsæ sanitatis sequela. Addit æger, se in Gallia degentem sæpius hirudinibus usum; abhinc vero multis annis non amplius. Suasu ergo Auctoris æger aliquoties, at inordinate, Væ Sem instituit cum aliqua, licet non perfecta, euphoria, nam pes mansit durus, scaber, ruberque, initio ulcerosus, vel potius ichore madescens. Si ergo levia id genus ulcuscula consanata graves post se corporis trahunt noxas; graviores etiam consequi a suppressione mucosi fluxus, utpote uberioris, quid mirum? Sic M. ALBERTII (a) „vir sanguineo - melancho-
 „licus 30 aliquot annorum, rheumaticos do-
 „lores ante aliquot annos in pede perpeffus,
 „corripitur æquinoctio autumnali diarrhœa
 „torminosa, dejectionibus mucidis (mucosis),
 „sanguineis striis tinctis, tensione hypochon-
 „driorum, dolore crucis, & tenesmo comite,
 „Hanc medicus . . . pro dysenteria habens
 „sistere in, & externis stypticis . . . cona-
 „tur;

(a) Diff. de fluxus hæmorrhoidalis provocatione
 thes. 18. p. 11.

„tur; striæ sanguineæ disparent mucidorum
 „dejectione perseverante: hinc dysenteriam
 „albam accusat, sub usu stypticorum dejectio
 „decrescit, tensione hypochondriorum, do-
 „loribus dorsi, & tenesmo ingravescentibus,
 „accedente una angustia pectoris, & momen-
 „tanæ strangulationis metu: hæc sæpius se-
 „cuta dejectione moderatiora fiunt. Aguntur
 „talìa per hebdomadas. Accedens alter me-
 „dicus ex relatis molimina hæmorrhoidalia
 „subesse concludit, eaque cum per aliquot
 „septimanas jam durassent; temperantibus,
 „anodynis, & specificis sopire, & in tran-
 „quillum statum deducere tentabat: ab eorum
 „vero usu & diarrhœa, & tormina cum supra
 „dictis incommodis crevere, post meridiem
 „invalescente horrore, extremorum frigore,
 „& levi æstu, tumore pedum, qui mane eva-
 „nescere suevit. Dantur tandem sanguinem,
 „& vias ad exitum disponentia, & hæmo-
 „rrhoidalem fluxum provocantia, sub quo-
 „rum usu & perrupit, & sensim una cum di-
 „arrhœa, & ceteris incommodis disparuit,
 „ægro ad pristinum sanitatis vigorem redeun-
 „te.“ Notari vero hic meretur, fluxum hæ-
 „morrhoidum albarum facile supprimi ab ingru-
 „entibus aliis morbis mucoso-serosis, inprimis
 „epidemice grassantibus. Ita S. SELIG-
 „MANN (a) meminit senis „qui cum jam per
 „multos

(a) Diff. cit. Sect. 3. §. 14. p. 30.

„multos annos hæmorrhoidibus ani . . . mu-
 „cosis laborasset, in epidemia . . . anni
 „(1782) catarrhali, quæ per totam fere Euro-
 „pam sæviit, ita ab hoc morbo præ aliis . . .
 „civibus fuit correptus, ut vix evaserit, ne-
 „que minus morbo superato diu adhuc pitui-
 „tam albam exspuit; ex ano vero durante hac
 „excretionem nullus prodiit mucus; cessante
 „vero hæmorrhoides albæ redierunt.“

§. XX.

IV. SOLVUNTUR *hæmorrhoides albæ* su-
 perveniente fluxu sanguinis, velut in paulo
 ante memorato ALBERTII (a) viro, BEHRII
 (b) Principe, aliisque. Interea tamen id haud
 alioquin nisi recenti adhuc in morbo, non-
 dum habitum nacto, sperare licet; neutiquam
 vero in habituali effecto: nam teste ALBERTIO
 (c) „quo constantius hic albicans fluxus re-
 „petit, & continuat; eo minor spes conci-
 „pienda, & promittenda erit de facile ex-
 „spectando, & inducendo legitimo hæmo-
 „rrhoi-

(a) Vide §. 19.

(b) Vide §. 4. Nro. 4.

(c) Diff. de hæmorrhoidib. albis §. 12. p.
 262.

„rroidum fluxu“ interno, ad quem albus pertinet. Quod vero serpiginosas illas hæmorrhoides attinet, quæ ad cæcas externas referuntur, hæc ne ab initio quidem, nedum ubi habituales jam sunt „ita facile in efficacem, & sinceram eruptionem hæmorrhoidalem abeunt: quid quod facilius magis a genuino fluxu discedunt, quam in eundem redeunt“? (a).

HISTO-

(a) Ibidem §. 13. p. 263.

HISTORIÆ
HÆMORRHOIDUM
ALBARUM.

PARS II.
THERAPEUTICA

CAPUT I.
SUMMA MEDENDI CAPITA.

§. XXI.

I. INDICANS est hæmorrhoids alba.

II. INDICATIO est multiplex, nempe, ut

A. Fluxus, si est

1. Infalubris, inutilisve; propulsetur,
prævertatur.

2. Salubris, & quidem

a) Re-

a. Recens in rubrum mutetur

α . Vasis transmissuris laxatis

β . Sanguinis

1) Copia nimia imminuta,

2) Lentore p. n. emendato.

3) Motu ad vasa idonea determinato

b) Habitualis in rubrum non mutabilis, si

α . Placidus est, non turbetur, nec interceptiatur; sin

β . Difficilis est; facilitetur

1) Spasmi sopitis

2) Vasis laxatis

3) Humore fluxili reddito.

γ . Suppressus vero vel

1) Revocetur, vel

2) Compensetur

B. Symptomata mitigentur, sopiantur.

C. Ef-

C. Effectus huic morbo solennes

I. Futuri prævertantur,

1. Præsentes tollantur

III. INDICATA sunt perinde multiplicia, sequentibus capitibus ex ordine occursura.

IV. CONTRAINDICATA sunt duo præsertim:

1. *Acria* nervos laceffentia, &

2. *Calida* sanguinem commoventia.

CAPUT II.

P H A R M A C A.

§. XXII.

I. **A**TTENUANTIA *diluentia*, & *incidentia*, aquosa, saponacea, salina mucosis in hæmorrhoidibus maximi sunt usus, quod pituitosum sanguinis lentorem, ac mucum ipsum fluxiliorem reddant, stases tollant, & æquabilem, liberamque restituant circulationem; qua obtenta facilius mucosorum e corpore evectio institui, & ruber abhinc fluxus provocari potest. Satis autem de his jam alibi actum

actum est (a): hic tantum duæ adhuc supersunt cautelæ memorandæ, videlicet

1. *Tonica* simul ut sint attenuantia dicta, ut sunt amaræ plautæ, millefolium, taraxacum, centaurium, trifolium fibrinum &c. & parata præsertim inde extracta; cavendo solum, monente M. ALBERTI (b), acriora antiscorbutica.

2. *Flores Sulphuris* etsi in superioribus (c) adversus stiles hæmorrhoidales viderimus „magnopere commendari; tamen SELIGMANNUS (d) iis prophylactice tantum, non „therapeutice in albis hæmorrhoidibus mucosis utendum esse censet: ex pharmacis „(inquit ille) maxime ex usu sunt flores Δ , „jam a WERLHOFIO ex eadem ratione satis „superque laudati“ prophylactice nempe ad hæmorrhoides albas avertendas; at iis jam vigentibus „ab usu florum Δ dissuadeo, licet proficui sint in hæmorrhoidibus rubris; „in mucosis tamen, ubi jam adest pituita „crassa, nocent. Argumentum si quæris, „nitor eodem, quo usus eorundem in pe- „ctoris

(a) Vide Tom. II. §. 66. sqq.

(b) Diff. de hæmorrhoidib. alb. §. 20. p. 270.

(c) Vide Tom. II. §. 70.

(d) L. c. Sect. 2. §. 10. p. 12.

„ſtoris affectionibus ſeroſis reſtringitur,
 „quantum enim emolumenti in catarrho te-
 „nui præſtant; tantum ex eorum uſu oritur
 „damni, ubi materia jam viſcida, & gluti-
 „noſa evaſit. Ratio hujus rei hæc mihi vi-
 „detur: flores \triangle velociorem promovent
 „ſanguinis curſum; quod vero ob majorem
 „humorum lentorem fieri nequit abſque
 „majori impetu verſus locum obſtructum,
 „ubi quaſi fons, & ſedes morbi, quo mor-
 „bus dein novum capit incrementum.“ Sed
 eadem hæc ratio etiam ſtare adverſus \triangle
 deberet non minus in prophylaxi hæmorrhoi-
 dum albarum, qua therapia rubrarum cœ-
 carum, ac moliminum hæmorrhoidalium; ſi
 enim \triangle humores inſpiſſando agit; ager &
 in hiſce dictis caſibus evidenti nocumento,
 quod tamen experientia manifeſte refellit,
 oſtenditque egregiam in \triangle virtutem aperi-
 entem, & attenuantem. Eliquato autem ita
 muco facilior ſuccedet deinceps ejus evacu-
 atio, vaſorumque turgentium depletio: qua-
 propter ſubjungenda veniunt.

§. XXIII.

II. CATHARTICA *eccoprotica*, non acria,
 nec larga doſi; ſed rheum, & ſalia præ aliis
 in parvis præbiis: hinc STORCHIO ſolennis
 fuit TRa rhei cum dimidio TRæ \square ri m., &
 v. ad gtt. 30, vel plures interdum exhibita.

Unde

Unde & M. ALBERTI (a) post Væ Sem si illa opus fuerit „tam præservatorie; (inquit) „quam curatorie conveniunt moderatæ lenitiones, & laxationes alvi cum rhabarbaro „sive in substantia, sive in infuso exhibendæ, uti tale vinum medicatum parari potest ex speciebus resolventibus, & abstergentibus, cui exiguum de fibris hellebori „nigri commisceri potest, cavendo ne helleborum paulo liberalius adhibeamus, ut nil „de illius excessivo usu dicamus, postulat „enim helleborus cautum artificem: cujus „loco polypodium cum tali infuso combinari potest, evitando alia, quæ flatulentiam „provocare possunt.“ Contra vero (b) „absint immoderatæ alvi provocationes & positiivæ purgationes; quæ irregulares motus „hæmorrhoidales eo magis exasperant, & „in majorem irregularitatem conjiciunt.“ Omnibus autem eccoproticis aliis hic SELIGMANN (c) præferendum vult *Solanum hypochondriacum* KLEINII ex ꝙro ꝙsato, rheo, corticibus ☉, & aliquot guttis olei cajeput conflatum; quippe quod leniter roborando, stases resolvendo, alvum laxam tenendo, spasmosque sopiendo omnem fere indicationem expleat.

§.

(a) L. c. §. 21, p. 271.

(b) Ibidem §. 20, p. 270.

(c) L. c.

§. XXIV.

III. *ALOE cum catharticiis* juncta tunc vel maxime convenit, quando morbus recens vel dissipandus, vel minuendus est, vel fluxum in rubrum commutandus; alias haud perinde. Utiles proinde hunc in finem sunt pilulæ BECHERI, RUF1, aut celebratissimæ balsamicæ STAHLII, de quibus M. ALBERTI (a) „laudamus (ait) præ aliis remediis pilulas balsamicas STAHL., quæ motus hæmorrhoidales plus quam alia medicamenta in ordinem justum transferre adjuvant.“ Ufu certe harum pilularum STAHLII (b) in aulico hæmorrhoides mucosæ in cruentas abiverunt. Utiles quoque id genus pilulæ sunt ad ipsas hæmorrhoides albas resistentes, vel ægro succedentes, si ex accidenti sint salubres, promovendas. Ita I. STORCH (c) meminit feminæ cholerico-melancholicæ, & ad hypochondriacum malum pronæ, quæ aliquamdiu alternis diebus pilulis ad imitationem STAHLIANARUM confectis, & purgante acuatis usa excretionem muci sanguine striati sibi procuravit, cum levamine, quam pilulæ 8. quoque die deinceps continuatæ pro-

(a) L. c. §. 22. p. 272.

(b) Vide Tom. II. §. 75. c.)

(c) Obs. clin. ann. 6. Januar, d. 4. art. 3. No. 11. p. 335.

promoverunt [cum euphoria; donec a potu
vini cum cochlearia parati anxietates hy-
pochondriacae reversae uberiores curatio-
nem per Vae. Ses aequinoctiales exegissent.
Veruntamen monente ALBERTIO (a) „ab
„indiscreto aloeticorum usu „solicite absti-
„nendum est; parcissimus, & circumspectus
„temperatorum, seu correctorum aloetico-
„rum usus non penitus improbandus est. In-
„primis vero circa aloeticorum ordinationem
„moderamen, & circumscriptio adhiberi de-
„bet, quando speciales tales anomaliae hae-
„morrhoidales in suo fervore, & vigore
„existunt.“

§. XXV.

IV. DIURETICA *diaphoretica*. De pri-
oribus ALBERTI (b) „pro congrua (inquit)
„intestinorum, & primarum regionum ab-
„sterfione, ne transitus sanguinis ullo modo
„offendatur, & impediatur; conveniunt sa-
„lina digerentia, & colliquantia sive enixa,
„sive ☐sata, quo liquores ☐satos abster-
„gentes, & moderate diureticos referimus.“
De utrisque autem I. LIETAUD (c): „egre-
„giam

(a) L. c. §. 21. p. 2. 271.

(b) Ibidem p. 272.

(c) Synops. univ. prax. med. P. 1. L. 2. S. 3.
p. m. 397.

„giam opem praestat diuturnus diureticorum,
 „& diaphoreticorum usus, quorum scilicet
 „praesidio materia quaecunque morbosa per
 „renes, vel cutis spiracula e vasis sanguini-
 „neis excutitur.“

§. XXVI.

V. ANTISPASMODICA nervina ad crucia-
 tus, ac strictiones hic solennes auferendas
 haud raro hocce in morbo sunt necessaria;
 at non narcotica, nec stimulantia acra, spi-
 rituosa, volatilia esse oportet; sed mitia:
 unde SELIGMANNUS (a) „per omnem . . .
 „morbi decursum (ait) vitanda sunt carmina-
 „tiva calida, quæ quidem flatus forte fre-
 „quentes compescendi causa alias propinan-
 „tur; partibus enim calidis aromaticis vasa
 „nimis irritant, majori, quam par est, im-
 „petu humores circumagunt, eoque pletho-
 „ram commovent. Multo minus adhibean-
 „tur ad motus spasticos nimis urgentes opiata,
 „& narcotica; relaxationem enim fibrarum
 „semper relinquunt, indeque renisu vaso-
 „rum imminuto lentor augetur, & graviori
 „stasi occasio præbetur: cui utrique autem
 „malo occurrendum est temperantibus, in-
 „fuso fl. chamomillæ, clysteribus antispas-
 „modicis“ &c. Optima vero teste ALBER-
 TIO

(a) L. c. pag. 14.

tro (a) „remedia, quæ irregulares commotiones mitigant, . . . sunt . . . nitroso-digestivo-cinnabarina, interponendo abstergentia, & diaphoretica fixa . . . si multæ inquietudines in abdomine concurrant; expedit subordinare talia, quæ contumaciores motus hæmorrhoidales irregulares magis tranquillant, & secure sedant, aut sine præjudicio compescunt, quo laudamus misscelam ex essent. millefol. ; gent. rubræ, chaccarill. paratam, subjungendo TRam, temperatam ♂ lum, sive ♂ tis ♀ fatam, sive pomorum leviter ♂ lem, abstinendo a potentioribus.“

§. XXVII.

VI. TONICA *roborantia* denique; cum fere omnibus hætenus memoratis remediis prudenti manu addenda sint, ut mucifera vasa pristinum suum tonum recuperent pedetentim; in fine morbi jam fere sola, & uberiori copia sunt præbenda, ut conciliato solidis constanti robore morbi recidiva prohibeatur. Adstringentibus autem, quamdiu fluxus ex toto sublatus non fuerit; prorsus est abstinendum, ne suppressus ab iis improvide fluxus graviora accersat mala (b); imo
ne

(a) L. c. §. 22. p. 272.

(b) Vide §. 19.

ne in fine quidem illis latis fidendum, nisi vasorum laxitas roborantibus solis non auferenda inevitabilem eorum usum exposcat. Roborantia STAHLIANIS hic usitatissima sunt (a): essent. gentianæ rubræ, helenii, pimpinellæ albæ, vincetoxici, & (b) „in serpinginosis hæmorrhoidalibus efflorescentiis „laudamus MRam ex TRa \odot ii \square - „sata, & essentia succini, aut ex essentia „vinctoxici, succ., & pimpin. alb.“ inquit ALBERTI. Priora ad fluxum ipsum laudata etsi suo non careant fructu, pretioque; tamen SELIGMANNO (c) teste „omnibus . . . „palmam præripit lignum Campechense, „quo ill. . . RICHTER optimo cum eventu „in hoc morbo utitur. Præscribi solet forma „decocti . . . scilicet $\mathfrak{z}\beta$ ad integram co- „quatur cum ∇ ae $\mathfrak{z}xvj$ ad remanentiam „ $\mathfrak{z}viiij$.”

CAPUT

(a) ALBERTI. l. c.

(b) Ibidem.

(c) L. c. p. 12.

CAPUT III.

CHIRURGIA.

§. XXVIII.

I. **S**ANGUINIS *missio* hic easdem prorsus habet, quas in haemorrhoidibus rubris, indicationes, cautelas, vasorum selectum, &c. Vel maxime autem scopo prophylactico ad fluxum rubrum promovendum valent; quippe quo oborto haemorrhoides albae desinere consueverunt. Hinc ALBERTI (a) „abstinendum . . . est (ait) in cura harum haemorrhoidum a curatoria, & confusa sanguinis missione, tanto magis vero e superioribus corporis regionibus.“ Contra vero jubet prophylactice agendum esse, ut fluxus ruber provocetur (b) „partim per universalem sanguinis depletionem cum Vae Se in pede administranda, & justis temporibus repetenda, moderata quantitate celebranda; partim per specialem, & particularem sanguinis subtractionem in locis haemorrhoidalibus per hirudinum applicationem obtinendam.“ Ubi vero ruber haemorrhoidum
fluxus

(a) L. c. §. 20. p. 270.

(b) Ibidem §. 21. p. 271.

Afluxus praegressus immoliscus albas, mucosas, ferolasve haemorrhoides invexit; indicium est, has nimiae jam sanguinis tenuitati, vasorumque laxitati deberi; atque tunc omnis missio sanguinis, utpote utrumque vitium auctura, est prorsus devitanda. Sensit ejus nocumentum aeger, cujus R. I. FORLIS (a) historiam dedit. Porro ad serpiginosas illas ani variculas externas abigendas testatur STAHLIUS (b) unicum esse praesidium in prophylacticis phlebotomiis tempestive institutis; quando quidem illa serpigo a sanguine in vasis haemorrhoidalibus externis congesto, indeque erumpere nequeunte ortum trahat. Namque (c) „aliquoties annotavit quod personis Vae Sui alias „assuetis cum eam temere omisissent, in „ipso loco alias factae incisionis leves serpiginos superficiales coortae fuerint.“

§. XXIX.

II. ENEMATA ad alvum ut plurimum hocce in morbo obstructam referendam, tenesmumque acerrimum (d) leniendum, ac
tor-

(a) Vide §. 4. No. 4.

(b) Colleg. cas. magn. Casu 16. p. 199. sqq.

(c) Diff. cit. l. c. p. 11.

(d) Vide §. 6.

tormina sopiēda, spasmos pacaūdos, & demum tonum vasorum amiſſum reparandum, longe eſſe utiliſſima nemo non videt; ſimul vero intelligit pro varietate harum indicationum variis quoque enematibus opus eſſe. Hinc ALBERTI (a) „tam in feminis; (inquit) „quam in viris (tanto magis, quando multa „flatulentia concurrit) conveniunt clyſteres „lenientes, & moderate roborantes; qui „intestina ita præparant, quo legitimo humo- „rum ingreſſui pateant, atque proprius ſan- „guis congeri, & ad ultimam perruptionem „promoveri queat; cavendo ne ſtimulantia „iis conjungantur.“

§. XXX.

III. FRICTIO *abdominis, ſpinæ dorſi* &c. blanda, crebra, pannis aſperis, aromatatum fumo imbutis, vaſa atona, & diſtenta roborat, ſtaſes hæmorrhoidales loco movet, attenuat, ſicque vel fluxum rubrum hic adeo ſalutarem promovet, vel citra hunc etiam hæmorrhoides albas diſſipat.

§. XXXI.

IV. TOPICA quoque hic magni ſæpè ſunt uſus, dum ano admota vel ſerpiginem
illam

(a) L. c. §. 21. p. 272.

illam pruriginosam, & ardentem sanant, vel
 tenesnum leniunt, vel fluxum ipsum album
 resitantem, ægreve succedentem promo-
 vendo molimina illius abolent. Hinc varia
 forma adhibentur. At omnis ab illis teme-
 ritas absit; namque monente ALBERTIO (a)
 „nocent externa repellentia, refrigerantia;
 „adstringentia, incrassantia, acriora septica;
 „suspecta & lia, atrata, unguinosa, pinguis,
 „& simul facile rancescentia“ &c.

1. *Litus* pro molesta illa, ac dolori-
 fica serpigine ani demulcenda, leniendaque
 tutissimus est, si suadente ALBERTIO (b) hunc
 in finem adhibetur „oleum ovorum cum tan-
 „tillo ceræ remixtum, & pro efficaciori ab-
 „sterfione addi potest exigua portio olei
 „empyreumatici: vel licet pauxillum un-
 „quenti de linaria miscere cum oleo ovorum,
 „& ad usus suos applicare, sicuti oleum
 „flor. verbasci cum oleo ovorum mixtum,
 „aut oleum ovorum cum pauca quantitate
 „camph., & oleo lil. alb. sociatum pro ab-
 „stergendis, & consolidandis illis pustulis,
 „atque discutiendis humorum affluxibus qua-
 „drat.“ Discussæ id genus variculæ oleo hy-
 perici cum thure, ac mastiche illito quam
 gravia

(a) Ibid. §. 20. p. 271.

(b) Ibid. §. 22. p. 273.

gravia mala STAHLII (a) viro, causerint, jam superius vidimus.

2. *Vapores* quoque emollientes ano admissi indifficulter succedente mucoso fluxu, graviorum causante symptomata sunt ad eundem facilitandum perquam efficaces. F. C. KRÆBS (b) nactus est curandum virum 34 annorum, cholericum, lautæ, sedentariæque vitæ, ab aliquot jam annis colicæ interdum obnoxium, quæ præviis levibus ad cardiam molestiis, ventrisque tensionibus ingruens vomitu semper, & diarrhœa stipabatur. Vomitus quidem semper aliquid levaminis afferebat; malum tamen nonnisi aliquo post tempore penitus conquiescebat. Cum vere A. 1783 colica solito sæpius recurabat, ægerque ex hoc tempore quovis mane habebat jam plus jam minus turgidulam. Junio mense dolor colicus rediit vix ferendus cum vomitibus, ac dejectionibus innumeris, fatus e chamomilla; tepida pediluvia, infusum chamomillæ cum essent: castorei malum leniverunt, non sustulerunt. Postridie perseverante dolore, cum lingua sordida, nauseis, ac pravis ructibus datum emeticum excussit multum lenti muci, ructus

(a) Vide §. 19.

(b) Medic. Beobacht. 1. Band. 4. Heft 3. Beobachtung. §. 4. p. 18. sqq.

Etus aliquamdiu sustulit, doloresque rarius
 repetentes, & versus os sacrum anumque
 magis devoluti hæmorrhoidum suspicionem
 præbuere. Tubercula nulla aderant, nec
 hætenus æger in alvi egestionem sanguinem
 reperit; sed interdum lentum mucum, quo
 tempore etiam puncturas in ano perpetieba-
 tur. Muci excretionem promovit potus aquæ
 amaræ moderatus; verum cum continuatus
 ejus usus alvum immodice cieret cum in-
 signi debilitate, ab ulteriori illius potu de-
 sistendum fuit. Dolores ventrem, sacrum-
 que os jam penitus relinquere; sed molesti
 ructus cum nauseis reversi sunt, quæ an-
 rexia se junxit, & stomachum levissimi etiam
 cibi lædebant. Quod cum ab ejus imbecilli-
 tate ortum videretur, exhibitum elixir ex
 amaris extractis, quassia, *Ra rhei*, pauxil-
 loque L. L., tum refractæ doses simul rhei
 ad tonum intestinorum reparandum, ac pro-
 clivitatem in diarrhœam ab aqua amara su-
 perstitem abolendam. Utrumque sensim ob-
 tentum est. Post aliquot dies tumor utroque
 super genu obortus, primum vix conspicuus,
 dein celeriter crescens, ita ut intra biduum
 femora a genibus ad coxasusque magnopere
 tumuerint. Artus inferiores erant secundum
 naturam, ægerque nil nisi de pressione dex-
 tro in hypochondrio querebatur. Data pti-
 sana sanguinem depurans, & aperitiva cum
 Æe e rheo, crem. *Utri*, & millepedibus: in-
 cassum; tumore in totos artus inferiores non
finē

sine ventris tensione se diffundente, idque intra aliquot dies tam conspicue, ut ægri vitæ metueretur. Spiratio facta laboriosa, venterque in dies elatior ab ictu resonabat. Idcirco dari cœptæ pilulæ LUDOLPH., continuatum prius dictum elixir, & ptisanæ adjectæ juniperi bacca. Tam irritabilia fuere intestina, ut parva pilularum dosis caularit borborygmos, & aliquot aquosas sedes, huic occurrebatur sensim aliquot guttis laudani vel cum elixirio, vel ex aqua post sumtas pilulas exhibitis: tum vero ea fuit pilularum energia, ut præter duas quotidie dejectiones lotium copiose moveant. Tumor abhinc in dies subsidebat, spiratio fiebat liberior, & intra 8 dies æger jam equitare valebat cum evidenti utilitate. Reliquias tumoris pedum abstulerunt sacculi calidi e lupulo, & ultimo fasciatio. Finem curationi imposuit ∇ a Selterana, & elixir prius dictum. Post 5 circiter hebdomades redierunt omnia pristinae colicæ præludia, dolorque circa os sacrum; sed sub idoneo diætetico regimine vapor e fl. chamomillæ, ac seminib. lini in aqua coctis ope sellæ perforatæ ano admissus fluxum hæmorrhoidum mucosarum provocavit cum omnium symptomatum remissione: unde recidiva colicæ averruncata.

S. XXXII.

V. APERTURA *varicum* ferro, mucove-
 rgentium, vel ferro vel admotis hirudini-
 bus facta e vestigio saepe omnia sympto-
 mata summovet. Sic I. G. GREISELI (a)
 „viro . . . 49 annorum perpetuo valetudi-
 „nario post purgationem Majalem hæmo-
 „rrhoides ut aperiri curaret, consultum fuit:
 „quibus apertis exivit materia instar sper-
 „matis ranarum ad ~~th~~ x, cum jactura ta-
 „men virium. Convaluit ab hoc momento,
 „liberatusque fuit a suo diuturno morbo, &
 „millenis aliis accidentibus.“ Et P. SORBAIT
 (b) „vidimus (ait) ex hæmorrhoidibus
 „externis per sanguisugas duas fere mensu-
 „ras materiae cujusdam instar spermatis ra-
 „narum fluxisse, & patientem a longissimis
 „malis, flatibus scilicet, continuis dolori-
 „bus, aliisque symptomatibus liberatum
 „fuisse.“

CAPUT

(a) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 1. Obs. 75.

(b) Medic. pract. Tr. 1. Cap. 68. p. 420.

CAPUT IV.

D I A E T A.

§. XXXIII.

I. **A**LIMENTA quod attinet, inculcatur a M. ALBERTIO (a) in albis praesertim haemorrhoidibus, abstinencia ab alimentis, & potulentis multum spirituosiss, & aromaticis, imprimis si subjecta spissiore sanguinem habent, sedentaria vita fruuntur, & parcius reliquum potum diluentem conjungunt. Vitanda quoque omnia dyspepta, ac flatulenta. Contra vero potus esto diluens, aperiens, humectans; cibis mollis, humectans, aperiens album lubricans, verbo: alimenta sunt medicamentis analoga.

§. XXXIV.

II. **AFFECTUS** *animi* graviores sollicitè vitandi, imprimis qui sanguinem vel magnopere rarefaciunt, & commovent, ut ira; vel lentiores, ac spissiores efficiunt, ac motum simul efficiunt languidiorem, ut diuturnus moeror; & qui vehementes concitant

(b) L. c. §. 21. p. 272.

tant spasmos, ut gravis terror: contra ea hilaritas, gaudium, spes, hic sunt saluberrima.

§. XXXV.

III. MOTUS *corporis* denique moderatus, & assiduus humorum lentorem ab otio praesertim natum subigit, motum humorum languidum accelerat, circuitumque illorum reddit liberum, & aequabilem, quo morbus haemorrhoidalis vel ex toto aboletur, vel regularis, & salubris efficitur.

HISTORIÆ HÆMORRHOIDUM VESICAE.

PARS I. PATHOLOGICA.

CAPUT I. DEFINITIO.

§. I.

HÆMORRHOIDES *vesicæ* sunt spontaneum vel sanguinis, vel muci ex vasis hæmorrhoidalibus vesicæ urinariæ profluvium aut præfens, aut imminens. Est hæc altera motuum hæmorrhoidalium ferme per propria vasa anomalia haud minori sagacitate rite cognoscenda, quam curanda. Dictum enim in superioribus (a) fuit, vesicam urinariam
nullos

(a) Vide Tom. I. §. 5. b).

nullos quidem ramos ab ipsis vasis haemorrhoidalibus adipisci; accipere tamen arterias a pudenda externa, communem habente originem cum trunco haemorrhoidalis externae ex pudenda hypogastrica interna; cujus rami vesicae, ejusque collo prospiciunt: unde sanguis in ramos haemorrhoidalis externae non receptus facile in proximae pudendae externae ramos conversus vesicam laceffit. In nonnullis autem corporibus etiam ipsorum haemorrhoidalium vasorum aliquae propagines ad vesicam abeunt. In Annalibus Vratislaviensium (a) refertur ab injecta in venam portae materia ceracea intumuisse simul ramus venae haemorrhoidalis internae una cum vena ex illo ad collum vesicae circa ureterum insertionem producta. Quale quid & apud VERHEYNIUM (b), & c. BAUHINIUM (c), aliosque anatomicos reperire est.

CAPUT

(a) Tent. 12. A. 1720. Maji d. 2. art. 3. §. 1. p. 516. sq.

(b) Anat. C. H. Traët. 2. Cap. 10.

(c) Anat. L. 1. C. 20.

CAPUT II.

G E N E R A.

§. II.

GENERA *hæmorrhoidum. vesicæ* præprimis duo sunt, videlicet:

1. *Cæcæ*, quæ in solo vasorum vesicæ p. n. infarctu, vel varicibus etiam consistunt citra fluxum. Uterque hic status ægre cognoscitur: quandoquidem visum, tactumque effugit, & pathognomico caret signo, nec nisi ex accidente quandoque detegitur, ut in VAN DER HAARII (a) ægro per catheteris applicationem.

2. *Fluentes*, exque

a) *Sanguineæ*, seu *hæmaturia hæmorrhoidalis* veteribus jam non ignota, de qua C. AURELIANUS (b) „solent præterea (inquit), „sicut in podice, vel feminarum sinu, aut „matricis collo, etiam in vesica hæmorrhoides

(a) Vide §. 26. 1).

(b) Morbor. chronic. L. 5. C. 4. p. m. 574.

„des generari, quæ fluorem sanguinis præ-
 „stant, quibusdam intervallis variatum, quod
 „oportet apprehendere prudentem; cum non
 „coacervata primo fuerit effusio, sed au-
 „gmentis quibusdam promota, interjectis de-
 „fectionibus, ac sæpe retento sanguine do-
 „loris pubetenus admonitione cessante cum
 „tensione inguinum, & gravedine clunium,
 „vel renum consensu; & cum sanguis eru-
 „perit supra dictorum relatione (relevatione)
 „sequente; siquidem aliquando inflatæ, ac
 „tumentes hæmorrhoides difficultatem, vel
 „abstinentiam faciunt miæctus, quam Græci
 „dysuriam vocant, vel uriam (ischuriam).“
 Veterum doctrinam de vesicæ hæmorrhoidi-
 bus insequentia quoque tempora suis obser-
 vatis confirmarunt. Unum hic interea testem
 P. HOECHSTETTERUM (a) nominasse sat esto,
 scribentem: „fundit namque sæpius hæc hæ-
 „morrhoids sanguinem in vesicam, ut absque
 „vitio renum mingatur, quod in nobili quo-
 „dam licuit videre, & non infimæ famæ
 „medicus de se hoc mihi recensuit“ Plura
 deinceps ævi nostri ejusmodi observata pas-
 sim in medium afferenda rei veritatem abun-
 de commonstrabunt.

b) *Mucosæ*, dum sanguinis loco mucus
 cum urina excernitur. Veteribus, quod
 sciam

(a) Obs. med. Dec. 1. Caf. 2. Schol. p. 8.

sciam, affectio haec prorsus ignota fuit: neque vero hodie etiam tam pervulgata est illius idea, ut omnibus innotuerit; quandoquidem non obscuri nominis viri eam cum aliis confuderint. Quid enim aliud est SAUVAGESII (a) *pyuria viscida*? in qua tamen haemorrhoidum ille ne verbo quidem meminit. Quam parum etiam saepe in Belgio noscatur malum, satis id testatur I. VAN DER HAAR (b); & I. C. A. THEDEN (c) haud ita dudum abhinc est conquestus, morbum hunc a gonorrhœa saepenumero non discerni, ut alios praeteream. Exempla haemorrhoidum vesicae mucosarum literis qui prodiderint, oppido pauci sunt, quos inter DETHARDING (d) HENCKEL (e) PEZOLD (f) HOFFMANNUS (g):

CAPUT

(a) Nosol. meth. cl. 9. ord. 3. Sect. 28. No. 5.

(b) Samml. zum. Gebrauche pract. Aerzte 2. Band 2. St. p. 47. sqq.

(c) Neue Bemerk. u. Erfahr. zur Bereicherung der Wundarzn. 2. Th. 26. Cap. p. 214. sqq.

(d) Vide §. 18. B. No. 1. 4. & 6.

(e) Vide §. 18. B. Nro. 3.

(f) Vide §. 13.

(g) Vide §. 19.

CAPUT III.

PROEGUMENAE CAUSAE.

§. III.

I. **S**EXUS *masculus*; enim vero ex 31 aegris haemorrhoides vesicae qua rubras, qua albas passis, quos coram habeo, nonnisi unicam STORCHII (a) mendicam video haematuria haemorrhoidali laborasse. Nec ratio deest: Cum enim universim haemorrhoidali morbo viri magis; quam feminae sint obnoxii, sanguine in his per uteri vasa inveniēte exitum; haemorrhoidibus vesicae tanto illae etiam rarius affliguntur, quod apud ipsas intestinum rectum inter, ac vesicam uterus interjaceat: quo fit, ut huic etiam rami aliqui haemorrhoidalium vasorum impendantur, atque eo pauciores, ac vix aliqui ad vesicam perveniant, simul etiam ab origine horum vasorum remotiorem. VAN DER HAAR (b) tamen feminas varis, aut gutta rosacea foedatas mucosis vesicae haemorrhoidibus obnoxias esse asserit.

§. IV.

(a) Vide §. 19.

(b) L. c. p. 53.

§. IV.

2. *AETAS adulta* ; cujus nempe sunt proprius morbus haemorrhoides generatim: (a) Interea tamen quemadmodum haud ita raro evenit, ut junioribus quoque rubrae ex ano fluant, ob rationes singulares; ita etiam quandoque haematuria haemorrhoidalis ex interturbatis ani haemorrhoidibus accidere est observata, ut in MATERNII (b) puero, ac PEZOLDI (c) figulo, quorum hic annos 26, ille 13 natus erat. Albae autem haemorrhoides vesicae, quantum per observata constat, nunquam ante consistentem aetatem, aut huic proximam oboriuntur. THEDEN (d) negat homines ante 30 annum hoc malo perinde corripi; ac eos, qui hanc aetatem jam praetergressi sunt; nisi forte junioribus jam haemorrhoides caecae molestae esse coepissent SELIGMANN (e) vero rarius id ipsum ante 40 annum evenire censet: „ea enim aetate homines magis; quam alia constitutioni pituitosae obnoxii sunt, & generatim morbis a causa serosa magis: quam
san-

(a) Vide Tom. I. §. 10.

(b) Vide §. 23.

(c) Vide §. 12. Nro. 3. 2).

(d) L. c. p. 215.

(e) Diff. cit. Sect. 3. §. 10.

„sanguinea afficiuntur.“ Denique G. C. DETHARDING (a) „ætas huic affectui obnoxia
 „(inquit) semper „fere est senilis, ut ante annum 50um vix unquam observaverim.“ Ego inspecto pro more meo ægrorum literis mandatorum, quorum de ætate constat, elencho reperio unum HOFFMANNI (b) ægrum 37 annorum, alterum quinquagenarium (c), ejusdemque ætatis virum HENCKELII (d), suto-rem PEZOLDI (e) unde sexaginta annos natum, sexagenarium DETHARDINGII (f) virum. Et vero mucosos morbos in provectam magis; quam aliam cadere ætatem in confesso est.

§. V.

3. TEMPERIES *sanguinea*, *cholericæ*, *melancholica*, vel ex his mixta sanguineo-cholericæ, sanguineo-melancholica, melancholico-cholericæ; quippe quæ ad hæmorrhoi-

(a) Diff. de hæmorrhoidib. vesicæ mucosæ Schol. ad §. 5. (4to Rostock 1754. Resp. F. P. KNAUDT.) in HALLERI. Disp. med. per T. 7. No 269. P. 783.

(b) Vide §. 19.

(c) Vide §. 18. B. Nro. 4.

(d) Vide §. 18. B. Nro. 3.

(e) Vide §. 13.

(f) Vide §. 18. B. Nro. 1.

rrhoidales affectiones maxime sunt proclives (a).

§. VI.

4. LAXITAS *vasorum vesicæ* (aut p. n. illorum vel amplitudo, vel dilatabilitas nativā) cum diathesi mucosa sanguinis. Laxitas vel mucositatem, vel ista illam facile producit; alterutrius autem generi favet temperies ante (b) dicta, quam ætas provecior cito amplectitur, præprimis, ubi procatarcticæ causæ accesserint.

§. VII.

5. GENTILITIA *dispositio* cum ad hæmorrhoides contrahendas permultum conferrat (c): satis liquet, illam, vel quatenus ad ani tantum hæmorrhoides a majoribus accepta ex harum interceptione hæmorrhoides vesicæ indirecte producit, vel quatenus ad vesicæ hæmorrhoides directe connata est (utut exemplo adhuc destituar), e censu prægumenarum causarum expungi neutiquam posse.

CAPUT

(a) Vide Tom. I. §. 12.

(b) Vide §. præced.

(c) Vide Tom. I. §. 15.

CAPUT IV.

PROCATARCTICAE CAUSAE.

§. VIII.

1. **I**NGESTA varia vel fluxum hæmorrhoidum ex ano turbantia; vel humores uberius ad vasa vesicæ determinantia, imprimis diuretica, & aphrodisiaca, quæis HENCKELII (a) vir ad excessum usque est abusus. GOHLII (b) autem homo turbatis vini potu, & neglecta Væ Se cæcis ani hæmorrhoidibus cruentum in mictum prolapsus est.

§. IX.

2. **V**ENUS *immoderata* humores ad genitalia, & vesicam uberius alliciens; observavit enim THEDEN (c) mucosas vesicæ hæmorrhoides ut plurimum iis obtingere, qui exlegem, ac vel maxime libidinibus non exsatiandam vitam transigunt, velut HENCKELII (d) viro accidit.

§.

(a) Vide §. 18. B. Nro. 3.

(b) Vide §. 19.

(c) L. c. p. 217.

(d) Vide §. 18. B. Nro. 2.

§. X.

3. HAEMORRHOIDES *ani anomalaë*, dum nimirum sanguinis in hæmorrhoidalia ani vasa nisus vel sponte naturæ ab his ad vesicæ deflectit vasa, vel excessu ab ægris in 6 rebus non naturalibus commisso ab intestino recto ad vesicam regurgitare cogitur. Atque hæc est princeps hæmorrhoidum vesicæ causa, de qua etiam DETHARDING (a) mucosæ (inquit) hæmorrhoides vesicæ „vix unquam se exserere solent, nisi motus hæmorrhoidales præcefferint, sive sanguinis sinceri, sive muci, saltem exclusio contigerit, sive in solis, sed irritis naturæ conaminibus huc respicientibus substiterint. Sæpius tamen ab hæmorrhoidibus externis cœcis, quam internis suppressis hanc evacuationem esse fuit deprehensum, cujus ætiologia in immediata vasorum colli vesicæ cum hæmorrhoidalibus externis connexionem est reposita.“ Hæc autem, utut de solis mucosis dicta, de rubris perinde sunt accipienda. F. HOFFM. (b) de mictu cruento agens „contingit hoc (inquit) maxime per translationem, sive, quæ Græcis dicitur, metestasin excernendi sanguinis per menses, aut hæmorrhoides, iis vel cessantibus, vel obstructis, aut suppressis. Vidimus

(a) Diss. cit. l. c. p. 782.

(b) Med. rat. Syst. T. 4. P. 2. S. 1. C. 6. §. 7.

„dimus nos talem criticam mictionem libera-
 „liorem in viris . . . plethoricis juvenilis,
 „vel etiam senilis ætatis suppresso, vel etiam
 „penitus cessante hæmorrhoidali fluxu“ &c.
 Et paulo post (a) „præterea non semel (sub-
 „dit) sed aliquoties notavimus in senibus
 „deficiente fluxu hæmorrhoidali, item in vi-
 „ris ætatis consistentis hæmorrhoidibus cæcis,
 „& tumentibus si affecti fuerint; a motu cor-
 „poris, & animi fortiori sanguinis portionem
 „non exiguam bruno colore instar decocti
 „cassæe tincti citra urinæ difficultatem cum mi-
 „ctu prodiisse; qui procul omni dubio ex
 „vasis vesicæ sanguineis circa sphincterem ejus
 „tumentibus, & apertis profectus fuit. Venæ
 „enim hæmorrhoidales externæ communicant
 „cum vesica, & ramos etiam ad eam spar-
 „gunt; minime vero (ut nonnullorum fert
 „opinio) de internis id putandum, quarum
 „ramos ad vesicam excurrentes anatomicus
 „hucusque vidit nullus.“ G. H. BEHRII (b)
 consiliarius 65 annorum anno ætatis 61 va-
 lidos lumborum, dorsumque dolores nactus est,
 hætenusque fere assiduum ani pruritum pa-
 tiebatur, nonnunquam vero etiam in brachiis,
 præsertim in lecto, diuque jam neglecta Væ
 Sc demum urinam reddebat cum sabulo, mul-
 toque muco, & aliquoties etiam sanguinem
 since-

(a) Ibidem §. 8.

(b) Medic. Consultat. Consil. II. p. 70. sqq.

ſincerum, vel filamenta rubra cum lotio reddidit, haud dubie ob hæmorrhoides exitum per anum non invenientes. Simile quid & in STAHLII (a) gonagrigo eſt obſervatum. Porro a fluxu hæmorrhoidum non rite ſuccedente miſtum cruentum naſtus eſt cum GRASSII (b) mercator; tum HOFFMANNI (c) vir. Id ipſum etiam a ſuppreſſione fluxus dicti accidit viro cuidam GOHLII (d) & alteri HOFFMANNI (e), nec non REINESII (f) Paſtori, ac ROLFIN-
GII (g) ægro. Neque ſponte etiam ſubſiſtens fluxus parcere ſemper ſolet; quippe VAN DER MONDE (h) ſiſtit ægrum, cui cum hæmorrhoides ſtatis temporibus per aliquot annos fluxiſſent; emanenti tandem fluxui ſucceſſit miſtio copioſi ſanguinis cum lotio, at ſine ulla vel mejendi moleſtia, vel debilitate. Idem ex eadem Cauſa malum naſti ſunt BECKERI (i) ſenex,

(a) Vide §. 19.

(b) Vide §. 23.

(c) Vide §. 18. B.-Nro. 4.

(d) Vide §. 18. B.-Nro. 4.

(e) Vide §. 19.

(f) Vide §.

(g) Vide §. 20.

(h) T. i. p. 168.

(i) Vide §. 17.

senex, & NESTERI (a) vir, ac mendicabulum STORCHII (b): quid quod vel ipsæ etiam cœcæ ani hæmorrhoides interceptæ hæmaturiam attulerunt? ab iis sane vini potu interturbatis GOHLII (c) vir; ab iisdem terrore discussis JOERDENSII (d) homo - cruentum in mictum inciderunt. Eadem porro omnia albas quoque vesicæ hæmorrhoides invexisse sunt observata. Sic a subsistente hæmorrhoidum solenni fluxu mucosas vesicæ hæmorrhoides contraxere DETHARDINGII (e) senex, ac HENCKELII (f) homo; a cœcis hæmorrhoidibus non reversis duo alii DETHARDINGII (g) ægri malum idem nacti sunt; & a turbatis Væ Sc in brachio facta cœcis itidem hæmorrhoidibus eadem mucosæ vesicæ in PEZOLDI (h) futore sunt consecutæ.

CAPUT

(a) Ibidem.

(b) Vide §. 19.

(c) Ibidem.

(d) Vide §. 18. b) Nro. 1.

(e) Ibidem.

(f) Ibidem Nro. 3.

(g) Ibid. Nro. 4. & §. 23.

(h) Vide §. 13.

CAPUT V.

SYMPTOMATA.

§. XI.

Quantum ad hujus morbi symptomata attinet, nulla subinde adsunt, ubi fluxus faciles habet exitus; quod etsi in rubro sæpius locum habeat; tamen in albo quoque interdum ut, ut rarius obtinet, de quo DETHARDING (a) „aliquando (inquit) clandestine procedit nullas molestias secum ferens; raro autem contingit hoc morbo correptis felicitas ista, quin varia experiantur symptomata plus minus acuta.“ Quod ipsum etiam de hæmaturia valet; nisi quod in hac, ut dictum, sæpius illa felicitas contingat. Ceterum symptomata, quæ hæmorrhoides vesicæ stipari solent, duplicis sunt generis; alia cuivis affectioni hæmorrhoidali communia, a nisu sanguinis in hæmorrhoidalia vasa pendentia, & prolixè alibi (b) jam data, cujusmodi etiam perpeffi sunt ægri BEHRII (c), HENCKELII (a)

(a) L. c. p. 783.

(b) Vide Tom. I. §. 31. sqq.

(c) Vide §. præced.

(a) ac MATERNI (b); alia vero affectæ ipsi vesicæ ab infarctis ejus vasis, laceratisque ibi nervis propria sunt, & ad obtinendam anomalix hujus hæmorrhoidalis diagnosin scitu maxime necessaria. De his tantummodo in præsentī sermo erit. Sunt autem

§. XII.

I. FLUXUS *phænomena* ipsa varia, nempe

1. *Humor* excretus, qui est vel sanguis vel mucus.

a) *Sanguis*, qui excernitur, aut fluidus est, aut coactus; prior porro vel sincerus rutilus, vel serosus, iste ut plurimum sub finem; ille sub initium redditur. HELWICHII (c) senex fluidum mejebat sanguinem, purum initio, dein loturæ carniū similem. Grumosum autem ab indito cathetere GABELCHOVERI (d) febricitans excrevit.

b) *Mucus* vero hæmorrhoidalis quonam sit præditus colore, odore, consistentia & ducti-

(a) Vide §. 18. B. Nro. 3.

(b) Vide §. 23.

(c) Vide §. 18. B. Nro. 2.

(d) Ibidem Nro. 1.

ductilitate, operæ prætium est advertere animum, in quo

a. *Odor* primum si exploretur „ut plurimum nullum exhibet, inquit DETHARDINGIO (a) & qui naribus objicitur, urinæ magis tribuendus; ast in cacochymicis, & scorbuticis imprimis ætate proVectis nonnunquam „specificè acris, & fœtuginosus quasi deprehenditur, ut nisi matulæ sæpius repurgentur, vel mutantur; totum conclave ægroti cum fastidio adstantium repleat; ad putridum tamen, vel purulentum nunquam „accedit.“ Ejusdem porro mucī est

β. „Color . . . ut plurimum mucilagini „feminis cydoniorum, vel psyllii non absimilis; interdum magis obscurus imo bruneus, „& quando exclusio multis molestiis stipata: „sanguinolentus existit; nonnunquam striæ „sanguinæ muco intermixtæ deprehenduntur“ (b), videlicet ut in mucosis ani hæmorrhoidibus.

γ. *Consistentia* vero hujus mucī varia, ac mira interdum habet adjuncta, namque DETHARDINGIO (c) notante „mucilago hæc „quan-

(a) L. c. p. 782.

(b) Ibidem.

(c) Ibidem.

„quando cum urina evacuatur, huic est in-
 „termixta; simul ac autem in matula refrixe-
 „rit, particulæ ejus gelatinosæ sibi magis co-
 „hærentes, & specificè graviores redditæ pe-
 „detentim fundum petunt, ut ab urina facile
 „dignosci possint: interdum tamen tantam
 „ejus tenacitatem deprehendere licuit, ut
 „miscelam cum lotio calido intimiorem recu-
 „saverit, & post hujus exclusionem nonnisi
 „molestè per urethram exprimi potuerit.“ Ge-
 „latinofum id genus sedimentum in quinquagenarii lotio apud HOFFMANNUM (a) præsto
 erat, cui filamenta sæpius velut abrasæ tuni-
 cæ permixta dicuntur fuisse; mihi potius te-
 nuissimi videntur fuisse polypi mucosi, quales
 grandiores etiam cum copioso muco, teretes,
 & albicantes in fundo matulæ PEZOLDUS (b)
 apud futorem deprehendit, & „cujusmodi
 „corpora teretia instar lumbricorum sanguine
 „leviter tincta in quodam nobili varicibus
 „vesicæ non sine maximo cruciatu laborante
 cum urina emissa postea observavit“ (c).

δ. *Ductilitas* denique muco huic tanta
 plerumque est, ut in longa sese fila duci pa-
 tiatur, quemadmodum in PEZOLDI (d) fu-
 tore,

(a) Vide §. 18. B. Nro. 4.

(b) Vide §. 13.

(c) Obs. med. chirurg. 29. p. 55.

(d) Vide §. 13.

tore, & HENCKELII (a) ægro, in quo a glande penis ad matulæ usque fundum cubitorum longitudine se extendebat.

2. *Copia* porro sanguinis juxta, ac mucī magnopere variat. Enimvero

a) *Sanguis* haud secius, ac in fluxu ex ano jam modicus, jam uberior, jam plurimus erumpit. In GOHLII (b) viro levissimum quid illius lotio inerat; contra ea GRASSII (c) mercator quotidie ultra ~~lib~~ij, & HELWICHII (d) senex, ac REINESII (e) Pastor plenas illius matulas excernebant; in STORCHII (f) autem mendica sanguinis copia urinæ copiam æquaverat.

b) *Mucus* vero non eandem hic sequitur cum albis ani hæmorrhoidibus proportionem; cum enim in hisce raro unquam uberior illius vis reddatur; in mucosis vesicæ hæmorrhoidibus ad non mediocrem quandoque

co-

(a) Vide §. 18. B. Nro. 3.

(b) Ibid. Nro. 4.

(c) Vide §. 23.

(d) Vide §. 18. B. Nro. 2.

(e) Vide §. 27.

(f) Vide §. 19.

copiam colligitur: „in aliis enim vix unciam, „in aliis libras fere attingit“ inquit SELIGMANN (a). In HENCKELII (b) homine una mictione $\frac{3}{4}$ ij. $\frac{3}{4}$ iiij. illius obtinebantur; ad libras tamen reddi nondum comperi: seduxisse hac in re nonnullos videtur DETHARDING, dum hæmorrhoides vesicæ mucosæ confudit cum diabete chyloso, ubi ingens chyli vis cum lotio ejicitur (c).

2. *Tempora* denique excretionis hæmorrhoidalis e vesica fere in totum congruunt cum fluxibus hæmorrhoidalibus alvinis. **Mictus**

a) *Cruentus* ut plurimum periodice instar fluxus hæmorrhoidum ex ano affligit, ita ut adhibitis remediis cessans percuratus jam videatur, donec denuo reversus spem frustratur. Sic HEURNIUS (d) „vidit, ægros, qui „cum hæmorrhoidibus tentari solebant, cum „urina sanguinem effundebant certis spatiis „sine noxa.“ Idem etiam refert H. SAXONIA (e) de nobili Patavino, & REINESIUS (f) de

(a) L. c. §. 8. p. 20.

(b) Vide §. 18. B. Nro. 3.

(c) Vide §. 16. B. Nro. 3.

(d) Comment. in HIPPOCR. Lib. 6. aph. 10.

(e) Vide §. 12. Nro. 4.

(f) Vide §. 27.

de suo Pastore. c. PEZOLDUS (a) figuli meminit pallidi, qui ab ineunte pueritia ad 26um ætatis annum, quo obiit; quovis mense sanguinem mejebat, quod ipsum fere omni mense etiam in HOFFMANNI (b) quadragenario est observatum. Variis ex intervallis hunc mictum perpeffi sunt ægri BECKERI (c) ac NESTERI (d).

b) *Mucosus* autem, albarum ani hæmorrhoidum instar, per initia ex intervallis affligit; sensim vero habitualis factus evadit assiduus. Hinc DETHARDING (e) „statas (inquit) raro servat periodos; sed irregulari typo incedere solet: in quibusdam sine intermissione continuat, plurimam tamen partem sua admittit temporum intervalla. Haud itidem sub una quaque urinæ exclusione observatur, quin hæc quandoque limpida existat, tempore tamen matutino, sommo nocturno exantlato, præsertim visui sese exhibere solet.“ Sic unus (f) illius ægrorum fluxum hunc a principio ex intervallis patiebatur,

(a) Obs. med. chirurg. 35.

(b) Vide §. 19.

(c) Vide §. 17.

(d) Ibidem.

(e) L. c. p. 783.

(f) Vide §. 18. B. Nro. 4^o

batur, donec sensim continuus evasisset, alterum (a) quoque assiduo afflixit. HENCKELII (b) perinde ab homine bis quotidie (uno tamen vel altero subinde die intercurrente vacuo), idque horis non matutinis, ut in HOFFMANNI (c) quinquagenario; sed meridianis, ac vespertinis mucus cum lotio reddebatur; alteri autem HOFFMANNI (d) viro mucosæ excretionis 8va vel 10ma quaque hebdomade recurrebant.

4- *Modus* denique hujus excretionis varius esse potest, quo lotium cum sanguine, vel muco ex vesica exigitur. Sæpenumero enim accidit, ut primis vicibus solus sanguis sine ulla urina mingatur, ut in GABELCHOVERI (e) febricitante, HENCKELII (f) senecæ ac NESTERI (g) ægro, pluribusque aliis: quandoque cruor lotio permixtus redditur, velut in GOHLII (h), & GRASSII (i) ægris:
ali-

(a) Ibid. Nro. 1.

(b) Ibid. Nro. 3.

(c) Vide §. 18. B. Nro. 4.

(d) Vide §. 19.

(e) Vide §. 18. B. Nro. 1.

(f) Ibid. Nro. 2.

(g) Vide §. 17.

(h) Vide §. 18. B. Nro. 4.

(i) Vide §. 22.

aliquando autem eodem sub mictu sanguis primum erumpit, quem deinde lotium consequitur. Sic H. SAXONIAE (a) nobilis Patavinus per 5 annos ex intervallo copiosum sanguinem sponte, subitoque ante urinam mejebat; quod ipsum REINESIUS (b) de suo Pastore narrat. Videntur nempe varices hæmorrhoidales sub vesicæ a fundo versus orificium contractione ab lotio deorsum pressio crepantes suum prima vice sanguinem eructare, quod demum subsistente urinæ primum exitus conceditur. Subinde varices dictæ ipsum orificium vesicæ obsident; atque tunc eo promtius ante lotium erumpit sanguis: id quod VAN DER HAARII (c) casus abunde commonstrat. De muco autem nil dum simile ab observatoribus est connotatum.

§. XIII.

II. DOLOR tensivus, aut pressorius in vesica, partibusque ei connexis haud raro percipitur, in his ante mictum; in illa præsertim sub ipsa mictione. Doloris hujus causa multifaria esse potest, nempe vasorum hæmorrhoidalium infarctus, & vel maxime vesicæ
spa-

(a) Pract. L. 3. C. 40.

(b) Vide §. 27.

(c) Vide §. 26. a).

spasmus, de quo inter symptomata mucosarum vesicæ hæmorrhoidum agens DETHARDING (a) „hæc inter (ait) præcipuum esse solet spasmodica collum inprimis vesicæ, & „sphincterem tangens constrictio ingentibus „subinde doloribus conjuncta, & non raro „per urethram se diffundens. Sub his circumstantiis parva satis muci quantitas profluere „solet, dum orificia vasorum coarctantur, & „crispaturam quasi induunt.“ Interea tamen non albis modo; verum rubris etiam vesicæ in hæmorrhoidibus dolor e vesicæ collo in urethram se diffundit, siquidem ad penem usque NESTERI (b) in viro hæmaturiam passo se extenderat. Nonnullis dolor ab ano ortus per perinæum ad vesicæ usque collum, imo ad penis usque glandem propagatur, idque in rubris non minus, ac mucosis vesicæ hæmorrhoidibus; mercator enim GRASSII (c) hæmaturiam passus, quoties ad matulam cogebatur, sensum prius calidi humoris cum dolore, ac tenesmo a recto per perinæum, & collum vesicæ, ac urethram usque ad glandem penis penetrantis percipiebat. Ejusdem modi autem dolorem in mucoso quoque morbo obtinere notat SELIGMANN, cujus solius ope a
go-

(a) L. c. p. 783.

(b) Vide §. 17.

(c) Vide §. 23.

gonorrhœa discerni possit (a) : „præsertim
 „vero adest (inquit ille) dolor lumborum
 „ad anum tendens, dolor lancinans cum sen-
 „su ardoris, & tensionis ab intestino recto
 „per perinæum ad sphincterem vesicæ vergens,
 „ibique quasi moram trahens, sensus pressio-
 „nis, ponderisque in perinæo, id quod (ut
 „exercitatissimus hujus urbis in arte medicus
 „me certiores fecit) fere signum pathognomi-
 „cum constituit ad hunc morbum a gono-
 „rrhœa distinguendum.“ STORCHII (b) au-
 tem mendica hæmaturiam nacta dolorem circa
 solam vesicam experiebatur; atque hic idem
 in mucoso quoque statu observatur, qui licet
 non acutus, sed pressorius tantum sit; usque
 adeo tamen gravis esse aliquando consuevit,
 ut ægri illi ferendo non sint. Luculentum
 hujus rei exemplum narrat C. PEZOLDUS (c) :
 Sutor 59 annorum, melancholico cholericus,
 macer, post juventutem boreali in frigore
 cibis salis, crassis, ac viscidis sustentatam,
 in qua subinde in consortiis immodice bibens
 frequentes patiebatur cephalalgias, ac narium
 hæmorrhagias, phlebotomiis tamen cedentes,
 & arcendas, deinceps vitam sedentariam, par-
 cissimique potus, cum cibis acribus, dyspe-
 ptis,

(a) L. c. §. 7. p. 19. sq.

(b) Vide §. 19.

(c) Obs. med. chirurg. 28. & 29.

ptis, ac lentis, flatulentisque iniens, & ad iram, mæsticiamque pronus, cum alvi quoque insuper obstructioni obnoxius fieri cœpisset; cœcas hæmorrhoides adeptus est, eo cum commodo, quod ex hoc tempore cephalalgia, nariumque hæmorrhagiæ desierint. Quapropter inutiles jam fore Væ Ses. ratus, eas triennio neglexit, licet crebri circa ver, & autumnum capitis, pectorisque catarrhi, velut molimina pristinorum affectionum, recurrerint. A. 1700 mensibus Sept., & Octobr. gravi iterum, longaque tussi corripitur, donec phlegmatorrhagia narium secuta eam levasset, ac magis etiam sumpta abhinc post præmissum purgans diapnoica, & pectoralia; levis tamen adhuc tussicula superstes metum phthiseos a medico, nescio quo, incussum fovebat, usque dum 14a Octobr. noctu modicum sanguinis floridi æger tussiendo ejecit non sine artuum lassitudine, pedum, & crurum frigore, faciei contra æstu, ac rubore, triduique alvi obstructione, quam cum reticisset sutor, imperata Væ Se tantum ei metum injecit, ut in eclypsin laberetur. Sub hac soluta alvus cum stricturæ ventris levamine, Secta dein brachii vena, pediluvia tepida adhibita, datique Sēs ex corall. r., lap. 69, cinnab. nec non conserv. ros., quibus gravius urgente tussi sem. hyosc. albi parca dosi junctum, additæ & congruæ potiunculæ. His 20ma Octobr. hæmoptoe prorsus desiit, ac non multo post etiam tussis. Verum nec frigore artuum inferiorum, nec cibis crassis, lentis,

cru-

erudisque dehinc vitatis Martio A. 1703 in
 bubones primum, tum 19na April. in tridui
 incidit ischuriam cum dolore, ac duritie cir-
 ca vesicam. Pharmacopœus calculum adesse ra-
 tus dat purgans, & *R*am *Q*ri, a queis lo-
 tium motum tam viscosum, ut in fila duci
 potuerit, subsidentibus una in fundo vitri
 citra sabulum corporibus albicantibus, lum-
 bricos conspicuæ magnitudinis æmulantibus.
 Facies sutoris e flavo virescens, & sæpius jam
 hæmorrhoides cœcæ prius toleratæ satis do-
 cuere, mucosam hanc urinam ad mucosas ve-
 sicæ hæmorrhoides pertinere, quas 2da Maji,
 libera prius lotii excretionem reddita, conse-
 cutæ sunt cœcæ ani hæmorrhoides conspicuæ.
 At cum homo ab esu casei, aliorumque len-
 torum, ac dyspeptorum non abstinuisset, iter-
 que A. 1707 Aprili ventoso, ac frigido super
 navi suscepisset, a perfrigeratione incidit rur-
 sus in ischuriam, & alvi obstructionem. In-
 fessibus, enematibusque urina mota quidem,
 at pallida, & aquosa cum longis filamentis
 mucosis semper adhuc, ut prius, procedebat,
 donec semestri ante obitum involuntarie,
 semperque pressorio cum dolore stillasset. Nam
 Augusto A. 1711 post diuturnam dysforexiam
 corripiebatur magna virium prostratione, de-
 bili pulsu, singultu, pedumque tumore, urina
 pressivo illo cum dolore stillante, glutinosa,
 ac viscida, queis in fine morbi fuscae, cru-
 entæque dejectiones se junxere. Hæc sym-
 ptomata die 10 morbi mors finivit, ægro in
 agone de solo illo pressorio, non acuto do-
 lore

lore conquerente, poscenteque novissime, ut cuneus ille premens auferatur. In cadavere vesica discissa angustior, crassiorque reperta; in ejus cavo ne granulum quidem sabuli, nedum calculus inventus; at circa collum interiori utrinque tumor durus detectus, in quo discisso similis glutinosa materia, qualis cum lotio excernebatur, est inventa.

§. XIV.

III. MICTURITIO, *dysuria*, *ischuria*, tam rubris, quam mucosis vesicæ hæmorrhoidibus solennes, quippe quas vel vasorum infarctus, varicesve, vel sanguis, mucusve in cavum vesicæ effusus, ac præsertim per moram coactus causant, videlicet nervos irritando, & viam pro exitu arctando, orificiumque vesicæ obturando. Sic *miçturitio* crebra molesta fuit ægris DETHARDINGII (a), & HOFFMANNI (b) quorum ambo mucosas vesicæ hæmorrhoides perpeffi sunt; *dysuria* porro accidit GRASSII (c) mercatori, & HENCKELII (d) homini, ac SCHMUCKERI (e) ministro statuum,

(a) Vide §. 18. B. Nro. 4.

(b) Vide §. 19.

(c) Vide §. 23.

(d) Vide §. 18. Nro. 3.

(e) Vide Tom. II. §. 115. Nro. 3.

tyum, nec non viro NESTERI (a); *ischuria* denique laborarunt, & quidem a grumoso sanguine vesicæ orificium obturante, ægri GABELCHOVERI (b), ac JOERDENSII (c); a muco, & polypis PEZOLDI (d) futor; a varicibus denique orificium vesicæ obsidentibus VAN DER HAARII (e) vir. Interea tamen in rubris hæmorrhoidibus vesicæ sæpe nulla sensibilis molestia in mejendo ægros fatigat, quemadmodum in ægro apud VAN DER MONDE (f) obtinuit, plurimisque aliis obtinet.

CAPUT VI.

DIAGNOSIS.

§. XV.

I. **A**BSOLUTA. *diagnos*is utrarumque vesicæ hæmorrhoidum obtinetur, si

1. *Cau-*

(a) Vide §. 17.

(b) Vide §. 18. B. Nro. 1.

(c) Ibidem.

(d) Vide §. præced.

(e) Vide §. 26. a).

(f) Vide §. 10.

1. *Causæ* illarum præviæ rite fuerint peruestigatæ, cognitæque (a); si porro

2. *Symptomata* hæmorrhoidum tum communia (b) adfuerint; tum hæmorrhoidibus vesicæ propria (c); si denique

3. *Causæ*, & *Symptomata* morborum aliorum analogorum characteristica abfuerint.

§. XVI.

II. **RELATIVA** autem habetur, dum absoluta hæmorrhoidum vesicæ diagnosi confertur cum singularum seorsim hisce affinium morborum diagnosi: præcipui autem, cum queis confundi hæmorrhoides vesicæ possent, morbi sunt, qui sequenti in serie continetur, & quidem

A. *Hæmorrhagiæ* viarum urophorarum.

1. *Hæmaturia renalis*. Verum in hac præter defectum symptomatum hæmorrhoidalium tam communium, quam hæmorrhoidibus vesicæ propriorum sanguis quoque excretus

(a) Vide §. 3. sqq.

(b) Vide §. 11.

(c) Vide §. 12. sqq.

rus & fluidior est, & lotio intimius mixtus, id est tardius matulæ fundum petens.

2. *Stymatosis*, at in hac sanguis non ex vesica; sed urethra erumpit, sine lotio, & sine mejendi nisu, imo sine voluntatis imperio.

B. *Sedimenta alba* urinarum varia facile hæmorrhoides albas quandoque mentiri possunt, ita ut pro muco hæmorrhoidali ea quis haberet; sed inter utraque discrimen produnt excreti dotes nativæ (ut odor, sapor, ductilitas, &c.), copia, tum symptomata vel propria, vel aliena, denique causæ prægressæ. Hinc

1. *Mucus* non hæmorrhoidalis cum lotio excretus pro varietate causæ illum præbentis varie quoque ab hæmorrhoidali dignoscitur. Solide hac in materia *ÆLIGMANNUS* (a) versatus est, varietates hujus muci rite distinguens. Sic si proventus muci sit:

a) *Spasmodicus*, docent id

α. Causæ prægressæ v. g. diuretica acrida assumpta vel applicata, præsertim cantharides.

β. Sym-

(a) L. c. Sect. 3, §. 9.

β. Symptomata hæmorrhoidalem statum prodentia nulla.

γ. Muci excretio nec copia, nec tempore cum hæmorrhoidali statu congruens.

b) *Calculosus*, hoc produnt

a. Symptomata hæmorrhoidalia absentia ex toto; nisi forte status calculosus fuerit cum hæmorrhoidali (ut fit) complicatus: atque tunc lucem affundit

β. Calculi præsentis detecti per sua criteria cognitio, ac præsertim

γ. Mucus calculosorum foetidus, & a sabulo sibi admisto opacior hæmorrhoidali, quod muci libero in aere exsiccatione in forma calcis albæ obtinetur, ut capto hujus rei tentamine A. HAEN (a), & I. A. MURRAY (b) viderunt.

c) *Gonorrhoeicus*, illi cognoscendo sufficiunt eadem, quæ ante de stymatosi dicta sunt; & dum lotio etiam sub mictu sese miscet; huic in forma filamentorum exilium innatat,

(a) Rat. med. P. 5. C. 5. §. 6.

(b) Comment. de arbuto uva ursi. Sect. 3. §. 6.
P. 47.

natar, dum hæmorrhoidalis mucus in grandiore[m] collectus massam fundum vasis urinæ petit, nihil ut dicam de causis gonorrhœæ benignæ prægressis manifestis (quæ ut plurimum sunt; onania diu, crebroque exercita, gonorrhœa virulenta prægressa, arthritis anomala, &c.), & absentia status hæmorrhoidalis

2. Pus autem ex ulceribus, renum, ureterum, vesicæ, &c. cum urina emictum ab hæmorrhoidali muc[o] discernunt complura; nam

α. Status hæmorrhoidalis plerumque abest; nisi forte hic ipse ulcera vesicæ, & anicausasset, vel se iis complicasset. Porro

β. Pus & paucius est muc[o] dicto, & opacius, & prunis injectum pessime fœtet.

γ. Causæ quoque ulcerum prægressæ, atque solennia eorundem symptomata præsentia non parum ambiguitati tollendæ lucis afferent.

3. *Chylus* in diabete vero urinæ junctus perinde ab hæmorrhoidali muc[o] multum diffidet, a quo illum imprimis distinguunt (α).

α.

(α) Conferatur meus commentarius de diabete §. 46. p. 89.

α. Copia longe major, quam qua mucus hæmorrhoidalis excerni solet; tum

β. Tempora excretionis statâ quotidie post chyli confecti in sanguinem trajectum.

γ. Dotes omnes chyli; color proinde griseus, dulcis sapor, ductilitas in fila nulla, at maxima cum lotio miscibilitas, tardissimusque ab eodem secessus, &c. ac denique

δ. Macies cita; quam hæmorrhoides vesicæ mucosæ longe tardius inducunt. Mirum est, potuisse a DETHARDINGIO (*α*) hos duos morbos confundi!

4. Creta denique, aut calx arthritica cum lotio reddita a mucosâ hæmorrhoidali optime per experimenta chemica instituta discernitur.

CAPUT

CAPUT VII.

P R O G N O S I S.

§. XVII.

I. CURABILITAS ceteris paribus major est in rubris; quam albis hæmorrhoidibus vesicæ; perinde nimirum, ac in duplici hoc fluxu ex ano obtinet. In albis enim vesicæ hæmorrhoidibus, ut recte SELIGMANN (a) animadvertit „ubi recens adhuc est malum, & hæmorrhoides ex ano rite antea fluxerunt, æque „nec diu suppressæ fuerunt; ætasque, & vires bene adhuc vigent, medelam omnino „non respuit; quin vel radicitus forte dispositio hæmorrhoidalis auferri potest, vel saltem non ægre ad sedem naturalem revocantur: ubi vero jam altius egit radices, & in „consuetudinem quasi erronea hæc excretio „jam venit; ubi hæmorrhoides nunquam antea legitimum observarunt decursum; aut „diu jam suppressæ fuerunt; ubi vires naturæ „in chronicis alias morbis summum curæ per „ficientes male opem ferunt; tunc malum „plerumque doctam superat artem: difficilissimum enim est, negotium hæmorrhoidale re- „lu-

(a) L. c. §. 12. p. 26.

„luctante natura in ordinem iterum revocare,
 „nihilque ad summum jam medico superest,
 „quam excretiones modum excedentes tem-
 „perare, symptomataque urgentia lenire. Id
 ipsum in ani quoque mucosis hæmorrhoidibus
 verum esse vidimus. Quin imo hæc eadem
 albarum hæmorrhoidum vesicæ prognosis ru-
 bris etiam per omnia convenit; quam enim
 ardua sæpe sit res, id genus hæmaturiam hæ-
 morrhoidalem persanare, uno, alterove al-
 lato casu juvabit ostendisse. I. M. NESTERI
 (a) familiaris vir 53 circiter annorum, san-
 guineo-melancholicus, obesus, in malum hy-
 pochondriacum pronus, a plurimis retro an-
 nis moderatum, ac periodicum hæmorrhoi-
 dum fluxum summa cum euphoria passus, isto
 ultra 3 annos non reverso, ante biennium in
 autumno corripiebatur horrore, & æstu febrili
 cum inflammatorio tonsillarum tumore. Dem-
 tæ ex læva mediana circiter $\frac{5}{8}$ sanguinis cum
 levamine. Sequenti autem nocte eminxit ul-
 tra $\frac{1}{2}$ sanguinis puri sine ulla vel gravitate,
 vel tensione, vel dolore circa jecur, renes,
 ureteres, vel pubem; per 3 dies insequentes
 reddebat lotium carniū loturæ simile, cum
 acutissimis in pene doloribus; interdum urina
 guttatim cum tenesmo reddebatur. Post varia
 lythontriptica cum internis, externisque emol-
 lientibus, quod calculus adesse crederetur,
 in-

(a) Misc. nat. cur. dec. 1. ann. 8. Obs. 23.

incassum exhibita demum cum summo cruciatu,
& ardore ima in pube, ac circa penem varios
magnos, & oblongos instar jecoris lucii pi-
scis grumos sanguinis mictu ejaculabatur, quæ
excretis dolor ocyus desit, & urina postea
clara, citrina, diaphana, sine ullo cruore
evadente æger ex integro convaleuit, ratus
se deinceps mali fore immunem. At post bi-
mestre dolorificus mictus rediit, & abhinc
ex intervallo 2, vel 3 mensium, aut longiori
etiam recurabat: sanguis primum floridus,
& sine lotio, ac sine lumborum dolore pro-
diens mox in grumos abibat; hunc sequeba-
tur niger cum copioso lotio, dysuria, ac te-
nesmo, nec vel fluxus, vel dolor prius con-
quiescebant; quam congruato in vesicæ
sanguine frustulatim excreto. Incredibilis fere
sanguinis copia ita exonerata est. Frustra varia
sanguinem cohibentia, & consolidantia data,
inter quæ decoctum contra hæmaturiam MYNS.,
troch. de carab., imprimis $\mathcal{R}a$ \triangle \oplus lis MI-
CHARL. Ad sanguinem autem coactum resol-
vendum datum decoctum rad. rub. tinct.,
asparag., cum syr. de alth. FERN., oxym.
squillit., ol. amygd. dulc. rec. expr., lap. 69;
&c. Ad sanguinis æstum, & acre corrigendum
exhibitum apozema e decocto malv., portul.,
plantag., nymph., burs. pastor., sem. 4 frig.
maj., c. syrupo portul., violar., tragacant.,
& troch. GORDON &c. V. S. prophylactice,
ac therapeutice in dextro brachio facta; sed
quo sæpius hæc facta, eo copiosior fiebat
hæmaturia. Nec utilius admotæ ano hirudines:

circo morbus contumax relictus cuncti medicatione sibi relictus ex intervallis porro redibat. Appellenti fluxui præludebat omnium artuum lassitudo, & gravitas cum melancholia; eoque cessante æger hilarius factus integerrima fruebatur sanitate. Ejusdem erat contumaciæ miſtus id genus cruentus in observatione H. L. BEKERI. apud C. C. ENGEL (a): nempe Senator 70 annorum sanguineo-chole-ricus, laute vivens, veneris in juventute appetens, 24to ætatis anno a crebra, fortique equitatione scrotalem herniam nactus, 33. anno uxore ducta, ante 20, & amplius annos adeptus est hæmorrhoidum fluxum minus regularem, quo sponte iterum cessante ante 6 circiter abhinc annos incidit in hæmaturiam primum indolentem, arti tamen diu rebellem, & aliquoties reversam, quandoque sat diu, imo semestrem etiam durantem, donec desit. At post modo iterum sæpius ad leves vel corporis, vel animi motus recurrere cœpit, utut transitoria. Urina tunc sat copiosa, facileque missa, floride rubra, lintea rubedine tingens, deposito autem sensim sedimento rubello clarescebat. Subinde levis stranguria, vel ardor urinæ se junxit, subinde flatus vexabant, neque raro æstus internus, fugax, somnum tamen turbans. Hac quoque
vice

(a) Specim. med. & Sylloge epist. Nro. 1. p. 113. sqq.

vice omnia remediis cessere, graviora aliquanto post reditura. Et vero media anni insequentis hyemeprehendabatur æger catarrhali febre cum tussi, nova hæmaturia, & crebra noctu imprimis micturitione, ac sub mictu urethræ ardore, alvoque per intervalla obstructa, omnia semper symptomata exasperante. Urina nocturna ex atro rubebat a sanguine; per vices etiam grumi sanguinis excreti. Aliquanto inde post orto tenesmo singulis dejectionibus mucum paucum instar ranarum spermatis egerebat. Postmodo etiam cœcæ hæmorrhoides obortæ in ano, sed intra paucos dies idoneis remediis mitigatæ. Hæmaturia demum quovis mense redibat. Flatus in ipsum subinde penem acerbissimo cum dolore irruebant. Interdum in lævi pedis digitis dolor arthriticus enatus, & manuum articuli paulo rigidiores visi. Post innumera efficacissima remedia incassum adhibita, nec nisi breve semper levamen afferentia, demum omnibus his miseriis finem mors attulit. STORCHII (a) quoque in mendica morbus se se curari non sivit, sibi que fuit relinquendus.

§. XVIII.

(a) Vide §. 19.

§. XVIII.

II. EFFECTUS hujus ægritudinis duplicis sunt generis: boni alii, ac salutare; alii pravi, ac plerumque funesti.

A. *Boni* sunt: spectata ipsa humoris ad vasa, & cavum vesicæ confluentis vacuatione, qua facta symptomata illam antecedentia tolli vel pro tempore, vel in perpetuum, si nempe nullus amplius novus illuc affluxus humorum contingat (id quod oppido rarum!) solent. Pro tempore tantum symptomata levabantur in mercatore GRASSII (a), & homine HENCKELII (b), donec novus vasorum infarctus enatus pristina hæc mala revocaverat. Quemadmodum autem hæmorrhoides ani mucosæ semel, bisve tantum apparentes evacuata omni materia ad vasa recti congesta non amplius ab hinc rediere quibusdam in ægris, velut in amico STORCHII, (c); ita etiam in vesicæ id hæmorrhoidibus mucosis evenire posse haud improbable est, ac forte hoc ipsum est, quod G. BAGLIVUS (d) aliquando observavit, nempe

(a) Vide §. 23.

(b) Vide §. 18. B. Nro. 3.

(c) Vide histor. hæmorrhoid. albar. §. 4. No. 2.

(d) Prax. med. L. 1. Cap. 9. de calc., & podag. p. m. 117.

pe „arthriticus quidam Romæ excrevit urinam „crassam, & copiosam, quæ paulo post in „consistentiam gelatinæ coagulata fuit, & ita „liber evasit arthritide.“ Si arthritidis illa anomalis hæmorrhoidum motibus ortum debebat (a), & urina postmodo gelatinosa mucosæ reipsa indolis fuit; quid vetat credere, hanc excretionem arthritidi illi hæmorrhoidalī criticam perinde ex hæmorrhoidalibus vesicæ vasis contigisse? neque aliorum etiam spectare existimo catarrhum illum vesicæ ab I. LIEB-
TAUD (b) ita dictum, & observatum in juvene, qui vix ex ephebis excedens superata 14 dierum febre rheumatico - arthritica post 7 inde dies in aliam incidit febrem ab horrore exorsam. Hac vigente dolorem in epigastrio natum continuo sequebatur stranguria. Lotium erat turbidum; sed procedente morbo ponebat uberrimum sedimentum subalbicans, mucosum copia ejus in dies adeo crescente, ut demum $\frac{1}{4}$ lotii excefferit. Febris typo catarrhali ferotinis horis recrudescens circa 14 diem conquievit, lotio in bimestri pene adhuc deinceps procedente crassissimo, non sine virium, carniūque jactura, ut marasmus metueretur, donec sub solo congruo regimine sine ullis

re-

(a) Vide Tom. I. §. 53. III. A. Nro. 2. 1.)
&c. §. 33. c. a.

(b) Synops. univers. prax. med. P. I. L. I. S.
4. Cap. de catarrho vesicæ. p. m. 272. sq.

remediis sponte demum excretio hæc p. n. cessisset. At mehercle hæc rara sunt!

B. *Mali* vero effectus pendent potissimum ab infarctu vasorum in collo vesicæ sensim magis, magisque invalescente, ac habituali demum effecto, humorumque in iis stagnantium, ac vel maxime muci degeneratione, unde spasmi vesicæ, ac tumores, extravasationes humoris in ejus cavum, micturitio assidua, ac dolores, lotique excernendi vel difficultas, vel impotentia &c. Ex his vero pessima quæque, videlicet

1. *Ischuria* plerumque funesta, vel ob diuturnitatem, vel frequentiam. Ita DETHARDING (a) narrat sibi „obtigisse casum in ægroto „sexagenario, qui olim hæmorrhoides cum „euphoria expertus abhinc ex vita sedentaria, „& mœrore gravi ultra annum nil harum præter molestam pressionem quandam circa os „sacrum, & vesicam cum leni stranguria senserat. Hic prævio dolore obtuso circa confinia vesicæ urinariæ tandem cum lorio emittebat mucum gelatinosum urina albidior, „& post quietem fundum petentem: quod „vero ab hac exclusione se aliquo modo levatum percipiebat, illam sibi salutarem ratus monita, & remedia . . . proposita asper-

„na-

(a) Diss. cit. Schol. ad 6. 7. p. 787.

„nabatur strenue: donec gliscente pedetentim
 „malo, accedente vesicæ spasmō, stranguria,
 „& intercurrentibus motibus febrilibus opem
 „medicam efflagitaret. Nec irrita eadem vi-
 „debatur; debitis etenim adhibitis auxiliis e
 „fonte chirurgico, pharmaceutico, & diæte-
 „tico petitis hæmorrhoides denuo apparebant
 „cum sensibili muci ex vesica profluentis, &
 „symptomatum eundem comitantium imminu-
 „tione; huc vero negotium redigi non pote-
 „rat, ut plane cessaverit, ut potius silentibus
 „per intervalla hæmorrhoidibus manifesto
 „recruduerit proventus mucositatis. Tan-
 „dem æger diuturnitatis morbi pertæsus am-
 „plectendo curationes empiricas ischuria, &
 „caro succubuit.“ Id ipsum etiam in rubris
 vesicæ hæmorrhoidibus vel ab infarctis ad
 orificium ejus vasis, præsertim varicosis fa-
 ctis, vel a sanguinis grumis orificio incunea-
 tis W. GABELCHOWERI (a) vir 76 annorum,
 sedentarius, ex subsistente hæmorrhoidum in-
 ternarum fluxu, quem sæpius expertus fuit,
 incidit in gravissimam febrem cum 5 dierum
 ischuria, virium prostratione, crebris rigori-
 bus, siti non sedanda, æstu, & ardore alvi-
 no, fecumque foetidarum, nigrarum, & cru-
 entarum dejectionibus, lateris dolore, ac spu-
 to, vomituque cruentis. Indito vesicæ blan-
 de cathetere, pro lotio erupit sanguis floridus

(a) Curat. & Obs. med. Cent. 6. cur. 50. p. 116.

dus, coactus in grumos, tanta fere copia,
 quæ brachio demi solet. Ab adhibita medela
 cum nulla coctionis apparerent signa, nocte
 ante unum diem supervenit dyspnœa, oculorum
 mador, & caligo, tremor, insultus
 anticipatio, duratio, & vehementia prioribus
 paroxysmis major, pulsu factò inæquali,
 inordinato, ac minimo. Tandem prodit
 urina copiosa, nigra, & cruenta, alvusque
 fere lotio similis egesta: urgebat in expugnabilis
 tenesmus. Viribus exhaustis aeger 5a
 vespertina 11mo morbi die periit, qui
 pernici equitatione in dissitum praedium hæ-
 morrhoides tum fluentes attritu ephippii
 (oborta forte inde inflammatione) cohibuit,
 atque inde in fatalem hanc prolapsus est fe-
 brem, sanguine hæmorrhoidali in vesicam
 converso. Porro C. F. JOERDENS. (a) me-
 minit cholericus 48 annorum, qui post maxima
 in juventute diætæ vitia multos annos po-
 dagricus & calculosus fuit. & subinde hæ-
 morrhoides ani, varices indolentes, citra
 ullum unquam fluxum, nactus est. Is dum
 ante 6 annos magno incendio extinguendo,
 suisque rebus salvandis laborem impendere,
 repente copiam sanguinis eminxit, hicque
 mictus abhinc subinde, præsertim prægres-
 sis hæmorrhoidum cæcarum vestigiis; re-
 vertebatur. Cum vero hanc hæmaturiam
 una,

(a) Act. nat. cur. Vol. 5. Obs. 107.

una, alterave vice dolores etiam nephritici comitarentur; simulque minores calculi excernerentur; alii ab horum læsione, alii contra a ruptura vasis rubri sub incendii labore hæmaturiam repetebant. Sed cum illa dein sæpiissime rediret a levissima sanguinis ebullitione, vel iracundia, vel podagrico, nephriticove malo, viresque minueret; consultus auctor expensa re nil nisi anomaliam esse hæmorrhoidalem ratus, Væ Ses æquinoctiales & alias etiam consulebat, apparentibus autem tuberculis ani hirudines admovendas, ut sic nisum sanguinis a vesica ad anum traduceret, non neglectis & aliis pro re nata remediis. Verum nil aliud hinc obtentum; quam quod hæmaturia biennio, quoties rediit, fuerit perquam moderata. Hujus pertæsus æger alterius medici poposcit auxilium; sed ab hujus remediis hæmaturia immodica evasit, vix moderanda, nedum cohibenda. Sanguis in vesica coactus causabat ischuriam subinde ultra 24 vel 48 horas durantem summis semper cum doloribus. Sæpe coagula puri sanguinis urethræ impacta æger obtusiore stilo frustatim comminuere ad facilitandam eorum expulsionem cogeбatur. Frequentiora his etiam fuere concrementa pituitosa ac ferme innumera, polypis cordis, ac majorum vasorum simillima, quæ nonnisi cum lorio copiosiori impetuosius excernendo foras propelli poterant. Ex plurimis incassum adhibitis optime profuit equisetum, quo & hæmaturia ad tempus cohibebatur, & polyposa illa concrementa

evanuerē. Verum tamen æger lenſim ſuperioribus membris contabefcebat, pedibus tantum œdemate tumentibus; febricula lenta, profuſique ſudores maciem auxere, donec demum exhauſto corpore, ac viribus æger vivere deſiit.

2. *Cyſtitis* plerumque etiam funeſta, a ſanguine veſicæ vaſa uberius farciente cum inflammatorio ſtimulo. Hujus quidem perniciem effugit GRASSII (a) mercator; non item C. HELWICHII (b) vir prope ſeptuagenarius ſanguineo - cholericus, venis amplis, turgidisque præditus, vitæ ſedentariæ, & craſſis cibis a pueritia deditus, qui a multis abhinc ſemel, iterumque hæmorrhoidum fluxum natuſ, iſto ſubſiſtente in podagram, & ex hac emanante in atrocem aliquot hebdomadarum dyſenteriam incidit, ac tandem ante 3 annos ſanguinem mejere cœpit, copioſum, purum, & craſſum, & ſine ullo dolore, vel tenſione, vel pondere circa renes, ureteres, veſicam, & ſine ullis aut calculi, aut labis in viſcere indiciis. Dein per aliquot dies loturam carnum eminxit. Ante 2 annos aliquoties iterum periodiſ menſtruiſ hæmaturia recurſabat. A. 1701 tempore verno id ipſum per plures, quam ante, menſes evenerat. Cum renes ulcerofi eſſe crederentur, data ballamica; at ſine levamine.

(a) Vide §. 23.

(b) Miſc. nat. cur. dec. 3. ann. 9. Obſ. 119.
p. 219.

vamine. Hæmaturia facta profusa, & assidua, ægro plenas matulas emingente sanguinis meri, crassique sine ulla urina, consultus auctor edocuit, illum non a calculo, sed hæmorrhoidibus esse: his proinde iussit admoveri hirudines, manequæ bibi calidum decoctum equiseti, & succum urticæ ter de die cum jusculis sumi, ac vesperi præbendum esse. His nitrosi ex decocto voluit. His intra 8 dies cohibita hæmaturia. Verum lapso vix mense, reversæ angustię præcordiorum, dolor in pube, ac radice penis, dysuria, tenesmus. Ad nova hæc molimina hæmorrhoidum vesicæ dissipanda imperantur denuo hirudines, & pristina remedia; quæ cum renuisset æger, hæmaturia impetuose erupit. Consulti abhinc alii medici. Phlebotomia pedis fluxum auxit. Ab adstringentibus varie, multumque adhibitis nil opis; sed pes lævus insigni tumore duro, & rubente inflatus est, unusque testium distendi, ac laxius propendere cœpit. Tumido in pede fonticulus excitatus gangrænæ periculum minabatur, auspicato tamen propulsatum. Demum & acidulas frigidissimas haurire æger cœpit, unde in ischuriam incidit. Revocatus quidem remediis cum sanguinis, cum lotii fluxus; at dolor inflammatorius in collo vesicæ mansit ad omnia remedia contumax cum pulsu febribus inflammatoriis solenni, qui prius ne in pessimo quidem morbi statu febrilis est repertus. Obiit æger eodem anno 25 Decembr. procul dubio e gangræna vesicæ inflammata.

3. *Incrassatio, ulcus vesicæ.* Incrassationis exemplum præbuit TRZÖDI (a) tutor, ulceris autem lethalis I. F. HENCKELII (b) vir 50 annorum, carnosus, sanguineo - cholericus, athleticæ sanitatis, vino venerique usque adeo deditus, ut ad hanc conquestis undique aphrodisiacis uteretur. Hic ante biennium post enormem crapulam, eique postmodum succedentem diarrhœam vehementem correptus est uberrimo hæmorrhoidum fluxu, quem ad vespèram sponte cessantem rursus excepit diarrhœa, atque hanc etiam post bidduum desinentem continuo secuta est colica spasmodica, dolore colum, & mesenterii centrum, regionemque dorsi ei oppositam affligente, qui sensim in artus, ac musculos inde propagatus ad anxietates quandoque, ac lipothymias usque incresebat, simulque coortæ turbulentæ alvi dejectiones, tenesmodæ quotidie quidem numerosæ, jam tamen parciore, ac segnior; jam copiosiores, celerioresque. Urina rite procedens successive ponebat sedimentum flavescens, albicans, subtus glutinosum, quod igne probatum nil calculosi exhibuit, nilque doloris causavit. In orthostadia plerumque hætenus æger constitutus & itinera sat molesta subinde confecit, & vino, epulis, venerique per aphrodisiaca,

(a) Vide §. 13.

(b) Aët. nat. cur. Vol. 4. Obs. 79.

distiaca, ut ante, vacabat: donec intra annum
 morbus evasisset gravissimus. Spasmus ille
 abdominis, alias tolerabilis, ac transitorius,
 nunc continuus, & adeo rigidus evasit, ut
 in pedes, manusque & circa scapulas insuper
 irruens anxietates non ferendas, & acerbissi-
 mos dolores crearet, ac 3 fere septimanas ita
 affligeret. Hinc anorexia, vigiliæ, debilitas,
 macies, at sine febre. Alvus ante dicto modo
 varians fecibus, utut plerumque paucioribus,
 scybalosis, per intervalla tamen nimium lu-
 bricis, & oleo quasi inunctis, sedibus plus
 justo semper numerosioribus. Flatus indom-
 iti jam incarcerati, pressorii, ac molestiores;
 jam borborygmodes ad spasmos, & lipothy-
 mias si non duplum, multum certe facientes.
 Ex hoc decubitu qua remediis qua tempore
 eluctatus quidem, sed ita, ut ne priorem
 quidem tolerabilem illam orthostadiam atti-
 gerit, manente nempe materiæ malignitate,
 ac spasmis per intervalla sævientibus, imo in-
 gravescentibus, ut æger inde morosus evase-
 rit. Ex dorso sentiebat nescio quid versus
 os sacrum de loco in locum progredi. Spa-
 smi nulli fere parti, excepto capite, pepercere;
 jam enim brachium imprimis dextrum,
 jam dextram manum, ejusque præsertim mi-
 norem digitum, jam dorsum, jam scapulas,
 jam crura, & pedes, jam coxam, modo se-
 orsim, modo simultanee laceßebant. Remit-
 tente dolore somnus, & appetentia semper
 redibant, imo hæc sæpe non satianda. Porro
 nocturnas pollutiones æger 3 vel 4 quovis
 die

die patiebatur, & interdiu quoque vel tacta penis glande, enataque inde titillatione semen ocyus crumpebat. Multis, variisque sedulo adhibitis remediis obtineri non potuit, quo minus afflictio hæc per varias periodos reverteretur, semper gravior. Solo betulæ succo ex arbore sponte stillante urinæ ardor leniebatur nonnihil. Prima notabilior periodus a cessante subito sub finem Augusti vomitu definienda videbatur; quem contra major in dies alvinarum excretionum numerus, & fecis sensibilibus oleosæ lubricitas pressa pede sequebatur. Sub initium Octobr. lotii materia glutinosa, cui hæctenus ulcerosa (saltem ita credita) prævalebat, copiosius fluere cœpit, a glande penis ad matulæ fundum per cubitos se extendens, unicaque mictione $\xi ij. iij.$ facile appendens, incredibili cum difficultate, & ardore; fluxus hic subinde unum, vel alterum diem intermittens plerumque stata servabat tempora, horas nempe meridianas, ac vespertinas, atque ubi paululum remisit, motu quodam in perinæo coëctorio vellicante continenter fere vexabat. Ab hoc vero tempore spasmus abdominis, alias gravissimus, & assiduus, minuebatur, & alvinæ excretionis frequentia, ac lubricitas magnoperè simul decrevit, manifesto indicio albas ani hæmorrhoides ad vesicam fuisse conversas. Verum insequentis anni initio hæmorrhoidales motus denno ad anum sunt revoluti: unde urina tenuis, mucique experts, ac subinde penitus clara, excepto pauculo pure,

pro-

procedebat, diuque ita pergebat, non sine læta spe hæmorrhoidum ad regularem typum reducendarum. At vero inopinato iterum spasmo mesenterii renato post aliquot dies hæmorrhoidalis mucus ad vesicam congestus per urethram egerebatur. Accessit denique acuta febris, ex qua æger decessit.

4. *Hectica* febris perfacile morbo huic, præprimis mucofo, supervenire consuevit. Accersunt eam nimia vel sanguinis, vel muci jactura, habitualis morbus assiduo dolore, vel micturitione somnum & appetentiam tollens, acrimonia muci vesicæ in vasis stagnantis, ac demum vesicæ exulceratio &c. G. C. DETHARDING (a) refert „se novisse . . . virum illustrem . . . hæmorrhoidibus cæcis quondam obnoxium, his vero deficientibus „spasnum vesicæ cum exclusione muci expertum, „sub principio per vices insultantem, demum „habitualementa redditum, ut continuus ad min- „gendum stimulus ingenti dolore circa collum „vesicæ stipatus omnem consuetudinem cum „amicis interdixerit; hunc celeberrimos Ger- „manicæ Medicos non sine magnis sumptibus in „consilium vocandos curasse, & quantumvis a „nonnullis arcana, aliaque non contemnenda „cum voto, & promissione felicitis successus „obtinuerit remedia; tantum tamen abfuisse, „ut allevamentum cruciatuum, nedum per- „fectam

(a) Diff. cit. §. 7. Schol. p. 738.

„fectam restitutionem senferit, ut potius in
 „dies fere ingravescente malo tandem in fe-
 „brim hecticam inciderit, & improvise, ces-
 „santibus omnibus doloribus, juncto rigore
 „per totum corpus se diffundente, sphaceli
 „teste, extremum vitæ spiritum ediderit.“
 Non multum abfimilis est, apud I. D. GOH-
 LIUM (a) observatio de viro procero 58 an-
 norum, narium hæmorrhagiis in juventute
 obnoxio, in adultiori autem ætate ordinatis
 Væ Sbus assueto, qui a cathartico quodam
 ordinario ante 12 annos sumto in hyperca-
 tharsin cum vomitibus, tenesmo, & copiosa
 hæmorrhoidum profusione, quæ in singulis
 deinde quotidianis egestionibus alvinis cum
 superveniente ani prolapsu in semestre conti-
 nuavit, lapsus est. Sopito abhinc fluxui hæ-
 morrhoidum superfuit ani prolapsus immedi-
 cabilis, quavis in dejectione accidens. Per
 elapsam jam annum vacillare sanitas ejus vi-
 debatur, & præsertim versus hyemale solsti-
 tium & vires, & appetentia minuebatur, &
 quæ diu hætenus ob levitatem contemserat,
 nunc ingravescebant, nempe dolores quasi
 colici cum symptomatis rheumatico-febrili-
 bus, & insuetis urinæ phænomenis, quæ jam
 erat naturalis, jam p. n. rubra, aliquanto
 post sedimentum ponens atro-fuscum, leve,
 nec

(a) Act. med. Berol. dec. 2. vol. 1. Sect. 2.
 p. 61.

nec vasi adhærens, quod factò rite examine nec fabulum erat, nec arthritica calx. Comes his urinis erat rheumaticus dolor a femore in totum extensus pedem, somnum turbans; multi flatus, obscurus sub umbilico dolor, anorexia diutina, ructuum amarescentium difficilis anoterica excretio, febris latica cum æstu interno, sensibilis corporis emaciatio, & hæmorrhagiæ narium symptomaticæ, a multis jam annis hætenus rarissimæ aliàs. Cumque nulla vel calculi, vel affectæ vesicæ indicia his essent copulata, satis apparebat, ægritudinem ad internas pertinere hæmorrhoides, ac sedimentum lotii ante descriptum nil nisi sanguinem esse hæmorrhoidalem. Utut autem congrua medendi methodus nunc adhibita fuerit; morbus nihilominus non abolendus, associata sibi febre hæctica, hominem æstate confecit. Magnis quoque passibus ad hæcticam, eundemque exitum properabat F. HOFFMANNI (a) vir sanguineo-cholericus 50 annorum, qui a fluxu hæmorrhoidum solito parcius procedente cœpit cum ardore mejere urinam albam cum multis fibris velut abrasæ tunicæ, ac plurimo dein sedimento albo gelatinoso. Molestia ex levi, ac transitoria fiebat acrior, longiorque cum corporis, & præsertim pedum contabescencia, & languore. Hæc lotii excretio mane vel maxime accidit,

Ce-

(a) Consult. & resp. med. Cent. 2. Casu 92.

Ceterum æger sine omni dolore alio optime appetebat, placide item dormiens, at cum p. n. manuum in somno æstu. Interdum fiebat anxius, & ob castimoniam testiculi subinde, sed non diu, vehementer dolebant, ac tuebant. Consultus Auctor suasit ▽æ Schwalbacensis, vel spadaneæ unam quotidie lagenam sub debito regimine per 4 vel 3 hebdomades forbillandam. Pharmaca duo commendavit: Essent. cascarillæ c. essent. Succini mistam, & succ. ppt. cujus ℥j. cum olei ☐ri p. deliq. 3℔. sit imprægnata, siccataque, ad 3℔. m. & v. sumendum. Vino ac cerevisiæ suasit suffici decoctum e rad. farsap., scorzon., cichor., liquir., & sem. fœnic. Vetuit fortiozem vegetationem equo, & rheda ob succusiones hic nocivas; Quo successu, incertum.

§. XIX.

III. SUPPRESSIO *hæmorrhoidum vesicæ* varia alia, gravissima sæpe, mala accersit, reverso fluxu plerumque iterum desinentia; alioquin haud raro morte sola finienda. Præprimis autem hæc de hæmaturia valent; quandoquidem mucosæ hæmorrhoides vesicæ non ita promte sese suppressi patiuntur. Istas autem ab hæmaturia cessante natas F. HOFFM. (a) literis prodidit: nempe vir sanguineus 37 an-

(a) Consult. & resp. med. Cent. 2. Casu 88.

annorum, eufarcus, post male curatam in juventute gonorrhœam virulentam, anni proxime elapsi initio corripiebatur febre purpuracea, quæ a calidissimo regimine ingravescebat, purpura in dies copiosius erumpente: donec imperato temperationi regimine post trimestre demum fere tempus æger convalescisset; superstita tamen urina ex atro rubente, sedimentumque ponente simile ☿ri ☉♂ii. Acidulis ergo usus, cum inde proficeret, urina evadente naturali; eas tota æstate hausit, at immodice, quotidie nempe ad 16 imo 20 mensuras. Augusto mense repente gravi urinæ ardore, & creberrima micturitione prehensus est, accessere atroces ventris, vesicæ, urethræ, & ani dolores, jam lancinantes, jam ardentes. Urina missa crassa ponebat sedimentum valde mucosum cum internatantibus filamentis jam tenuioribus, jam crassioribus, instar abrasæ cuticulæ non sine suspitione excoriationis, vel ulceris vesicæ, aut urethræ. Potis emulsis refrigerantibus, injectisque extus demulcentibus lacteis, & mucilaginosi intra paucos dies omnia symptomata mitigabantur, micturitio inducias 8 horarum dabat, urina prodibat naturalis, & paucum tantum muco mista. At non multo post rediit prius malum, doloris tamen, & ardoris expers, ac pauciori jam cum sedimento; sed sub micturitione prodibat prima in puris cochli. j., dein tenue lotium cum quibusdam filamentis. Hæc quoque recidiva remediis cessit, at non cum constantia; namque malum quavis 8 vel

10 hebdomade abhinc revertebatur; novissime etiam accedente ani tenesmo cum vehementibus torminibus, ac muci albi spissique egestionem alvina, quæ profligatis micturitione pristina successit, cum insigni micturitionis difficultate. Ceterum sæpenumero cœcæ ani hæmorrhoides apparebant, nullatenus ne admotis quidem interdum hirudinibus ad fluxum perducendæ. Calculi signa penitus aberant. Ex hac historia satis liquet, urinam illam ex atro rubram fuisse cruentam, sedimentumque Ari ⑤ ⑥ simile, nil nisi sanguinem in minutissimos grumulos coactum fuisse, qualis in ante dicto GOHLII (a) ægro viscebatur: hæmaturiam porro hanc dein abiisse in mucosum fluxum, &c. Non vulgare autem est, quod I. G. KLEIN (b) commemorat: „observavi, mus (ait) impotentiam virilem plurimum annorum ex moliminibus hæmorrhoidum vesicæ, antehac suppressarum, revertente hoc fluxu cum laude depulsam.“ I. STORCHII (c) femina cœlebs prope quinquagenaria, sanguineo-melancholica, e spinæ dorsæ curvitate vitiose incedens, hinc ex stipe quidem, at non misere vivens, desinentibus non pridem

(a) Vide §. præced. Nro. 4.

(b) Interpret. clin. tit. impotentia. p. m. 152.

(c) Von Krankh. der Weiber. 8. Band. Casu 27. p. 125. sqq. & Obs. clin. anno. 6. p. 640.

dem catameniis, quæ ultimo anno uberrime fluxerant, nata est copiosam leucorrhœam fere assiduam, a qua excoriente subinde vix ambulare quivit, cum non esset syphilitica, datum:

℞. Essent. lign. Sassafras.

— millefol.

— rosmarini ꝯa 3jß.

℞æ ʒ ii 3j. M.

S. m. & a meridie gtt. 30; vesperi autem ʒis ossium sepiæ cuspidem cultri. Ab his leucorrhœa brevi desit. Novembri anni insequentis ex lapsu per scalas lapideas contudit faciem, pectusque, unde sanguinem sputavit. Imperatus infusi arnicæ matutinus potus, a meridie vero, ac vesperi ʒis sequentis dosis

℞. ʒ corall. rubr. 3j.

⊙ puriss. ʒj. M. div. in jv doses.

Anno sequenti sub initium febris hæmorrhoides abundantissimæ fluxere, iisque desinentibus superfuere ventris dolores, quos intra aliquot tempus usus TRæ rhei cum TRa ʒri mitigavit. Initio Junii obortis denuo ventris, spinæque dorsi doloribus data dosis pil. purgant. BECH. aliquoties quidem alvum solvit; sed oborta alvi obstructione cum tenesmo; datum 4 Junii:

℞.

R. Sal. Sedl. ʒij.

℞. antispasm. ʒj, M. div. in doses 6.

S. m. & v. unam ex aqua. Julii 5a obortis torminibus, æ vomitu præscriptum:

R. TRæ rhei, & ☐ri, (*)

Postridie vero datus ℞ antispasm., & rhei ʒʒ
 ʒj. cum levamine. Die 27a in allatæ urinæ
 fundo multus sanguis subsidit, vexantibus ni-
 hilominus adhuc doloribus dorsi, & circa ve-
 sicam: idcirco rursus præscriptum:

R. ℞ antispasm. ʒij.

Corall. r. ʒij, M. div. in 8 doses.

Augusti 23a hæmaturia adhuc pergebat; sed
 cum hanc pro fluxu hæmorrhoidum ex ano
 magis ferret, nil nisi ℞es ex ☉., & ☿ dati;
 vetitis quibusvis stipticis. Verum hæmaturia
 17. Septembr. nondum cessante dati ℞es:

R. ☉ puriss. ʒiij.

Corall. rubr. ʒij. M. pro dosibus 11.

Octobris 26a, cum per aliquot dies clara
 urina procedente, vomitus obortus fuerit;
 sisten-

(*) Hic in MSpto deest quantitatis pharmaci de-
 signatio.

stendendus erat TRa rhei. Novembr. 10. rediit hæmaturia, cum micturitione tenesmode: idcirco datæ pil. BECH. purgantes. A. 1732 Septembr. 7a pro mictu cruento, cujus jam ægra ultra annum expers fuit, hæmatemesis ingruit, sed mox desit ad usum TRæ rhei cum arcano ☐ri. Die 13a querebatur adhuc subinde de ardore, & doloribus in ventre, queis opposita MRa refrigerans, & in prophylaxin die 25a essent. millefolii, & summitatum ejus infusum quavis hebdomade bis hauriendum. Vixit adhuc 1742. At funestiora his videamus. I. D. GOHLII (a) medicus melancholico-cholericus, ex motu externarum hæmorrhoidum, quarum tuberculis hirudines aliquoties admovit cum levamine, calculosus, ac deinceps hæmaturia aliquamdiu cum impedito hinc lotii fluxu laborans, demum post insuetum vini Hungarici potum in lassitudinem incidit, cum pressorio frontis dolore; tum balbutiens, & frigoris sensu perculsus apoplexia correptus est, in hemiplegiam lateris lævi abeunte, sub qua in lotio sanguis, qui ei hæctenus constanter inerat, nullus amplius conspectus. Die 7mo supervenit singultus continuus, quem die 9mo, ætatis anno 56, mors abruptit. Porro G. E.

STAN-

(a) L. c. dec. 2. Vol. 1. Sect. 1. p. 29, Vol. 7. Sect. 1. p. 22.

STÄHLII. apud F. HOFFMANNUM (a) „vir 62
 „annorum gonagrigo pathemate in sinistro
 „genu ab aliquot retro annis per vices infe-
 „status, diætæ per plures annos vinosæ, ha-
 „bitus corporis sanguinei leviter phlegmatici
 „ex usu largiore vini Thuringici, & insuper
 „facto in rheda itinere tempore autumnali
 „corripitur ischuria cum dolore sinistri lumbi,
 „& coxæ ad os sacrum gravativo, mingit ma-
 „gnam copiam sanguinis partim floridi, par-
 „tim coagulati in magnos grumos. Post pau-
 „cas septimanas fluit nonnihil ex hæmorrhoi-
 „dibus, sed caret sufficiente successu moli-
 „men; levatur tamen sensibilibiter a gravativo
 „dolore, & lassitudine tensiva in artubus.
 „Post annum recrudescit malum in renibus;
 „occupatur adstringentibus: accedit febris
 „acuta, fit translatio inflammatoria ad fauces,
 „nascitur gangrænodes corruptio linguæ, &
 „faucium. Moritur.“ Denique E. HOFFMAN-
 NII. (b) „Vir 40ta annorum, sanguineo-
 „cholericus ex vitæ genere valde inquieto
 „transiens ad quietum, & sedentarium expe-
 „ritur brevi post hæmorrhoidalem fluxum,
 „quem præpostere remediis adhibitis suppressi
 „curavit. Secuta hinc mictio cruenta singulis
 „fere

(a) Diff. de salubritate flux. hæmorrhoidalis §.
 9. Opp. 2. P. 2. p. 114.

(b) Med. rat. Syst. T. 4. P. 1. S. 2. C. 9.
 obs. 2.

„fere mensibus rediens; qua cessante anxietates præcordiorum, dolores lumborum, borborygmi ventris, prava digestio, & inappetentia oborta. Ad tollenda hæc mala, variis usus quidem remediis, thermis, lætis cura; sed non cum debito regimine. Accessit hinc postea funesta vesicæ inflammatio, cognoscenda satis ex magno ardore, dolore in regione pubis, nictu difficili, & dolorifico, febre, præcordiorum anxietate, & delirio, ac post mortem vesica inflammata, & sphacelata inventa fuit.“

§. XX.

IV. SOLVUNTUR *hæmorrhoides vesicæ* fluxu hæmorrhoidali ex ano, quæmadmodum in pastore REINESII (a) & ROLFINKII (b) ægro, ut ut huic demum fatalis evaserit. Fuit nempe vir hæmorrhoidum fluxui assuetus, quo suppresso incidit in multarum hebdomadum hæmaturiam. Hæc autem evanescebat vel apparentibus hæmorrhoidibus levi, parcoque fluxu, ut vix anus inde tingeretur. Lapso ½ anni in vado se esse ratus, mane corripitur ingenti cephalalgia; a meridie epilepsia cum aphonia ingruit, cui depulsæ superfuit mens turbata: rediit quidem ad se; sed recidivam
sæ-

(a) Vide §. 27.

(b) Dissert. anat. L. 5. C. 20.

sæpius passus, tandem immodico hæmorrhoidum fluxu exhaustus placide obierat.

§. XXI.

V. RECIDIVAE huic morbo sunt perquam familiares, quas præsertim experti sunt senator BECKERI (a), mercator GRASII (b), & mendica STORCHII (c). Ubi enim vasa vesicæ semel a congesto sanguine in majorem solito capacitatem fuere diducta; non ita facile deinceps ad pristinam reduci possunt ætitudinem; quod ab affluente assiduo in vesicam calida urina, ibique commorante laxitas illa vasorum foveatur, ut a superveniente nova causa, sanguinem uberius illuc compellente, illum facile & admittant, & transmittant.

HISTO-

(a) Vide §. 17.

(b) Vide §. 23.

(c) Vide §. 19.

HISTORIÆ
HÆMORRHOIDUM
VESICAE.

PARS II.
THERAPEUTICA

CAPUT I.

SUMMA MEDENDI CAPITA.

§. XXII.

I. INDICANS est hæmorrhoids vesicæ.

II. INDICATIO est eam tollendi sine noxa.
Hinc

A. Causa submovenda.

B. Infarctus p. n. vasorum vesicæ auferendus

1) Con-

1. Contractili vi illorum aucta; idque

a) Plenitudinem eorundem minuendo, ac

b) Robur deinde iis conciliando.

2. Distendente vi liquidi imminuta, i. e. ejus

a) Lentore subacto,

b) Copia imminuta

c) Motu averso aliorum (præsertim vero ad anum, si nempe prius hæmorrhoides an diutius fluxere; secus imprudenter morbo uni alter substitueretur.)

C. Symptomata urgentia (v. g. dolor, micturitio, &c.) mitiganda.

D. Effectus futuri arcendi; præsentis tollendi.

E. Recidiva prævertenda.

1. Proegumena causa sublata, tuncque reddito,

2. Procatarticis causis vitatis.

CAPUT II.

C H I R U R G I A.

§. XXIII.

I. SANGUINIS *missio* vasa vesicæ deplens, sanguinem ab iis revellens, simulque (si opus) ad vasa ani derivans. Verum non proletario in ea administranda iudicio uti oportet, e brachiine, an pedis, vel ani vasis instituenda sit? consultus pro viro albis vesicæ hæmorrhoidibus laborante F. HOFFM. (a) „suasit „ut protinus ex vena in brachio tusa 6 vel 8 „cruoris unciae detrahantur, & abhinc sectio „hæc pro plethoræ ratione 3 vel 4 quot annis iteretur.“ Sed num non ad superiora regurgitabit sanguis hæmorrhoidalis (b)? Istud enim vero utut in hæmorrhoidibus an metuatur plerumque, hic autem aliquatenus etiam optatur; sola enim regurgitatio malo huic abolendo par est, nisi forte fluxus hæmorrhoidum ex ano procurabilis tutiora promittat: quapropter DETHARDING (c) ita hunc vena-

(a) Consult. & resp. med. Cent. 2. Cas. 88.

(b) Vide Tom. I. §. 54. No. 8. d). Tom. II. §. 108. c).

(c) Diff. cit. schol. ad §. 8. p. 789.

venarum selectum dirimit: „si quando nunquam veræ hæmorrhoides apparuerint, sed „in solis saltem substiterint motibus eo tendentibus, vel hæmorrhoidibus cæcis fuerit „infestatus æger; juvabit venam in brachio „tundendam curare, habito saltem respectu „virium, & constitutionis individualis . . . „Sin autem veræ hæmorrhoides cum successu „olim contigerint; vena pedis eligenda, atque eo allaborandum, ut illæ resuscitentur; „modo ætas, & vires ægroti, aliæque causæ „procatarcticæ haud obstiterint.“ Postmodo vero eadem alterutra Væ So vel non cedente morbo, vel ad recidivas præcavendas ex certis intervallis iteranda est, præsertim si æger jam prius missioni sanguinis assuevit. Quam utilis sit Væ So in pede, docet G. C. MATERNI (a): puer sanguineo-cholericus annum 13 ingressus, ab anno 8 ad 10 mi finem crebras narium hæmorrhagias non sine pallore, ac macie inde secutis expertus, postquam hæc in sequenti biennio non rediissent, primo anni tertii sesqui mense, quo 12um ætatis annum absolvit, continuum, copiosumque ptyalismum spontaneum perpeffus est multo cum levamine, quo sponte iterum cessante puer ultimis februarii diebus serenis, siccisque cum patre curru peregre vectus, ubi 3 milliaria emensus est, corripitur palpitatione

cor-

(a) Aët. med. Vol. 10. Obs. 6.

cordis cum æstu, & prægravante lassitudine. Confecto itinere nares parum sanguinis fudere sine levamine. Mox ingruit rigor genuum, ac musculorum tibiæ cum dolore; ut hæ nec flecti, nec commode extendi potuerint. Post 4 dies mane ante abitum nova iterum; ac parcior, narium hæmorrhagia oborta: unde spasticus ille rigor, qui jam paulisper remiserat, pristinam ad vehementiam rediit, obortis simul copiosis circa tarsum, ac malleolos scorbuticis maculis utroque in pede. Humerus lævus arthritico spasmo affectus intumuit. Accessere dolores dorsi lacerantes, tormina, alvi obstructio cum suffusione oris velut a vermibus. Lævo in latere circa spurias costas acutus dolor cum dispnoea, & molesta nimis exeretione. In artubus summa motus impotentia ad corpus erigendum, ac movendum, artusque flectendos, aut tenendos. Tandem post biduum sub celeri, plenoque pulsû larga secuta diaphoresis, & enema emolliens alvum solvit. Sic puer a patre domum reductus ubi iisdem adhuc malis aliquamdiu laborasset; Martii 10ma, 11ma, & 12ma apparuit hæmaturia dolorifica, & convulsiva; sub mictu enim puer oculos mire huc illuc torfit, ac brachia varie quatiendo, inconditeque vociferando lumbari de dolore querebatur. Dextrum quoque latus cum humero conspicue tumebat. Morbum ab aliis ob gravitatem pro magico licet habitum unica pedis phlebotomia post 10 dies, interpositis eccoproticis ex toto profugavit.

gavit. Aliquando autem phlebotomia pedis nil opitulatur, præsentissimaque est phlebotomiæ in brachio necessitas, quæ e vestigio prodesset solet. Sic s. GRASSII (a) mercator 40 annis major, sanguineo-cholericus, laboriosus, liberioris semper diætæ, & inebriaminum amans, circiter ad 20um usque ætatis annum narium hæmorrhagiis, interdum valde profusis, obnoxius, hisce postmodo non reversis, erysipelas faciei subinde perpetiebatur. Ad hoc abarcendum Væ Snem pertinaciter abnuens scarificationes nimis crebras instituit; at incassum, quod vino semper uberius indulgeret. Post pleuritidem anno 36mo superatam anno insequenti erysipelas circa nasum potissimum, ac cephalalgia recursabant, dolorque tensivus, ac pressorius in lumbis molestus erat, quem demum modicus hæmorrhoidum fluxus obortus aliquatenus lenivit. Cum autem neque Væ Sc in pede, neque cathartici, neque aliis idoneis præsiidiis sibi unquam prospicere vellet; sed potius continuis diætæ erroribus, animi motibus, incauta corporis a potu æstuantis perfrigeratione, &c. excederet; demum aliquot supra 40 annos natus, & capitis, artuumque afflictus doloribus, vertiginosa scotomia apoplëxiam minante, phlebotomiam expetiit, ac deinceps bis quotannis celebravit, internaque usurpavit remedia,

quo-

(a) Ibid. Vol. 2. Obs. 64.

quorum unum Egranæ erant acidulæ domi potæ. Abhinc hæmorrhoides aliquoties fluxere, ad statas forte etiam periodos perventuræ; nisi æger diætam, & remedia iusto citius deseruisset. Post initium anni 1723 hyeme ventis, nivibusque horrida iter aliquot dierum init, plastro admodum succussante. Frigus spiritu frumenti crebrius poto oppugnat, & confecto itinere vinum generosum Hungaricum ad crapulam usque hausit; at domum redux cephalalgiam, artuum dolores, ac tussim siccam adeptus est: regimini tamen diapnoico leni omnia hæc cessere, superstitie tantum pertinaci dolore tensivo a medio scapularum protenso deorsum, qui explosis post frictiones pannis calidis factas e stomacho ructibus aliquatenus levabatur. Magis etiam affligebat colica, alvi obstructio, & fixus circa os sacrum dolor, in quovis corporis situ molestus, nec fotu, nec emplastro sapon. camphorato minuendus; donec hæmorrhoidum tridui fluxus inducias procurasset. Aeger nil præsidiorum admisit, præter nitrofa, & emulsiva. Tandem lapsis ita aliquot hebdomadis medio Martio valde dolorifica dysuria occepit, ingenti nisu, ac pressione continuo vexans, qua crebriori micturitione raro ultra $\frac{1}{2}$ lotii crassi farinaceo cum sedimento reddebatur. Dolor tendebat a perinæo ad glandem usque cum penis rigore, ita ut dolorifico mingendi nisu semper comes esset tenesmus, & ardor ani. Circa vesperam febriles motus ingruebant cum nausea, levi

cephalalgia, & agrypnia. Dabantur ergo Æ es ex
 l^{ap}. 69 cum succo citri. cinna. nat., O io di-
 aph., Q lato, & nitro; Liq. Q ri Q sfatus,
 essent. alexiph., & succini mistæ; emulsa e
 sem. 4 frig. majoribus, cum sem. milii solis,
 genistæ, violar. purpur., decoctum emolliens
 FORRESRI cum aqua laxat. Viennensi: molli-
 um enematum usum. exquisitus hæmorrhoidum
 tumentium dolor rarius admisit; Væ Si tamen
 æger tamdiu obstitit, donec lotium cruentum
 prodire conspexit: larga ergo in pede facta;
 sed nullo levamine, imo hæmaturia ita inva-
 lescente, ut die 8, ac 9 quotidie ultra $\frac{1}{2}$ men-
 suram sanguinis lotio mixti prodierit. Quo-
 ties ad matulam cogeatur, sensum prius per-
 cipiebat laticis calidi cum dolore, tenesmo
 ab ano per perinæum, collumque vesicæ, &
 urethram usque ad glandem excurrentis.
 Nullus tamen ad renes dolor, & ad scapulas,
 ac os sacrum jam mitior evasit. Remedia fere
 priora mansere; nisi quod additum decoctum
 ex rad. glycyrrh., asparag., herbis millefol.,
 equiseti, virgæ aur., flor. ros. rubr., bellidis
 rubræ, & santalo rubro, nec non pilulæ ex
 extr. balsamicis tonice adstringentibus: exte-
 rius sacculi paregorici in lacte cocti, loco
 affecto admoti; subinde vero dolore furente
 magis ∇ a Sclopetaria, & V camphoratus
 adhibitus. His parum juvantibus romo die
 post sectam in pede venam in brachio Væ So-
 facta, dato insuper 3a quaque hora Æ e tem-
 per. leniter camphorato, eo cum successu, ut
 altero mox die urina & purior, & facilius
 pro-

prodierit, & post paucos dies hæmorrhoides ex ano leviter fluxerint, morbumque fere penitus abegerint; nisi quod subinde urinæ adhuc crassæ, & cum sedimento farinaceo, cumque aliqua molestia fluere: sed & hæc ver adveniens sustulit. Abhinc Væ Ses quovis æquinoctio factæ, & hæmorrhoides promptius fluxere, non modo trimestri spatio, statim fere periodis; sed etiam intermedio tempore a potu largiori. Postquam vero ultra annum varias calamitates, & ærumnas perpeffus est; circa æstivum solstitium 1725 fluxus hæmorrhoidum iterum substitit, eique pedetentim succedere lassitudo, anorexia, anxietates, colicæ, agrypnia, & appetente brumali solstitio dolor ad os sacrum, molestia alvi dejectio, frequensque micturitio, ac paulo post exquisitam dysuriam anno vertente hæmaturia. Ocyus ergo, ob signa manifesta turgescentiæ vasorum hæmorrhoidalium, admotæ ano hirudines modicum sanguinis crassi, & glutinis instar viscidi elicuerunt; at sine levamine: symptomata pergebant, & quotidie post 8am vespertinam febriles motus aborti usque adeo ingravescebant, ut post leve frigus intensus æstus deliria sæpe attulerit, maximamque noctis partem turbarit. Cephalalgia extra accessiones etiam gravis erat, hæmorrhagia narium subinde lenienda. Ad pristina ergo medicamenta reditum, præsertim ad potiones diluentes, temperantes, emulsivas, nitratasque; Væ Se in brachio facta cephalalgia, febris, &c. fere penitus desiere, ac

ac hæmaturia admodum imminuta. Verum nil boni præſagiebant ſanguis eductus viſcidus, ſeculentus, lividisque maculis notatus, pulſus celer, ac durus vel in ipſa euphoria, & extenuatio corporis. Et vero poſt 3 dierum inducias omnia rursus ſymptomata rediere; ſub aſſidua fere miſturitione urina non jam cruenta; ſed intenſe rubra inter ſummos cruciatus guttatim prodibat, ſedimentum ponens craſſum, pituiroſum. Febre in dies aucta ſupervenit inflammatio veſicæ, die 6 Febr. 1726 anno ætatis 55 letalis. Quantum vero ad hirudines attinet: F. HOFEMANNUS (a) iis omnino hic diffidit „ſanguifugæ. . . „fugiantur (inquiens); quoniam majorem humorum ad affecta loca affluxum concitant.“ Alii vero ad ſanguinem a vaſis veſicæ ad hæmorrhoidalia ani derivandum, ſi jam antequam diutius illac hæmorrhoides fluere conſueverant; nil hirudinibus efficacius arbitrantur, ac proinde præter pedis phlebotomiam has quoque ano admoveri jubent: „quæ operatio, „inquit DETHARDING (b), repeti poterit, „quando abhinc imminutus mucoſitatis fluxus, „& ſymptomatum obſervatur mitigatio. Præſentaneam efficaciam ſubductione hac ſanguinis particulari, prævia Væ Se in brachio, „ſe aliquando vidiffe retulit . . . in ægroto a „ſup-

(a) Conſult. . & reſp. med. Cent. 2, Caſu 88.

(b) L. c. p. 789.

„suppressis hæmorrhoidibus cœcis, mucosis
 „vesicæ correpto, utpote qui ab iterata post
 „mensis spatium hirudinum admotione junctis
 remediis internis perfecte convaluit.“ Con-
 firmantur hæc etiam ab experientia I. L.
 SCHMUCKERI (a).

§. XXIV.

2. ENEMATA quoque sua hic utilitate
 multiplici non carent; namque alvum obstru-
 ctam reserant, vasa intestini recti ad suscipi-
 endum a vasis vesicæ sanguinem relaxant, &
 ad hæmorrhoidalem fluxum revocandum ap-
 tant, dolores denique, spasmusque vesicæ
 mitigant, & lotii excretionem faciilitant. Non
 abs re autem illa Væ Soi præmitti vult DE-
 THARDING (b).

§. XXV.

3. TOPICA porro vel maxime pubi ap-
 plicari hocce in morbo solent, eaque pro va-
 rio illius statu perinde varia, videlicet: emol-
 lientia, & anodyna in vesicæ spasmo, dolo-
 re, ischuria, dysuria, &c. Roborantia vero,
 &

(a) Vide Tom. III. §. 115. Nro. 3.

(b) L. c.

& adstringentia in fine morbi ad tonum vasis relaxatis restaurandum, quo scopo **ÆLIGMANN** (a) haud immerito commendat fomenta frigida, vel si spasmus vesicæ, ac tenesmus adfuerit; ex fermento panis acidi, vino rubro, & aromatibus parata. Huc pertinet ingeniosa **I. QUARIN** (b) hæmorrhoides vesicæ ad ani vasa revocandi ratio: „monachus . . . sæpe hæmorrhoidum fluxu absque incommodo laborans, cum æstuante syrio iter institueret, vinumque largius biberet; repente mictu cruento afficiebatur, qui & infessibus auctus, & variis pharmacis datis exasperatus est. Demum æger meam opem imploravit. Huic præcepi, ut sellæ pertusæ, quæ ligneo operculo concavo tecta erat, ita insideret, ut vapor aquæ calidæ suppositus per foramen tenue in operculo ligneo apertum, anoque respondens eo tantum perduceretur. Una jussi lintea aquæ glaciali immersa regioni pubis applicari. Quo factò cum post biduum mictus sanguinis sileret, & vasa hæmorrhoidalia intumescerent; his lanceola apertis integra sanitas rediit.“

§. XXVI.

(a) Diff. cit. l. c. §. 12. p. 27.

(b) Animadvers. pract. in divers. morb. Cap. 13. p. 268. sq.

§. XXVI.

4. CATHETER denique interdum in hæmorrhoidibus vesicæ superest adhibendus, cuius applicationem exigunt ut plurimum.

a) *Ischuria* a grumis, polypisve orificio vesicæ impactis (quos catheter retrudit, dividit) velut in GABECHOVERI (a) ægro; aut vasis tumidissimis in vesicæ collo, aut varicibus ibidem turgentibus (quas catheter rumpit) enata. Sic I. VAN DER HAAR (b) „ali-
 „quando mihi (ait) memorabilis accidit ca-
 „sus, ut dum viro cuidam ex ischuria ægro
 „lotium cathetere educere vellem, sanguis
 „ex isto tanto cum impetu effluxerit, ut co-
 „actus fuero illum rursus educere prius,
 „quam in vesicam penetrarit; mox post hanc
 „hæmorrhagiam sponte superflua lotii vis eru-
 „pit. Hinc suspicor non abs re, hæmorrhoi-
 „dalem varicem vesicæ in collo cathetere fu-
 „isse perruptam; quod etiam post parciore
 „hæmorrhagias, quæ subinde in ischuriis
 „post irritas catheteris applicationes seque-
 „bantur, res hæc pene æque feliciter evenie-
 „rit, sæpius ipse vidi.“

b) In-

(a) Vide §. 18. B. Nro. 1.

(b) L. c.; p. 52. sq.

b) Injections faciendæ in vesicam, dum aut grumofus sanguis, mucusve lentior diluendus; & attenuandus est, quas P. G. WERLHOFFIUS (a) tum utiles esse agnoscit; aut spasmus, doloresque vesicæ demulcentibus, & anodynis leniendi, aut amissus vasorum tonus reparandus, quam in rem optime aqua frigida sola adhibetur (b).

C A P U T III.

P H A R M A C A.

§. XXVII.

I. **C**ATHARTICA eccoprotica in utrisque vesicæ hæmorrhoidibus duplicem habent utilitatem; primum enim alvum ut plurimum obstructam referant, apertamque tenent, tum etiam humores a vesicâ revellunt, atque ad intestini recti vasa invitant. Quemadmodum vero in toto hæmorrhoidali morbo; ita vel maxime in vesicæ hæmorrhoidibus cavenda sunt cathartica acriora, ne vesicæ spasmus augeant. Quid quod hic vel \ominus sedlicensis,

aut

(a) Apud C. C. ENGEL. l. c. p. 129.

(b) SELIGMANN. l. c.

aut Anglicanus quandoque obfuerit teste DETHARDING (a)? Proinde manna, rheum, tamarindi, fenna hic optima sunt, quæis tamen utilissime sæpe aloë jungitur ad sanguinem versus anum alliciendum: „imprimis multiplici „experientia, inquit DETHARDING (b), pilulæ sic dictæ balsamicæ ex extractis amaris „& aloë gummofa paratæ ita se commendant, ut in quibuscunque fere anomaliis „hæmorrhoidalibus non sine fructu adhiberi „soleant; non tantum enim gaudent virtute „alvum movendi; verum & tonum roborant, „& vasis, fibrisque relaxatis robur debitum „conciliant. Sicubi pilulæ non arriserint; hæ „solvi possunt liquore ∇ æ fol. \square ri, eoque „ipso virtus aperitiva magis acuabitur.“ Confirmat hæc historia REINESII (c): Pastor quidam ob hæmorrhoidum a triennio suppressionem magnam sanguinis crassi meri, sine urinarum aquis, cum impetu promanantis quantitatem (matulam enim implevit) minxit; qui tamen per totam vitam suam nihil sanguinis vel e venis, vel ex habitu amiserat; atque eundem paroxysmum ter statò circuitu fuerat expertus: copiam sanguinis uno tantum mictionis actu secedentis proximè secuta

(a) L. c. Schol. ad §. 10. Nro. 2. p. 793.

(b) Ibidem Schol. ad §. 8. p. 789.

(c) Epist. 44.

tæ fuerunt urinæ naturales, & limpidaë. Postquam autem medici consilio vino usus fuerat solito largius, & diebus aliquot continuis pilulis ex aloe, succo cichorii imprægnata, & extr. troch. alhandal. sumserat; hæmorrhoides ei fluxerunt..

§. XXVIII.

1. SOLVENTIA mitia, de quibus alibi (a) satis actum, perinde hic ex usu sunt, præsertim ∇ a Selterana cum lacte; aliis minus hic fidendum, ne diuretico suo stimulo spasmus vesicæ exasperent. WERLHOF (b) consultus pro sene hæmaturiam hæmorrhoidalem patiente inter cetera, quæ hic usu probata proprio noverat „aquarum Selteranarum „(inquit) quovis mane mensuram unam; po- „meridie vero, & vesperi Æ em balsamicum „ex lacte Æ ris, qui alvum servat apertam, „per dies 14 vel pro euphoria dari suaserim „ . . . Ad alvum, ubi opus videbitur, ape- „riendam idem . . . lac Æ ris egregium, & „in hæmorrhoidariorum morbis singulare est, „urinam etiam promovens magis, quam mi- „nuens, quod alia alvum cientia sæpe faci- „unt. Dari potest sub noctem ad 3ß. vel j. „cx

(a) Vide Tom. II. §. 66. sqq.

(b) L. c. p. 128.

„ex emulsione seminis melonum, vel simili.
 „Et ita quoque ad levandam dysuriam con-
 „fert.“

§. XXIX.

3. ANTISPASMODICA, *anodyna* ad spas-
 mum, doloresque vesicæ sopiendos sint licet
 quam maxime necessaria; tamen summo cum
 delectu, & cautione sunt exhibenda: caven-
 da nempe et stimulantiora, & vel maxime
 opium, quod non sine summa atrocium do-
 lorum, vires ægri frangentium, & aliis re-
 mediis non leniendorum mitigandi necessitate
 est exhibendum, nec sine interpolatis ecco-
 proticis, nec diutius etiam, quam sævior do-
 lor urserit, porrigendum; secus sopiti do-
 res dein atrocius recrudescent, imo a pro-
 tracto ejus usu, ut recte DETHAADING (a)
 monet, alvi segnities, ischuria, coma, pa-
 ralyfes &c. sunt metuenda. Nihilo tamen mi-
 nus, P. G. WERLHOF (β) pro BECKERI (b)
 ægro consultus ad spasmos, ac dolores miti-
 gandos „tuo (respondet BECKERO) judicio
 „permitto, an non ex re fore videatur con-
 „tinuatus 3a, 4a, 6a, 8a, 12a, quavis pro
 „re

(a) L. c. Schol. ad §. 10. No. 2. p. 794.

(β) L. c. p. 134. sq.

(b) Vide §. 17.

„re nata hora usus medicinæ . . . ad guttas
 „pro dosi 20:

R. Liqu. anod. min. HOFFM. ʒß.
 Essent. anod. ʒj. M.

„Continuandam suaserim non solum, donec
 „aliquod persentiat lenimen; sed ad pleni-
 „orem usque dolorum, stimuli molesti, fla-
 „tulentiaequē cessationem: & tunc quidem ra-
 „tiores sensim doses dari possent, multipli-
 „cando denuo; si symptomata rursum urgere
 „videntur. Novi senem jam octuagenarium,
 „qui ex calculo vesicæ similia omnia patitur,
 „vel potius passus antehac est, donec eo-
 „dem remedio familiariter uti antè hoc sexen-
 „nium cœpit, idem, quoties dolores ingru-
 „unt, fausto cum successu repetens. Si al-
 „vus sub ejusdem usu tardior justo sit; vel
 „omisso per diem unum opio sponte solve-
 „tur, vel lacti sulphuris, aut blando enemati
 „facile cedit.“

§. XXX.

4. TONICA denique, ubi copia liquidi
 vasa vesicæ distendentis imminuta, & alior-
 sum aversa est, usurpanda veniunt, ut vasa
 laxiora reddita pristinum recuperent robur,
 ac recidiva prævertatur. Præcipua hic sunt:

a)

a) *Mars*, vel quod DETHARDING (a) præfert, pilulæ balsamicæ cum limatura ♂ conjunctæ, iis præsertim salubres, qui alvo segni aut obstructa laborant.

b) *Millefolium*, quod in spasms hæmorrhoidalibus, & hæmorrhagiis compescendis virtute sua duplici, nimirum antispasmodica, ac tonica simul (b) est celeberrimum.

c) *Peruvianus cortex*, cujus TRam cum TRa succi catechu mistam SELIGMANN (c) magni hic facit. WERLHOF (d) autem vel maxime commendat extractum corticis in Ω Θ dulci solutum: haustæ nempe in 14 dies ∇ æ Selteranæ subjungi jubet „postea remedium blande diureticum, & tonicum, solutionem extracti Cort. Peruv. in spiritu salis „dulci factam per octiduum, & facta deinde „unius hebdomadis intercapedine per alterum „octiduum, & rursus semper alternis hebdomadibus ad 3am, & 4am usque vicem. Quater quotidie ejus medicamenti 60 guttas derim (ait), hora ante jentaculum, & ante prandium, bihorio post hæc, & ante noctem,

(a) L. c. Schol. ad §. 8. p. 791.

(b) Vide Tom. II. §. 84.

(c) L. c. §. 12. p. 26.

(d) L. c. p. 128. sq.

„Item, vitro probe prius agitato. Hac medicina curatus haud pridem est verbi divini „minister septuagenario major, ex eodem plane „affectu his 6 mensibus bene valens, ab „ctu cruento, & dysuria immunis.

d) *Uva ursi* in roborandis urophori systematis fibris remedium celebratæ efficaciamereretur, ut in mucosis præcipue hæmorrhoidibus vesicæ periculum illius medici faciant.

CAPUT IV.

D I A E T A.

§. XXXI.

I. **A**LIMENTA sunt medicamentis secundum indolem analogia; hinc non dyspepta, nec acria, diuretica, flatulenta, fibras laxantia nimis, nec sanguinem accendentia; sed blanda, eupepta, aperientia, alvumque apertam servantia.

§. XXXII.

2. **AFFECTUS** *animi* vehementes recidivam celerrime causant, præsertim ira, terror, moeror,

mœror, notante DETHARDINGIO (a). Ira enim sanguinis motum accelerat, illumque rarefacit, vasa distendit: hinc facilis hæmaturia, vel mucosi infarctus. Terror autem spasmos creat, resuscitat sopitos. Mœror denique lentorem sanguini inducit.

§. XXXIII.

3. AER porro siccus esto, non humidus, iste namque solida relaxat, & perspirationem immittit: unde materia perspirabilis renes petens, indeque vesicam, morbum semper foveret. Contrarium autem facit aer siccus, præsertim calidus insuper.

§. XXXIV.

4. MOTUS corporis moderatus, & æqualis faciendus ad prima usque sudoris indicia; cavendus vero omnis succussorius pelveos, ac natium: hinc vitanda equitatio, vectio rheda per vias lapidosas, foveisque inæquales, quod HOFFMANNUS (b) ægro cuidam dissuasit.

§.

(a) L. c. Schol. ad §. 10. p. 791.

(b) Vide §. 18. B. Nro. 4.

§. XXXV.

5. VENUS denique hic nocentissima cane
pejus, & angue vitanda monente DETHAR-
DINGIO (a); præterquam enim quod succus-
sorium plerumque corporis motum supponat;
humores finiul ad vasa organorum in pelvi
locatorum, proinde vesicæ etiam copiose,
impetuoseque allicit: hinc recidiva facillima.

(a) L. c.

E R R A T A.

pag.	lin.	Errores	lege
3	24	Fleuts	Fleurs
33	2	consequitur ,	consequitur
—	17	SILVATHO	SILVATICO
57	19	conf.	conf.
66	16	diffuria	dysuria
78	14	qua	quam in
81	16	DIURETICA	DIURETICA,
83	12	♂lum	♂lem
89	21	innumeris ,	innumeris ;
93	14	aperiens album	aperiens , alvum
102	10	unde sexaginta	un-de sexaginta
111	1	prætium	pretium
120	23	Væ Se	Væ So
130	28	lychontriptica	lithontriptica
131	21	⊙lis	⊙li.
135	23	bimestri	bimestre
140	14	abhinc	abhinc annis
165	ult.	desiere	desiere
172	4	pilulis	pilulas.

